



# Veeartsenij-recepten


<https://hdl.handle.net/1874/235800>

UB-ZUID

**ODA**

**5065**

mm 12992



BIBLIOTHEEK UNIVERSITEIT UTRECHT



2911 123 8

1. f. C 505

C 21

# VEEARTSENIJ-RECEPTEN

DA 5065

*geschenken door:* Drs. D. FRIELING

Plataanstraat 7

6-10-1989

DOOR

8266 BH KAMPEN

Tel. 06202 - 18880

J.<sup>on</sup> BRUIN,

*Gemeente-Veearts te Oldebroek.*

Bibliotheek der  
Rijksuniversiteit te Utrecht  
Afd. Diergeneeskunde



GEDRUKT TE KAMPEN,  
BIJ  
G. PH. ZALSMAN.  
- 1837.

SNELPERSDRUK VAN G. PH. ZALSMAN TE KAMPEN.


Op verzoek van vele Veehouders om eenige van mijn Recepten, die ik als practicus veearts, vele jaren met goed gevolg heb toegediend, voel ik mij gedrongen, uit liefde voor den veestapel, vóór ik vertrek naar America, aan hun verzoek te voldoen, om het in druk te geven. Ik heb de recepten in 't Hollandsch geschreven, alsmede het gewicht in grammen vermeld, bijvoorbeeld een ons heeft 100 gram, een lood 10 gram.

**J. BRUIJN.**

*Gemeentelijk-Veearts.*

OLDEBROEK, 20 Juni 1887.





## *Inwendig voor Koeien.*

### **No. 1. Verstopping met opgeblazenheid der maag.**

|                |           |
|----------------|-----------|
| Wonderzout     | 150 Gram. |
| Gentiaan       | 100 »     |
| Fenkelzaad     | 100 »     |
| Braakwijnsteen | 10 »      |

Te zamen tot poeder, 2 maal daags 3 op hoop vol eetlepels met  $\frac{1}{2}$  flesch warm water in te geven.

De koe goed gedekt, vermijden van aardappelen of knolgewas te geven, nog minder warm of verbroeid gras of groen. Het middel zoo noodig kan herhaald worden.

---

### **2. Bij zeer sterke opgeblazenheid met weeke mest.**

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Zuiveringzout (Bicarb. Natr.) | 120 Gram.    |
| Pepermuntolie                 | 40 Droppels. |
| Fenkelolie                    | 60 »         |
| Gentiaan                      | 120 Gram.    |

Te zamen tot 4 poeders. Om de 8 of 12 uur één, met  $\frac{1}{2}$  flesch koud water in te geven.

**3. Indien de koe dun is, weinig eetlust, minder melk, goede mest en tusschenbeiden koud is.**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Spiritus aromaticus | 90 Gram. |
| Pepermentwater      | 260 „    |

gemengd.

Om de 12 uur  $\frac{1}{2}$  gedeelte in te geven met  $\frac{1}{2}$  fl. warme zoete melk of water. Recept 1 en 2 kan ook met goed gevolg gebruikt worden, indien de mest niet te week is.

**4. Bij sterke verstopping.**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Wondersout        | 300 Gram. |
| Aloë van de beste | 30 „      |
| Gemberpoeder      | 15 „      |

De poeder om de 12 uur  $\frac{1}{3}$  in te geven met een flesch koud lijnmeelwater.

**5. Melkvuur of melkziekte.**

Bij groote fijne melkgevers komt deze ziekte veel voor, ofschoon ik nimmer beesten behandeld heb van het eerste en tweede kalf, maar van het derde en verdere jaren honderden, en altijd binnen de 48 uur na het kalveren; daarom is het raadzaam de koe in dien tijd weinig drinken te geven en niet vooraf te melken, daar anders de koe, voor of onder het kalve-

ren de ziekte alreeds kan krijgen. Indien men na het kalveren in het opgegeven tijdperk bespeurt dat de koe koud wordt en de melk vermindert, haalt men haar van den stal en zet haar goed gedekt in 't stroo. Dan duurt het niet lang of de koe valt en kan moeielijk of niet weêr opkomen; indien zij blijft liggen, zorg dan dat het beest niet te vlak ligt, daar anders door wind de buik wordt opgezet. Om de 6 uur omleggen en melken; vooral geen mest afhalen eer de koe weer aan de beterende hand is, want in de ziekte doet de mest voor den enteldarm groote diensten. Maar speedig het volgende middel voorzichtig in te geven:

2 flesschen best Bier,

$\frac{1}{2}$  flesch Water,

$1\frac{1}{2}$  ons Anijszaad.

Te zamen laten koken, het aftreksel in 2 keer om het uur in te geven.

Vier á vijf uur later de volgende poeder:

|            |           |
|------------|-----------|
| Wonderzout | 200 Gram. |
|------------|-----------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Valeriaan | 100 » |
|-----------|-------|

|          |      |
|----------|------|
| Angelica | 60 » |
|----------|------|

|             |      |
|-------------|------|
| Louribessen | 50 » |
|-------------|------|

Te zamen 5 minuten laten koken op  $2\frac{1}{2}$  flesch water, na het koken bij te voegen  $\frac{1}{2}$  pond stroop. Om de 4 uur  $\frac{1}{2}$  flesch koud in te geven, — en geen medicijn meer toe te dienen, — maar zorg, als de koe weer eetlust krijgt, of drinken wil hebben, niet te veel.

Mogt het blijken, na verloop van 3 á 4 of 5 dagen, dat de mest hard of te weinig komt en de melk vertraagd blijft, geeft haar dan het volgende recept in :

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Aloë, van de beste, | 20 Gram. |
| Wonderzout          | 80 »     |
| Gemberpoeder        | 5 »      |

Te zamen in eens met koud Lijnmeelwater in te geven. — Kan herhaald worden.

Rug en lenden met de volgende smeer :

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Geest van Ammoniac | 90 Gram. |
| Terpetijnnolie     | 30 »     |
| Raapolie           | 60 »     |

gemengd, om de 6 uur smeeren, maar goed in te wrijven.

## **6. Tot voorbehoed tegen het melkvuur**

heb ik met goed gevolg het volgende toegediend :

- 2 ons Anijszaad,
- ruim een halve flesch water,
- 2 flesschen zoete melk.

Te zamen laten koken, aftreksel pl. m. 24 uur voor het kalveren warm in te geven ; dit middel kan geen kwaad te herhalen na het kalveren. Aderlating 8 dagen voor het kalveren mag ik niet afraden.

## 7. Achterblijven van de nageboorte of kort vuil.

|               |          |
|---------------|----------|
| Zeeschuim     | 50 Gram. |
| Zevenboom     | 50 »     |
| Borax         | 50 »     |
| Terpetijnolie | 5 »      |

Te zamen tot 3 poeders. Om de 12 uur een in te geven, met een flesch lijnmeelwater; van tijd tot tijd de koe wat keukenzout te geven is sterk aan te bevelen; ook voor ander vee is het niet te verachten, want ik heb voorbeelden meer dan één ondervonden, dat een koe door gebrek aan zout zoo vermagerd was, dat de boer hem verliet voor f 18 en maar f 12 kon krijgen. Mijn hulp bij een ander ziek beest werd ingeroepen, en toen ik mijn aandacht er op vestigde, vond ik de oorzaak in het eten van alle vuile voorwerpen, en schreef de volgende poeder voor als:

## 8. Lekziekte genaamd.

|              |           |
|--------------|-----------|
| Alsemknoppen | 150 Gram. |
| Gentiaan     | 100 »     |
| Krijtwit     | 100 »     |
| Keukenzout   | 100 »     |

gemengd,

daarvan 2 maal daags een hand vol met een flesch koud water ingegeven, na zulks 3 pakken gebruikt te hebben, bedankte de koe voor alle vuile voorwer-

pen, en de boer verkocht haar het volgende jaar voor f 180.

---

### **9. Nawceën, werken of persen na het kalveren.**

Heulsap. (Laudum lig. Sydenh.) 10 Gram, 60 Droppels, 3 maal daags, met een flesch aftreksel van een handvol kamillen.

Poeder van Valerian van ieder 100 Gram.  
gemengd.

Recept No. 7 mag in zulke gevallen niet ingegeven worden.

---

### **10. Voor gestrikte baarmoeders der koeien.**

Indien de koe kalven moet en niet kan, daar de koe niet ontsloten is, heb ik gevallen gehad, dat ik gehaald werd en bevond dat de koe zwaar perste; het gier (uier) niet vol en de banden vast waren. In zulke gevallen, dat door vooraf gedaan onderzoek, de koe nog is gesloten, is het raadzaam de koe krampstillende middelen in te geven, als:

Een aftreksels van kamillen, een flesch met 30 droppels Heulsap. (Laud. liq. Sydk.)

Zoolang de koe perst om de 8 uur te herhalen. In de meeste gevallen raakt het persen spoedig over en men krijgt binnen of met de acht dagen

goed en wel een levend kalf. Maar zijn erteekens, namenlijk, het ujer vol, banden gedeeltelijk weg, bloedig slijm, en men overtuigd is, dat het kalf geen verkeerde ligging heeft, maar werkelijk de koe gestrikt is, geve men haar in, als:

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| 11. Poeder van Zeeschuim | 60 Gram. |
| Witte Zeep               | 80 »     |

geschraapt,

in 2 flesschen zoete melk, warm en de zeep gesmolten zijnde, geve men het de koe in eens te samen warm in, dekt het beest warm onder en wachte 24 uur, eer men er meer aan doet; mocht het kalf komen, grijpt het dan maar bij de beenen.

## 12. Tot aanvoer der melk, indien de mest niet week is.

|                |           |
|----------------|-----------|
| Salpeter       | 150 Gram. |
| Valeriaan      | 120 »     |
| Zevenboom      | 50 »      |
| Braakwijnsteen | 10 »      |

tot 6 poeders; 2 maal daags een poeder met  $\frac{1}{2}$  flesch warm water in te geven. Indien het ujer gezwollen is, kan men het van tijd tot tijd geheel insmeeren met warm rijstenmeel en azijn, of met karnmelk en roggemeel. Telkenmale melken is aan te bevelen.



### 13. Bij weeke mest en aanvoer der melk.

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Pepermuntwater      | 300 Gram. |
| Spiritus aromaticus | 80 »      |

gemengd,

2 maal daags  $\frac{1}{4}$  gedeelte met een flesch warme zoete melk in te geven.

---

### 14. Het hoesten met korte adem, steunen en harde mest, minder melk.

|                |           |
|----------------|-----------|
| Salpeter       | 180 Gram. |
| Ammon. zout    | 30 »      |
| Fenkelzaad     | 100 »     |
| Braakwijnsteen | 20 »      |

Tot 6 poeders 2 maal daags één, met  $\frac{1}{2}$  flesch of meer lijnzaadwater in te geven.

---

### 15. Bij een dikke verharde tong uitwendig.

|               |           |
|---------------|-----------|
| Loodwit       | 250 Gram. |
| Goudglid      | 50 »      |
| Varkensreusel | 150 »     |

gemengd,

2 maal daags uitwendig onder het strottenhoofd en kaken, dik in te smeerē, de koe goed gedekt en den hals niet te vergeten; is de smeer te hard,

laat het dan op de plaat of vuur iets smelten; vooral volhouden en de koe geneest. Inwendig in den mond met wat honing, doet goede diensten.

---

## 16. Bloed wateren.

In 't vaassen, oogen, gier, mond, alles een wit-geele kleur of het dier dood is, melk weg idem geel; dek de koe vooral het voorste gedeelte, en leg op de lenden minstens om het half uur een uitgewrongen natte koude lap en geeft inwendig om de vier uur een flesch gaar stijfselwater, maar zoo dun dat het in en uit de flesch wil, met  $\frac{1}{2}$  lepel krijtwit. Volhouden en de koe zal genezen.

---

## 17. Miltvuur.

Indien een koe spoedig sterft, is het raadzaam voor een onkundige haar op een goeden afstand van het huis en ander vee, met huid en alles, diep te begraven. Tevens moet er aangifte gedaan worden bij den Burgemeester. Weest op uwe hoede voor uw ander vee en geeft dan als een goed beproefd huismiddel, al zijn zij oogenschijnlijk gezond, het volgende middel, iedere koe.

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Beste Azijn | $\frac{1}{4}$ flesch. |
| Buskruit    | 2 lepels.             |
| Eijeren     | 2                     |

Te zamen goed geschud, en om de 12 uur 3 á 4

maal iedere koe dezelfde hoeveelheid in te geven; jonger vee iets minder. Zet alle nwe beesten een wrangwortel en zuiver zoo spoedig mogelijk alle voorwerpen die met het dier in aanraking zijn geweest met chloorkalk, opgelost in water, dan zult gij voor groote rampen bewaard blijven; voor mensch en beest hoogst besmettelijk.

**18.****Tongblaar.**

Zuiveringszout

440 Gram.

Fenkelolie

10 "

goed te zamen gewreven tot 10 poeders, 2 maal daags iedere koe een poeder, met een flesch koud water in te geven. na het ingeven zal de koe beter eten, men behoudt het grootste gedeelte en goede melk en behoedt haar voor het klauwzeer. Het middel kan bij eenige beesten herhaald worden.

**19.****Klauwzeer.**

Aluin.

Rijstemeel.

Azijn.

Te zamen tot een pap, 2 maal daags in een zakje om de klauwen te verbinden.

**20. Zeere speenen of peppen.**

|            |          |
|------------|----------|
| Lood Azijn | 1 deel   |
| Zoete Olie | 2 deelen |

Te zamen

na het melken goed in te smeeren.

---

**21. Gezwollen beenen.**

Gedurig wasschen met Klei of Modder en Azijn.

---

**22. Gezwollen spronggewrichten.**

Als No. 21, of met Brandewijn en Groene Zeep.

---

**23. Gestooten of gehouwen wonden.**

Bij veel zwelling eenige malen daags wasschen met Rijstemeel en Azijn, daarna, als de outsteking weg is, wasschen met sterk Groenezeepwater.

---

**24. Persloop, dun als vuil water.**

Dit is een gevaarlijke ziekte, die de koe binnen acht dagen doet sterven, wanneer er geen goede gepaste middelen worden aangewend; het darmslim soms met bloed vermengd en ier doch zonder mest, koningshoofd of boekenpens blijft de mest vast zit-

ten. Zulk beest 4 à 5 of 6 flesschen afkooksel van Lijnzaad per dag. Warm lijmig drinken als lijn-meel enz., warm in 't stroo en toegedekt, de melk gaat geheel weg. Volhouden met ingeven tot de mest weer natuurlijk is en de melk vermeerdert; 2 maal daags kan men bij iedere flesch een lepel Azijn voegen.

---

## **25.           Weeke dunne mest.**

2 maal daags  $\frac{1}{3}$  gedeelte van een halve flesch Rum, 2 Eijeren en warme zoete Melk; te zamen een flesch, jonger vee wat minder, volhouden tot het dier hersteld is.

---

## **26.           Overgeven of braken.**

Het komt meer dan eens voor dat de koeien, na het eten het voeder weder uitspuwen. Wel overtuigd zijnde dat er geen voorwerp in de keel zit, geve men het de volgende middelen, als :

|              |           |
|--------------|-----------|
| Alsemknoppen | 150 Gram. |
| Gentiaan     | 100 »     |
| Alandswortel | 100 »     |
| Aloë         | 30 »      |
| Keukenzout   | 1 »       |

Te zamen tot poeder, 2 maal daags drie lepels met koud water in te geven.

---

**27. Moelelijk boter karnen.**

Braakwijnsteen 20 Gram, tot 3 poedertjes, iedere koe om den anderen dag een poedertje, gesmolten met een theekopje kokend water. Te zamen met een flesch koud water in te geven, de 3 poedertjes zijn voor een koe, zoo noodig kan herhaald worden.

---

**28. Luizen.**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Witten Nieswortel | 50 Gram. |
| Tabak             | 50 »     |

Te zamen op 4 kop water koken. Wasschen met een borstel waar de diertjes zitten.

---

**Schurft of deegmuil.**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Bruinsteen       | 100 Gram              |
| Bloem van Zwavel | 50 »                  |
| Varkensreusel    | 500 »                 |
| of Raapolie      | $\frac{1}{2}$ Flesch. |

Te zamen eenmaal daags de schurftplekken in te wrijven, voor schapen op den neus en om den mond goed gesmeerd, geneest spoedig en is niet vergiftig.

---

**29. Kreupelheid van het schouderblad, rug of kruis.**

|         |          |
|---------|----------|
| Campher | 25 Gram. |
|---------|----------|

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Brandewijn           | 350 Gram (halve fl.) |
| Witte of Groene Zeep | 60 »                 |
| Cajeputolie          | 30 »                 |

Gemengd,

2 maal daags smeeren.

---

### 30. Idem voor kreupelheid.

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Geest van Ammoniac | 60 Gram. |
| Terpentijnolie     | 30 »     |
| Spijkolie          | 30 »     |
| Raapolie           | 100 »    |

Gemengd,

2 maal daags smeeren.

Deze smeersels mogen niet aangewend worden indien het lijdende deel te warm is. Dan eerst smeeren met klei, modder of rijstemeel met veel azijn, tot de ontsteking weg is.

---

## *Voor Paarden.*

### **No. 1. Voor den droes met zwelling onder de keel.**

Poeder van Calmuswortel.

» » Fenkelzaad.

Bloem van Zwavel.

Spiesglans. Van ieder 100 Gram.

Te zamen tot poeder, 2 maal daags 2 lepels over het voeder, of met stroop of honing in te geven. Geeft het paard slobbering van Gerstemeel en Weite zemelen. Zet het in een tochtvrijen stal en toegedekt. De klieren 2 maal daags in te smeeren met varkensreuzel; indien zij hard blijven, pappen met warm Lijnmeel en Water of Karnmelk tot zij goed door zijn, is aan te bevelen.

---

### **2. Voor hoesten.**

|                |           |
|----------------|-----------|
| Salpeter       | 150 Gram. |
| Braakwijnsteen | 12 »      |
| Belladonwortel | 10 »      |
| Zoethout       | 240 »     |

Te zamen tot poeder, 3 maal daags een lepel over het voeder, of met Honing, Stroop of Boter in te geven.

---



### 3. Voor bevangenheid.

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Salpeter                  | 150 Gram. |
| Campher                   | 10 »      |
| Duivelsdrek               | 15 »      |
| Vollekruidwortel (arnica) | 75 »      |

Tot poeder, 2 maal daags 2 lepels, met ruim een halve flesch warm water. Aderlating en dragt is noodig, den voorhoeven de ijzers afnemen en zetten die hoeven in zakjes met rijstemeel en azijn, of modder en azijn, tevens warm toedekken.

---

### 4. De netelroos, belroos.

Over de huid komen een aantal knobbels, de een grooter en de ander kleiner.

Geeft het paard het recept No. 1.

Goed toegedekt en zoo noodig een dragt voor in de borst en aderlating.

---

### 5. Voor bulkpijn uit gevatte koude.

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Spiritus aromaticus        | 70 Gram.     |
| Fenkelolie                 | 40 Droppels. |
| Heulsap (Laud. liq. Sydh.) | 2 Gram.      |

gemengd,

om het uur of 2 uur  $\frac{1}{3}$  gedeelte met warme zoete melk in te geven.

---

**6. Idem voor buikpijn.**

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Anijszaad | 2 Ons, (200 Gram.) |
|-----------|--------------------|

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Zoete melk | 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Flesch. |
|------------|---------------------------------------|

Te zamen laten koken, afkooksel warm om het uur de helft in te geven, met een stuk boter. — Dit recept niet vergeten.

---

**7. Idem voor buikpijn.**

|     |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| Rum | 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Flesch. |
|-----|---------------------------------------|

<sup>1</sup>/<sub>3</sub> gedeelte in te geven met een flesch warme zoete melk. Zoo noodig om het uur te herhalen.

---

**8. Verstopping, koliek.**

|            |           |
|------------|-----------|
| Wonderzout | 200 Gram. |
|------------|-----------|

|            |      |
|------------|------|
| Fenkelzaad | 75 » |
|------------|------|

|          |      |
|----------|------|
| Gentiaan | 50 » |
|----------|------|

Tot poeder om de 3 uur de helft in te geven met een flesch warm water.

Het paard rond laten stappen is raadzaam. Het middel, zoo noodig, kan herhaald worden.

---

**9. Idem voor verstoppingen windkoliek.**

|               |           |
|---------------|-----------|
| Zuiveringzout | 160 Gram. |
|---------------|-----------|

|          |      |
|----------|------|
| Gentiaan | 80 » |
|----------|------|

|            |              |
|------------|--------------|
| Fenkelolie | 60 Droppels. |
|------------|--------------|

Te zamen tot 4 poeders. Om de 2 uur een in te geven met  $\frac{1}{2}$  flesch lauw water.

---

## 10.                    **Bloed pissen.**

Men kan dezelfde behandeling toedienen als recept 16 dat voor de koeien is voorgeschreven.

---

## 11.                    **Bij plotselinge verlamming**

Dadelijk een aderlating. Lenden en kruis koud houden met Klei, Modder en Azijn, tot de hitte geheel over is, want in de meeste gevallen ontstaat de ziekte door volbloedigheid of vergiftiging en ook wel door kort zwenken.

|                |           |
|----------------|-----------|
| Salpeter       | 120 Gram. |
| Valeriaan      | 80    »   |
| Braakwijnsteen | 5    »    |
| Stroop         | 500    »  |

Te zamen.

Dit recept moet in 24 uur bij tussenpozen ingegeven worden. Het recept kan herhaald worden, Verkoelende lavamenten op de maag aangewend worden. Als het paard niet den 4en dag niet weer staat, laat het dan, als het niet dood is, maar afmaken.

---

**12. Bij weeke dunne mest.**

Gebruik No. 25 totdat het beter is, met droog voeder, als voor de Runderen is voorgeschreven.

---

**13. Neusbloeding.**

Een gevaarlijke ziekte bij paarden en runderen. Deze ontstaat gewoonlijk door springen, hard loopen, zwaar trekken enz.

Met goed gevolg heb ik meer dan eens een huis-middel toegediend, als:

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Beste Azijn | $\frac{1}{2}$ Flesch. |
| Eijeren     | 6 Stuks.              |

Te zamen goed geschud. Om de 12 uur  $\frac{1}{3}$  gedeelte in te geven. Houdt het dier rustig op stal.

---

**14. Voor gallen.**

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Ammoniakgeest liq               | 50 Gram. |
| Tincturen van Spaansche Vliegen | 2 »      |
| Raapolie                        | 60 »     |

Te zamen in een goed gestopt fleschje eenmaal of om den anderen dag eukel de gal goed insmeeren.

---

**15. Zwelling en pijn in de pezen.**

Indien de pezen warm en gezwollen zijn moeten

dere gewassen worden met koud water, beter nog een windsel om het heen, van de knie tot aan de koot of kogel, niet te stijf, en gestadig met koud water nat houden. Is de zwelling met 3 à 4 dagen niet geheel weg, dan smeeren met de volgende zalf:

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Kwikzalf               | 100 Gram. |
| Lauriolie              | 90 »      |
| Geest van Ammoniac liq | 3 »       |
| Spijkolie              | 5 »       |

gemengd.

Te zamen eenmaal daags smeeren en vooral het windsel er om houden.

## 16. Mok, boven en onder het koot-gewricht.

2 of 3 dagen goed afwasschen met warm zeepwater, de lange haren wegnippen en vervolgens smeeren met:

|                |          |
|----------------|----------|
| Blauw Vitriool | 20 Gram. |
| Aluin          | 15 »     |

Opgelost in  $\frac{1}{2}$  flesch kokend water, bij te voegen  $\frac{1}{4}$  flesch azijn, eenmaal daags in te smeeren.

## 17. Idem bij mok onder vetlok

|            |           |
|------------|-----------|
| Lood Azijn | 1 Deel.   |
| Raapolie   | 2 Deelen. |

Te zamen 2 maal daags smeer en om de 3 dagen afwasschen met zeepwater.

---

## **18 Drooge oploopende mok of schurft.**

Achter en voorbeenen, als hier en daar over het geheele lichaam haarloze plekken, heb ik nog nooit beter middel aangewend, dan :

|          |               |
|----------|---------------|
| Azijn    | 1 Flesch.     |
| Baskruit | 2 of 3 Lepel. |

Te zamen 1 of 2 maal daags de plaatsen, waar zulks noodig is te wasschen. Ziet tevens of het paard ook luizen heeft. Zoo ja, wascht het dan eerst met het recept No. 28, dat aan de koeien is voorgeschreven. Denk er vooral aan dat er geen kippenhok boven of bij den paardenstal is, want die luizen zijn nog veel lastiger.

Recept No. 1, dat voor de paarden is voorgeschreven, kunt gij inwendig voor de ziekte gebruiken.

---

## **19. Geschaafd of doorgetr**

Lood Azijn

Regenwater

2 of 3 maal daags de wond of wasschen. Indien de wond met een hard korst bedekt is, kan men gebruik maken van Recept No. 1. 2 maal daags van tijd tot

sehen. Met zeepwater is een zuiveringsmiddel voor alle wonden.

---

**20.**

### **Rotstraalen.**

Recept No. 16 is aan te bevelen of sterk kalkwater.

aal

---

### **21. Voor gezwollen spronggewrichten of bloeten.**

Nat houden met Klei en Azijn is aan te bevelen, of smeeren met:

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Sterke Brandewijn    | $\frac{1}{2}$ Flesch. |
| Campher              | 20 Gram.              |
| Witte of Groene zeep | 50 "                  |

Te zamen 2 maal daags wasschen of smeeren.

---

**22.**

### **Spat.**

200 Gram.

30 "

20 "

Gemengd.

twee maal daags smeeren.

---