



Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de Verloskunde ...

<https://hdl.handle.net/1874/288773>

STELLINGEN.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

ST. BERNARD'S



20

STELLINGEN

TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD

VAN

Doctor in de Verloskunde,

AAN DE HOOGESCHOOL TE UTRECHT,

NA MAGTIGING VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS

Mr. J. A. FRUIN,

GEWOON HOOGLEERAAR IN DE RECHTSGELEERDE FACULTEIT,

MET TOESTEMMING VAN DEN ACADEMISCHEN SENAAAT

EN

VOLGENS BESLUIT DER GENEESKUNDIGE FACULTEIT,

DOOR


JOHANNES JACOBUS MAATS,

Geboren te Schagersbrug,

MED. DOCTOR,

TE VERDEDIGEN

op Woensdag den 20sten December 1865, des namiddags ten 6 $\frac{1}{2}$ ure.



UTRECHT.

A. VAN DORSTEN, Jr.

1865.

ST. LOUIS, MO.

THE UNIVERSITY OF MISSOURI

LIBRARY

OF THE STATE OF MISSOURI

ST. LOUIS, MO.

THE UNIVERSITY OF MISSOURI

LIBRARY

OF THE STATE OF MISSOURI

ST. LOUIS, MO.

THE UNIVERSITY OF MISSOURI

LIBRARY

OF THE STATE OF MISSOURI

ST. LOUIS, MO.




THE UNIVERSITY OF MISSOURI

LIBRARY

OF THE STATE OF MISSOURI

ST. LOUIS, MO.

STELLINGEN.



I.

Er is geen bezwaar, hoegenaamd, gedurende de zwangerschap tegen syphilitische verschijnselen antisymphilitische middelen aan te wenden.

II.

Ten onregte beweren sommigen, dat men bij vrouwen, die voor de eerste maal zwanger zijn, geene kunstmatige vroeggeboorte mag opwekken.

III.

Eene syphilitische moeder moet zelf haar kind zogen.

IV.

De auscultatie is het zekerste middel, om zwangerschap te herkennen.

V.

Eijerstok-zwangerschap bestaat niet.

VI.

Het goede effect van compressie der aorta bij bloeding na de verlossing is toe te schrijven aan gelijktijdig plaatshebbende prikkeling der baarmoeder.

VII.

Wanneer bij keizersnede het hoofd niet met de hand uit de baarmoeder kan worden verwijderd, is het beter, de wond te vergrooten dan de forceps te gebruiken.

VIII.

Bij anaemie na bloeding mag men geene excitantia gebruiken.

IX.

Bij bil-ligging is bijna altijd kunsthulp noodig.

X.

Zit eene placenta, met zeer dunnen rand, vast aan de baarmoeder, dan is tot hare verwijdering de methode van Monjon zeer aan te bevelen.

XI.

Een rhachitisch-vernaauwd bekken laat eene gunstigere prognose toe dan andere ver-naauwingen.

XII.

Een scheef-vernaauwd bekken is bijna altijd aangeboren.

19 156 25


8

XIII.

Het gebruik van den forceps bij bil-ligging
is af te raden.

XIV.

Tot het opwekken van kunstmatige vroeg-
geboorte verdient de methode van Cohen
de voorkeur boven alle andere.



XV