



Fragmenta de viribus medicamentorum positivis sive in sano corpo humano observatis

<https://hdl.handle.net/1874/14701>

0. 8. 2925

F R A G M E N T A

D E

V I R I B U S

M E D I C A M E N T O R U M

P O S I T I V I S

S I V E I N S A N O C O R P O R E H U M A N O

O B S E R V A T I S

A

S A M U E L E H A H N E M A N N M. D.

P A R S P R I M A.
T E X T U S.

L I P S I A E,
S U M T U J O A N. A M B R O S. B A R T H I I

1 8 0 5.



RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT



0345 9504

P R A E F A T I O.

Quae corpus mere nutriunt, *Ali-
menta*, quae vero sanum hominis
statum (vel parva quantitate ingesta)
in aegrotum — ideoque et aegrotum
in sanum — mutare valent, *Medica-
menta* appellantur.

Instrumentorum artis suae habere
notitiam quam maxime perfectam, pri-
mum artificis est officium, medici ve-
ro esse, nemo, proh dolor, putat.

Quid enim medicamina *per se* efficiant, id est, quid in sano corpore mutent, perscrutari, ut inde pateat, quibus in universum morbis convenient, nemo hucdum medicorum, quantum scio, curavit.

Vires Medicaminum, dum iis in morborum conflictu utimur, non quae ipsae per se sint apparent, sed morbi symptomatis transformatae — phaenomena mixtae prorsus naturae et complicatae, quae parempiricos reddunt medicos, dum iis nituntur, et parum ad artem veram exercendam conferunt. Has *relativas* nominare liceat vires.

Equidem vero satius duxi, medicamenta nulla aegroto corpori adhibere, nisi ea, quorum vires in sano corpore (*absolutas* vel *positivas* vocare libet) perspectas antea haberem et, si modo licuit, perspectissimas et

exploratas. Experimenta maxima quidem ex parte in me ipso, partim vero et in aliis cepi, quos noveram sannissimos et a morbo aperto alienissimos.

Medicamenta simplicia vires edunt in corpus sanum sibi unumquodque proprias, non tamen omnes simul vel in una et constanti serie, aut cunctas in singulis hominibus, sed hodie forsan has, illas cras, hanc primam in Cajo, illam tertiam in Titio, ita tamen ut et Titio aliquando usu veniat, quod Cajus inde sensit heri.

Medicina quaevis alias vires citius edit, alias serius, quae ambae sibi utcumque oppositae sunt et dispare, immo e diametro oppositae; illas vires *primarias* vel *primi ordinis* runcupo, has *secundarias* vel *secundi ordinis*.

Habet enim in justa dosi unaquaeque medicina tempus sibi proprium et fere definitum agendi in corpus humanum, brevius, longius, quo transacto omnia a medicamine profecta symptomata una exspirant.

Quarum itaque medicinarum effectus pro natura ipsarum brevi decurrit spatio, horum vires primariae intra paucas horas apparent et disparent, post illas secundariae apparent, et non minus cito disparent. Hora vero ipsissima, qua vis quaelibet sese exserere soleat, constanter determinari nequit, partim ob naturam hominis diversam, partim ob dosum differentiam.

Quod majusculis typis expressum est symptoma, crebrius observavi, rarius vero quod minoribus literis excusum est.

Uncinis () inclusa dubitanter profero, utpote non nisi semel a me ob-

servata, nec in casu satis integro, claro. Interdum veracitas hominis non satis probata hos uncinos addidit, vel si homo ingenii paululum hebetis erat, vel dietae aliqua vitia commiserat.

Medicamina aliquot observavi, quorum operationis curriculum duobus, tribus vel pluribus paroxysmis constat, ambas vires et primarias et secundarias complectentibus, illas quidem, ut in universum dixi, primo loco, has vero secundo loco procedentes.

Nonnunquam et tertii cujusdam ordinis vires observasse mihi visus sum.

Quae *reliquias* nominavi symptoma, ea non occurunt nisi, ubi enormis dosis enormes susscitavit tumultus, tumque diutius justo aliquae, vel primae classis vires vel secundariae remanent, hae vel illae, ut fert cujuslibet hominis natura, vel in hanc morbositatem vel in illam potissimum prona.

Per mediocres vel parvas doses fere non nisi primi ordinis vires in conspectum veniunt, secundi ordinis minus. Illas in primis curavi utpote ad artem medicam exercendam maxime aptas et scitu dignissimas.

Quatenus observare mihi datum est, veritati litavi scrupulosissime, religiosissime. Ut amur his qualibuscumque; nemo me melius novit, quam manca sint et tenuia.

Adjeci ad calcem cuiuslibet medicaminis ea, quae scriptores medicinae de positivis medicamentorum viribus quasi aliud agendo adnotarunt.

Pars secunda indicem complectetur.

H

ACONITUM NAPELLUS. L. (succus
herbae totius in sole inspissatus.)

*V*is*) 16 ut plurimum horas durat, in minimis do-
sibus 8 horis absolvitur.

frigiditas totius corporis.

frigus totius corporis cum fronte calida, au-
riculis calidis et calore interno sicco.

Rigiditas frigida totius corporis, oculis apertis
horridis, rigidis, gena altera rubra,
calida, altera frigida pallida, cum
pupillis angustis, parum et lente di-
latabilibus.

horrescentia, metus frigoris **).

brachiorum frigus, stupor,

vertigo, titubationis in cerebro hinc inde pen-
dantis sensus.

aviditas lucis ***).

muscae volitantes in visu.

sensus adstrictorius in faucibus quasi ab austre-
ris.

*) Per totum operationis hujus plantae curriculum vires
primi ordinis et subsequae secundi ordinis paroxysmis
brevibus repetunt, bis, ter, quater, antequam effectus
totus exspiret.

**) Aliquando post tertiam horam observavi.

***) An etiam Musices? sic nūhi videbatur semel.

sensus adstrictorius in ventriculo quasi ab austoris.

sensus in linguae radice, piperis modo titillans, cum salivae affectione.

punctus in faucibus quasi a setis e fructibus cynosbati *).

propensio in offenditionem summa } **).

5 *propensio in terrorum summa* }

angor et morositas cum punctione in pectoris latere; tum pulsatio in scrobiculo; tum capitinis dolor pressorius.

tremor, propensio in palpitationem cordis, intolerantia strepitus maxima ***).

rixae cum mania scurrili alternantes a hora ad horam — fabulae aniles, animus nimis hilaris.

10 opprobriatio †).

articulationum omnium (ligamentorum eorum?) instabilitas ‡‡).

veneris appetentia imminuta.

genuum instabilitas; status, gressus vacillans.

syncope.

15 paralysis volatica ani, sedes involuntariae.

paralysis volatica vesicae urinariae, mictus involuntarius.

paralysis volatica linguae.

asthenia in femoris capite inter eundum, sive impossibilitas incedendi ob dolorem innominabilem, intolerabilem, fere

*) Intra primam horam observatum.

**) Intra primam horam observatum.

***) Intra primam horam observatum.

†) Etiam quarta hora observatum.

‡‡) Etiam quarta, sexta hora observatum.

quasi a contritione, vehementiae nunc majoris, nunc minoris, in femoris capite, post decubitum et somnum natu-^{ta} *).

asthenia in cruribus et femoribus paralytica post sessum.

memoria debilis **).

moeror.

timor ne vacillet.

meticulositas, ne mali quid sibi accidat. 5
angor inconsolabilis et ejulatus miserabilis, op-
probiis plenus, ob mala et incom-
moda (parva) ***).

DE MORTE PRAESENTANEA TIMOR ET QUERELAE ****).

angor moribundi †).

decubitus.

propensio in decubitum pertinax. } ††).

somnolentia, somnus †††).

capitis dolor supra orbitam in maxillam superiorem tendens, lancinans, vomituriens, seu ejusmodi ut a vomitorii oriri solet, quadantenus pressorius ††††).

capitis dolor pressorio lancinans, vomituriens, supra orbitam in maxillam superiorem tendens,

A 2

*) Post quintam horam observatum.

**) Etiam intra quintam et nonam horam observatum.

***) Post quintam horam observatum.

****) A secunda ad duodecimam usque horam observatum.

†) In sexta aliquando hora etiam observatum.

††) Etiam intra secundam et quintam horam observatum,

†††) Etiam secunda hora observatum,

††††) Post secundam horam observatum.

capitis dolor obnubilans quasi a crapula, in temporibus pressorius.

capitis dolor, quasi oculi e capite casuri essent.

capitis dolor, quasi cerebrum foras ex-primeretur.

capitis dolor, quasi cerebri pars modo hic, modo illic tollatur, motu parvo et loquela et potu excitandus, augendus.

5 capitis dolor lancinganti pulsatorius, ut ab ulcere interno, per accessus loqui impediens.

capitis dolor hinc inde minutim pulsatorius.

capitis dolor pulsatorius in fronte sinistro, in fronte dextro ictibus fortibus per accessus **).

sensus crepitans ***) in temporibus, naso, fronte. proctalgia †).

10 lancingatio et pressio in ano.

dolor pressorius, qui gravitatem mentitur, in ventriculo.

dolor pressorius, qui gravitatem mentitur, in hypochondriis.

dolor pressorio tensivus, quasi a pondere et plenitudine in ventriculo, hypochondriis †††).

DOLOR CONSTRICTORIUS IN PECTORE.

15 dolor pressorio coarctans in pectoris latere.

*) Intra semihoram observatum.

**) Post tres horas observatum.

***) Sensus soni quasi ab aurichalci laminis motitatis.

†) Prima hora observatum.

††) Post sesquihoram observatum.

†††) Post semihoram observatum.

dolor pressorio tensivus in pectore, in sternone.

dolor articulationis ossis sacri cum lumborum vertebris quasi a confractione.

dolor vertebrarum lumborum tensivo pressorius, vel quasi a confractione, cum torminibus colico-flatuosis connexus. tormina colica, quasi a flatibus, pressorio tensiva.

tormina flatuosa in ima parte abdominis, quasi a purgantibus flatuosis.

borborygini fermentantes quasi.

*sedes moliores, parvae, tenesmodae *).*

vomituriens nausea primo in scrobiculo, tum sub sterno, denique in fauces sine salivae concitatione.

*vomituriens nausea, quasi ab esu nauseosi cuiusdam vel pinguis, vel dulcis **).*

ructuum molimina frustranea.

sapor satius, piscosus, quasi aquae mucidae, in putrescentiam inclinantis.

anima foetida.

sedes albæ.

excrementa alba, urina rubra.

diarrhoea aquosa.

dolor pressorius in regione hepatis, respirationem coarctans, postea statim tormina (forficantia?) in regione supra umbilicum.

icterus.

angor respirationem intercipiens, cum sudore frontis calido.

* Tres, quinque per diem; interdum inter reliquias observatum.

** Hora prima observatum.

asthma cum exspiratione valida, sonora.

dolor in serobiculo pressorius, in angustiam pectoris transiens *).

serobiculi dolor, quasi interne tumidum esset, cum anorexia et respiratione, per accessus, brevi.

respiratio per nares intercepta, maxime intersomnum.

pavor concussorius, agitatio, blateratio in somno.

dolor in dorso a nucha ad os sacrum usque quasi a contusione **).

dolor rheumaticus in nucha, colli motu tantum percipiendus ***).

dolor in osse cubiti strictorio lancinans, motu excitandus.

dolor in testiculo simplex, sive is, qui post conquassationem remanet †).

lancinatio et forficatio in glande penis durante mictu.

dolor vesicae inter eundum. }
tenesmus vesicae colli. } ‡‡).

micturitio anxia †††).

micturitio post tactum abdominis.

hypogastrium post tactum dolorifice sensibile.
inter eundum dolores in lumbis quasi ad partum, tumque

dolor lancinans in latere dextro et animus flexibiliter querulus,

*) Versus tertiam horam observatum.

**) Ante quartam horam observatum.

***) Etiam intra quintam et nonam horam observatum,

†) Secunda hora observatum.

††) Quarta etiam hora observatum.

†††) Quarta hora observatum.

ardor in umbilicali regione.
 ardor et punctus in pectore.
 ardor et punctus in faucibus.
dolor formicans in digitis.
dolor formicans in genis.
dolor formicans in gula.
dolor formicans in pectore.
 dolor formicans in pectore, quasi a scarabaeis
 reptantibus.
 dolor formicans in spina dorsi, quasi a scara-
 baeis reptantibus.
 cutis formicatio, pruritus, desquamatio (ma-
 xime in parte pridem affecta).
tussicula.
 tussis sanguinea.
epistaxis *).
 catarrhi, coryzae symptomata **).
 haemorrhoides fluens.
 Menorrhagia.
 ophthalmia valde dolorifica, chemosis.
 siccitas palpebrarum superiorum quasi presso-
 ria ***).
 caloris sensus primo in manibus, dein in teto
 corpore, in pectore adeo, sine ca-
 lore sensibili externo †).
 paroxysmi alternantes ‡‡): modo inter gena-
 rum ruborem scurrilitas, caloris sen-
 sus universalis et capititis dolor inter
 movendum oculos sursum et ad latus,

*) Intra quartam et nonam horam observatum.

**) Etiam ab octava ad decimam sextam usque horam ob-
servatum.

***) Quinta hora observatum.

†) Quarta hora observatum.

‡‡) Tertia, quarta, sexta hora observati.

modo inter genarum ruborem et calorem capitis horripilatio per totum corpus,
cum sapore integro,

modo inter genarum ruborem horripilatio et lacrymatio cum cephalalgia pressoria,

modo inter genarum ruborem reluctantia pertinax, ardor circa umbilicum et pressorius in capite dolor,

sudor cum horrore febrili *).

§ Sudor lenis universalis.

volae manus frigido humidae.

(oedema frontis, faciei).

sensus quasi a convalescentia e morbo gravi **),
lucis odium ***),

¶ somnus levior.

(lac in nutricibus auctum.)

animus fortis, constans, nec hilaris †).

animus irae capax,

pertinacia,

¶ visus acutus.

memoria viva.

imaginatio viva.

cogitationes altae, meditatio alta,

pupillae dilatatae,

¶ agrypnia ‡‡).

ardor in vesicae collo extra mictum.

maculae puliceae in manibus, facie etc.

*) Post tertiam fere horam observatum.

**) Etiam post horam duodecimam observatum.

***) Post duodecimam horam observatum.

†) Horis post octavam,

‡‡ Aliquando jam quarta hora observavi.

nausea diurna, appetitus prostratus.
ductuum salivalium quasi excoriatio.
languor.
intestinorum debilitas, qualis a laxan-
tium abusu evenire solet.
sudor languidus.

*) Haec symptomata nonnisi tamquam *reliquias* observa-
vi, inter doses majores, post 15 et 16 horas.

[OBSERVATA ALIORUM.]

CLAUD. RICHARD. ap. SCHENK lib. VII. obs. 136.
(a drachma pulveris in adulto.)

Angustia pectoris.

dolor stomachi.

oculorum obtenebratio vertiginosa, pulsu im-
mutato.

mortis praesentaneae metus.

cum anxietate vomitus.

post vomitum statim spes erecta.

dolor posterioris capitis partis et colli.

delirium, ineptiae *).

delirio evanido, dolores stomachi, capitis,
maxillarum, pectoris, et modo unius,
modo alterius juncturae.

omnes juncturae dolent **).

ventris tumor, quasi hydropicus esset.

praecordia duro et doloroso tumore tensa.

punctio in renibus cum suppressione urinae.

brachium alterum et crus paralyticum.

pulsus febriculosus, saepe interceptus.

inter vomitum aliquoties repetitum et sedes, ta-
men querela perpetua quasi de lapi-
de frigido in ventriculo.

*) v. c. Cantus in folio lacero.

**) Elapsis septem horis.

ophthalmia lippitudinosa, adeo dolorifica et
horrida, ut mori potius cuperet *).

MATTHIOLUS, Comment.in Diosc.lib.IV.Cap.73.
(in adulto.)

De universi corporis lassitudine, imbecillitate
magna et cordis gravedine quere-
lae **).

inter audacem loqueland et vividis oculis frons
sudore frigido madida, et pulsus fe-
re deletus ***).

Idem, ibidem.
(a drachma in adulto.)

A pipere quasi sapor.
vomitus †) bilis viridis.

sensus quasi a globo circa umbilicum, superna
petente, inque vertice et occipite au-
ram quandam frigidam diffundente.
stupor paralysi similis in brachio et crure sinis-
tro, ita ut vix manum summam mo-
vere possit.

ex sinistro latere, brevi a paralysi liberato, pa-
ralysis subito in dextrum latus migrat.

Sensus, quasi venae omnes frigescerent.
vertigines.

dolor capitis ardens, quasi cerebrum ab aqua
bulliente commoveretur.

oris convulsio.

*) Symptoma omnia conquevere hora octava clapsa.

**) Post tres horas.

***) Quae sequuntur deleteria symptomata, omisi, utpote
magis ab antidoto quodam ignoto, hic propinato, acer-
timo, quam ab aconito profecta.

†) Post horam primam.

oculorum convulsio.

maxillarum acutissimus dolor, quasi excidere
vellent.

oculi turgentes.

livida facies, labia nigra.

5 ventris tumor, quasi hydropticus.

vicissitudines mentis perturbationum contraria-
rum.

modo de vita desperatio, modo spes erecta.

modo rationis compos, modo delirans.

modo ploranti similis, modo cantans.

10 appetentia aquae frigidae.

occoecatio reiterata, loquela integra.

agon per vices repetens *).

VINCENT BACON, philos. transact. Vol. 38.

No. 432. p. 287.

In lingua et maxillis ardoris sensus et formica-
tio, ita ut dentes vacillare videren-
tur **).

sensus quasi a tumore magno in genis.

15 formicationis et ardoris sensus totum corpus
sensim occupans, maxime brachia et
erura.

debilitas magna juncturarum, maxime genuum
et malleolorum, cum vulsione in ten-
dinibus, ita ut vix incedere posset.

sensus, quasi sanguinis cursus in extremitatibus
interceptus esset.

ab emesi artificiali symptomata pejora.

vertigo.

20 Caligo in visu.

*) Post septimam horam symptomata evanida.

**) Statim post esum aconiti in acetario.

oculi distorti.

aurium continuus surdus sonus et susurrus, lipothymia subsequa.

capitis gravitas.

virium defectus.

nitus in decubitum.

pulsus duo, tres, citi; asphyxia, idem tempus durante, subsequa.

quiete jacet, sed friget et horret et stragulis multis operiri gestit.

calor lenis cum sudore modico.

somnus tranquillus *).

RÖDDER, in ALBERTI Jurispr. med. Tom. 6. p. 724.
(externe succus in vulnere.)

Dolores digitii et brachii.

cardialgiae.

anxietates cum metu suffocationis.

lipothymia.

calor magnus cum siti.

tumor partis, et gangraena, suppuratione insigni subsequa.

MORAEUS in K. Vet. Ac. Handl. 1739. p. 41.
Insania brevis.

vomitus cum siti molesta subsequa.

sapor fatalis **).

ANTON STOERCK, lib. de Stram. Hyos. et Acon.
Viennae 1762. p. 71, 74, 80, 91, 96, 110.

In lingua ardor diu inhaerens.

*) Horarum quatror ad quinque.

**) Relictis post mortem maculis lividis circa collum, dorsum et hinc inde in reliquo corpore.

momentanei, vagi, lancinantes dolores in lingua cum salivae affluxu.

mador et sudor corporis totius.

pruritus in corpore, maxime circa pudenda,
pustulae rubicundae, acri humore repletæ.

, purgatio.

leucorrhœa copiosa, tenax, flavescens.

pustulae latae, rubrae, pruriētes per totum
corpus.

lotii copiosius profluvium.

EBERH. GMELIN, Nov. Act. N. C. Vol. 6. p. 394.

10 Prostratio virium insignis.

ACRIS TINCTURA *). (Spiritus vi-
ni cum kali caustico digestus et, ne kali pree-
valeat, tinctura acido acetii saturata.)

*V*is ad 20 et 22 horas usque extenditur,
*angor maximus **).* (Vertigo.)
tremor.
trémor manuum.
rixae ***).
reluctantia.
dolores arthritici in omnibus membris. } +).
dolor arthriticus in maxilla inferiori. } +.
(dolor laceranti lancinans in aure cum susurre
quasi a vento procelloso).
debilitas paralytica in artubus ††).
lapsus virium syncopticus.
artuum convulsiones †††).

*) Quid sit principium causticum, in calce viva et alcali-
bus causticis reperiendum, nondum liquet — esse tamen,
nec a basi alcalica dependere, ex viribus medicatis vehe-
mentibus tincturae acris (acido saturatae) liquet.

**) Plus quam duodecim horas durare vidi.

***) Post quadrantem horae ad sesquihoram usque obser-
vavi.

†) Jam post semihoram incipere vidi.

††) Hora tertia observatum.

†††) An potius *vulsiones uno ictu concussoriae* fuerunt?
ambigo.

pandiculationes *).

pedum frigiditas maxima.

oscitatio.

flatuum eruptio sursum, deorsum.

5 febrile frigus per horam, tumque
calor in fronte.

cephalalgia pulsatoria, pulsus arteriarum in ce-
rebro vehementer dolorosi.

sudor vehemens.

pruritus in cute.

10 eruptiones in cute.

sapor escarum imminutus.

pressio in scrobiculo.

cardialgia.

(raucedo.)

15 asthma convulsivum.

dolor oculorum.

alvus soluta.

agrypnia **).

*) Sexta hora observatum.

**) Non satis mihi constat, an posteriorum symptomatum
quaedam inter reliquias sint referenda.

ARNICA MONTANA L. (Tinctura
spirituosa pulveris radicis, Radicis pulvis.)

Vis durat ad minimum 12, plerumque 16 horas.

Frigus, frigiditas universalis.

frigus maxime vespertinum.

(vertigo).

palpitatio cordis maxima *).

tremor.

capitis perturbatio.

inquietudo.

oculi horridi, anxietatis nuncii.

angor agonizans.

(inspiratio cito, gravis, exspiratio lenta). 10

oscitatio vespertina crebra, sine dormititione.

oscitatio crebra.

languor.

dormitiritio **).

hypochondriaca morositas ad quaevis segnis, 15

adiaphoria erga negotia; indifferentia.

taedet negotiorum, segnis ad negotia.

anxietas hypochondriaca.

spel abjectio.

lacrymatio.

*) Post octavam partem horae observatum.

**) Post semihoram observatum,

morositas summa, taciturna.

morositas primo varia appetens, deinde modo fastidiens.

vomituritio inanis *).

maxillae inferioris paresis.

appetentia aceti.

5 appetentia aeris liberi.

symptomata, maxime capitis perturbatio, angor, vertigo, augentur vomitu artificiali.

dolor pressorius in velo palatino **).

deglutitio strepera.

deglutitio nausea quadam impedita, quasi escae descendere detrectent.

10 *plenitudinis saturo - nausebundae sensus in ventriculo.*

dentes mucaginosi ***).

ructus inanes.

ructus amari, hepatico -- sulphurei †).

regurgitatio aquae salsaæ.

15 *sensus mordax in lingua* ††).

sensus quasi ab excoriatione linguae †††).

cardialgia forficans, convulsiva.

dolor ventriculi, cardialgia.

borborymi, flatus.

20 *flatulentia colicalis.*

colica.

tormina quasi pressio a flatibus.

tormina lacerantia supra umbilicum.

*) Post quadrantem horae observatum.

**) Anginae species?

***) Prima hora observatum.

†) Post secundam horam observatum.

††) Etiam quarta hora observatum.

†††) Quarta hora aliquando observatum.

*termina dysentericā **), *in infimis ossium ilium recessibus ab utraque parte fodientia, nauseabunda, soporifera.*

*nitus in diarrhoeam irritus,
tēnesmus ani.*

(*proctalgia pressoria*).

*dejectiones parvae, crebrae, mere muco-sae **).*

egestiones diarrhoicae, albae.

(*diarrhoea fermenti fusci instar*).

excrementa indigesta, quamvis non fluida.

tenesmus vesicae urinariae, micturitio irrita.

lancinatus in urethra.

10

pruritus seu punctus pruriens in glande penis.

lancinatus singuli in scroto.

fissurae labiorum.

labia sicca, siti torrida.

*sitis sine calore externo, pupillis parum dilatilibus ***).*

*sensus corrugationis in palato, quasi ab aus-
teris †).*

*ardor in faucibus cum caloris interni sensu, seu
potius eo angore, quem calor excita-
re solet, sine calore externo.*

*calor in capite, corpore caeteroquin frigi-
do, saltem non calido.*

*ardor, rubor in gena alterutra, corpore
caeteroquin frigido, saltem non
calido.*

B 2

*) A secunda ad quintam usque horam observatum.

**) Aliquando intra sextam et septimam horam observatum.

*** Prima hora observatum.

†) Hora quinta observatum.

ardor in cerebro, corpore frigido, certe non calido.

capitis cum ardore dolor pressorio distendens.
dolor pressorius in fronte.

post cephalalgiam pressoriam (etiam in temporibus) cephalalgia pulsatorio pressoria.

5 *post cephalalgiam, prima hora exacta, frigus externum et internum et angor continuus.*

dolor in fronte punctoriis, sublatione oculorum auctus, cum faciei calore et siti.

dolor in capite quasi a clavo per tempora transfixo, cum sudore universalis, languore subsequo *).

*dolor punctorio lacerans in temporibus (sinistris), identidem reiterans **).*

(capitis dolor vulsorio lacerans, pronatione et tussi auctus).

10 *formicatio in vertice externe ***).*

dolor pressorius in aure, susurrus aurium †),

narium exulcerationis sensus.

dolor punctorio lacerans in naso.

15 *nasi tumor.*

glandularum tumores.

dentium vacillatio, elongatio, non dolorosa.
(odontalgia, quasi a luxatis (vacillantibus) dentibus, pressorio pulsatoria, quasi a sanguinis turgore extra premerentur,

*) Post aliquot horas, media nocte.

**) Quarta hora observatum.

***) Post primam horam observatum.

†) Non nisi inter reliquias observavi, sed primi ordinis esse vim puto.

tactu tune digitorum doloresiores).

*dolor pressorius in pectore (dextro) parvo
spatio circumscriptus, nee motu,
nec tactu, nec respiratione auctus.*

(in pectore strictrioris dolor cum anxietate).

sensus in pectore sinistro, medio, constrictorius,
respirationem angustans, non doloresificus; scrobiculum tunc, si tangitur,
dolore affectum, respirationem praecludente.

dolor lancinans in pectore sinistro, medio.

dolor in pectoris latere dextro punctorius. 5

dolor punctorio lancinans sub costis ultimis.

dolor lancinans in utrovis latere (pectoris),
cum tussicula dolorem exasperante
et asthmate continuo.

sternutatio *).

tussis siccissima ob pruritum in infima bron-
chiorum sede **).

tussis nocturna inter somnum.

10

haemoptysis.

*tussis emesin creans ***).*

post vagitum tussis in infantibus.

vociferatio tussifera infantum cum morositate
et jactatione †).

reluctatio pertinax ‡).

15

morositas imperiosa ††).

*) Ab interno usq.

**) Quartâ hora observationum.

***) Intra secundam et quartam horam observatum.

†) Intra septimam et octavam horam observatum.

‡) Quarta hora observatum.

††) Post aliquot horas observavi.

(dolor lacerans in brachiis, manibus, et in occipite).

dolor arthriticus in dorso, in artubus,
sensus vulsorius in femore.

(psoadis abscessus).

5 dolor lacerans in artubus inferioribus.
statio dolorosa.

dolor quasi a distortione in carpo, in lumbis (in dorso, pectore).

dolor pressorius in pede *).

formicatio, reptatio in pedibus,

10 ictus singuli in pollice pedis.

lancinatus in pede per pollicem.

lassa artuum gravitas.

dolor omnium articulationum inter movendum (sere paralyticus).

dolor omnium membrorum vibrans, dum
corpus concutitur, v. c. in rheda,
vel dum pes sistitur.

15 hyperaesthesia dolorosa totius corporis,

dolor ingratus, formicatio, pressio in parte
pridem affecta, contusa.

ulcerum pus in ichorem, in serum mutat.

inter somnum terrores, concussions,

excrementorum secessus involuntarius inter
somnum **).

20 appetentia veneris summa ***),

pavor †).

*) Qui tamen paralyticus erat.

**) Non vidi nisi inter reliquias.

***) In effoeto observatum; inter vires secundi ordinis re-
ferri debere videtur.

†) Non observavi, nisi inter reliquias.

[OBSERVATA ALIORUM.]

DE MEZA, Samml. br. Abh. f. pr. Aerzte,
Tom. XIII. 1.

Anxietates.

angustia pectoris.
abdominis dolores anxii.
cephalalgia.
pulsus citus.
nausea, vomituritio.
calor totius corporis.
cardialgia.

A. CRICHTON, Samml. br. Abh. f. pr.
Aerzte, Tom. XIII. 3.

Sensus in cute punctorius.
dolor ingratus in ventriculo.
cardialgia.
soda.
ictus quasi electrici in corpore.

10

COLLIN, obs. circa morbos p. 5.

Anxietas.
spasmus circa praecordia.
concussio quasi electrica.
ardor in epigastrio.
punctus in epigastrio.
intropressio umbilici.
sensus quasi a liquore in medullam spinalem
vi injecto.

15

20

dolores lacerantes in artibus,
tremor,
formicatio, reptatio,
lancinatus in oculis,
ardor in oculis,
ardentes et secantes hinc inde dolores,
sudor,
mictio majoris urinae copiae, quam pota erat,
vomitus.

VICAT, mat. med. I. S. 20 et 562.

Anxietates graves.
sudor pectoris ruber.

dolores lancinantes.

AASKOW, soc. med. hafn. collect. Vol. II,
S. 162.

Vehementes vomituriones,

ATROPA BELLADONNA L. (succus herbae totius solis calore inspissatus).

*V*is per 58 horas ad minimum, per 72 horas ut plurimum durat.

Frigiditas universalis, facie pallida.
horror.

memoria imminuta *).
stupor mentis.

accessus vertiginis cum stupore mentis, aliquots minuta durans **).

obnubilatio capitis cum tumoribus glandularum
in nucha ***).

inebriatio.

(a cibo capto statim inebriatio).

palpebrae diductae, latius apertae,
pupillae dilatatae.

10

diffidentia timida.

timiditas ploratoria †).

lacrymatio, ploratus, ejulatus, sine causa,
maximus, cum meticulositate †).

desipientia meticulosa timens de cane atro, de
patibulo etc. †).

*) Non certo scio, an inter vires primi ordinis sit referendum.

**) Circa decimam horam observatum.

***) Post sex horas observatum.

†) Semel post octavam partem horae, cibarius intra octa-

desipientia, vivo corpore putrescere metuit.
fuga motus, laboris.

abhorrescentia laboris, motus. } *).

rigiditas omnium artuum, sub specie lassitudi-
 nis sensus.

, paresis omnium muscularum, maxime pedum.
 , paresis loquacae organi.

deglutitio impedita.

impotentia deglutiendo non dolorosa.

pulsus minimus, celer.

16 tremor, cum concussione convulsiva.

gravitas crurum tremula **).

cibi appetitus nullus.

potus appetitus nullus, adipsia.

suppressio evacuationum alvi, urinae ***).

agrypnia.

17 agrypnia ob angorem,

angore impeditus somnus.

dormituritio †).

somnum capturi pavor concussorius.

20 horror supra brachia et abdomen, non in ca-
 pite ‡).

pedes frigidì cum facie rubra, tumida, et con-
 gestione sanguinis ad caput.

rubor et calor capitis solius. } †††).

sudor faciei solius. }

vam et duodecimam horam, etiam intra duodecimam
 et vigesimam horam, quamvis rarius, observavi.

*) Post primam horam, et circa quintam horam observa-
 tum.

**) Aliquando circa quartam horam observatum.

***) Ad decem usque horas.

†) Semel vidi post semihoram.

‡) Circa secundam horam observatum.

†††) Aliquando circa primam horam observatum.

cum frigiditate externa ardor internus.
 sudor manuum copiosus frigidus *).
 (motu levi (eundo) excitatus calor corporis).
 singultus ructuosus, spasmus ex ructu et sin-
 gultu compositus.
 propensio in ructus frustranea.
 ructuum molimina irrita,
 nisus vomendi irritus.
 nisus alvum exonerandi irritus.
 sapor nauseosus, lingua pura,
 sapor acidus panis.
 os mucaginosum inter experrectionem e som-
 no, cum dolore capitis pressorio,
 brevi ambo evanida,
 post frustraneum alyum exonerandi molimen,
 vomitus.
 tormina, cum intumescentiae abdominis sensu,
 constrictoria infra umbilicum, per
 accessus invalescentia, quae truncum
 incurvare et inclinare cogunt **).
 dolores subiti, immanes, crampoides, bre-
 ves, in alterutro latere pectoris, ab-
 dominis, immo lumborum, vel et
 cubiti, maxime in somno, partem
 dolorificam inclinare et incurvare
 cogentes ***).
 tormina forficantia, trunco incurvato sedere
 cogentia, cum diarrhoeae molimini-
 bus frustraneis, vomitu subsequente,
 (urina albida).

*) Circa quartam horam observatum.

**) Post quartam horam observatum.

***) Circa octavam, decimam sextam et trigesimam horam
observatum.

*dolores lancinantes in testiculo retracto *).*
excrementa granulato citrina, aliquantum mu-
*cosa **).*

egestiones parvae, celeres, involuntariae.
incontinentia urinae.

5 *(calor pedum et manuum (vespertinus), nec*
tamen crurum aut brachiorum).

pruritus pedum vehementis.

*formicatio a pedibus sursum ***).*

dolor fodiens in plantis pedum, et terebrans †).
(dolor lacerans in tibiae corpore).

10 *tumor pedum vespertinus.*

gravitas crurum strictoria.

(intertrigo).

(salivatio).

excoriatio in buccis, ubi Stenonis ductus finit.

15 *dolor lacerans in fronte, externe.*

dolor lacerans in aure externa et interna
versus inferiora.

dolor lancinans in parotide.

dolor in glandulis terebrans.

dolor capitis pressorius in alterutro hemicra-
nio ††).

20 *dolor capitis, quasi cerebrum foras expri-*
meretur, paulo supra orbitas in
fronte, sublationem oculorum im-
pediens, decubere cogens, pu-
pillas maxime contrahens, dormi-
turiens, vocem submittens ††).

* Aliquando circa duodecimam, decimam octavam, et tri-

gesimam horam observatum.

** Mucosa purulenta?

*** Aliquando circa vigesimam horam observatum.

† Serioribus horis observatum.

†† Aliquando circa quintam, aliquando circa vigesimam

quartam horam observavi.

dolor immanis hinc illinc cerebrum lacinati-
bus obtusis, seu pressoriis permicans.
joci sutiles, scurrilitas *).

dolor lacinians hinc inde sub cuto in latere
dextro, externe quadantenus.
(pressorio lacinians dolor in latere sinistro in-
fra costas).

(strictorius in omnibus membris dolor).
lacerans dolor modo hinc inde in dorso, modo
in brachii inter menstrua **).

(pressorio in pectore et intra scapulas dolor).
catarrhus, seu tussis cum coryza.

tussis valida inter somnum cum stridore den-
tium ***). extensio convulsiva artuum momentanea inter
expergiscendum e somno.

per horam capillorum easus copiosus; }
tum cessans. } †).

capilli antea idioelectrici, nunc minime. }
furunculus in humero.

pustulae parvae in naso, in buccis, in nucha,
in brachio erumpentes, cito puru-
lentae et crusta tectae.

labiorum anguli et nares ulcerata, non pru- 15
rientia, nec dolorifica.

erythema et maculae polymorphae scar-
latinosa (prurientes?) ††).

*) Post minimam dosin circa sextam et octavam horam
observatum.

**) Lacerantes hi dolores cum crampoidis illis, quos su-
pra retuli, vel convenire, vel parum ab iis distare vi-
dentur.

***) Circa horam decimam observatum.

†) Circa horam vigesimam quartam observatum,

††) Circa horam decimam sextam observatum.

- synochus erysipelacea, tumoribus inflammato-
 riis, immo gangraenosis stipata.
 menstrua *).
 pulsus magnus, plenus, rarus.
 furor atrox, laedens **).
 pupilla contracta, aegre dilatabilis.
 appetitus auctus.
 sitis intensa.
 sudor magnus.
 sudor nocturnus, adustionem olens.
 sopor profundissimus.
 spasmus ventriculi in prandio chronicus.
 anorexia chronica.
 tubercula, tumores frigidi, dolorifici,
 chronicci.

* An inter vires secundi ordinis sit referendum, me latet.

**) Trigesima hora observatum.

***) Haec tria inter reliquias observavi.

[OBSERVATA ALIORUM.]

W.T.H.RAU, Act. Nat. Cur. Vol. X.obs.24.

(a baccis in adulto.)

Sensuum privatio *).

calor vehemens.

pulsus celer, inaequalis.

stertor in bronchiis.

respiratio difficultis.

spastici artuum motus.

balbuties linguae.

faucium inflammatio.

5

dementia aliquot septimanarum.

J.F.C.GLIIMM, Act. Nat. Cur. Vol.II.obs.60.

(a baccis in trimula.)

Aversatio ciborum.

10

sitis anxia.

captatio somni frustranea.

vomitus ciborum indigestorum, ante duodecim
horas manducatorum.

convulsiones enormes, epilepsiam mentientes.

insania.

respiratio violenta, parva, crebra. anxia **).
pulsus celerrimus, debilissimus, fere tremens.

*) Post duas horas.

**) Post octodecim horas.

siti ardente et aestu excruiciata potum modo de-
siderat, modo repellit exhibitum.
capilli madore rigent.
vultus rubet tumens, reliquo corpore pallido.
oculi scintillantes, torvi.
corporis sudantis agitatio.
mictus frequens urinae pallidae, tenuis, aquo-
sae, copiosae.
garrulitas incongruorum, mente vehementer
perturbata.
cachinnus.
convulsiones repetitae, spasmi dirissimi, in-
primis flectentium muscularum.
intermissio inter convulsiones, clamoris altissi-
mi plena, dolorum proditoris.

J. G. HASENEST, Act. Nat. Cur. Vol. III.

(a baccis.)

Soporosus affectus.
amentia.
pulsus debilis, tardus.
mutitas.
coecitas.
gestus ridiculi, corpus obviorum palpat, nunc
sedet, nunc circuit caligans, jam lo-
tricis, jam pecuniam numerantis, jam
vero bibentis speciem praese ferens.
trismus.
quasi somnolenta murmurat.
aestus internus, ardor circa ventriculum.
amaurosis *), typis excusa legera non pot-
est.

MAY,

* Ultra tres dies durans.

MAY, harnöv. Mag. 1775. No. 97.

(baccae in infantibus.)

Inebriatio *).

delirium.

sitis molestissima.

nitus vomendi irritus.

furor cum stridore dentium et convulsionibus. 5

pupillae diductae, immobiles.

facies rubra, tunida.

trismus.

deglutitio labefactata.

ventriculi irritabilitas deleta.

sopor profundissimus cum tendinum subsultu,

facie pallida et frigida, manibus fri-

gidis et pulsu duro, parvo, celeri.

MAPPI, plant. alsat. S. 36.

Gangraena universalis.

MARDORF, Diss. de maniacis Giesensi-
bus, Giesae 1691.

(a baccis.)

Subitaneae phlogoses.

somnolentia turbulenta.

titubatio.

oscitatio ebriorum more.

suspiria in tripudium soluta.

furor capillos adstantium diripientis.

J. J. WAGNER, Misc. Nat. Cur. Dec. II.

ann. 10. obs. 108.

(a baccis.)

Virium lapsus.

* Post semihoram.

anxietas magna circa praecordia.
cardialgia.
stupiditas.
aphonia.

3 tormina ventris.
cruciatus diri circa præcordia.
stupor.
convulsiones epilepticae.
apoplecticus status.

10 haemorrhagia oris, et narium.

lethargicus, apoplecticus status, ultra nycthemerum, sine ullo membrorum motu; vellicatus, oculos quidem aperiebat, sed vocem nullam edebat.

J. C. HOYER, Misc. Nat. Cur. Dec. III.
ann. 7, 8. obs. 176.

(a baccis.)

Delirium cum ferocia.
vigiliae aliquot dierum.

J. F. DILLENIUS, Misc. Nat. Cur. dec.
III. an. 7, 8. obs. 161.
(a baccis.)

Profundus somnus.

15 insania, abjectis vestibus, indusio solo velati
in plateas excurrunt gesticulando, tri-
pudiando, cachinnando, et delira-
multa tam blaterando, quam agen-
do.

J. J. MAYER, Commerc. lit. nor. 1731.

(a baccis.)

Caput obtenebratum et inebriatio quasi a vino
nimio, cum tumore et rubore faciei.

calor summus universalis cum delirio.
spuma sanguinolenta ante os *).

BOUCHER, Journ. de med. Vol. XXII,
1766. S. 310.

(a baccis.)

Inquietudo.

delira blateratio.

agitatio continua totius corporis.

spasmi continui oculorum, manuum,

oculi splendidi, pupillis summe dilatatis **).

vultus inquietus.

motus continuus corporis, maxime brachiorum, 10
pulsu integro.

abdomen tumidum, nec tamen durum, nec
dolorosum.

animus abjectus, demissus.

vultus conturbatus.

pulsus exilis, debilis.

motitatio valida hinc illinc, in lecto.

15

mictus involuntarius.

pupillae maxime diletatae.

oculorum bulbi in gyrum spastice moti.

brachiorum et manuum continua intorsio.

C 2

*) Inter mortem.

**) Circiter post viginti horas.

brachia et manus interdum protensa, quasi
aliquid captatura.
mictus involuntarius.

sopor *) cum pulsu exili, debili, inaequali.
mictus involuntarius.

SAUTER, HUFELAND'S Journ. d. pr. Arzn.
Tom. XI. 1. S. 122.

(a rad. granis octo.)

5 Siccitas oris cum siti.

brachii pridem laesi livor, lacinatus, dolor
tensivus **).

faciei tumor intense ruber.

cutis in facie crassa, quasi exanthema eruptu-
rum sit.

totius corporis pruritus, eruptio stigmatum et
macularum rubrarum ***).

10 pupillae dilatatio.

visus objectorum multiplex, scotomicus.

pulsus plenus, fortis †).

enuresis.

mania ferox.

15 vultus atrox, musculi voluntarie et involuntarie
ad furem concitati.

in fugam nisus.

dilacerat obvia, mordet, screat.

modo violenter captat obvia, modo timide se
retrahit.

sudor.

*) Circiter post triginta horas.

**) Post tres horas.

***) Post quatuor horas.

†) Post duodecim horas.

SAUTER, in Hufel. Journ. d. pr. Arzn.
Tom. XI. 1. S. 125.

Sitis aucta.
mentis alienatio.
suffocatoria deglutitio potus.
continuus omnium muscularorum motus.
tumor colli, pectoris. 5
oculi agitati, rubri, splendidi.
pupillae dilatatae *).
pulsus plenior, mollior.
maculae rubrae in facie, collo, pectore (toto
corpore).
sudor universalis **).

ELIAS CAMERARIUS, in obs. et apud WEP-
FER, hist. cicutae.

(a baccis.)

Sitis immanis aquae frigidae ***).
deglutitio aquae difficillima et non nisi in mini-
ma quantitate.
blateratio inconcinna †).
crampus, spasmus ventriculi.
vomitus ††) et statim somnus altus plurium 15
horarum.
expergefactio cum amaurosi.
delirium.
pulsus celer, debilis †††).
abdomen circa costas tensum.

*) Post tres horas cum semisse.

**) Post 6½ horas.

***) Post circiter quatuor horas.

†) Post circiter sex horas.

††) Post circiter septem horas.

†††) Post circiter novem horas.

oculi coeci continuo aperti,
cutis calore ardens.
corpus modo immobile, modo artus motibus
miris flexi.
modo delirat, modo juste respondet et que-
ritur.
modo respirat, modo ultimum halitum exspi-
rasse videtur, vicibus per quadrantem
horae quater alternantibus.

SAUVAGES, Nosol. Tom. II. p. II. S. 338.

Febris.

Inflammatio superficie corporis,

aphonia temporaria.

delirium jucundum.

sopor.

WEINMAN, in GMELIN Giftpfl. S. 296.

Tremor linguae.

risus sardonus.

LOTTINGER, in med. chir. Wahrneh-
mungen Altenb. Tom. II. S. 326.

Siccitas oris, quasi cutis faucium a materia
mordicante et acri degluberetur,

atonia paralytica oris partium,

vacillatio.

urinæ epischesis guttatum prostillantis,

presbyopia,

sapor deletus,

anorexia.

DUMOULIN, in med. chir. Wahrneh-
mungen Tom. II. S. 78.

convulsivi motus extremitatum mites,

vultus torvus.
 cachinnus.
 lacrymae.
 verba atrocia, semiarticulata.
 dilacerandi obvia nisus.
 mordendi adstantes nisus.
 paralysis sphincteris ani, alvi exoneratio involuntaria,
 paralysis sphincteris vesicae urinariae, mictio involuntaria.
 paralysis extremitatum inferiorum.

Med. chir. Wahrnehm. Tom. VII. S. 65.

delirium.
¹⁰
 cachinnus.
 cantus.
 reminiscentia factorum ante triennium gestorum.

de ST. MARTIN, Journ. de Medic. Tom. XVIII. Aout.

Risus sardonius.
 circuitio, circumactio in gyrum.
¹⁵
 convulsiones, contortiones omnium musculorum,
 causus *).
 pulsus minimus intermittens.

SICELIUS, diatribe de Bellad. Jen. 1724.

Inebriatio.
 pituita tenax oris.
²⁰
 dormituritio.
 deglutitio impedita.

* Post duodecim horas.

**de MEZA, Samml. f. pr. Aerzte, Tom.
XIV. St. 3.**

Siccitas oris vix delenda.
vomitus pituitoso biliosus.

R. BUCHAVE, ibid. St. 4.

Siccitas in ore, faucibus, naso per quatuor horas.
indeglutitio ob siccitatem oris, faucium, nisi.
balbuties ebrii instar.
micturitio indesinens.
pulsus plenus, celer.
congestio sanguinis ad caput.
genarum rubor.
vertigo.
stupor mentis.
scotomia a pupillarum dilatatione.

genarum tumor et rubor.
faciei tumor magnus cum calore.
totius corporis tumor cum rubore.
loquacitas quasi a delirio cum oculis fixis. et horridis.
post loquacitatem mutitas.
mentis absentia.
inter somnum sudor.

oculi retorti inter faciei tumorem et ruborem.

exanthema morbillosum.

amentia cum artuum convulsivis motibus.
rubor totius corporis cum pulsu celeri.

rubor et calor magnus genarum.

loquacitas delirans.

post somnum morositas summa, mordet ad-
stantes.

J. B. PORTA, Mag. nat. lib. VIII, 1.

(ab aquae belladonnae uncia.)

Jacuit quatriduo sine cibo et motu, mortui in-
star.

de LAUNAY d'HERMONT, hist. de l'acad.
des sc. 1756.

Respiratio difficillima.

5

deglutitio abolita.

urina suppressa.

febris ardens, causus.

inebriatio.

tremor.

10

HORST, Op. omn. II, S. 488.

Urinae fluxus nimius.

tumor capitis.

delirium continuum.

tremor.

TIB. LAMBERGEN, lectio inaug. sist.
ephem. persanati carcinomatis. Grö-
ning. 1754.

(a foliis.)

Vertigo titubans.

15

siccitas oris.

angor.

cardialgia,

- presbyopia, non nisi literas maiores legere potuit.
 tumor (sine rubore) faciei, maxime labiorum.
 labii ulcus, ruptum.
 bullae aqueae in vola et in tibia ad rupturam pronae.
 5 bullae aqueae serum affatim fundentes, maxime dolorosae, ejulatum exprimentes.
 dolor capitis vehemens.
 menstruum auctum.
 anorexia totalis.
 dolor crurum immanis, pedem extendere cogens.
 10 digiti inflammatio dolorosa, bulla obsessi.
 bullae serosae dolorifcae in sterno.

**WIERUS, de praestigiis daemon. lib. III,
Cap. 17.**

(a baccis.)

- Furor.
 inagnitio parentum,
 animi languor.
 15 corporis languor.
 somnus profundus 24 horarum.
 stupor mentis,

**SAUTER in HUFELAND's Journ. d. pr.
Arzn. Tom. XI. St. 3. S. 126.**

Vesana patrat *), tunicam dilacerat, lapides e terra eruit, quibus obvios feriat.
 in aquam se praecipitem dat.

20 mania ferox **).

*) Post duas horas.

**) Post decem horas.

facies profunde rubra,
pulsus plenus, magnus.
corpus totum tumidum, ardens, rubrum,
blateratio velox rerum insanarum,
lacerat indusia et vestimenta.

accessus symptomatum, inquietudinis, spas-
morum, delirii reiterant circa septi-
mam horam vespertinam.

GREDING in LUDWIGII advers. med. pract.
I, P. 4.

Somnus tranquillus,
oculi inflammati,
ardor in oculis,
pressio in oculo quasi ab arenulis,
enuresis.

sedes virides.

SCHRECK, Commerc. lit. nor. 1745.

Tormina,
furor,
spasmi oculorum.

SCHMUCKER, chirurg. Wahrnehm. II.

Anxietas,
oppressio pectoris.

LENTIN, Beobacht. §1,

Ulcera interna,
febris post quotlibet praebium,

GÖKEL, Fränck. Saml. III.

Inflammatio faucium,

inflammatio ventriculi.
inflammatio duodeni initii.
abdomen tumidum.

MANETTI, Viridar. flor. 1751.

Spasmus ventriculi.
deglutitio abolita.

ALBRECHT, Commerc. lit. nor. 1731.

Ardor in abdomine.
delirium, accessibus reiterans.
inebriatio.

VALENTINI, Misc. Nat. Cur. Dec. II.
ann. 10. obs. 118.

Delirium accessibus reiterans.
furor.
sopor.

CARL, Act. Nat. Cur. Vol. IV. obs. 86.

Cachinnus immanis.
ardor internus.
debilitas magna.

BUCHHOLZ, in Hufel. Journ. d. pr. Arzn.
Tom. V. 1. S. 252.

In visu nebulae ante oculos.
sensus in cerebro quasi ab aqua fluctuante.
literae aureo et azureo colore tremulantes.

MOIBANUS, ap. SCHENCK lib. VII, obs. 164.

Conturbatio mentis ita ut, utrum dormiat,
an vigilet, nesciat.

perturbatio sensuum, in somnum propensi, ut,
quodammodo vigilans, somniare sibi
videatur.

oculis insectorum variae imagines et lemurum
quaedam ludibria obversantur.

in libris lecturus, praeter candidam marginem,
nigris areis literarum circumfusam,
nihil agnoscere potest.

VICAT, plant. venen. de la Suisse S. 181.

Deglutitio difficilis et dolorosa.

sapor salivae incongruus.

raucedo.

aurium susurrus.

insensibilitas.

asthma.

calor ardens externus vel internus.

10

delirium vel per intervalla rediens vel continu-
um, hilare primum, postea pleram-
que in furorem mutatum.

BUCHOZ, apud VICAT, pl. ven. de la Suisse S. 183.

Ebrietas.

delirium.

praecipitatio ab alto.

EHRHARDT, Giftpflanzen X.

Rigiditas totius corporis.

15

CULLEN, Arzneimittellehre, II, S. 307.

Siccitas insignis faucium.

oesophagi constrictio insignis.
haemorrhagia faucium fatalis.

v. WASSERBERG, in Stoll's ratio medendi. P. III. p. 403.

Siccitas in ore, oesophago, naribus, oculis.

EVERS, in SCHMÜCKERS verm. Schr. B. I. p. 185.

Sudor magnus.

enuresis.

menstruatio.

EBERH. GMELIN, Acta Nat. Cur. Vol. VI. App.

(a baccis in viro.)

Inquietudo.

anxietas.

delirium.

¹⁶ floccos carpit, evellit.

horror *).

oscitatio crebra.

de morte instantे timor.

tremor.

¹⁷ vertigo.

electo exsilire tentat **).

Inquietudo, anxietas.

delirium.

straguli tectum projicit.

¹⁸ convulsiones.

sensibus orbus.

suspicio ***).

*) Spiritu vini poto.

**) Pest opii electuarium sumtum.

***) Mors post quatuordecim horas.

LAURUS CAMPHORA L. (*camphorae pulvis et solutio in spiritu vini.*)

*V*is duodecim circiter, ad summum sedecim vel
viginti quatuor horas durat.

Pupillae contractae.

frigiditas universalis maxima.

pallor faciei.

hyperesthesia frigidi aeris.

oculi horridi fixi.

horrescentia, horror cum cute anserina, cute
dolorifice sensibili.

adiaphoria.

sensus aboliti *).

mentis impotentia.

trismus.

caput obstipum et oblique, humerum versus,
revulsum *).

bulbi oculorum sursum versi.

respiratio alta, lenta.

respiratio fere deleta.

akynesia.

spuma ante os. } *).

dyskynesia et lassitudo crurum.

10

15

*) Paucis post ingestam camphoram minutis observavi.

pulsus parvus, durus, lentior, lentiorque.
fragor juncturarum, lumborum, genuum,
 pedum.

palpitatio cordis.
 angor.

5 tremor pedum.

sudor frigidus.

pedum instabilitas tremula.

brachiorum aliquae conyulsivae rotationes.

dormititio.

10 omnia objecta externa odio sunt et morosita-
 tem aversantem causant.

(ejulatus lacrymatorius in loco abdito, dicta
 aliorum tamquam imperata aegre fe-
 rens; animus injuriari et *conviciis la-*
cessiri se putantis).

contentiositas *).

asthma suffocatorium, pressione quadam a
 scrobiculo epigastrico proficiscens **).
 erysipelas ***).

15 dormiturientis et oculos claudentis is phanta-
 siae lusus, quo omnia objecta modo
 justo crassiora et grandiora, modo,
 momento post, graciliora justo esse
 videntur, secundum velocitatem pul-
 sus reiterans †).

dolor ventriculi.

dolor pressorius in scrobiculo, vel in hepatis
 anteriori parte.

dolor constrictorius circa hypochondria ad
 vertebras lumbares usque.

ce-

*) Secunda hora observatum.

**) Prima hora observatum.

***) Extero usui adhibita camphora.

†) Secunda hora observatum.

cephalalgia pressorio lacerans.

cephalalgia pulsatoria.

cephalalgia quasi a contusione, a contritione,
a vulnere.

constrictionis in basi cerebri, maxime occipi-
te et supra nasi radicem dolor indesi-
nens, pedes frigidi manusque, frons
calida, coma vigil, capite in alteru-
trum latus acclinato, cephalalgia pro-
natione magna, decubitu et pressione
externa perquam aucta.

calor in capite et sensus in eo, quasi a sudore,
erupturo cum horrore artuum et ab-
dominis *).

lancinatus singuli vehementes in dextro
hemicranio.

lancinatus singuli vehementes in velo
palatino.

dolor in canto narium anteriori lancinans qua-
si ab exulceratione **).

dentes quasi elongati, odontalgia quasi
cum glandulis submaxillaribus cor-
respondens.

dolor periostei omnium ossium.

dolor rheumatico lancinans in omnibus muscu-
lis, maxime intra scapulas.

pollutionum molimina.

sensatio quasi objecta solito lucidiora et ni-
mis lucida essent †).

pupillae dilatabiliores et magis dilatatae ‡).

*) Tertia hora observatum.

**) Quarta hora observatum.

***) Secunda hora observatum.

†) Hora circiter quinta observatum.

‡) Hora quinta observatum.

consilii praecipitatio.

rubor genarum, auricularum.

*congestiones sanguinis ad caput *).*

calor capitidis, manuum, pedum, sine siti.

5 cephalalgia obtusa supra os frontale, vomititiva.

cephalalgia quasi a constrictione cerebri.

*coma et cephalalgia constrictoria aucta **), calor totius corporis magnus, venae tumidae, respiratio cilissima, sitis nulla, sapor integer, dorsi dolor quasi a contritione.*

pulsus plenus, celer.

sudor calidus frontis et volae manus.

10 sudor universalis calidus.

bronchiorum et arteriae asperae dolor, inter tussiendum maxime, immo et interscram.

stertor in somno in exspiratione et inspiracione.

mictio dolorosa.

ardor urinae.

15 urina rubra.

ischuria, tenesmus vesicae.

radius exilis urinae.

mictio involuntaria post urgentem nisum min-

gendi.

ructus, eructatio contentorum ventriculi.

20 flatulentia.

alyi constipatio.

**) Aliquando hora sexta observatum.*

***) Post quatuor horas.*

(CAMPHORA.)

51

ophthalmiae.
gravedo.
coryza.
dentium vacillatio dolorosa.)

*) Haec post horam decimam ut reliquias observavi; ad secundi certe ordinis vires referenda videntur.

[OBSERVATA ALIORUM.]

CULLEN, Arzneimittel, II. p. 333.

(a 40 granis.)

Pectus concutit et animo delinquitur *).
insensilitas.

pulsus perquam debilis, vix perceptibilis.
respiratio fere evanida.

spallor, frigiditas totius corporis.
somnus cum pulsu et respiratione auctis **).

pulsus lentior ***).

HEBERDEN, med. transact. Vol. I. p. 471.
(a scrupulis duobus in clysmate.)

Dolores quasi ad partum insignes.

(ab usu interno.)
stranguria †).

WHYTT's Works, p. 646.

(a Semidrachma.)

10 Ardor ventriculi.

oculorum caligo.

congestio sanguinis ad caput insignis.

*) Post semihoram.

**) Post tres horas.

***) Decem ictibus.

†) Paulo post euptum bolum camphoratum.

GRIFFIN, Diss. de camphorae viribus.
Edinb.

(a semidrachma.)

Nausea.

vomitus biliosus sanguine tinctus.

pulsus sensim celerior.

(a scrupulis duobus.)

ardor ventriculi.

pulsus pluribus ictibus lentior.

oscitatio et somnus *).

vertigo per intervalla rediens.

ebrietas.

horror levis.

pallor vultus.

ALEXANDER'S experim. essays, p. 227.

(a scrupulo uno **).

Pulsus tribus ictibus imminentus.

(a scrupulis duobus **).

in ore calor ingratus.

pulsus decem ictibus imminentus.

insignis virium lapsus cum oscitatione et pan-
diculatione.

vertigo.

nausea.

memoriae defectus.

sensuum abolitio.

furor cum ore spumante.

convulsiones.

tremor.

sopor.

*) Post tres horas.

**) In semet ipso observata.

pulsus acceleratus*).

tinnitus aurium.

calor cum tremore.

alvi obstructio pertinax.

COLLIN, Observ. circa morbos P. III. p.

148.

, Ebrietas.

vertigo.

spasmi.

Loss, Observ. med. p. 314.

Impotentia virilis.

KOHLHAAS, in Med. Nat. Zeit. 1799.

Oestrus venereus**).

BREYNIUS et PAULINUS apud MURRAY, Appar.

Med. IV. p. 518.

10 Veneris stimulus auctus.

SPOONITZER, in HUFELAND'S Journ. d. pr.

Arzn. V. p. 518, 545.

(ab odoratu.)

Tremor universalis.

(ab externa applicatione.)

pruritus.

erysipelas partis.

92 HUFELAND, Journ. d. pr. Arzn. I. p. 428-

433.

Agitatio anxia cum fletu continuo.

*) Ictibus viginti tribus post tres horas.

**) In vidua.

pulsus plenus, irritatus.
capitis dolor.

pulsus decem ictibus lentior.
delirium.

vomituritiones.
vertigines volaticeae.

pulsus celerior *) vel sine caloris augmento.

FR. HOFFMANN, Consult. et resp. med.
Sect. I. Cas. 19.

(a scrupulis duobus.)

Angor maximus.
sudor capitis frigidus.
coma cum delirio.
pulsus debilis, parvus.
calor magnus **).
pulsus celer.
urina rubra.

GEOFFROY, Matiere med. IV. p. 30.

(a nimia dosi.)

Gravitas capitis.
vigiliae.
dispositio ad inflammationes.

QUARIN, Method. medend. febr, p. 57.

(a majori dosi.)

Pulsus celerrimus.
facies ruberrima.

*) Decem, immo quindecim ictibus — post plures dies.

**) Post aliquot tempus.

oculi torvi, inflammati,
convulsiones.
phrenitis lethalis.

MURRAY, Appar. Med. IV. p. 484.

Sensus caloris in ore et ventriculo,
acceleratio pulsus,
congestio insignis ad caput.
sudor *).

*) Camphora odore.

SOLUTUS IN VINO CONFINIS
aliquotum opus est propter suam pungentiam
et irritatorem, et
autem ipsa etiam tollere.

LYTTA VESICATORIA L. (pulveris tinctura.)

V*is*

Micturitio.

lotium guttatum destillans,

dolor pressorio lancinans in vesicae collo.

formicatio et pruritus in urethra post mictum.

dolor mordax in urethra inter mictum.

dolor strictrius in artibus, sive paralyticus.

dolor in affecta parte (v. c. in ulcere) lacerans,

dolor lacerans in dorso.

effluvium austum ex affecta parte (v. c. ex ulcere pedum, e naribus in coryza chronica, ex urethra in blennorrhoea chronica).

muci in coryza chronica in sanguineum mutatio.

sensus mordax in oculis, quasi a sale culinari insperso.

inappetentia ciborum.

debilitas, prostratio virium,

morositas.

diarrhoea sine torminibus.

tormina.

incarceratio flatuum in hypochondriis.

agrypnia.

pruritus in cute.

sudor lenis nocturnus.

[OBSERVATA ALIORUM.]

BRASSAVOLA apud SCHENCK, lib. VII. obs. 125.
(ab interno usu)

Canalis intestinalis ab ore ad anum usque ex-
coriatio.

vesicae urinariae excoriatio longa.

LANGE, apud SCHENCK, lib. VII. obs. 124, 127.
Sanguinis mictus copiosus.

pruritus circa pudenda.

punctiones in corporis cute.

sapor picis cedrini in ore.

mens parum constans.

animi deliquium.

vertigo.

cruentum urinae stillicidium.

ardor urinae continuus.

PASCHALIUS et **OCCO**, apud eundem, ibid.
obs. 125.

(ab usu externo.)

Sanguinis mictus.

PAREUS, apud eundem, ibid. obs. 127.
(ab usu interno.)

Sanguinis meri excretio per anum.

sanguinis mictus.

priapismus.

ardor urinae.

(ab emplastro cantharidum in facie.)

ardor vesicae.

cervicis uteri tumor.

5 tormina.

vomitus assiduus.

mictus continuus.

dejectio virium.

artuum jactatio fanatica.

10 febris ardentissima.

WIERUS, de praestig. daem. III. c. 35.

(ab interno usu.)

Vesicae cruciatus atrox.

sanguinis mictus copiosus.

JOACH. CAMERARIUS, apud SCHENCK, lib. VII.

obs. 127.

(ab interno usu.)

Tormina gravia.

mictus cruentus.

15 vesicae ardor.

dolor ventriculi.

anxietas magna.

frigus extreborum.

urinae retentio.

20 pulsus deletus, ratione constante *).

BACCIUS, apud eundem, ibid. obs. 128.

(ab interno usu.)

Corrodens ventriculi dolor.

* Mors post 36 horas.

(ab externo usu.)

ischuria gravis.

ardor urinae.

mictus sanguinis.

Miscell. Nat. Cur. Dec. II. ann. 8. p. 193.

(ab usu interno.)

Aphthae artificiales.

SAM. LEDELIUS, Misc. Nat. Cur. Dec. I.

ann. 9, 10. obs. 148.

(ab usu interno.)

Tumor scroti.

sanguis, loco seminis, excretus.

Misc. Nat. Cur. Dec. I. ann. 2.

Dolorifica urinae retentio.

ibid. Dec. II. ann. 10. App. p. 60.

Ardor in genitalibus.

perpetua micturitio cum dolore intolerabili.

dolor cordis.

CULLEN, Arzneimittell. II. p. 622.

(ab interno usu.)

Ventriculi dolor vehemens.

febris species.

G.F. HILDANUS, Obs. 99.

(a 12 cantharidibus devoratis.)

Dolores ventriculi.

Tormina.

dolores renum.

dolores totius corporis.
mictus cruentus, dolorosus.

Jos. LANZONI, Opera Tom. III. animadv.
18. p. 478.

(ab usu interno.)

Dolor vesicae.
maxima urinae difficultas.
inflammatio penis *).

PETR. FORESTUS, Obs. lib. 30, obs. 6.

(ab usu interno.)

Erosio ab ore ad anum usque.
ex ore halitus picis cedriae instar.
praecordia dextra inflammata.
ischuria.

mictus sanguineus.
dysentericae sedes strigmentosae.
fastidia.
animi deliquia.
vertigo (fatalis).

G. F. HILDANUS, obs. 98.

(ab usu externo, in genu tumido.)

Inquietudo.
febris.
renum, lumborum dolor maximus.
ventris totius dolor.
dysuria vehemens.
ardor urinae tantus, ut sine cruciatu et ejulatu
ne guttulam quidem urinae sanguino-
lentae emittere posset.

* In cadavere inventa sunt vesica, urethra, renes exulce-
rata.

Misc. Nat. Cur. Dec. II. ann. 7. obs. 86.

(ab usu externo in nucha *).

Lethalis diabetes.

WERLHOFF, Opera p. 699.

Urina sanguinolenta, parum grumosa.

urina pituitosa.

stranguria.

STALPAART van der WIEL, Cent. I, obs. 83.

(ab usu externo.)

Dolor vehementissimus inter micturitionem;
continuum **).

*) Post curatam urinae incontinentiam.

**) Post paucas horas.

**CAPSICUM ANNUUM. L. (siliqua
rum totarum pulveris tinctura.)**

*V*is sedecim, ad summum viginti quatuor horas durat.

Inebriatio.

(ex somno exergiscenti infatuatio capitis, qua-
si se ipsum non nosceret).

vertigo, titubatio a latere ad latus.
oscitatio.

5 (mane major lassitudo, quam vesperi.)
lassitudo ingens, non dormituriens *).
debilitas tremula in pedibus.
calor imminutus pedetentim.
frigus post levem lecti remotionem.

10 horripilatio in tergo vespertina, nec calore, nec
siti, sed sudore miti subsequitur.

frigiditas per totum corpus, extremitates frigi-
dae, sine horrore.

frigiditas crescens **), cum animi aegritudine
et pupillae contractione.

frigiditas scroti, impotentia virilis.

frigus

*) Aliquando circa secundam horam observavi.

**) A quarta ad decimam quintam horam crescentem frigi-
ditatem vidi et inde ad vigesimam quartam usque iterum
decrecentem.

frigus ventriculi, sensus in eo quasi ab aqua fri-
gida, (tum sensus quasi a tremore).

tremor ex horrore.

siccitas oris.

sapor insulsus, postea Soda.

pituita tenax oris.

sapor in ore quasi ab aqua putrida.

5

sitis nulla.

fames nulla, anorexia.

taciturnitas.

fuga motus.

adiaphoria.

taedium, morositas.

morositas taciturna cum pertinacia.

*reluctantia ejulans *).*

animus, inter jocos ipsos, minima aegre ferens.

15

animus opprobrians, vitia aliorum magni fa-
ciens, parva aegre ferens, reprehendens.

somnus insomniosus.

somnus clamoribus interruptus et pavoris insul-
tibus quasi ob casum ab alto.

somnus cum inspiratione, sibilo stertoroso per
nares stipata et suffocationis nasalis
*accessibus **).*

taedium et morositas post somnum cessant.

20

angor alte respirare cogens.

alta respiratio, suspirii instar.

asthma inter requiem et motum.

asthma, sensus plenitudinis in pectore.

asthma quasi a ventriculo proficiscens.

25

Orthopnoea.

*) Circa tertiam horam aliquando observatum.

**) Circa primam horam observatum.

dolor costarum et sterni in respiratione.

dolor pulsatorius in pectore.

*dolor constrictorius pectoris, respirationem
angustans, motu parvo auctus *).*

asthma inter eundum.

5 asthma vel inter quietem, rigiditas dorsi inter pronationem dolorosi, respiratio hinc inde alta, suspiriosa, tussicula sicca.

dolor tensivus ex abdomen in pectus tendens, sensus quasi ab intumescentia abdominis.

*sensus distentionis abdominis ad disrupti-
nem usque, suffocationem minitanus **).*

dolor in respirando punctorius intra scapulas et in regione ventriculi, punctus singuli in latere abdominis, in osse en- siiformi, et in sterno, qui vero exteri- ni videntur.

sensus tractorius in pectoris latere ad collum usque inter tussiculam.

10 tussicula creberrima,

tussicula sicca crebra.

tussicula maxime post coffeeae potum.

tussis dolorosa.

a tussi et sternutatione dolor micans hinc illinc.

15 halitus exspirationis in tussi sapore aliquo alieno praeditus.

anima inter tussim foetida.

post decubitum vesperi titillatio in larynge et tussicula sicca.

raucedo.

*) Circa quartam horam observatum.

**) Circa secundam horam observatum.

gravedo matutina.

titillatio in naribus gravedinosa.

(epistaxis, mucus narium sanguinolentus.)

pustulae dolentes in narium orificio.

salivatio.

dolor lacerans in auris concha.

*dolor pruriens in intimo auris recessu *).*

*dolor pressorius in intima auris parte **).*

dolor infra aurem.

labii tumor.

labiorum fissurae.

gingivae tumor.

dentes hebetes, elongati.

dolor strictorius in gingivis.

dentis dolor strictorius, nec tactu, nec pastu;
auctus.

dolor pressorius in oculis.

a motu capitis et itione in temporibus dolor
quasi cranium dirumperetur.

dolor pulsatorius in temporibus (sinistris).

dolor pulsatorius in fronte.

dolor pressorius in temporibus.

dolor pressorius in fronte.

dolor punctorius in capite.

dolor capitinis punctorius magis, quam lace-
rans, requie pejor, motu pacatior.

dolor in capite pulsatorio terebrans.

dolor capitinis distendens, seu quasi a plenitu-
dine.

dolor capitinis in fronte distendens.

dolor strictorius in fronte.

(cephalalgia lacerans).

E 2

* Non nisi decima sexta hora observatum,

**) Prima et octava hora observatum,

dolores hinc inde in facie partim osteocopi, tactu excitandi, partim subtile penetrantes (nervosi) inter capiendum somnum excruciantes.

cephalalgia pressorio lacinans unius lateris resupinatione oculorum et capitum, vel motu capitum, vel pronatione aucta (una cum obliuione), more hemicraniae hystericae, nausea stipata.

dolor in colli parte externa.

dolor in pharynge inter deglutitionem.

5 dolor inter deglutitionem ut in angina, extra deglutitionem dolor strictorius in gula.

dolor pressorius in scrobiculo cum vomituratione.

dolor pressorius in scrobiculo cum vomituratione, menstrui tempore.

vomituritio.

post pastum plenitudo et angustia pectoris, tum vel ructus acidi, vel soda; tandem alyus cita mollior.

10 Soda.

dolor ardens in ventriculo ad os usque, post jentaculum.

*tensio pressoria abdominis, maxime regio-
nis epigastriæ, inter scrobiculum
et umbilicum, motu inprimis aucta,
una cum tensione pressoria in infi-
ma parte dorsi.*

statim post pastum tormina pressorio forficantia cum flatuum incarceratione.

dolor pressorius in abdomen hinc inde.

15 dolor pressorius in hypochondriis et infra scro-
biculum.

tormina quasi a flatibus in hypogastrio.

post tormina in hypogastrio flatuosa, parum

torminosa, sedes parvae, crebrae,

ex pituita constantes, interdum

sanguine intermisto, tenesmodae.

diarrhoea torminosa, pituitae tenacis, interdum sanguine atro intermisto, torminibus dissidentibus et contorquentibus circa umbilicum; post singulam sedem sitis, et post haustus singulos horror.

sedes parvae, merae pituitae.

sedes parvae, pituitae sanguinolentae.

tenesmus.

dolor ardens in ano. } *).

pruritus in ano. }

tenesmus vesicae, micturitio. } **).

ardor urinæ. }

extra mictum lacinatus in urethrae orificio.

statim post mictum punctorius dolor in urethrae orificio.

sensus vulsorius in nucha.

sensus rigiditatis in nucha dolorosus, motu tantum sensibilis.

dolor tractorius in dorso.

dolor strictrior pressorius in dorso.

dolor dorsi inter pronationem.

(dolor simplex in costa parvi spatii, tactu maxime exasperandus, neutiquam tussi, nec respiratione.)

(dolor strictrior paralyticus supra et infra cubiti articulum.)

* Post tertiam, circa quartam et octavam horam observatum.

**) Circa quartam et octavam horam observatum.

dolor tensorius in genu.

tensio genuum.

fragor juncturarum, genuum, digitorum.

dolores rheumatici plurium horarum volatiles,
motu excitandi, hinc inde in artibus,
dorso, nucha, scapulis, manibus.

articulationum omnium rigiditatis sensus et dolor simplex, in motus principio summus, inter motum continuatum mitigatus, cum pituitae tenacis catarrho in bronchiis.

reptatio hinc inde in cute quasi a musca.

dolores pressorii hinc inde, volatiles.

calor et una horripilatio cum siti aquae.

(calor internus cum sudore frigido frontis.)

rubor genarum.

meridie post pastum rubor genarum, manibus
et pedibus frigidis, sine horrore *).

(ardor genarum, manuum, pedum, genae tumor.)

cum ardore in buccis, micans sursum deorsum
sensus indolorificus.

agrypnia **).

evigilations post medium noctem.

insomnias impedimentorum plena.

inquietudo negotiosa †).

sedulitas inquieta.

(proclivitas in terrorem.)

*) Post duos dies continuo observatum; prima vice post quatuor horas enatum.

**) Dehinc fere incipiunt secundi ordinis symptomata.

***) Intra quintam et sextam, sic et intra nonam et decimam horam observatum.

†) Post aliquot horas observatum.

(constipatio quasi a calore magno in abdomen.)

sensus omnes acutiores.

ophthalmia.

animus contentus. { *).

Iudibria.

animus contentus, jocosus, in stomachationem

brevem, data minima occasione, ap-

prime pronus.

5

*) Intra octavam et vigesimam quartam horam observata.

[OBSERVATA ALIORUM.]

BROWNE in MURRAY's Appar. med. I. p. 705.

Tenesmus,
ardor ani.

FORDYCE, apud eundem, ibid. p. 704.
(interne et externe adhibitum.)

Blennorrhoea urethrae.

MATRICARIA. CHAMOMILLA

L.*). (herbae totius succus calore solis insipit
satus.)

*V*is ad summum 28 horas durat,
Oscitatio crebra, interrupta **),
frigiditas, ut plurimum cum horrore a tergo ad
abdomen reptaate ***).
*horror singularium partium in facie ****), in*
brachiis †), sine et cum frigiditate
externa.
horror singularium partium non quidem fri-
gidarum, cum somnolentia ‡†).
frigiditas manuum, sudor frigidus volarum,
corpo reliquo juste calido ‡‡†).

*) Operationis suae curriculum paroxysmis aliquot horarum, vires utriusque ordinis complectentibus absolvit, spatiis liberis vel remissionibus interjectis, ita tamen, ut in paroxysmis prioribus vires primi ordinis, in posterioribus vero vires secundi ordinis potissimum dominentur,

**) Post quadrantem horae observatum,

***) Prima et quarta hora observatum,

****) Semihora observatum.

†) Secunda hora observatum.

‡†) Post secundam et dimidiam horam observatum,

‡‡†) Secunda hora observatum,

horrescentia aëris frigidi *).

cum horrescentia amblyopia.

a denudatione horrescentia.

*animi deliquiorum accessus plus minus repetiti**).*

5 lassitudo et debilitas maxima ad syncopena accedens ***).

lassitudo, pedum maxime ****).

debilitas inter requiem major, quam per motum; inter motum robur sufficiens.

fuga laboris.

vertigo maxime inter loquendum †).

10 (vertigo inter pronationem.)

accessus breves vertiginis syncopalis ‡‡).

vertigo syncopodes.

(vertigo matutina.)

stupiditas cum vertigine.

15 dormititio diurna et lassitudo.

stupor mentis laetitiae expers (achaeria)

dormituriens, a somno tamen alienus.

coma vigil, vel potius impotentia, oculos apriendi, cum exspiratione cito, sopore somni experte et cephalalgia frontis lacerante, vomititiva †††).

intelligentiae hebetudo, vis perceptionis imminuta ††††).

* Secunda hora observatum.

**) Semihora, hora tertia, quarta, quinta observatum.

***) Quarta hora observatum.

****) Decima hora observatum.

†) Hora decima sexta observatum.

††) Ab odore florum et extracti interno usu post quadrantem horae observatum.

†††) Sesquihora observatum.

††††) A quarta ad sextam horam saepius observatum.

a meditatione levi languor.
somnolentia maxima *).

dum sedet, (diurna) somnolentia; dum decumbit, insomnia vigil.

*vis perceptionis et intelligentia hebetata surditate quadam, vel insomniis vigilibus **).*

inattentio cogitationibus immersi (ideac dis-tractae).

cogitationes, ideae evanescentes.

scotomiae lateralis sensus, dum oculi in rem albam figuntur.

balbuties, verborum inconcinna commutatio ***).

imaginatio, voces absentium exaudire opinantis.

agrypnia, angoris accessibus stipata, visionibus luculentis et graphicis phantasiae obversantibus †).

delira blateratio de impedimentis variis removendis.

convulsivae vulsiones singulae incipiente somno.

vulsiones in artibus, palpebris,

febris soporosa (matutina) cum vulsionibus singularis artuum, capitis.

expavescientia tremula.

anxietas tremula cum palpitatione ‡).

congestio sanguinis ad cor ††).

15

*) Post tres quadrantes horae ad sesquihoram usque observatum.

**) Ante secundam horam observatum.

***) Quarta circiter hora observatum.

†) Per primas quatuor horas observatum.

††) Prima hora observatum.

†††) Statim post potam chamomillam.

*dysphoria immanis, jactatio, agitatio se-
rox quasi moribundi, cum lace-
rantibus abdominis doloribus *),
tum stupiditas, tum dolor capitis fe-
rox.*

hypochondriaca anxietas.

*pupillae contractiores **).*

*cordis oppressio, cum aestuatione, ejulatu et
sudore immanni.*

¶ non nisi gestatus quiescere potest infans.

*infans pedibus insistere et incedere detrectat,
misere ejulando ***).*

lacrymatio.

*ejulatus ob injuriam levem, vel imaginariam,
vel jam diu praetcritam ****).*

ejulatus ob petita negata miserabilis †).

*¶ inquietudo lacrymabunda varia efflagitans
et oblata negligens, respuens ‡‡).*

morositas per duas horas durans.

*animus ad iram, contentionem, rixam paratus,
pronus ‡‡‡).*

morositas ad rixam prona ‡‡‡‡).

suspicio injuriari se putantis.

*¶ morositas; omnia ab aliis facta ipsi displicant,
nulla aliorum facta ipsi grata.*

*intolerantia interpellationum, oblocutionum,
maxime post somnum, pupillis*

**) Prima hora saepius observatum.*

***) Ut plurimum intra primas quatuor horas.*

****) Quarta hora observatum.*

*****) Secunda etiam hora observatum.*

†) Tertia hora observatum.

‡‡) Quarta hora ab odore florum observatum.

‡‡‡) Secunda hora vidi.

‡‡‡‡) Aliquando duodecima hora observatum.

aegre dilatabilibus et contractilibus *).

deliquescentiae sensus in cordis regione.

deliquescentia cordis nauseabunda.

nausea vomituriens ut a syncope nascitura.

nausea vomituriens, matutina.

syncopes species, deliquescentia cordis nau-
seabunda; pedes subito quasi para-
lytici, stupor artuum.

rigiditas stuporisca brachiorum, dum manus
aliquid capessit.

rigiditas et narcosis manuum frigidarum para-
lytica, cum obnubilatione capitis, et
hyperesthesia aëris, quasi refrigeri-
un sit nasciturum.

nocturna pedis asthenia paralytica, vires in eo
deficiunt, insistere eo nequit, inter
surgendum concidit, cum dolore cru-
ris strictorio, plantae dolore surdo.

dolor in periosteo artuum cum asthenia para-
lytica.

dolores spurii ab osse sacro per femora tenden-
tes, strictorio paralyticus **).

dolor omnium artuum, maxime inter motum,
simplex; cum asthenia artuum, sine
tamen vero lassitudinis sensu.

sensus in cruribus quasi a narcosi nascitura.

dolor strictorio paralyticus in cubito et mani-
bus.

narcosis manuum et pedum, quasi gelu con-
fecti essent ***).

*) Decima hora observatum.

**) Primis horis observatum.

***) Quinta hora observatum.

lacerans dolor cum formicatione in brachii
ossum tubis ad digitos usque et sensu stuporis (narcoseos) quasi brachium sensu tactus careret.

dolor pollicis et digitii indicis, qualis a distortione, sive a nimio laboris nisu remanet, seu quasi a confractione, cum asthenia paralytica, inter motum percipiendus.

dolor strictorius in carpo.

in genu strictorio - lacerans dolor ad malleolos pertingens.

⁵, dolor strictorius in manibus, scapulis, pectori, ut a refrigeratione *).

dolor strictorius in dorso per unam horam **).

dolor tensivo lacerans in dorso.

dolores punctorii in dorso.

dolor lacerans in femoribus et cruribus.

¹⁰ contractio digitorum pedis spasmodica, inter lacerantem artuum dolorem.

dolor lacerans in confiniis claviculae et colli ***).

vespertini accessus dolorum lacerantium.

dolores strictorio lacerantes uno ictu et rari in artuum ossum tubis vel tendinibus.

pedum dolor lacerans, lecto obtegi recusantium.

dolor lacerans in auribus.

¹⁵ (dolor lacerans in auricula dextra.)

lacinatus singuli in aure, maxime inter propagationem, cum animo minima aegre ferente.

*) Hora quinta et decima sexta observatum.

**) Post primam horam observatum.

***) Hora secunda observatum.

obtusa pressio in aure interna inter pronationem quasi ab ictu,
 obturationis aurium sensus et susurrus, quasi
 avis pedibus radat et scalpat.
 in aure susurrus quasi ab aqua cadente.
tinnitus aurium *).
 lancinatus singuli in maxilla ad aurem internam 5
 usque.
 dolor lacerans in maxilla, ad aurem tendens,
 cum genae tumore.
 odontalgia strictoria in mandibula inferiore an-
 trorum versus **).
 dentium dolor, cum salivatione, hinc illinc
 micans, et ad oculos tendens, frigi-
 dae aquae (multae?) admotione mox
 exasperatus.
 dentium dolor lacerans et lancinans per digi-
 tum aquae frigidae intinctum paulis-
 per sedandus, vesperi ***).
 post pastum et potum, maxime calidum (etiam
 frigidum) vel statim, vel post minu- 10
 tam nascens odontalgia.
 odontalgia post haustum calidum (maxime
 coffeae) potum saeviens.
 odontalgia post pastum et potum etiamsi neu-
 ter neque calidus, neque frigidus
 sit †).
 dentium dolor strictorius, post pastum vel po-
 tum.
 dentium dolor a calida admota,

*) Prima hora observatum et tertia et quarta.

**) Semihora observatum.

***) Nona et decima hora observatum.

†) Inter reliquias observavi.

in dentibus dolor, incerti loci, strictorius, inter cibandum evanidus, noctu maxime ingravescens; dentes elongati.

dentium vacillatio.

dentium dolor cum genae tumore.

formicatio in dentibus maxillae superioris.

5 odontalgia dissindens.

gingivae tumor.

strictorius dolor in palato versus fauces.

dolor lacerans in fronte per vices reiterans.

10 *hemicrania strictorio lacerans* *).

hemicrania in temporibus alterutribus lacerans.

dolor lancinanti lacerans in fronte, in pectus tendens.

lacerans et lancinans dolor capitis per tempora penetrans.

lacinatus singuli in hemicranio dextro et ab alterutra parte in cerebro **).

lacinatus singuli in cerebro.

15 hemicrania lancinans ut a refrigerio.

dolores punctorii in capite.

dolor capitis punctorius, quasi oculi casuri essent.

hemicrania volatice pulsatoria.

cephalalgia pulsatoria ***).

20 pulsationes aliquae in capite †).

gravitas capitis.

dolor capitis ex gravitate et contusione compo-

situs ‡‡).

fragor

*) Tertia et quartá hora observatum.

**) Undecima hora observatum.

***) Post decimam quartam horam observatum.

†) Primo quadrante horae observatum.

‡‡) Tertia hora observatum.

fragor crepitans in hemicranio sinistro.
in oculis lacinatus.

marginis in palpebra superiore et inferiore sic-
citas summa, glandularum meibomi-
anarum secretio suspensa *).

oculi cantus mane purulentus.

ocultus mane tumidus, pure conglutinatus. 5
dolor pressorius in oculis, oculi inflammati,
mane purulentii.

post somnum palpebrae conglutinatae.

frigiditas genarum, manuum et pedum gelida,
cum frontis, colli, pectoris calore
ardente, quo postea in genam dext-
ram progresso cum rubore, manus
et pedes iterum calorem justum ac-
quirunt, pupillis contractis, non di-
latabilibus; tum somnus stertoro-
sus **).

frigus totius corporis cum calore faciei, per
oculos micante.

extremitates frigidae cum calore faciei ardente, 10
calore ardente in oculis et halitu per-
quam calente ***).

sensus quasi calor et ignis per oculos micaret.
scintillatio in visu.

post potum et pastum calor et sudor faciei.

vesperi ardor in genis una cum horrore ac-
cessibus volaticis.

gena rubra alterutra, sine horrore, sine ca- 15
lore interno, per vices reiterans †),

*) Prima hora observatum.

**) Haec intra horam primam et tertiam observavi.

***) Quinta hora observatum.

†) Quarta et duodecima hora observatum.

horror posterioris faciei corporis, brachiorum,
femorum, dorsi, per accessus repe-
tens, sine frigiditate externa, immo
cum caloris interni, siccii sensu et
calore externo, maxime frontis et fa-
ciei.

sudores volatichi crebri faciei et volarum manus.
faciei, colli, manuum sudor *).

gemitus involuntarii inter calorem faciei.

gemitus singuli inter somnum cum sudore fron-
tis calido, viscido.

capitis maxime sudor inter dormiendum.

ardor pedum cum pruritu utin gelatis fieri con-
suescit **).

calor internus una cum horrore.

calor externus una cum horrore.

10 caloris externi sensus sine calore externo ***).

caloris sensus, sine calore externo et sine siti.

delira blateratio nocturna vigil, inter sessum.

siccitatis linguae sensus cum siti aquae, ano-
rexia, calore volaticho, sudore faciei,
et palpitatione cordis; fame canina
subsequa.

sitis vespertina et expergiscentia nocturna cum
dolor.

15 sitis inextinguibilis, lingua sicca †).

ob caloris externi sensum stragulorum intole-
rantia.

somnus insomniosus phantasticus.

*) Sexta hora observatum.

**) Tertia hora observatum et tamen dubium, an ad vires
secundi ordinis sit referendum.

***) Prima hora observatum,

†) Quinta hora observatum.

insomnia luculenta, quasi historia vigilando ageretur.

vagitus inter somnum, *ejulatus inter somnum,* *concussiones, aestuatio, ejulatus, blateratio inter somnum**).

nocturna jactatio aestuans in lecto cum phantasiis.

dolor ossis sacri maxime nocturnus.

inspiratio stertorosa inter somnum.

inspiratio stertorosa inter somnum, citior quam exspiratio, ore aliquantum aperto et sudore frontis calido, viscido **).

maxima anxietas in lecto, non extra, et pupillae tum citissime mobiles.

labii inferioris medium rhagade fissum ***).

exulcerationes crustosae in labiorum margine ****).

mordacitatis insignis sensus in posteriori linguae parte et velo palatino †).

vesiculae supra et infra linguam punctorio lancinanti dolore,

pulsationes aliquae in pharynge ‡).

faucium dolor simplex, motu partium, colli et deglutitione auctus.

angina parotidea.

salivatio †††).

F 2

*) Sexta hora observatum.

**) Tertia hora observatum.

***) A tertia ad decimam usque horam observatum.

****) Inde a prima hora ad quartam observatum.

†) Prima hora observatum.

‡) Post quadrantem horae observatum.

††) Quarta et sexta hora observatum.

- sapor mucinosus* *).
dentes mucaginosi.
screatus putridi saporis.
sapor acidus in ore **).
5 *sapor acidus panis.*
anorexia.
anorexia coffeeae.
sapor et appetitus deletus, escae quodammodo descendere detrectant.
nulla cibi appetentia, nullus ciborum gratus sapor.
10 *anorexia quasi a fastidio cibi, sapore non corrupte.*
vesperi escae ad scrobiculum colli quasi adscendunt, ibique subsistunt, cum plenitudine, nausea vomituritiva et ructibus.
a cibo capto vertigo.
a cibo capto pressio in hypochondriis, ventriculo.
a cibo capto plenitudo ventriculi satra, vel in crastinum diem; vomituritio.
15 *a pastu abdomen intumescens.*
nausea vomituriens cum salivae in ore affluxu.
nausea post pastum.
(vomitus sine ructibus praeviis.)
eructatio escarum ***).
20 *post pastum plenitudo, angor et dolor lacerans dorsi in abdomen tendens.*
angustia pectoris, quasi a flatibus in epigastrio cum pressionis sensu testagnantibus,

*) Secunda et duodecima hora observatum.

**) Tertia et decima octava hora observatum;

***) Quinta hora observatum.

et ventriculi dolor, quasi a soda nas-
citura, postea ardor in spina dorsis
restagnatio flatuum in hypochondriis *).
colica flatulenta **).

pressorius in ventriculo dolor quasi a lapide
casuro.

dolor pressorius ventriculi et hypochondrii, re-
spirationem angustans, maxime post
potam coffeam ***).

glocitatio in latere ad abdomena usque.
per intervalla rediens colica, hypochondrio
flatibus absesso, lacinatibus pectus
pervadentibus ****).

strictorius in abdomine dolor.

tormina forficanti lacerantia in umbilico et in-
fra ad utrumque latus, cum dolore
ossis sacri, quasi a confractione †).

dolor lacerans continuus in abdominis latere,
concentratus quasi in globum.

dolor in abdomine torminosus, qualem in constipa-
tione alvi exoneratio causat.

molestia in abdomine, quasi a constipatio-
ne ‡‡).

angor quasi ab alvo deponenda.

constipatio, quae ab intestini recti inertia pro-
ficiuntur, ita ut alvus non nisi abdo-
minalium musculorum nisu extorque-
ri queat †††).

* Inter reliquias aliquando observatum.

**) Prima hora et aliquot horis post observatum.

***) Prima hora observatum.

****) Circa horam octavam observatum.

†) Prima hora et aliquot horis post observatum.

††) Quarta hora observatum.

†††) Quarta hora observatum.

abdomen durum tumidum,

diarrhoea aquæa cum (et sine) torminibus dis-
scindentibus.

excrementa muco obducta, vel et in interstitia
muco insinuato.

*diarrhoea torminosa mère albo mucosa *).*

s proctalgia lancinans post sedem singulam.

impetus in annulum abdominalem, quasi a
debilitate temporaria hujus partis,
*ut in hernia nascitura **).*

impetus in uterum, dolorum ad partus instar,
cum micturitione creberrima,

menstrui suppressio cum scrobiculi tumore et
scrobiculi pressione anxia, tumore
abdominis, doloribus quasi ad partum
et hydröpe cutaneo.

blennorrhagia vulvae flava, mordicans,

*pruritus scroti ***).*

molimina haemorrhoidum coecarum †),

haemorrhoides coeca.

dolor lancinans in vesicae collo extra mictum,
ardor in vesicae collo inter mictum.

angor inter mictum sine impedimento mecha-
nico.

angor cum micturitione frustranea, sine lotii
copia.

mictio involuntaria ‡†).

obturatio narium gravedinosa ‡‡†),

*) A prima ad tertiam horam observatum; hoc et priora
duo ad secundi ordinis vires referenda videntur.

**) Ante quartam horam observatum;

***) Sexta hora observatum,

†) Duodecima hora observatum,

††) Tertia et quarta hora observatum; an viribus secundi
ordinis accensendum?

†††) Prima hora observatum,

coryza quinque ad octo horas durans *).
 ardor in gula.
 dolor ardens in sterno ad os usque.
 stridulatio bronchiorum in respiratione.
raucitas a pituita viscida caput laryngis oc-5
cupante, screatu valido abigen-
*da **),*
raucitas catarrhosa arteriae asperae et sic-
*citas palpebrarum ***).*
 raucedo, tussis ob mucum in superiori trache-
 ae parte stridulantem, cum dolore in
 eo loco, ubi mucus a tussi abrasus
 fuerat ***).
 tussis sicca quater, quinquies de die.
 tussis valida, sicca inter somnum †).
 tussis sicca ob pruritum et titillationem conti-10
 nuam in ea parte tracheae, quae scro-
 biculo colli subjacet ‡).
asthma strangulatorium circa colli scrobicu-
lum, cum irritatione continua ad
tussim †††).
 constrictio superioris pectoris tractus, inter
 tussiendum dolorifici ††††),
 constrictio pectoris.
 angustia pectoris.
 dolor strictorius, seu intus tractio reiterata in¹⁵
 pectore dextro (1).

*) Secunda hora observatum.

**) Hora octava observatum.

***) Intra primas octo horas observatum.

****) Secunda hora observatum.

†) Undecima hora observatum.

††) Quarta hora observatum.

†††) Primo quadrante horae observatum.

††††) Quarta hora observatum.

(1) Duodecima et decima sexta hora observatum.

dolor pressorius in sterno, respirationem non angustans, nec respiratione, nec tactu auctus *).

dolor pressorius in sterno, respirationem angustans **).

acupunctio in pectore.

*lancinatus singuli, volatice in pectore ***).*

§ lancinatus per transversum pectus, inter singulam respirationem.

lancinatus post singulam exspirationem e sterno ad latus dextrum micans ****).

dolor ex pruritu et lancingione compositus, hinc inde, parvo spatio circumscriptus, scalpendo dolorificentior †).

miliaria rubra in genis.

erythema parva cutis, miliaribus papulis obsessa.

10 rigiditas universalis, volatice.

articulationum omnium dolor, inter motum, simplex, quasi rigidae essent et diffingerentur ‡).

crampus in suris.

dolor crampoides, tensivus in sura inter motum §).

crepitus et dolor juncturarum, maxime inferiorum artuum, quasi a contritione, nec tamen lassitudo completa ¶).

*) Duodecima hora observatum.

**) Decima sexta hora observatum.

***) Secunda et quarta hora observatum.

****) Post sesquihoram observatum.

†) Quarta hora observatum.

‡) Sexta hora observatum.

§) Octava hora observatum.

¶) Octava hora observatum.

sensus in femoribus quasi a verberatione volatilis *).
 muscularum abdominalium dolor quasi a verberatione **).
cutis fit ulcerosa, id est, *in exulcerationem pronata*.
 dolor auctus in ulcere, si quid adest ***).
 in ulcere, si quid adest, vulsorius et lacinians dolor.

in ulcere, si quid adest, *ardens et mordax dolor nocturnus, cum formicatione in eo et hyperaesthesia intertactum*.

glandularum mammae scirrhosa durities ****).
 nodus durus sub papula mammae, tactu dolorosus, interdum per se dolore strictorio lacerante.

rei venereae appetentia †).

pollutiones nocturnae.

epistaxis.

haemorrhois fluens.

haemorrhagia uteri vel in decrepitis.

vesicae urinariae vis imminuta, urinae radius languidus †††).

cogitationes altae, seriae, cum animo composito, aequo.

ideae fixae.

10

15

* Post quadrantem horae observatum.

**) Nona hora observatum.

***) Post tres quadrantes primos horae observatum.

****) Post plures horas observatum; cui ordini virium hoc et sequens accensendum sit, dubium.

†) Post plures horas observatum; dubium an ad vires secundas sit referendum.

††) Inter vires secundi ordinis referenda videntur.

†††) Post horam vigesimam observatum.

††††) Inter vires secundi ordinis referenda videntur.

vi perceptionis et intelligentiae rediente et sopore evanido, pupillae fiunt dilatabilesiores *).
pupillae perquam mobiles, citius tamen contractiles **).
dolor quasi ab excoriatione in canticis oculorum externis, labiis excoriatis ***).

*) Ut plurimum inde a septima hora.

**) Inter reliquias observavi,

***) Non nisi inter reliquias observavi altero psychhemero, dubium utri ordinum sit accensendum?

[OBSERVATA ALIORUM.]

SENAC, de recondita febrium interm.
et rem. natura, p. 188.

Mordacem calorem accedit.

CULLEN, Arzneimittell, Tom. II, p. 94.
Alvi dejectiones,
vomitus, Pringle, Monro, Lind, Rosen-
stein,

CINCHONA OFFICINALIS L. ET
REGIA *). (pulveris corticis tinctura.)

*V*is ad summum viginti horarum.

Pallor.

frigiditas universalis.

sudor frigidus per totum corpus **).

frigiditas (frigus) mannum, pedum, nasi.

sudor frigidus faciei cum siti.

sudor capillorum.

oscitatio.

obturatio auris interna ***).

pituita caput laryngis obsidens, raucam et cavam vocem vocisque sonos absonos et nimis altos reddens †).

suffocationis paroxysmus quasi a pituita caput laryngis occupante, maxime circa vesperam et inter evigilationem e somno ‡‡).

pandiculatio.

dormitatio diurna.

* Easdem apprime vires a C. regia, quales a China vulgaris officinali, observavi.

**) Post semihoram observatum.

***) Hora prima observatum.

†) Post duas horas observatum.

‡‡) Post octavam horam aliquoties observatum.

sternutatio.

sternutatio paroxysmum febrilem incipiens.

*stupor *) membrorum.*

lassitudo.

*vapiditas capitis et torpor corporis quasi ex pervigilatione et insomnia **).*

idearum processio tarda.

languor animi et corporis.

*muscae volitantes ante visum ***).*

aegrotatio; omnino non bene valet.

facies hippocratica, apex nasi acutus, oculi 10 cavi, nimis lividis, indifferentia, insensibilitas, externorum, immo amicissimorum objectorum contemtus †).

oculi in somno, hic semiclausus, ille apertus, globis oculorum retortis, morientium instar †).

manus haec gelida, illa calida, ejulatus raucus, miserabilis †).

pupillae contractae.

frigiditatis sensus in ventriculo.

vapiditas et sensus vacui in ventriculo.

hypererethismus, cum pusillanimitate et intolerabilitate strepitus.

sensorii nimia teneritudo et hyperaesthesia, ita ut exasperetur et offendatur animus per visus, olfactus, auditus, gustus objecta ‡‡).

*) Primus gradus narcoseos.

**) Hora prima observatum.

***) Quarta hora observatum.

†) Circa primam horam observatum.

††) Aliquando quarta hora observatum.

animus male contentus, infelicem se, et impediti et excrucianti ab omnibus hominibus putantis.*).

circumspectio nimis sollicita.

cura anxia et nimis sollicita ob minima **).

morositas querula,

morositas suspiriosa.

inobedientia.

(taciturnitas pertinax, respondere detrectat.)

stomachatio, indignatio, irascentia, animus exasperatus ***).

indignans haesitatio †).

10 *jactatio atrox et aestuatio desperabunda.*

dolorum pristinorum renovatio,

doloris praesentis augmentum,

cardialgia pressorio-corripiens.

fames canina cum sapore fatus in ore.

15 post pastum plenitudo diutina ad gulam usque.

post cibum captum expansionis abdominis sensus quasi a plenitudine.

post pastum dormiturio.

pressio in ventriculo post pastum.

inappetentia ciborum, potulentorum.

20 *inappetentia ciborum, sapore integro.*

inappetentia ciborum, inter vescendum tamen reddit appetitus et bene sapiunt escace ††).

* satietas escarum, potulentorum, tabaci, sapore grato, integro †††).

*) Post quinque horas observatum.

**) Post sesquihoram observatum.

***) Quarta hora observatum.

†) Post aliquot horas observatum.

††) Post sex horas observatum.

†††) Post paucas horas observatum.

anorexia cerevisiae. (sapor panis fusti acidus *).
sapor salinus in ore.
*nausea summa vel minus ingratorum, etiam absentium, cum laboris fuga, somnolentia continua diurna et albuginea icterode **).*
vomituritio, vomitus.
nausea et sanguinis ebullitio, ambo post cibum captum evanida.
palpitatio cordis.
palpitatio cordis cum dormititione.
congestio sanguinis ad caput, frons calida, artibus frigidis.
rubor genarum, auricularum. 10
*rubor et calor alterutrius genae et auriculae, et hoc nondum penitus evanido, frigus supra totam cutem — dein supra inferiores artus ***).*
calor in facie et post aliquot horas horror, frigus, cum frigiditate totius corporis.
(caloris per totum corpus sensus, venis tumidis, sine calore externo sensibili, pedibus frigidis.)
calor in toto corpore aliquantum auctus, venae tumidae, sine siti, pupillae dilatables †).
motu levissimo corporis excitatus sudor nuchae 15 et dorsi.

*) Post tres horas observatum.

**) Circa octavam horam observatum.

***) Ante quintam horam observatum.

†) Circa octavam et circa duodecimam horam observatum; an ad vires secundi ordinis pertinet?

infirmitas tremula artuum, tumque pupillae dilatatae.

(reptatio in cute frontis.)

odontalgia, gravedo, oculi aquei.

odontalgia cum vacillatione dentium *).

5 primo pulsatorius in aure sensus, dein tinnitus longus.

susurrus aurium.

(dolores lacerantes in auricula.)

(bullae aqueae pone aures.)

capitis dolor hinc illinc migrans.

10 cephalalgia frontis ut a gravedine.

dolor in nasi radice pressorius, ad latus migrans **).

cephalalgia temporum ut a gravedine,

(capitis dolor, quasi cerebrum vulneratum esset, motu minimo capitis et capitum partium, maxime vero attentione et meditatione fixa, et loquela auctus.)

capitis dolor pressorio lancinans in fronte et temporibus unius lateris ***).

15 (labia fissilia.)

tumor dolorosus in latere radicis linguae †).

(dolores lancinantes volatici hinc inde in parotide.)

anginosa indeglutio; dolor, tumor glandularum maxillarium, maxime inter deglutendum percipiendus.

tumor veli palati et uvulae, sine dolore ‡).

sibi-

*) Post tertiam horam observatum.

**) Quinta hora observatum, post calorem genae cyanum.

***) Quarta hora observatum.

†) Post quartam horam observatum.

‡) Post tres horas observatum.

*sibilatio bronchiorum in respiratione *).*

sibilatio stertorosa per somnum.

inspiratio gravis, difficilis, dolorosa, exspiratione cita.

somnus stertorosus, ejulatorius infantum.

somnus insomniis gravibus, vel evigilantem, angentibus.

expavescientia, maxime somnum capturi.

somnus turbulentus, plenus insomniis, vociferationibus.

dolor tracheae, sterni in tussi.

*colica flatuosa **).*

*tormina forficanti lancinantia ***).*

(dolores lancinantes volatice hinc inde in ventriculo, abdomen.)

tormina circa umbilicum cum horrore coniuncta.

tormina eccoprotica.

eccoprosis terminosa.

diarrhoea prave concoctorum, lienteriae species.

proctalgia pressoria †).

pressio in vesica post nisum ad mingendum

crebriorem, fere frustraneum.

sensus strictorius in testiculis.

glocitatio circa bulbum urethrae ‡†).

nuchae motus dolorosus.

(dolor dorsi pulsatorio lancinans.)

narcosis artuum, quibus incumbitur.

*) Post secundam horam observatum.

**) Post duas horas observatum.

***) Circa sesquihoram observatum.

†) Circa sextam horam observatum.

‡†) Post sex horas observatum,

narcosis brachii anterioris inter flexionem (inter scribendum) cum punctorio dolore in digitorum apicibus.

dolor muscularum posteriorum femoris in sessu, quasi a contusione.

dolor osteocopas juncturarum costarum in inspiratione, artuum, humeri, scapulae quasi a contritione, motu maxime percipiendus.

dolor dorsi et genu, quasi a verberatione inter motum levissimum *).

5 dolor ossis sacri intolerabilis quasi a crampo vel contritione aut verberatione inter motum levissimum clamores subitaneos extorquens **).

dolor (simplex?) juncturarum in sedendo et decumbendo, quietem, et moram in uno loco diu tolerare impatientium, ejusmodi qui per iter maximum, lassitudinem summam, vel seminis, aut sanguinis jacturam nimiam enervato evenire solet, et artus modo hinc, modo illinc movere, modo incurvare, modo extendere cogit.

fragor juncturarum.

in vulnere (ulcere) dolorem fodienti diruentem causat ***).

in vulnere (ulcere) lancinanti prurientem dolorem excitat per duas horas †).

* Post tertiam horam observatum.

**) Tertia hora observatum.

***) Hora prima observatum.

†) Post aliquot horas observatum.

amor laboris, lectionis, scriptionis, meditatio-
nis, assiduitas.

appetentia veneris.

appetentia rerum multimodarum, nescit qua-
rum.

pica.

idearum turba (projectantium) circa varias pro-
positiones versantium.

pupillae mobiles, magis contractiles, quam di-
latabiles **).

^{*}) Dehinc vires secundi ordinis incipere videntur.

^{**}) Cirea vigesimam horam observatum.

[OBSERVATA ALIORUM.]

MORTON, Opera Tom. II. S. 76, 81.

Surditas aliqualis inter usum chiae molesta.

vomitiones.

lipothymiae.

fluxus alvi.

sudor profusus.

**CLEGHORN, diseases of Minorca S. 191,
215.**

Sommus turbatus.

anxietas.

deliria.

virium prostratio.

SYDENHAM, Opera pag. 501.

Rheumatismi.

dolores ossium osteocopi.

PERCIVAL, Essays, Vol. I.

Sensus ponderis et oppressionis in ventriculo.

QUARIN, method. med. febr. p. 23.

Nausea.

anxietas.

sensus ponderis in ventriculo.

amarities oris.

calor auctus.

alvi obstructio.

crebriores alvi dejectiones nigricantes.

Friborg, Diss. de usu cort. peruv. 1773.

Indigestio.

vomitus.

RICHARD, Recueil d'obs. de med. T.

II. p. 517.

Hydrops.

pleuritis.

icterus.

aphonia.

J. A. LIMPRECHT, Act. N. C. II. obs. 129.

To mina in ventre ineffabilia.

B. M. ETTMÜLLER, de usu et ab. prae-
cipit. C. 3. §. 5.

Dolores tensivi.

J. FR. BAUER, Act. N. C. III. obs. 70.

Dolores colici atrocissimi, intolerabiles.

alvi obstructio.

vomitus continuus.

D. CRÜGER, Misc. Nat. Cur. Dec. III.

ann. 3.

Lipothymia.

asphyxia.

labia nigra.

ungues nigri.

pedum paralysis.

5 dolor ventris scorbuticus.

J. W. ROMBERG, ibid. Dec. III. ann. 9,
10. obs. 109.

Hydrops.

virium prostratio.

appetitus prostratio.

J. F. CARTHEUSER, Diss. de febr. interm.
epid. Frft. ad V. 1749.

Vertigo.

10 capitis obnubilatio.

amblyopia.

pectoris constrictio.

angor circa scrobiculum.

tumor abdominis.

15 tumor artuum.

J. E. STAHL, in variis scriptis.

Angustatio circa scrobiculum, maxime post
pastum.

calor et rubor volaticus in facie.

gravitas capitis.

desidia veternosa.

20 intumescentia flatuosa.

tensio pertinax in abdomen, angorem pro-
creans.

hypochondriaca symptomata.
colicae.

inflammations in abdomine.
 aposthemata in abdomine.
 indurations in abdomine.
 icterus.
 tumor pedum.
 ascites.
 anasarca.
 tympanites.
 synochae cum sudore immanni, exleges.
 angina.
 cardialgiae suffocatoriae.

Idem, obs. clin. p. 144, 171.

In hypochondriis molestiae.
 artuum lassitudo.
 siccitas oris.

anxietates insignes.
 febres lentae.
 tumor pedum.
 hydrops.

15

FORMEY, med. Ephem. I, 2.

(ab usu interno.)

Tumor erysipelaceus totius corporis.

(a dentifricio ex Cinchona.)

gingivarum et labiorum tumor.

20

**C. E. FISCHER, in HUFELAND'S Journ.
d. pr. Arzn. IV. p. 657.**

Facies tumida, rubra.
 tumor pedum dolorosus, urina pauca, luteo-
 viridi, turbida.

— Id. p. 653.

Anorexia,

sapor amarus,

flatulentia,

dolor in articulis manuum et pedum arthriti-
cus.

constipatio.

urina turbida.

lingua pituita flava obducta.

color cutis flavescens,

caput obnubilatum,

de KOKER.

(a semiuncia in sanis inter primas horas.)

pulsus multo lentior, debilior.

ALEX. THOMSON, medic. inqu. and.
obs. IV. N. 24.

Icterus,

hydrops.

asthma.

),

dolor pedis, genuum, capitis ossis femoris jun-
cturarum, quasi distortae essent et
dissecarentur, per vices invalescens.

abdominis duritiei, tumoris et dolorum parvi
accessus.

asthmatis suffocatorii paroxysmi breves.

apoplexiae et insaniae parvi accessus,

* Sequentes paroxysmi 5 ad 6 minuta durabant et reitera-
bant.

— *).

post horrorem levem aphonia.
respiratio intercepta **).

respiratio cum sibilo per nares.

abdominis et laterum constrictio, scapulis sur-
sum deorsum tractis.

collum obstipum in latus.

protensis brachiis incurvatio digitorum.

debilitas chronica.

*) Sequentes paroxysmi 25 circiter minuta durabant et re-
terabant.

**) Per semiminutum.

MENISPERMUM COCCULUS, L.

(seminum pulveris tinctura *).

*V*is ad minimum 36 horas durat.

Angor repentinus summus.

palpitatio cordis.

anxius animus.

desperans animus.

animi despensio.

lacryma.

animus atrociter serius, tum querulus.

morositas summa.

mens fixa, inattentio alte cogitabundi.

10 *cogitationes immotae.*

mens tristissimis cogitationibus immersa, offendens haerent alta mente repostae.

serius, de valetudine sua parum sollicitus, valetudinem aliorum scrupulose curat.

animus malefacta aliorum et prave dicta et mendacia vel minima maximi faciens, aegre ferens.

amor laboris nullus.

15 amor nullius rei, achaeria.

*) Summarum virium.

**) Post sex horas.

intolerantia interpellationum, strepitus.
 vis vitalis languida.
 debilitas summa.
 nisus in decubitum.
 artus quasi paralytici.
 artuum paralytica immobilitas cum strictoriis
 doloribus quasi in ossibus.
 pedum paralytica immobilitas *).
 paroxysmi astheniae paralytiae cum dorsi do-
 lore.
 hemiplegia sinistri lateris.
 vertigo per sex horas.
 muscae amauroticae oculis obversantes.
 visus hebetudo.
 infatuatio.
 stupor mentis cum sudore frontis et manuum
 gelido et abhorrescentia potus et cibi.
 obnubilatio capitis, maxime potu et cibo 15
 aucta.
 frigiditatis sensus sine frigiditate, in hume-
 ro **).
 frigiditas sine horrore universalis, manus livi-
 dae ***).
 frigus in dorso, quasi a glacie hinc illinc illa-
 ta, calore fornacis non delendum.
 horror vespertinus in dorso.
 manus haec frigida, illa calida, et vice 20
 versa †).
 stupor manuum alternatim.
 narcosis pedum et manuum alternatim, rei-
 terans, volatice.

*) Post viginti quatuor horas observatum.

**) Post quatuor horas observatum.

***) Primis horis.

†) Jam primo quadrante horae observatum.

- crepitus, fragor juncturarum.*
*rigiditas dolorosa articulationum *).*
manus frigido sudore madidae, alternatim
haec, illa.
pedum (sudor) mador frigidus.
⁵ *calor et frigus corporis alternans **),*
sudor, mador universalis languidus a minimo
*corporis motu ***).*
ardor in genis, pedibus frigidissimis †).
calor in fronte.
intolerantia frigidi et calidi aëris ‡‡).
¹⁰ *ab aëre frigido summe augentur statim sympto-*
mata, maxime capitis dolor.
pulsus ejusdem frequentiae, sed minimus, du-
rus.
tremor in dorso.
tremor in omnibus membris.
propensio in terrorem. } ¹⁵ *propensio in tremorem. }* ^{†††}.
convulsiones tremulae capitis.
convulsiones brachiorum cum pollicis in ma-
num intorsione.
sopor.
coma vigilans invincibilis.
²⁰ *angor terribilis insomnii instar somni princi-*
pium impediens.
evigilatio cerebra e somno.
dolor ventriculi constrictorius somnum impe-
diens.

*) Post octo horas observatum.

**) Post aliquot horas observatum.

***) Jam prima hora observatum.

†) Quarta hora observatum.

‡‡) Ultra et circa 75 gradus Fahrenheitianos.

†††) Prima et sexta hora observatum.

somnus crebris terroribus et vigiliis interrup-tus.

(inter so-nm decubitus pronus in abdomen.)
respiratio, maxime inspiratio sibilans, sterto-rosa ad suffocationem usque impedita, longissima cum brevissima, interdum cessante, alternans, cum facie tumore apoplectico.

pressio in scrobiculo respirationem praeclu-dens.

constrictio in epigastrio respirationem prae-cludens.

constrictio tensiva dextrī lateris pectoris re-spirationem coarctans **).

constrictio pectoris maxime in superiori sterni parte respirationem intercipiens ***).

oscitatio vehemens.

oscitatio vehemens, cum fragore in tuba Eu-stachii versus tympanum.

(dolor in oculis, quasi ab arenulae grano pre-mente, irritante.)

dolor dilacerans, evulsorius in oculis.

siccitas palpebrarum †).

dolor capitis, cerebrum quasi con-stringens vinculo.

dolor punctarius in temporibus.

dolor capitis econstringente, arden-te, lacerante, fodiente, te-rebrante compositus.

*) Circa primam horam observatum.

**) Post semihoram observatum.

***) Quarta hora observatum.

†) Non nisi inter reliquias observavi.

††) Dolores fere omnes capitis ex cocculo magis externi quam interni esse videntur.

(accessus crebri, aliquot minuta durantes, capitis doloris, parvi spatii, in frontis sinistri eminentia - primo doloris diri pulsatorio lancingantis, dein formicationis versus dextram ossis frontis protuberantiam tendentis, ibique exspirantis).

dolor in maxilla inferiori laceranti diruens.

dentis cariosi elongatio, vacillatio, tumor gingivarum *).

pharyngis paralysis, indeglutitio oesophagea,
5 pharyngis dolor, cum tumoris in linguae radice,
inter deglutitionem dolorosi sensu.

ardor in velo palatino.

tumor parotidis.

siccitas faucium.

sapor cupreus in ore.

10 sapor in ore ut ab inedia longa.

fuga esculentorum et potulentorum.

ructus.

a refrigerio vomituritio lenis, saliva afflu-
xum copiosum alliciens.

vomituritiones crebrae **).

15 dolor pressorius in ventriculo, scrobiculo, hypochondriis aliquot horas postpastum
vel noctu in lecto.

sensus in ventriculo ut ab inedia longa.

cardialgia vehemens (erodens?)

dolor constrictorius ventriculi.

pressio in abdomine superiore.

20 vomituritio cum cephalalgia et dolore intestin-

*) Post duodecim horas observatum.

**) Post plures horas observatum.

rum, quasi a contritione, contusione,
conspirans *).
dolor tractorius (stricterius) in intestinis.
tormina dilacerantia.

ardor in abdomen.

diarrhoea, sedes molles **).
egestiones parvae, crebrae ***).
urina aqua †).

leucorrhoea.

lacinatus in praeputii apice.

pruritus in scroto.

molimina herniae ‡).

dolor lacinanti punctarius in testiculo alteru-
tro.

dolores stricterii in testiculis.

sternutatio.

coryza vehemens quatuor dierum.

pituita tenax, caput laryngis obsidens et screa-
15 tum urgens.

irritatio ad tussim in suprema laryngis parte.

calor, rubor faciei cum siti.

sitis frigidorum, maxime cerevisiae ¶¶).

lacinatus in gena externe, in cute et in mus-
culis.

gravitas in nucha, scapulis ¶¶¶).

subter ultima costa vera dextri lateris dolor im-
20 maniter pressorius, inclinatione, tus-

*) Semihora prima observatum.

**) Colicales fere omnes dolores ad vertebrales lumbares con-
centrantur.

***) Post semihoram observatum.

****) Post plures horas observatum.

†) Post duas horas cum dimidia observatum.

‡) Octava hora observatum.

¶) A minima dosi jam sexta hora observatum.

¶¶) Post viginti quatuor horas observatum.

si et respiratione auctus, tactu non auctus.

dolor pressorius in media sterni parte, cum angore; postea lancinans in sterno dolor *).

lacinatio in latere dextro **).

lacinatio in latere sinistro ***).

inter motum dolor artuum quasi a confractione.

5 a tactu musculi artuum dolorifici ****).

strictorius dolor in artibus sinistri lateris.

dolor artuum tam internus quam tactu exasperatus †).

dolores in dorso dilacerantes.

dolores in dorso fodientes.

10 dolores in dorso strictorii.

dolores in pedibus dilacerantes.

dolores in pedibus fodientes.

dolores in pedibus strictorii.

dolor in digitis manuum dilacerans, fodiens, strictorius.

15 dolor in digitis pedum exedens ‡‡).

inter quietem lancinatus singuli in humeri musculis et articulatione ‡‡‡).

sub axilla dextra dolor pulsatorio formicans et ardor inde ad digitos pergens ‡‡‡‡).

lacinatus in genu.

in-

* Tertia hora observatum.

**) Prima hora observatum.

***) Tertia hora observatum.

****) Post nycthemerum observatum,

†) Post nycthemerum observatum.

‡‡) Tertia hora observatum.

‡‡‡) Prima hora observatum.

‡‡‡‡) Prima hora observatum.

in suris tensivus dolor inter motum *).
lancinatus in scapulis a dextra ad sinistram.
in brachii radio dolor inter motum et a tactu,
quasi a contortione.
dolor in articulatione humeri et cubito et tubo
ossis intermedio ex diffringente, lacerante, lancinante compositus, inter
quietem intolerabilis cum gravitatis
sensu et metu brachium movendi, mo-
tu tamen ipso mitigatus **).
pedum tumor vespertinus.
pedum calor, tumor, pruritus indesinens, ex-
edens.
dolor acutus in pedis junctura, inter movendum,
quasi a contortione.
pruritus in junctura pedum.
pustulae tuberculosae durae, nullo humore re-
fertae, rubore circumfusae, pruriens
tes per diem totum ardenti dolore,
in artibus, in metacarpo et dorso
phalangum digitorum.
dolores lacerantes in tumoribus glandularum 10
duris, si qui adsunt, excitat.
dolores lancinantes et calorem in glandula-
rum tumoribus frigidis, si qui ad-
sunt, excitat, certe si tangun-
tur ***).
symptomata omnia, maxime capitis dolor au-
gentur potu, cibo, somno, lo-
quela.
symptomata maxime aucta a tabaci fumo haus-
to.

*) Post decem horas observatum.

**) Quinta hora observatum.

***) Prima hora observatum.

symptoma^ta aucta a coffeea.

animus hilaris, contentus, lepidus; facetiae,
sales **).

propensio irresistibilis in cantillationem, deli-
rii instar.

orgasmus partium genitalium, appetentia rei
venereae **).

5 (menorrhagia.)

hyperesthesia ***).

irritabilitas stomachi, haec illa facile in malam
partem vertit †).

calor.

sudor.

10 (restagnatio flatuum ††).

constipatio plurium dierum †††).

*) Sequentia octo symptoma^ta inter vires secundi ordinis
referenda esse videntur.

**) Aliquando post minimam dosin jam hora sexta obser-
vatum.

***) Post horam vigesimam quartam observatum.

†) Post nycthemerum observavi.

††) Inter reliquias vidi.

†††) Inter reliquias vidi.

[OBSERVATA ALIORUM.]

AMATUS LUSITANUS, Cent. 4. curat.

79.

(a quatuor granis in adulto.)

Nausea.

singultus.

animi angustiae, agon *).

JOHN HILL, History of the mat. med.

S. 504.

Nausea.

syncope.

RUMPH, Amboin. Tom. V. S. 35.

Haemorrhagiae.

^{*}) Haec symptomata illico nata sunt.

COPAIFERA BALSAMUM L. (solu.
tio balsami in spiritu vini.)

*V*is

Micturitio continua.

urinae parcum stillicidium.

ardor in urethra inter mingendum.

dolor in urethra pulsatorius extra mictum, ori-
ficio urethrae aperto, tumido, in-
flammato.

5 dolor in urethrae orificio, quasi a vulnere.
blennorrhagia purulenta.

febris aliquot dies repetens; post matutinum
frigus et frigiditatem, calor pomeri-
dianus universalis, cum siti aquae.

diarrhoea excrementorum alborum maxime
mane inter frigus cum doloribus ven-
tris dissidentibus, truncum incur-
vare cogentibus, ante et inter sedes.

diarrhoea involuntaria.

10 uteri haemorrhagia.

inter motum dolor dorsi pedis, inter frigus fe-
brile.

ante tormina dissidentia dolor strictorius in
femoris ossis tubo.

[OBSERVATA ALIORUM.]

FR. WILH. HOPPE, in VALENTINI hist.
Simpl. p. 617.

Sanguinem exagitat; febris.
haemorrhagiae.
cephalalgiae.
dolores et ardores ventris.
cordis palpitationes.

haemoptysis.
mictus cruentus.

MURRAY, Apparat. Medicam. IV. p. 61.
(largiori dosi.)

Alvum laxat.

CUPRUM VITRIOLATUM (solutio
in aqua.)

*V*is *).

- Fastidium quadrantem horae durans. }
nausea quadrantem horae durans. } **).
pressio in scrobiculo ***).
nausea vomituriens.
vomitus identidem recurrens, violentus.
mane pituitosum maxime os.
sensus in vertice formicans, ut in narcosi ob-
tusus, mistus cum depressionis sensu
a vertice deorsum et quodam stupo-
re †).
sensus depressorius in vertice ‡‡),
angor.
sapor dulcis in ore.
hypochondria per respirationem dolore lace-
ranti affecta, tactu maxime dolentia
ut a contusione.

*) Quantum temporis duret, nondum experiri mihi licuit,
sed diu non durare, mihi verosimile est.

**) Statim post sumptum medicamen oriuntur.

***) Post quadrantem horae observatum.

†) Post quadrantem horae observavi.

‡‡) Hora una exacta observatum.

palpitatio cordis.

vertigo.

haemoptysis.

constrictio pectoris dolorifica.

tussis.

respiratio inter tussim intercepta et fere deleta.

dolor pressorius pectoris.

lassitudo.

oculi vacillantes.

palpebrae statim clausae, vibrantes.

sensus omnes evanidi.

respiratio citissima, vagitosa.

jactatio.

pedes frigidi.

singultus.

reminiscentia aliquante cito rediens, quam
potestas palpebras diducendi et lo-
quendi.

tussicula ^{***}) respirationem intercipiens.

tussis [†]) indesinens per semihoram, horam,
horas duas durans ^{††}).

* Ex his, quae sequuntur, symptomatis conflatis paroxysmus ecstaticus post plures tandem horas oriri, et subinde recurrere solet; unus quisque semihoram, horam durat, spatiis hiberis inter quemque plus minus longis intercalatis.

**) Quae sequitur series symptomatum paroxysmus est ecstaseos, qui per tempus aliquod subinde recurrere conuenescit.

***) Post reditum reminiscentiae.

†) Primo mane orta a dosibus binis pridie datis.

††) Nec interdiu rediens.

[OBSERVATA ALIORUM.]

COSMIER, Wahrnehm. med. chirurg.
Altenb. III. p. 308.

Dolores atroces ventriculi,
convulsiones extremitatum.
ululatus quasi ranarum.
amentia timida aufugere conantis.
oculi prominentes, splendentes.
tormina.
ventriculi debilitas.
dolores intra scapulas, in cubiti flexione, in
genu flexione.

} *).

LAZERME, de morbis capitis p. 253.

(a denario deglutito.)

Epileptici insultus per intervalla brevia recur-
rentes.

PFÜNDEL, in HUFELAND'S Journ. d. pr.
Arz. II, p. 274.

(a granis duobus cupri ammoniaci.)

10 Obtenebratio visus.
anxietas.

*) Symptomata per paroxysmos recurrentia improviso-
subitaneos.

mador cutis.

enuresis.

pulsus celerior.

mens exaltata.

(a granis sex.)

vomitus vehemens bilis merae *).

vomituritiones cum terminibus spasmodicis in
abdomine.

paroxysmi epileptici **).

paroxysmi asthmatis, pectus angustatum, re-
spiratio difficilis, fere ad suffocatio-
nem usque.

post paroxymos epilepticos et asthmaticos, vo-
mituritiones spasmodicae, subsequan-
tia intermissione vix semihorae.

caput tumidum.

10

facies rubra.

pulsus plenus, naturalis tamen velocitatis.

lapsus virium insignis, nec artus movere, nec
verbum proferre potest ***).

impos animi †).

constipatio per septem dies.

15

vomituritio.

ardoris sensus in ventriculo.

secessus copiosus urinae foetidae, viscidae,
turbidae sine sedimento.

sudor nocturnus validus.

* Post quadrantem horae.

**) Ante primam horam elapsam.

***) Post octavam horam. Per sequens nychthemerum hinc
inde reiterantes leves spastici insultus et post singulum
quasi mortua jacebat.

†) Postero die.

J. HORSTIUS ap. SCHENCK, lib. VII. obs. 223.

(a scobina ex campana in adulta.)

Vomitus violentus.

diarrhoea vehemens,

corporis tumor.

capitis dolores immanes.

, ventriculi dolores immanes.

vertigines.

punctiones.

phrenitis.

post mentem receptam rosiones et punc torii do-

lores in ventriculo, quasi acubus

transfixus esset.

**DIGITALIS PURPUREA, L. (succus
foliorum solis calore inspissatus.)**

Vis sex ad septem dies durat.

Frigiditas primo digitorum, manuum, pedum,
tum volae et plantae, tum totius cor-
poris maxime artuum,

lapsus virium vitalium.

palpitatio cordis.

nitus in laborem *).

moeror lacrymatorius de frustrationibus va-
riis **).

mortis timor.

mania taciturna, reluctans, inobediens; aufu-
gere tentat.

pulsus dimidio tardior plurium dierum.

constrictio dolorifica pectoris suffocatoria ma-
xime inter experreptionem e somno,
considerate cogens, cum sensu, quasi
connatae essent omnes partes pecto-
ris.

dolor in genibus quasi a contusione.

10

juncturarum dolor acutus.

*) Post semihoram observatum.

**) Post sesquihoram observatum.

languor dormituriens, sopor *).

borborygmi colicales per semihoram.

salivatio.

nausea.

• vomitus.

purgatio.

urinae profluvium.

haemoptysis.

ophthalmia chemodes.

10 inflammatio glandularum meibomianarum.

pulsus durus, parvus, celer.

incontinentia alvi et urinae **).

*) Post octo horas observatum.

**) Non nisi inter reliquias observavi, dubius an primi ordinis viribus sit accensendum.

[OBSERVATA ALIORUM.]

H. BOERHAAVE, Hort. L. B. p. 308.

Exulceratio oris, faucium, oesophagi, ventriculi.

(BAYLIES) Practical essays on med. subjects. Lond. 1773. p. 59.

Vomitus ingens *).

purgatio vehemens.

exulceratio oris interni, linguae, gingivarum, cum salivatione **).

DON. MONRO, in Samml. b. A.f. pr. Aerzte, XIII. p. 2.

Inflammatio vesicae colli.

LENTIN, Beob. einig. Krankh. 1774. p. 167.

Vomitus enormis.

constrictio gulæ spasmodica.

singultus.

diarrhoea vehemens.

salivatio.

pulsus latus.

10

* Quatuor horarum.

**) Trium dierum.

SCHIEMAN, Diss. de digit. purp. Göttin-
gae, 1786.

Objecta alieno colore visa.
salivatio.

BAKER, medical transact. Vol. III. p. 292.
Pulsus multo lentior, ad dimidium fere.

LETTSON, Mem. of the medical society,
Vol. II. p. 172.
Pulsus multo lentior *).

WARREN, in Samml. br. Abh. f. pr. Aerz-
te, XI. p. 1.

5 Nausea quasi moribundi.

WITHERING, in Samml. br. Abh. f. pr.
Aerzte XI. p. 1.

Nausea agonizans per vices repetens **).
vomitus longus.

purgatio.

vertigo.

scotomia.

10 confusio visus, color objectorum vel viridis,
vel luteus.

pulsus latus ***).

sudor frigidus.

*) Per 24, immo 48 horas; tum vero tanto celerior, de-
pressus tamen.

**) Quatuor saepe horas durans et vel ante vel post diure-
sin invalescens.

***) Triginta quinque adeo ictibus in minuto.

spasmi.

syncope.

MURRAY, Appar. Medic. Vol. I. p. 734.

Pruritus in glandulis.

dolor in glandulis.

cephalalgia.

visus obtenebratio.

vertigo.

inflatio faciei.

febris.

DROSERA ROTUNDIFOLIA, L.

(foliorum pulveris tinctura.)

*V*is duarum fere dierum esse videtur.

Frigus continuum, calefieri nequit.

inter requiem et calorem justum corporis horripilatio, calefieri nequit nec in lecto.
inter requiem horripilatio, inter motum nulla. membra omnia torpescit.

5 *raucedo, raucedo aphona.*

caput obnubilatum, grave.

in capite dolor pressorius.

respiratio angusta.

respiratio alta.

10 *lancinatus et pulsatio in scrobiculo.*

effluxus salivaæ aqueae copiosus *).

amari liquoris regurgitatio.

amari et acidi liquoris regurgitatio.

sapor escarum deletus.

15 *tussis.*

tussis nocturna.

vomititio inter tussim.

inter tussim vomitus aquae, pituitae, escarum.

palpebrarum conglutinatio purulenta.

lin-

*) Citius, serius observavi.

- linguae apicis exulceratio albida.
 sternutatio dolorosa, et tussis, manu pectus
 fulcire cogens.
 pupillae contractae.
 haemoptysis.
 tormina forficantia, correptoria cum diarrhoea. 5
 (tormina dissidentia *).
 tormina contortoria.
 dolor hinc inde in dorso quasi a contusione.
 artus omnes quasi a verberatione dolorosi, vel
 tactu.
 rheuma motu percipiendus intra scapulas ad os 10
 sacrum usque.
 femorum musculi dolorosi, quasi caro ab ossi-
 bus separata esset.
 dolor regionis hypochondriacae, tactu exaspe-
 randus, tussim reprimens, constri-
 ctorius; tunc tussis non possibilis,
 nisi manus scrobiculo imponatur.
 sitis.
 calor in capite.
 calor et rubor faciei **).
 sudor nocturnus. 15
 agrypnia.
 tumor parvus, rotundus in medio linguae cor-
 pore, non dolorosus ***).

* Post tres horas observatum.

**) Post quintam horam observatum.

***) Non nisi inter reliquias observatum.

[OBSERVATA ALIORUM.]

HALLER, vel VICAT, Matiere med. I. p.
313, 314.

Cutem exulcerat.
dentes laedit.

BONFIGLI, apud VICAT, ibid.
Sudores.

NICOLAUS, apud VICAT, ibid.
Diuresis.

HYOSCYAMUS NIGER, L. (herbae
succus calore solis inspissatus.)

Vis trium ut plurium dierum.

Caput obnubilatum et obtenebratio ea, quae
a nimia corporis debilitate in caput
adscendere solet *).

ob angorem et anxietatem agrypnia.

dolor capitis obtusus in fronte, maxime in me-
ningibus cerebri.

dolor capitis in fundo cerebri obtusus.

(dolor lacerans in occipite.)

(dolor capitis punctoriis.)

5

taciturnitas interna.

coma vigilans.

gustus et olfactus deletus.

hallucinatio in visu, candelae unius flamma mi- 10
nor videtur, alterius magna, quam-
quam candelae sint pares **).

narcosis artuum.

frigidi pedes.

vertigo.

memoria debilis.

I 2

*) Maxime mane observatum.

**) Post decem horas observatum.

nausea.

anorexia sapore integro.

vomititio.

salivatio.

5 salivae sapor salsus.

sensus mordax in faucibus.

dentium vacillatio et sensus vibrans, tinniens,
in iis.

dentium (inter mordendum maxime) dolor,
quasi casuri essent.

dentium (in gingivis) dolor lacerans maxime ab
aere frido.

10 siccitas narium.

tussicula sicca.

accessus crebri pressionis in scrobieulo, re-
spirationem coaretantis.

pressio in umbilico.

tormina discidentia.

15 dolor in infimo abdomine dissindens,

spasmi abdominalium muscularum quasi a vivo
animante intus tumultuante *).

nitus alvum exonerandi creber.

cacaturitio, sedes naturales.

dolor in pedibus infimis.

20 dolor tensivus, in femorum medio transversus

et quasi nimis curta essent inter ad-
scensionem scalarum.

dolores fixi in lumbis.

(dolor lacerans in dorso.)

faciei calor, rubor.

haemorrhagia narium.

* Post tres horas a vapore excitatum.

zelotypia.
 rixae. } *).
 furor injurians, laedens.
 paralysis vesicae.
 febris pomeridiana frigoris plena, do- }
 lore stipata, v. c. dorsi.
 furunculi frequentes mayores.
 meticulositas summa. } **).

* Inter secundi ordinis vires videntur referenda.

**) Non nisi inter reliquias vidi.

[OBSERVATA ALIORUM.]

EL. CAMERARIUS, Acta Nat. Cur. Vol. I.
obs. 121.

(a radicibus in puero 6 annorum.)

Prosternitur in terram subito.
convulsus alternis quassat pedibus terram.
jactationes corporis enormes.
spasmis artus flectuntur et truncō flexo corpus
in altum projicitur.

5 spuma ante os.
oculi torvi tortique.
facies distorta, livida, lurida, ore hiante.
praecordiorum coarctatio.
respiratio difficilis, ronchis reciprocis.

CHPH. SELIGER, Misc. Nat. Cur. Dec. II.
ann. 1. obs. 138.

(a fotu capitis per decoctum Hyoscyami.)

10 Epilepsia.

G. W. WEDEL, Misc. Nat. Cur. Dec. I,
ann. 3. obs. 21.

Coma vigil.
inagnitio adstantium.
faciei rubor.
delirium.

stupiditas.

verba non cohaerentia.

anxietas ingens.

J. B. HELMONT, Jus duumvir. §. 22.

Dementia totalis.

J. la SERRE, Misc. Nat. Cur. Dec. II. ann.

5. obs. 78.

(in clystere.)

Temulentia.

omnibus sensibus orbatus.

torvus adspectus.

sedet in lecto immobilis, statuae instar.

G. CLAUDER, Mis. Nat. Cur. Dec. V. ann.

6. obs. 178.

(ab externo usu.)

Tumor.

stupor dolorificus manuum.

10

J. A. HÜNERWOLF, Misc. Nat. Cur. Dec.

III, ann. 2. obs. 92.

(a radice.)

Stupida obmutuit *).

torvo vultu obvios intuetur.

excoecata et aniens passim errat per urbem.

vomitus.

somnus trium dierum.

15

**).

constrictio faucium.

*) Foemina.

**) Filius 13 annorum.

caligant oculi.

motus convulsivi.

delirium.

diarrhoea.

5 somnus immodicus.

pectoris angustia.

vertigo.

prostratio humi.

delirium.

10 oculi inversi.

intra pugnum imprimit pollices.

vomitus.

somnus altus.

anxietas.

15 lipothymia.

riget tota veluti tetano.

desipientia.

vomitus.

somnus duorum dierum.

20 nausea.

difficilis respiratio.

stupor in verbis et factis obvius.

M. GRÜNEWALD, Misc. Nat. Cur. Dec. III.

ann. 9, 10. app. p. 179.

(a fumo seminum.)

Contumeliae, rixae, tumultus,
violentia, verbera,

*) Puella 8 annorum.

**) Puella 6 annorum.

***) Mater, quae parum gustaverat,

scotomia.

vomitus crebri.

ridiculi gestus, ebriorum more.

vertigines *).

sedes crebriores.

absurdae gesticulationes, morionis instar saltantis.

cantilenae amatoriae, profanae.

versificationes.

vagabunda insania per varias terras, nudo corpore, per aestatem pelle vestito,

(a clystere ex foliis H. ibid. p. 181.)

Effutiunt plurima, quae per totam vitam retinuisse prudentia suasisset.

(in sacerdote a foliolo H. per clysterem **).

Ferociae intermista facta inepte solemnia, vestitu inconcinno ***).

hallucinatio circa magnitudinem rerum †).

temulentia.

vomitus.

altercatio.

illatio manuum violentarum.

gesticulatio.

inepte facta.

15

*) Per quatuordecim dies.

**) Octodecim horas haec mania durabat.

***) Stola sacerdotali supra indusium indutus et tibialibus pellitis amictus templum adire, ibique concionari et mystica tractare intendit, et furibundus aggreditur eos, qui eum retinere conantur.

†) Alaudam pro ansere venditahat.

S. SCHULZE, Misc. Nat. Cur. Dec. I. ann.
4, 5. obs. 124.

(a radice.)

Jurgia.

verbera, furor *).

gesticulationes histriorum instar.

hallucinatio circa formam et faciem rerum ob-
viarum **).

ARCH. HAMILTON, in neue edinb. Vers. II.

p. 275.

(a seminibus Hyosc. albi.)

, Torpor ***).

somnolentia, palpebras aperiendi impotentia.

animus demissus, tristitia.

Iassitudo et languor totius corporis.

propensio in somnum incoercibilis †).

10 faucium immeabilitas insignis et siccitas, ita ut
sorbitio theae potus ipsum suffocatu-
ra esse videretur.

tormina,

post potum modo convulsiones, modo inagni-
tio adstantium.

blateratio absurdorum.

querelae de beneficio sibi illato.

15 oculi aperti, hinc illinc distorti.

pavoris concussions cum tremore et convulsio-
nibus alternantes.

floccilegium, tentat manu lectum, caput, fa-
ciem, nasum.

*) Ovios trucidare gestiebat.

**) Alter omnia ex auro confecta putat, alter homines ob-
vios porcos esse credebat.

***) Post semihoram.

†) Quae manu tenet, labi patitur.

pulsus minimus, debilis.
 subsultus tendinum.
 tactus sensus abolitus; yellationem non aegre
 ferebat.
 excretio alvi suppressa.
 indeglutio; liquores ori ingestos statim ex-
 spuebat bis.
 agrypnia nocturna convulsionibus et concussio-
 nibus quasi a terrore, intermista.
 captat temere circumcirca.
 pulsus fortior *).
 mens redux, oculis tamen torpidis et cerebro
 obtenebrato **).
 pulsus celer, plenus, fortis.
 querelae de gravitate et dolore insigni capitisi.
 sudor copiosus.
 somnus.

C. M. BLOM, kon. vetensk. acad. handl.

1774, p. 52.

(a duabus radicibus comestis in adulto.)

Ardor ventriculi.
 sitis intolerabilis.
 pervigilia.
 vertigo.
 insania.
 visus imminutio.
 macularum et vesicularum gangraenosarum co-
 piosa eruptio maxime in artibus infe-
 rioribus ***).
 diarrhoea.

* Post quatuordecim circiter horas.

**) Post viginti sex circiter horas.

***) Post nycthemerum,

NAVIER, Recueil period. d'obs. de med.
Tom. IV.

Narcosis extremitatum.
debilitas.
vertigo.
syncopae iterata.
5 chemosis.

PLANCHON, Journ. de Medecine Tom.
XIX. p. 42.

(a semine.)

Vertigines.
cephalalgia continua, atrox.
agrypnia diuturna.
insomnia terrifica.
10 phantasmata millia animo obversantia.
motus convulsivi leves extremitatum, modo
superiorum, modo inferiorum.
anorexia.
languor.
oculi convulsionibus agitati, prominentes *).
15 collum sinistrorum incurvatum.
epileptici parvi insultus intermisi apoplecticas
accessibus.
sudores magni.

COSTA, Journ. de Medic. Tom. XXX.
febr.

Ardor per totum corpus internum **).
caput grave, obnubilatum.

*) Post quatuor heptomadas.

**) Statim initio.

facies livida *).
 venae inflatae totius corporis.
 oculi rubri, splendentes.
 saltatio.
 furor incoercibilis.
 floccilegium cum müssitatione.
 apoplexia stertorosa.
 convulsiones.
 pulsus parvus, citus, intermittens.
 lingua sicca, munda.
 hypogastrium inflatum, tactu dolorosum.
 suppressio urinae.
 pruritus, scalpere ad sanguinolentiam usque
 cogens.
 horror potulentorum.
 circulatio sanguinis aucta **).
 sudor universalis, maxime femorum et cru-
 rum †).
 eruptio cutanea ‡) a zona ad genu usque pus-
 tularum magnarum coacervatarum
 (variolarum confluentium instar) nullo
 humore repletarum post quatuor dies
 squamis deciduarum.
 myopia quatuor dierum.

KIERNANDER, Utkast til medicinal Lag-
 far. 1776. p. 267.

(a radice in duobus adultis.)

Sopor diuturnus.

* Post duas horas.

**) Paroxysmi invicem alternantes.

***) Per duodecim horas.

†) Post nycthemerum, per duos dies durans.

‡) Post 72 horas.

fatuitas, vesania.

mussitatio, blateratio in semet versa.

furor atrox, obvios cultro adgreditur.

GARDANE, Gazette de santé 1773, 1774.
P. 294.

(a vapore herbae.)

Vomitus.

5 haemorrhagia narium.

obnubilatio, stupor.

cephalalgia plurium horarum.

HAMBERGER, Diss. de opio §. 18.

(in puero a radice Hyosc. comesta.)

Inquietudo.

masticatio impedita. } *).

10 indeglutitio.

molestia in faucibus; digitis monstrat, ac si quid
in ore haereret.

potum desiderat, nec tamen deglutire valet.
dormititio **).

ex somno sponte excitatur cum clamore.

15 standi, sedendi potentia.

natum et pedum rubor.

ardor externus totius corporis sine rubore.

cutis totius corporis inflammata, rubicunda
cinnabarini coloris ***).

inter clamorem, et ardorem constantem, re-
spiratio vehemens (gravis) et manuum
violenta agitatio †).

*) Post sesquihoram.

**) Post duas horas.

***) Brevis post solum ardorem.

†) Hic status ad octavam usque horam durabat.

tranquillus decubitus *).
facies pallida, frigida.

H. SLOANE, philos. transact. No. 457.
(a seminibus in infantibus.)

Sitis indebilis.
vertigo.
scotomia.
furor.
somnus longus, profundus **).

J. STEDMAN, philos. transact. Vol. XLVII.

P. 194.

(ab herba in decocto, in septem hominibus.)

Vertigo ingens.
ebrietas.
stupor.
vacillatio.
amentia ***).
inagnitio necessariorum.
blateratio inconcinna.
delirium quasi synochi.
pulsus debilis, abnormis.
salivatio.
mutatio coloris faciei crebra.
oculi splendidi.
captabant obvia, casura enim fore clamantes. 20
imbecillitas pedum.
sudor magnus.
enuresis.

*) Per duas horas cum semisse durabat, morte subse-
quente.

**) Duorum nychthemerorum.

***) Post tres horas.

inquietudo summa.
 mania; vix contineri potest.
 ventriculi imbecillitas.
 pressio in ventriculo.
 5 tormina.
 lancinatus in pectoris latere.
 cephalalgia.
 rigescientia manuum.
 tumor manuum.

A. STOERCK, lib. de Stram. Hyos. acon.
 Vien. 1762. p. 36, 59, 47, 55.

10 Frigus et horror per totum corpus *).
 anxietates.
 mador subfrigidus.
 visus debilitas.
 animi deliquii accessus.
 15 dolor colicus.

diarrhoea pituitosa, debilitans.

alvus tardior.

TARG. TOPPETTI, relaz. di alcuni viaggi
 Vol. VI. p. 279.

Impotentia deglutiendi.
 aphonia.
 20 amentia.

GRE-

* Circa semihoram.

GREDING, in LUDWIGII advers. med. pract.
Vol. I. P. 113-116.

(a granis extracti per diem tribus ad octodecim.)

Sudor copiosus.

somnus placidus, profundus.

animi serenitas, corporis vigor.

capitis obnubilatio.

capitis gravitas.

cephalalgia.

vertigo.

sensuum internorum torpor.

exanthemata fusca, serpiginosa, pustulosa in
mento et gena.

furunculi.

tumor parotidis sinistrale.

urinae copiosum profluvium.

alvi dejectiones crebrae.

nausea *).

vomitus.

ventris tormenta.

borborygmi.

alvus adstrictior per breve tempus **).

menstrua.

menstruum irregulare.

* Rare.

**) Rare.

ptyalismus.
muci narium copiosior excretio. } *)

dolores rheumatici.

tussis sicca convulsiva.

, tussis phthisica.

singultus.

languor totius corporis.

J. G. GMELIN, Reise d. Sibirien. Gött.

1752. Vol. III. pag. 84, 85.

(ab hyoscyamo physalode.)

Ebrietas.

hallucinatio circa magnitudinem rerum **).

, terribilis phantasia de morte praesentanea,

MATTHIOLUS, comment. in Diosc. lib.

VI. p. 1064.

Capitis gravitas.

venatum distentio.

mentis alienatio cum quadam verborum alter-
catione.

mania quasi a cacodaemone obsessi.

BARRERE, observ. d'anatomie 1753.

, 5 Hydrophobia.

ventriculi inflammatio.

hydrops pertinax.

*) Raro.

**) Culmum paleae pro trabe et guttulam pro oceano ha-
bentis.

WEPFER, hist. cicutae aquat. Bas. 1716.

p. 230.

(a radice in acetario.)

Vertigo.

ardor, siccitas linguae, labiorum, corii ad-
usti instar.

fauces horridae.

tormina.

dolores in artibus.

lapsus virium insignis *).

amentia.

delirium, hallucinatio nubes diffingere opinan-
tis, quarum nucleos avibus projice-
ret, et manibus abigentis veluti pa-
vones.

mussitatio ineptorum.

hallucinatio fornacem amplectentis loco arbo-
ris scandendae.

clamores de torminibus quasi ilea rumpantur,
pugnis in latera innixis.

impotentia palpebras aperiendi.
scotomia.

inter legendum, verborum et phrasium incon-
cinnia admistio.

visus depravatus literas, formicarum discurren- 15
tium instar, animatas opinantis.

hallucinatio amblyopica acum loco incongruo
figentis.

presbyopia chronica.

HALLER, in VICAT Matiere med. I. p. 184.

(a seminibus.)

Amentia.

hemiplegia.

* Post quatuor circiter horas.

VICAT, mat. med. I. p. 185.

(a pulvere seminum naribus attracto.)

Vertigines.

capitis gravitas.

J. JASKIEWITZ, Diss. pharmaca regni veget. Vindob. 1775. p. 53.

(a seminibus in puella.)

Convulsiones *).

(in adulto **).

visus obtenebratio.

, memoriae lapsus.

spasmi.

aphonia.

van EEMS, in praelect. Boerhaavii dem. n. ad Tom. I. p. 236.

(a vapore succi ***).

Sensuum amissionis periculum.

de RUEF, Nov. Act. Nat. Cur. Tom. IV. obs. 59.

(a fumo seminum.)

Virilis impotentia †).

J. FABER, ap. SCHENCK, lib. VII. obs. 152.

(a viginti quinque seminibus in viro.)

zo Mensis alienatio summa.

*) Quinque dies durantes.

**) In ipso VAN SWIETEN.

***) In ipso BOERHAAVIO.

†) Per duos menses.

inagnitio parentum.
Iipothymia mortui instar.

WENDT, in HUFELAND's Journ. d. pr. Arz.
V. p. 390.

Objectorum color rutilus visus. } ANTAVOI
oblivio omnium. }

punctiones ex digitorum apicibus et omnibus s
corporis partibus micantes **).

stupor mentis totalis ***).

BERNIGAU, in HUFEL. Journ. d. pr. Arz. V.
p. 905.

Myopia vix trium passuum.
scotomia, quasi velamen ante oculos.
facies rubra tumida.
vox impedita.
delirium.
fauces siccae.
fauces constrictae, deglutitio impedita.
debilitas, vix pedibus insistere potest.
vertigo, labi continuo visus †).

*) Per 36 horas.

**) Post pauca minuta.

***) Per 12 horas.

†) Symptomata 36 horas durabant;

IGNATIA AMARA L. (seminis pulve-
ris tinctura.)

*V*is octo ad viginti usque horas durat.

Frigus maxime in pedibus.

*frigiditas pedum et tibiarum supra genu usque.
frigiditas et frigescentia (sive horror quasi ex
metu frigoris) pupillis parum dilatabi-
libus.*

formicatio in pedibus.

*formicatio narcotica in artibus *).*

pupillas initio contrahit.

*vertiginis species, sensus titubationis, hinc inde.
angor brevis durationis **).*

fuga laboris, motus.

fuga loquelae, taciturnitas.

angor summus vocem impedit.

*submissa vox, impotentia clara voce lo-
quendi.*

*immobilitas quasi paralytica artuum inferiorum
cum vulsionibus singulis,*

pedum infirmitas.

lassitudo brachiorum, pedum.

*) Aliquando quarta hora observatum.

**) Post quadrantem horae observatum.

***) A prima ad quartam usque horam observatum,

debilitas ad geniculationem usque. anek s. 1080
vacillatio, casus, ad minimum offendiculum,
inpingit et prolabitur.

coma; piget, oculos ad videndum, os ad lo-
quendum aperire, cum respiratione
leni et lenta.

capitis sensus quasi a vacuo.
caput grave *).

caput propendulum.

caput mensa suffultum.

gravitas capitis, quasi sanguine nimis turgeret
(qualis vulgo fit per pronationem al-
tam capitis) cum dolore lacerante in
occipite, qui mitior fit inter decubi-
tum in dorso, exasperatus erectione
trunci, maxime vero pacatus alta pro-
natione capitis inter sessum.

*pressorius dolor in fronte supra nasi radi-
cem, caput deprimere cogens, tum-
que vomituritio* **).

*caput sanguine quasi turgidum, narium in-
ternarum sensibilitas erga aerem
ut in epistaxi instantे usu venit.*

capitis dolor pulsatorius.

capitis dolor tempora quasi distendens.

pressio in temporibus, interdum cum somno
profundo.

capitis dolor pulsu arteriarum auctus.

capitis dolor loquela auctus.

manuum calor cum horrore corporis et anxi-
tate ploratum gignente.

*) Etiam quarta et sexta hora observatum.

**) Hora quinta vidi, sed tamen ad primi ordinis vires
referendum videtur, forsitan secundi vel tertii paroxysmi
initium.

calor ardens pedum.

ardor in ulcere.

querelae immodicae ejulatoriae ob minima *).

timiditas, diffidentia sui, omnia perdita putantis.

5 angor, quasi crimen commisisset.

punctus innumeri (maxime in lecto) quasi a pulicu-

licum ictibus.

pruritus in scroto quasi a pulicibus innumerabi-

libus.

lancinatio in cordis regione in exspiratione **).

lancinatus, postea punctus in scrobiculo ***).

10 punctus in latere sinistro ****).

punctus in gena.

punctus in ventriculo †).

punctus in nucha.

lancinatio in labiis, maxime dum moventur ‡‡).

15 labia fissa, sanguistua.

lancinatio in velo palatino ad aurem inter-

nam usque †††).

pressorius dolor sinistri pectoris, et hoc eva-

nido:

puctorius dolor dextri pectoris ††††).

cum angustia pectoris, pressio in scrobiculo,

inspiratione aucta et in lancinatio-

nen in scrobiculo cito transiens (1).

*) Hora prima observatum.

**) Statim post haustam Ignatiam observavi.

***) Circa quadrantem horae observatum.

****) Post semihoram, sed et post tertiam horam observa-

tum.

†) Hora una exacta observatum.

††) Post quadrantem horae observatum.

†††) Post sesquihoram observatum.

††††) Circa horam primam observatum.

(1) Secunda hora observatum.

pressio in collo.
 pressio in serobiculo.
 constrictorius dolor, torminum instar, a latere
 utroque, sub costis ultimis *).
 pressorius dolor in utraque parte epigastrii, seu
 hypochondriorum.
 constrictorio pressorius dolor in utero, dolorum
 ad partum instar, immanis, subse-
 quente blennorrhagia purulenta, ero-
 dente.
pressorius dolor in glandulis submaxillari-
 bus.
 spasmus tonicus membrorum omnium, quasi a
 rigiditate.
 rigiditas genu et lumborum, inter motum do-
 lorifica.
 tensionis sensus in cruribus supra genu usque,
 cum gravitate crurum.
 rigiditas nuchae.
 tormina (infra umbilicum) punctoria **).
tormina forficantia (post punctoria) in alter-
 *utro latere abdominis ***).*
tormina forficantia †).
 tormina forficantia in ipsa umbilici regione vo-
 mitum procreantia, dolore postea in
 pectoris sinistri latus migrante forfi-
 canti punctoria.
 dolor punctorio lacerans in nucha ‡†).

10

15

*) Post quadrantem horae observatum.

**) A prima ad secundam horam observatum.

***) Post secundam et circa decimam horam observavi.

†) Aliquando circa primam horam observavi, et tamen
plura suadent, ut inter secundi ordinis vires ponere ma-
lim.

‡†) Circa secundam et dimidiam horam observavi.

dolor lacerans in larynge, deglutitione, respiratione et tussi auctus *).

dolor strictorius in glandulis submaxillariibus **).

dolor strictorius a glandulis maxillaribus in maxillas tendens, tum glandularum istarum tumor ***).

in gula quasi ab epistomio sensus, extra deglutitionem percipiendus.

5 tumor dolorosus ostii ductuum salivalium †).
salivae sputum crebrum.

vomititio inanis.

anorexia ‡‡).
signa digestionis impeditae, debilis.

10 regurgitatio ingestorum.
sapor in ore ut a corruptione ventriculi contentorum.

sapor ingestorum, maxime cerevisiae amarus,
vel putridus.

regurgitatio amari liquoris.

post cibum captum distentionis abdominis sensus.

15 post pastum distentio abdominis cum siccitate et amarore faucium, sine siti et genae unius rubore, vesperi.

sapor antea amarus in acidum mutatur †††) cum ructibus acidis.

*) Circa sesquihoram observatum.

**) Circa quartam horam observatum.

***) Aliquanto serius observatum.

†) Circa quartam horam observatum.

††) A prima ad septimam usque horam continuatam vidi.

†††) Circa desimam horam in acidum mutatum vidi amarum saporem et tamen utri prioritas competit, nondum satis mibi liquet.

ructus acidi.

sapor acidus saliva in ore. } *).

acidorum anorexia. }

ardor in lingua **).

ardor ventriculi ***).

(sensus in ventriculo ut ab inedia longa quasi
a vacuo, cum sapore fatuo, et lassi-
tudine omnium membrorum.)

tenesmus (sive impetus ad alvi exonerationem)
in recto, non in ano ****).

(lacerans in abdomen dolor.)

borborygni.

lacerans in digitis dolor et in carpi malleolo. 10

in manum malleolo dolor lacerans mane post
experreptionem e somno.

stricterius dolor in brachii.

pulsatio in osse sacro †).

pulsatio in pectore dextro ††).

palpitatio cordis. 15

tremor plurium horarum.

vulso membrorum spasmodica uno ictu.

vulso artuum uno ictu, incipiente som-
no †††).

concussiones terrifcae inter somnum capien-
dum ob phantasias monstrosas ††††),
vel post experreptionem aliquamdiu
vigentes.

*). Circa primam horam observatum.

**). Statim post potam Ignatiam.

***). Aliquando circa sextam horam observatum.

****). Post sesquihoram observatum.

†). Circa septimam horam observavi.

††). Sesquihora observavi.

†††). Circa tertiam horam observavi.

††††). More: humano capiti cervicem jungere equinam, si
velis. —

somnus profundus *).

delirium querulans de strepitu nimio **).

intolerantia strepitus cum faciliori dilatabilitate pupillarum ***).

pupillae dilatabiliores ****) et magis dilatatae.

taedium et stomachus brevis.

morositas summa, opprobrians, vituperans.

inconstantia, impatientia, haesi-

tatio (indeterminatio), } rixae.

mutabilitas mira animi, in jocum
jam, jam in fletum proni.

capitis dolor pronatione auctus ††).

dolor capitis supra orbitam dextram ad nasi radicem pressorius et aliquantum stritorius, pronatione alta emergens †††).

calor in capite.

calor internus ad caput ascendens, sine siti.

faciei rubor vespertinus cum horrore.

febris pomeridiana, horripilatio cum tormibus, tum debilitas et somnus cum calore corporis ardente.

* Tertia circiter hora observatum.

**) Secunda hora observatum.

***) Sexta circiter hora observatum.

****) Etiam quarta circiter hora visum.

† Hi animi affectus intercedpine trium vel quatuor horarum reiterare solent.

†† Hunc quamvis hora jam prima exacta observaverim, nihil tamen obstat, quo minus secundi ordinis viribus acceseam, superius dictum autem capitis dolorem pronatione pacatum viribus primi ordinis, cum constet, Ignatiam operationis suae curriculum paroxysmis pluribus, ambos virium ordines complectentibus, et intervallo aliquot horarum repetentibus, absolvere.

††† Decima sexta hora observatum.

*sensus quasi a sudore erupturo (caloris volatili anxi sensus) *).*

caloris externi intolerabilis sensus; tum respiratione cita.

inter somnum inspiratio stertorosa.

respiratio omnis generis inter somnum alternans, brevis, lenta, gravis, lenis, evanida, stertorosa.

*somnus tam levis, ut quaevis exaudiantur, v. 5
c. campanarum procul distantium sonitus.*

gena et auricula alterutra rubore suffusae, ardentes.

calor, ardor in nucha, vel colli alterutra parte.

caloris insultus subitanei per totum corpus volatiles.

calor externus auctus.

calor et rubor externus, sine calore interno. 10

*ardor pruriens (ut a pernionibus) in calcaneo et caeteris pedum partibus **).*

titillatio narium.

excoriatio narium.

catarrhus, gravedo.

tussis cava, sicca inter expurgescendum e somno. 15

*fauces quasi excoriatae, anginae species ***).*

dolor in faucibus quasi ab excoriatura, deglutitione tantum percipiendus.

asperitas linguae apicis, quasi a vulnere.

constrictio pectoris et respirationis †).

* Post sesquihoram observatum.

**) Circa octavam horam observatum.

***) Post semihoram observatum.

†) Quinta circiter hora observatum.

inspiratio pondere quasi oppressa, exspiratio-
ne expedita.

pectoris oppletio.

expectoratio difficilis.

sudor universalis.

pupillae et dilatabilitas expedita et contractili-
tas.

diuresis aquosa.

sedes mucosae.

oscitatio crebra, interrupta *).

lucis intolerabilitas **).

memoria labilis ***).

vacillatio dentium, odontalgia.

formicatio in ossibus pedum, non narcotica †).

dolor capitis quasi a contusione ‡†).

dolor in vicinio scrobiculi, tactu tandem per-
cipiens, ut a vulnere interno.

dolor simplex, tactu tantum excitandus,
vchemens, parvo spatio circum-
scriptus v. c. in costis etc.

dolor in articulatione humeri inter brachii
retroversionem, quasi a nimio la-
bore, sive a contusione.

symptomata aucta a coffeeae potu et tabaci fu-
mo.

dolor in articulatione humeri, femoris, ge-
num quasi a contortione seu luxa-
tione ‡‡†).

*) Intra octavam horam et decimam observatum.

**) Decima hora observatum.

***) Ante octavam horam vel decimam observatum.

†) Post decimam horam observatum.

‡†) Hora octava observatum.

‡‡†) Octava hora observatum.

dolor in humeri junctura, quasi contorta vel luxata esset *).

dolor in nucha, quando collum movetur, laceras, quasi a distortione **).

in malleolo manus sinistrae sensus paralyzans et dolor quasi a distortione.

tinnitus aurium.

agrypnia.

pupillae magis dilatabiles quam contractiles.

leucorrhœa chronica.

*) Decima hora observatum.

**) Duodecima hora observatum. Isti quasi a luxatione dolores an vere secundi ordinis virium sint, non ausim pronuntiare.

***) Ambo inter reliquias observavi.

[OBSERVATA ALIORUM.]

BERGIUS, mat. med. S. 150.

Menstruatio *).

vertigo.

tremor totius corporis.

motus convulsivi.

sudores frigidi.

animi deliquium.

CAMELLI, philos. trans. Vol. XXI. No.
250.

Spasmi.

convulsiones.

risus involuntarius.

angustia pectoris.

vertigo.

sudores frigidi.

VALENTINUS, hist. simpl. reform. S.
198.

Borborygmi.

J. C.

* A nimia dosi, scrupulo.

IPECACUANHA (radicis pulvis et pulveris tinctura.)

*V*is ultra 16 horas durare non videtur.

Horripilatio cum oscitatione *).

frigoris hyperaesthesia.

horripilatio cum ructibus.

frigiditas.

5 palpitatio cordis.

palpitatio cordis fere sine angore.

(vertigo inter eundum.)

inquietudo in abdomine **).

sensus vacui et atoniae in ventriculo.

10 sapor in ore satius.

a lipsia.

in ima linguae parte et in velo palati is sensus,

salivam concitans, qui ab esu mar-

chantiae, seu potius artemisiae dra-

cunculi nasci solet.

nimia et fere dolorosa sensibilitas oris interni

partium.

mordacitas in labiis.

*) intra horam primam observatum;

**) Semihora observatum.

mordacitus in linguae margine.
 salivae affluxus copiosus per aliquot horas.
 vomititatio, vomitus.
*punctio in gula**).
 dolor inter deglutionem, quasi a tumore in s
 pharynge**); anginae species.
 sensus in pharynge quasi a siccitate nimia vel
 aspritudine ea, quae a deglubitione
 oritur; salivae vel potus ordinarii de-
 glutitione ad breve tempus minuitur
 et fugatur***); anginae species.
 somnolentia †).
 somnus turbulentus, ejulatorius.
idearum series lente progrediens,
 ineptitudo ad quaevis impingens. 10
 achaeria.
 fastidium omnium.
 morositas tacitura, contemtrix.
morositas omnia vilipendentis et optantis, ut
et alii omnia flocci faciant.
 morositas infelicem se putantis. 15
impatientia summa.
 aegritudo ob labores et negotianimis lente suc-
 cedentia.
 stomachatio ob strepitum minimum.
 propensio in indignationem et stomachationem
 summa.
Glançinantes hinc inde dolores, motu excitati
et in ardentes dolores terminati.) 20

L 2

*) Intra semihoram, et circa horam primam plures obser-
 vatum.

**) Hora prima observatum.

***) Hora ut plurimum prima observatum.

†) Ante horam primam exactam observatum,

*lancinatio in hypochondrio sinistro *).*

lancinatio in ano.

*punctorius dolor in fronte, tactu exasperandus,
excitandus.*

*dolor osteocopus omnium ossium }
(juncturarum) quasi a
contusione.*

*5 dolor articulationum, qualis in }
artuum narcosi junc-
ris usu venit.*

*tensionis et expansionis summae abdominis
sensus.*

colica flatulenta.

*tormina forficantia in utroque hypochon-
drio, epigastrio **).*

*tormina dissidentia circa umbilicum una
cum horrore.*

*10 lacerans dolor in abdome supra umbilicum.
lacerans dolor in fronte, tactu exasperandus,
excitandus.*

*forficantes dolores in pede dextro. } †).
forficantes dolores in brachio dextro. } †).*

*(forficantes (vulsorio lacerantes?) dolores, vo-
latici in pectore sinistro sub axilla.)*

15 asthma.

angustia pectoris aliquot horarum ††).

*cephalalgia quasi a contusione cerebri et
cranii, per omnia capitis ossa ad
linguæ radicem usque pertingens,
nauseabunda.*

*) Semihora observatum.

**) Tertia circiter hora observatum.

***) Tertia hora observatum.

†) Intra tertiam et quartam horam observatum.

††) Circa quartam horam oriri observavi.

(cephalalgia pressoria.)

(cephalalgia tensiva.)

urina rubra, pauca.

(calor internus cum frigiditate externa.)

stridulatio bronchiorum in respiratione.

tussis ex sensu constrictorio titillante in superiori laryngis parte ad imam bronchiorum sedem tendente, nascens^{}).*

tussis suffocatoria.

fragor juncturarum.

dolor genu quasi in ligamentis defatigatione confectis.

pupillae dilatabiliores.

(sedes porraceo virides.)

(sedes citrinae.)

siccitas palpebrarum cum somnolentia **).

capitis dolor volatice punctoriis, lancinans,
post horam in pressorium transiens ***).

animus desideriis et votis ignotis agitatus, scrupulosus, curiosus, plenus sollicitudine †).

pupillae maxime dilatabiles ††).

siccitas palpebrarum cum somnolentia †††).

lassitudo crurum et artuum inferiorum ††††).

* Circa quartam, sextam et septimam horam observationem.

**) Hora octava observatum.

***) Hora circiter octava observatum.

†) Intra sextam et octavam horam observatum.

††) Octava hora observatum.

†††) Octava hora observatum.

††††) Intra octavam et decimam horam observatum.

(dolor dentium evulsorius per intervalla *),
sensus contorquens, strictorius in testiculis **),
calor externus sine calore interno ***).

*) Intra octavam et decimam horam observatum. An iusta
ta observatio?

**) Hora circiter octava vel decima observatum,

***) Inter reliquias observavi.



[OBSERVATA ALIORUM.]

SCOTT, med. and phil. Comment. Vol.
IV, p. 75.

(a pulveris vapore.)

Asthma convulsivum *).

MURRAY, med. pract. Biblioth. Tom.
III, p. 237.

Asthma.
epistaxis.
haemoptysis.

GEOFFROY, traité de la mat. med. II,
p. 157.
(a pulvere valitante.)

Oculorum inflammatio.
haemorrhagia narium.
angina.
respirandi difficultas.
haemoptysis.

5

* In foeminis duabus observatum.

MURRAY, Appar. medicam. I. p. 806.
Emesis *).
purgatio,

HILARY et CLEGHORN, apud. eund.
ibid p. 813.

Sudor, saepe noctu sequenti.

CLARCK, apud eund. ib. p. 814.
Nausea molesta.

*) Post quadrāntem horae vel semihovam.

**LEDUM PALUSTRE L. *), (foliorum
pulveris tinctura.)**

- V*is ad sex dies extendi videtur.
 Frigiditas universalis et frigus.
 frigiditas corporis matutina sine frigore.
 frigus quasi ab aqua frigida corpori hinc inde
 affusa.
 horror et frigus 48 horarum cum cute anserina
 sine frigiditate externa.
 ebrietas, temulentia, vappiditas capitis. 8
 dilatatio pupillae maxima.
agrypnia cum inquietudine et jactatione.
 cephalaea quasi ab ictu.
 cephalaea saeviens ferox.
 cephalaea stuporifica. 10
lipothymia.
*constrictio pectoris asthmatica, motu, itione
 exasperata.*
respiratio angusta, dolorosa.
 inspiratio convulsiva, dicrota.
 dolor in sterno. 15
angina punctoria.
 asthma bronchiale.

*^o) Ledi effecta plura coram observare mihi non licuit, in
 de dubium tempus symptomatum et ordo eorum dubius.

in bronchiis formicatio, tum respiratio cito, angusta.

aspritudo rauca in bronchiis.

tussis mere nocturna, matutina cum expectoratione purulenta.

in pectore dolor quasi a vivo animali intus tumultuante inter respirationem.

susurrus in auribus quasi a campanis vel vento procelloso.

Iippitudo (sine albugineae inflammatione) lacrimis mordaci dolore palpebram inferiorem et genam erodentibus.

palpebrae purulentae, sine dolore.

palpebrae purulentae sine tumore, vel inflammatione.

fragor genuum.

narcosis ariuum.

morositas.

appetitus prostratus.

salivae aquae effluxus ex ore cum colica.

pruritus cutaneus.

pruritus articulorum malleoli, pedum, lumbi. miliares pruriens in carpo.

pruritus in pectore ut a pediculis, cum maculis rubris, pustulis miliaribus et tuberculis in fronte ut in bibonibus.

maculae lividae, petechiarum instar.

furunculi in fronte.

pruritus punctoriis, volaticus supra totum corpus in cute.

dolor lancinans, punctoriis in manu.

dolor lancinans in malleolo pedis.

humerus sublatione brachii maxime dolorificus, dolore lancinante.

dolor in metatarso pedis quasi a luxatione.

diuresis,

— *).

tormina strictoria.

tormina quasi a dysenteria.

tormina quasi ab intestinis contritis et debilitate ea, quae post purgantia remanet **).

tormina quasi a diarrhoea nascitura ab umbilico ad anum usque, anorexia sapore integro, pedibus frigidis.

tormina (disscindentia?) cum haemorrhagia ex ano.

(in latere sinistro abdominis sensus quasi a tumore pressorio ex ventriculo cibis onusto.)

dorsi et scapularum rigiditas dolorosa intermotam.

dolores volatici lacerantes rheumatici, maxime per motum.

surae dolor tensivus post sessum inter eundum, genuum tumor et dolor tensivus et lancinans inter eundum.

genu rigiditas,

dolor tensivus genuum et calcis post sessum inter eundum.

rigiditas crurum matutina, dolorosa,

dolorosa lumborum et dorsi rigiditas post sessum.

lumbago post sessum.

dolores osteocopi, gravativi, stuporifici artuum ***),

*) Sequentes vires secundi ordinis esse videntur; nec tamen certo contendam.

**) Sexta hora observatum,

***) Vigesima circiter hora observatum.

dolor lacerans in brachiis *).

dolor lancinanti lacerans in articulationibus.

artus et totum corpus tactu dolorifica, quasi coutusa essent.

dolor in osse sacro lacerans ad occiput, hemi cranium sinistrum et maxillam sinistram usque pertingens, maxime vesperi; tum genae tumidae ardentes et oculi rubri inflammati.

5 plantae incessu dolorosae quasi ab aposthemate vel sugillatione.

pila pollicis mollis, tumida, incessu dolorosa.

tophi et nodi in articulationibus dolentes, duri.

intolerabilitas lecti caloris.

stragulorum intolerantia ob calorem inde natum.

10 sudor cum stragulorum intolerantia.

calor pedum et manuum vesperi.

sudor plantarum et volarum diutinus, calidus.

tumor pedum pertinax.

calor universalis sine siti.

15 haemoptysis valida cum tussi vehementi.

haemoptysis sanguinis dilute rubri, cum tussi vehementi.

dolor lacerans in capite et oculo, conjunctiva et albuginea chemotica, summe inflamnata, tumida, dolor lacerans in oculis, decubitu exasperatus, sessu levatus, oculis mane pure congluti-

*) Jam tercia hora observatum; an ob latentem morbi jam praesentis labem tam cito natum sit symptoma, ambiguo.

natis, sero effluo foetente (palpebris integris) siti aquae nocturna, horripilatione vespertina, calore subsequo, borborygmis, appetitu integro, capitis interno magis quam externo calore, sudore dorsi et capillitii *).

(anima foetida.)

* Post vigesimam quartam horam observatum.

[OBSERVATA ALIORUM.]
LINNEUS, flor. lappo. p. 121.

Temulentia effraena,
cephalalgia dira.

PALLAS, flor. ross. Tom. I. P. 2. p. 94.
Cephalaea.
nauseae.
; dementia.

HELLEBORUS NIGER *), L. (pul-
veris radicis tinctura.)

*V*is duarum fere dierum esse solet.

Angor summus.

frigiditas, maxime mane.

frigus in abdomine.

asthenia subitanea omnium musculorum; col-
labitur extemplo in terram frigidus,
madore frontis frigido, voce haerente,
pulsu quam lentissimo, pupilla con-
tractissima (ratione superstite?) **). —

lassitudo femorum.

pulsus latus ***).

5

nostalgia †).

desperatio vitae.

(indeterminatio.)

(inconcinnus vestitus.)

10

tussicula.

cephalalgia a nucha ad verticem confluens.

*) Planta a me ipso collecta.

**) Post horam observatum. Syncopes aliqua, sed non
vulgaris, videtur esse species.

***) Hora prima, et decima sexta observavi.

†) Semel sed indubie observavi. Nostalgia species, angor
summus genus esse videtur.

dolor capitis penetrans, (inter erectionem trunci ardor in cerebro.)

rigiditas nuchae rheumatica.

sensus in parte tumida quasi ab expansione et onere.

(dolores lancinanti fodientes in integumentis ossium.)

5 leucophlegmatio subitanea.

parvi tumores in cute frontis, dolorifici quasi ab ictu.

dolor constrictorius in osse sacro.

dolor glandularum colli.

salivatio.

10 rugitus ventris.

tormina.

vicissitudines crebrae volatiae caloris universalis sicci tum et horroris et frigiditatis, torminibus latenter forficantibus subsequis.

sedes pituitae merae, tenacis, albae.

vomituritio *).

15 menstruatio **).

pupilla dilatata.

pulsus minimus.

respiratio cito.

calor, sudor ***).

20 dolores lancinanti fodientes tam ab aura frigida, quam a labore, a pastu, et a potu exacerbati †).

[O B.

* Aliquando quadragesima hora observavi;

**) Post octavam horam observatum.

***) Hora trigesima sexta observavi.

†) Inter reliquias tantum observatum.

[OBSERVATA ALIORUM.]

GREW, anatomy of plants, pag. 280.

Stupor linguae.

SCOPOLI, flor. carn. p. 557.

Torpor artuum et insueta rigiditas.

BACHER, in Samml. f. pr. Aerzte I. p. 5.
Tumor non ingratus in lingua.BÜCHNER, Diss. de salut. et nox. Elleb.
nigri usu. p. 22.

Tormina.

anxietas.

situs.

singultus.

animi deliquia.

sudores frigidi.

faucium strangulatio.

5

10

convulsiones; spasmi.

SCHULZIUS, Mat. med. p. 152.

Molesta cephalalgia.

constrictio narium quasi praefocatoria;

stimulus ad haemorrhoides;

febris.

15

M

HILDANUS, Op. med. chir. Cent. 4.
obs. 12.

Convulsiones.
sternutatio.

TOURNEFORT, Voyage du Levant.
Tom. II, p. 189 —

Spasmi.
motus convulsivi.

BISSET, essay on the med. const. of
Great Britain p. 333 —
(ab helleboro foetido.)

5 Anxietas dira, vomitu mox cessans.

JOHN COOK, in Oxford Magazine for
March 1769.
(ab helleboro foetido.)

Vomitus.
cardialgia.
deliquia animi.

pilorum et unguium casus.
epidermidis desquamatio.

DAPHNE MEZEREUM L. (pulveris
corticis tinctura.)

*V*is septem fere dies durat post majores doses,
Pupillae constrictae.
debilitas, languor.
vitae taedium et mortis desiderium cum taciturnitate.
nil nisi ingrata et taediosa cogitat.
vertigo syncopodes.
horripilatio in dorso et supra brachia. 5
(frigus internum.)
frigiditas externa maxima 56 horarum cum
siti magna, sine appetentia caloris,
sine fuga aëris liberi et sine calore
subsequo.
inter frigus et frigiditatem totius corporis, constrictio asthmatica pectoris anterioris et posterioris.
febrile frigus cum aquosorum tantum appetentia. 10
asthma continuum plurium horarum.
inter altam respirationem dolor internus in pectoris latere, quasi pulmo ad costas adhaeret.
ponderis sensus in abdomen cum anxietate.

- cum palpitatione dolor sterni pressorius.
dolor pectoris internus lancinans. } *).
dolor pectoris internus punctorius. } *).
 constrictio et quasi strictura pharyngis.
 anorexia quasi a pituita faucium nimio.
 sensus piperatus in lingua.
 vesiculae ardentes, ureates in lingua, gingivis.
 aspiritu lo et excoriatio faucium, palati.
 raucedo ad scrobiculum colli usque pertingens.
 10 aspiritado et excoriatio narum.
 (aspiritudo et excoriatio oesophagi.)
 dolor lancinans in glandulis submaxillaribus.
 dolor nuchae, in frontem tendens, lacerans.
 in fronte dolor pressorio pulsatorius.
 15 capitis dolor pronatione trunci magna levatus.
 dolor capitis lancinans in vertice et fronte.
dolor osteocopus cranii et externe, maxime tactu dolorifici.
 dolor osteocopus claviculae lancinans.
 dolor osteocopus femorum, crurum.
 20 dolor (simplex?) omnium membrorum.
 (singultus convulsivus brachia et totum corpus concutiens **).
palpitatio cordis.
 coryza muci spississimi sanguinea.
 tussis sicca.
 25 (tussis irritatione in ima pectoris parte excitata,
 non cessans nisi vomituritione, et effluxu salivae aqueae copioso.)
 tussis indesinens aliquot horarum, vehemens,
 emesin provocans ***).

*) Hora quarta observatum.

**) Post quatuor horas semel observatum.

***) Hora prima observatum.

casei putridi halitus ex pulmonibus.
 carnis anorexia.
 sapor cerevisiae amarus.
 tormina lacerantia.
 (tormina doloris simplicis.)
 dolor in abdomine pressorius cum anxietate
 et aestuatione.
 sedes parvae, molles, crebrae.
 mictus creber *).
 urinae ardor.
 haematuria.
 bleorrhagia urethrae et vulvae.
 (in urethra pruritus extra mictum.)
 dolores tensivi in glandulis inguinis.
 frigus supra abdomen et brachia, pupillis dilata-
 tatis **).
 somnolentia diurna.
 soninus inquietus, parum reficiens.
 insomnia terribilia.
 post somnum morositas maxima.
 inter somnum successiones vehementes, ad
 morsuram linguae usque.
 pruritus pertinax plurimum dierum supra totum 20
 corpus.
 eruptio cutanea, maxime vesperi in lecto pru-
 riens.
 dolor in ulcere lancinans, maxime vesperi.
 dolor in ulcere strictorius, in margine ulceris,
 lancinans.

*) Hora quarta observatum.

**) Post quintam horam observatum.

[OBSERVATA ALIORUM.]

BERGIUS, mat. med. p. 520.
(ab usu interno.)

Eruptiones miliares rubrae, pruriētes, brachium, caput et totum corpus occupantes, discretae vel in plagulas confluentes, molestissimae.

HOME, clinical experiments p. 466.
(ab usu interno, corticis.)

Nausea.
sudor.
alvi dejectiones.

J. MAUR. HOFFMANN, Eph. Nat. Cur. Cent. 5, 6. p. 298.
(a baccis quatuor.)

5 Hypercatharsis effraena.
vomitus.
oris fauciumque ardor intolerabilis.
sitis.
febris acuta.
10 cutis totius corporis desquamatio.

LINNÉ, flor. Suec. p. 128.
(a duodecim granis baccarum.)
Vomitus cruentus fatalis.

Veckoskrift for Läkare III. p. 291.

(a baccis.)

Dolores colici vehementes. } *).
diarrhoea. }

LANGE, domest. brunsv. p. 172.

(a 50 granis baccarum.)

Vomitus.

ventriculi inflammatio.

convulsiones **).

(a nidore baccarum.)

vertigines.

lipothymiae.

WEDEL, Miscell. Nat. Cur. Dec. II.

ann. 2. p. 140.

Diarrhoea continua cum torminibus intolera-
bilibus.

vomitus enormes ***).

Acta helvetica III, p. 531.

(a baccis.)

Ardor in lingua ad stomachum usque.

10

vomitus.

febris ardentissima.

virium lapsus summus.

RITTER, Nova Acta Nat. Cur. III. App.

pag. 254.

(a baccis.)

Tormina maxime diurna.

*) Per duos dies.

**) Post 24 horas morte.

***) Per sex hebdomadas quotidie repetentes.

ENGEL, Spec. med. b. 5.

(ab externo usu.)

Incalescentia magna corporis,

tumor brachii,

tumor faciei,

abscessus supra cubiti flexuram.

HALLER in **VICAT**, Mat. med. p. 355,

(a 15 baccis.)

§ Tormina chronica *),

Gazette salutaire 1761. Dec.

(a daphnes laureolae cortice.)

Inflammatio gulae, ventriculi, intestinorum,

GMELIN, Giftpflanzen p. 562.

(a scrupulo pulveris baccarum Laureolae.)

Vomitus vehemens,

pulsus plenus, durus, remittens.

constipatio, abdomine molli **).

*) Per mensem integrum.

**) Mors post novem dies.

STRYCHINOS NUX VOMICA L.

(seminum pulveris tinctura.)

*V*is vitam periclitans 26 horis finitur, vis tota ultra tres dies extendetur.

*Ebriosa capit̄is obtenebratio,
inebriatio.*

titationis sensus in cerebro.

*vertiginis accessus, quasi cerebrum in gyrum
verteretur cum sensum abolitione
momentanea,*

vertigo cum scotoma,

*vertigo, sensus in cerebro hinc illinc trahens *),*

*gravitas capit̄is matutina, ebriosa, vertigino-
nosa.*

*capitis, dum rectum est, infatuatio, dum vero
pronatur sensus in fronte quasi a pon-
dere prolabente,*

*contractio pupillae **).*

*frigiditas maxima nec fernacis calore, nec le- 10
cti stragulis delenda,*

noctu in lecto calefieri nequit.

*frigiditas totius corporis, livor cutis ***).*

*) Sexta hora observatum,

**) Primis horis.

***) Prima hora observatum,

calor imminutus ad frigiditatem universalem usque.

frigus vehemens cum crepitu dentium.

metus frigoris, horrescentia.

frigus in pedibus, quasi ab aqua frigida infusa, cum tremore.

, mane horripilatio.

per aerem liberum vel minimum refrigeratio et odontalgia punctoria, punctorio ardens.

frigus in pedibus mane.

fuga laboris, nec tamen fuga motus.)

impedit laborem, maxime literarium, } *).
nescio quid.

10 taciturnitas in semet versa, idearum progressio tarda **).

elocutio et scriptio minus correcta retractationi obnoxia ***).

loquela difficultas.

impatientia parvorum malorum.

lacrymatio ob minimas injurias perpessas.

15 impatientia strepitus, confabulationum.

meticulositas, pavor concussorius inter capitis ebriosam infatuationem.

stomachus ingens, iracundia †).

opprobria, convicia, objurgationes zelotypiae, obscenissimis vocibus intermistae — mox lacrymatoria ejulatio ‡‡).

*) Secunda hora observatum.

**) Semihora observatum.

***) Inter sextam et duodecimam horam observatum.

†) Prima hora observatum.

‡‡) Tertia et quarta hora observatum.

*jurgia in castigationem et verberationem
invalescentia.*

lucis fuga.

intolerabilitas lucis matutina scotomica.

nitus in decubitus.

dormituritio *).

dormituritio matutina.

§

mane pandiculatio et oscitatio enormis et post
pandiculationem dolor in artibus
spasticus maxime in genu.

lassitudo major matutina, quam dormitum
ituri.

mane nitus in decubitus.

*pedum infirmitas, instabilitas **).*

10

syncope.

deliquescentia cordis.

genuum instabilitas.

tremor ***).

tremor pedis alterutrius et genuum.

15

visiones terrificae. } †).

pavor. }

phantasiae nocturnae, semivigiles, lugubres ††).

phantasiae delirae. terribiles.

insomnia terribilia.

20

ejulalio suspiriosa in somno.

insomnia de laboribus diurnis sedulo perficiendis.

cephalalgia quasi ab inanitione.

*) Prima hora observatum.

**) Secunda hora observatum.

***) Secunda hora observatum.

†) Vigesima hora observatum.

††) v. e. de capitibus mortuorum.

dolor capitis in medio cerebri (pressorius?)
qualis post vomitum usu venit, depressione palpebrarum emergens.

conquassationis et glotinationis sensus in cerebro inter cundum.

ardor in cerebro subter frontem.

capitis dolor pressorius in fronte, pronatione
in mensam allevatus, in aere libero
adgravatus, cum crurum lassitudine
inter adscensionem*).

5 capitis in pronatione dolor, quasi a pondere
prolabente.

dolor capitis integumentorum, tactu exasperandus.

indolorifice tractorius motus hinc inde in cerebro.

dolor lacerans in oculis, in fronte et vertice
continuis cum nausea vomitidente
in pectore, deliquescentia cordis, et infirmitate loquelae organi **).

dilacerans cephalalgia ad nasi radicem, et maxillam superiorem protensa et eundo ancta.

10 *strictorio lacerans dolor in capite.*

strictorius motus hinc inde in fronte ad nasi radicem.

dolores tractorii (strictorii) in capite ***).

dolor (strictorius) tractorius primo in tempore, tum in fronte, tum in occipite.

dolor capitis constrictorius.

*) Tertia hora observatum.

**) Post duodecim et post duas horas.

***) Sexta hora observatum.

sensus, quasi cerebrum fissum esset *).

pulsationes vel ictus aliqui in capite.

impotentia caput erigendi in dorso reclinati ob
vertiginem et scotiam **).

presbyopia ***).

ardor in oculis sine inflammatione.

5

moriax sensus in a sale culinari in oculis.

ardor formicans in oculis.

oculi aquei, lacrymis superfusi, ut in lippitu-
dine, vel gravedine ****).

formicatio in fronte externe.

in gena hinc inde formicatio et rubor et ca-
lor †).

genae calidae cum horrore interno.

faciei caloris sensus cum horrore corporis cae-
teri.

genae rubrae calidae sine siti.

horripilatio primo, tum calor angorem creans,
posita sitis cerevisiae.

cum frigore sitis cerevisiae ††).

15

anxietas ingens.

animus pueriliter obsequiosus, tum somnius
(altus) cum rubore genarum, frigore
corporis et calore capitinis interno †††).

anxietas autochiriae cupida ††††).

animus demissus, morosus.

palpitatio cordis.

20

*) Octava hora observatum.

**) Hora vigesima quarta observatum.

***) An ad vires secundi ordinis referendum?

****) Hora prima exacta observatum.

†) Per duodecimi horas.

††) Aliquando hora vigesima quarta observatum.

†††) Circa sextam horam observatum.

††††) Circa quintam horam observatum.

inquietudo morosa ab inquietudine viscerum
abdominalium proficiscens.

hypochondriasis, aegritudo animi.

solicitudo taciturna, in seinet versa.

inconstantia consilii.

5 dilatatio pupillae cum respiratione lentissima.
timor mortis.

mortem instare putat.

dolor in hepatis regione.

*dolor in hepatis regione punctarius *).*

10 icterus cum nausea ciborum et accessibus syn-
copes brevibus (morbosa debilitate
subsequa).

appetitus diiminutus.

*anorexia cibi **).*

anorexia maxime panis.

nausea panis fusci cerealis et ab eo salivaefl^{uxus} in ore.

15 abhorrescentia a tabaci fumo consueto, coffea,
cibo, potu.

sapor in fauibus nauseosus, herbaceus, quasi
foliorum dauci***).

sapor putridus in ore.

singultus creber.

ructus creberrimi.

20 ructus post potum et pastum.

regurgitatio amari et acidi saporis †),

copiosus salivaefl^{uxus} ‡‡).

screatus salsa pituitae.

*) Post aliquot horas observatum.

**) Statim post propinatam nucem vomitani observatum.

***) Post primum horam observatum.

†) Circa sextam horam observatum.

‡‡) Ad duodecimi usque horas durans.

vesiculae in lingua dolentes *).

pyrosis.

ardor stomachi.

ardor in oesophago ad os usque.

rasionis sensus in gula, qualis post sodam 5 remanet.

rasio scalptoria in fauibus, inter deglutiendum cessans.

rasionis sensus in pectore screatum provocans.

rasio in scrobiculo.

cardialgia lacerans.

lacerans dolor in ventriculo.

10

cardialgia diurna.

dolor ventriculi constrictorius.

circa ventriculum obvolutio, inversio.

constrictionis et relaxationis vicissitudines subter hypochondria.

*dolor constrictorius in hypochondriis **).* 15

dolor constrictorius in abdomine.

constrictorius dolor in ventriculo.

tensorius dolor in ventriculo.

asscensio flatum in abdomine et restagnatio eorum ad hypochondria.

flatum incarceratio.

pressio aliquot uncias infra scrobicum, ru-
ctus afferens.

20

scrobiculi expansio, tactu dolorosi.

temperatura justa corporis, sitis, et tamen potu-
lenta ventriculum aggravant ***).

ventriculi pulsatio.

in ventriculo pressio quasi a lapide.

25

*) Sexta hora observatum.

**) Sexta et duodecima hora observatum.

***) Sexta et octava hora observatum.

ponderis sensus in abdomen;

post pastum pressio in abdomen et scrobiculo
cum meteorismo;

borborygni matutini, sonori.

borborygni pomeridiani.

§ forficanti lacerans dolor in abdomen ad pectus
tendens *).

sensus (non dolor) tractorius ab extremitatibus
inferioribus ad umbilicum usque, et
tum in umbilico convolutio, seu de-
psatio.

pároxysmus spasmo corpus in latus trahens, ma-
nibus corpus sustentare nisis; sed in-
firmis, tum vomitus et alvi et urinae
exainteratio involuntaria, citissima,
mente constante.

haematemesis **).

(termina dissidentia cum vomitiritione.)

10 *tormina strictorio lacerantia.*

tormina strictorio lacerantia ab utroque latere,
in pubis regionem convergentia.

tormina strictoria a latere sinistro, supra um-
bilicum.

*tormina forficantia ***).*

dolor punctarius in abdomen †).

15 *molimina herniae ‡‡).*

vulsio et palpitatio sub cuté muscularuni ar-
tuum, maxime vero abdominis mus-
cularum.

a

*) Prima hora observatum.

**) Sanguinis effluvia a nuce vomica inter primum magis
quam inter secundum virium ordinem referenda videntur.

***) Post primam horam observatum.

†) Quarta et sexta hora observatum.

‡‡) A quinta ad septimam usque horam observatum.

a contusione quasi dolor muscularum abdominalium, tactu et motu tantum percipiendus.

abdomen tactu dolorosum.

egestiones parvae, crebrae.

cum excrementis alvinis sanguinis excretio.

haemorrhagia ex ano.

micturitio.

micturitio pomeridiana.

post mictum pressio in vesicae collo.

ante mictum dolor in vesicae collo.

inter mictum pruritus in urethra.

inter mictum dolor in vesicae collo ardens et lacerans.

urethrae orificium quasi a vulnere dolorosum post vel ante mictum.

pruritus ardens in penis glande, posteriori parte *).

pruritus in scroto.

calor in testiculis **).

lacinatus in testiculo.

tentigo diurna, rigiditas penis.

blennorrhagia urethrae.

juncturarum mobilitas diminuta.

rigiditas artuum una cum vulsionibus.

rigiditas, tensio artuum ***).

constrictionis sensus vehemens per totum corpus.

sensus in musculis (scapularum, dorsi, artuum) quasi aliquid rursum versum traheretur, magis spasmodicus, quam dolorosus.

*) Sexta hora observatum.

**) Quarta hora observatum.

***) Cirea octavam et decimam sextam horam observatum.

quasi a verberatione dolor omnium membrorum.

torpor omnium membrorum.

lassitudo ingens.

ardens pruritus supra totum corpus.

5 punctus ardens hinc inde in corpore.

ardor per totum corpus *).

calor mere internus, ex angore natus, subsequuo frontis sudore **).

calor interius cum pulsu pleno ab hora in horam auctus, cum siti —; tum agrypnia ***).

agrypnia †).

10 anxietas diaphoresin causans, ad minimum frontis.

post anxietatem nausea, respiratio cito, tum tussis sicca a nausea oriunda, et vomitatio et vomitus.

asthma, et anxietas sensim per aliquot horas crescentes, respiratione sensim brevior et breviore, sudoribus identidem e toto corpore erumpentibus.

inter et post anxietatem ingentem sudor profusus.

sudor duorum dierum ††).

15 cum calore et pulsu magno, frequente, lecti appetentia et sitis aquae †††).

(sudor lateris aegroti putidus).

*) Internus ardor vel sensus tantum caloris ardoris esse videtur — sexta et duodecima hora observatum.

**) Post aliquot horas observatum.

***) Octava et decima sexta hora observatum.

†) Octava hora observatum.

††) Post sedecim horas observatum.

†††) Quadragesima octava hora observatum.

(sudor foetidus in latere.)

dolor continuus in calotia, tactu adgravatus,
tumores dolorosi in fronte.

oculi cantus quasi purulentus.

oculi canthus quasi a vulnere dolorosus, 5
(amaurosis aliquot horarum *).

(dolor punctorius in oculis.)

ophthalmia, chemosis **).

rectum supercilium tactu dolorosum.

diapedesis sanguinis ex oculo, (et ex steatoma-10
te prope oculum ***).

in palpebris dolor strictorio lacerans.

aurium tinnitus sibilans, sibilus tinniens.

formicatio reptans, pruriens in aure interna.

saliva sanguinea.

vacillatio dentium.

casus dentium, vix antea vacillantium.

circa labia miliares eruptiones, pus includen-15
tes.

aposthemata parva in buccis, in femore doloris
punctorio lancinantis vehementis fu-
runcularum species ***).

tuberculum sub cate in maxillae inferioris su-
perficie externa, tactu tantum dolo-
rosum.

epulis dentis canini gingivae, dolore tensivo et 20
ardente.

strictorio lacerans dolor in maxillis.

e naribus destillatio matutina.

N 2

*) Post nychthemerum observatum.

**) Inflammationes ex nuce vomica ad vires secundi ordinis
referendae videntur.

***) In tuberculorum enim altae duritici, et rubrorum
calidiorumque medio puris collectio post 24 horas.

diurna destillatio cum nocturna gravedine.
copiosum naris alterutrius stillicidium, obtura-
tae quasi a gravedine *).

*pruritus narium obturatarum ut in grave-
dine.*

narium internarum hyperaesthesia dolorosa.

*5 mucus narium sanguinolentus **).*

epistaxis diurna.

tussis nocturna.

pruritus laryngis, tussim proritans.

inter tussim dolor capitis, quasi cranium dis-
rumperetur.

10 in tussi dolor epigastrii (quasi a contusione).
halitus acidus pulmonum.

respiratio extra lectum angusta, difficilis, in
lecto justa.

dolor pectoris horizontaliter pressorius, re-
spirationem suffocans.

dolor horizontalis pectoris cum respiratione
cita.

*15 dolor in sterno mere diurnus, quasi pectus ni-
mis curtum esset, inter respirandum.*

dolor pectoris constrictorius.

dolor mere diurnus quasi a verberatione a ster-
no ad scapulas cum lancinatione et
asthmate inter motum et quietem.

dolor pectoris strictorius.

dolor strictorius in costis.

20 dolor strictorius in nucha.

juncturae ipsarum vertebrarum colli dolentes.

dolor strictorius in humeri capite.

dolor strictorius in brachio.

†) Prima hora observatum.

††) Prima hora observatum.

narcosis manuum, pedum.

dolor dorsi strictorius.

dolor dorsi strictorio lacerans *).

dolor dorsi constrictorius.

dolor dorsi ardenti lacerans.

5

dolor in osse sacro.

dolor mere diurnus in osse sacro quasi a verberatione et quasi pars nimis debilis esset, ut a puerperio.

dolor lacerans in lumbis.

intertrigo in inguine.

dolor tensivus in femore, quasi nimis curtum 10
esset.

in ossis femoris capite lacinatus quasi a luxatione.

formicatio a pedibus sursum.

*in poplitibus post sessum, inter surgendum,
sensus, quasi nimis curti essent.*

poplitis tensio, rigiditas.

dolor mere diurnus genuum, quasi a verberatione, inter motum et quietem. 15

dolorosi tumores in genu.

eruptio miliaris ardenti pruriens in genu.

tensio in suris.

ardor pruriens in digitis pedum, quasi a gelu.

fames magna.

20

constipatio.

inquietudo cum pupillis maxime dilatabilibus **).

*) Prima hora observatum.

**) Hora quinquagesima sexta observatum.

[OBSERVATA ALIORUM.]

Veckoskrift för Läkare, Vol. II, S. 169.
(a scrupulo in adulto.)

Innebratio *).

singularis omnium artuum, praecipue genuum,
rigiditas cum tensione.
gressus vacillans cum metu labendi,
motus convulsivi.
cardialgia diurna,

SEUTTER, Diss. de nuce vom. L. B.
1691. §. 11.

Convulsiones horrendae.

rigiditas omnium fere corporis partium,
stupor omnium fere corporis partium.

STRANDBERG, ap. KIERNANDER's med.
lag. S. 269.

Vehementes ventriculi affectiones.

¹⁰ spasmi abdominis.

anxietas ingens,
convulsiones,

vomitus.

diarrhoea,

*) Post semihora.

JUNGHANSS, Diss. de nuc. vom. etcort.
Hippoc. Hal. 1770. S. 11.

Sudores validi.

HARTMANN, Diss. spicilegia ad nuc.
vom. us. med. Traj. ad Viadr. 1785.
S. 25.

Anorexia diurna.

MATTHIOLUS, Comment. in Diosc. I,
IV. Cap. 23.

Nausea.

vomitus ingens.

sitis vehemens.

diarrhoea enormis.

pectoris angustia.

subita virium prostratio.

convulsiones.

sudor frigidus.

Fr. HOFFMANN, med. rat. syst. T. II.

p. 175.

(a granis 15 in puella 10 annorum.)

Anxietates summae.

vomendi conatus.

HUFELAND, Journ. d. pract. Arzneik.
Vol. I. S. 125.

(a novem granis in adulta.)

Debilitas artuum maxima, ut pedibus insistere
non posset.

tremor universalis.

vertigo.

15

stupor cerebri,
angor.
pulsus parvus, intermittens.

CONSBRUCH, *ibid. Vol. IV. S. 443, 444.*
(a duabus drachmis in adulta.)

Tormina intolerabilia *).
angor ineffabilis,
convulsiones horrendae.
opisthotonus per minutam, pluries repetens.
facies tumida, praerubra.
oculi splendentes, horridi.
manus frigidae.
pulsus evanidus, ratione constante.
dolor cessans cum sudore frigido **).

RADEMACHER, *ibid. S. 573.*
Pedum infirmitas, instabilitas.
oris distorsio.
trismus, ratione constante.
pruritus narium intolerabilis.
sensus quasi a formicis innumerabilibus, faciem
obreptantibus.
splendor objectorum auctus.

BERGIUS, *mat. med. S. 149.*
(a scrupulo in adulta.)
Pandiculationes summe convulsivae.
vertigo.
evacuationes suppressae omnes.
dolor ventriculi et regionis epigastricae per
longum tempus.

*) Post unam horam.

**) Mors post duas horas.

PAPAVER SOMNIFERUM (lacrymae
tinctura.)

*V*i s ad summum nychthemerum durat.

Excretio alvina. } *).

diarrhoea pultacea. } *).

tussis cava siccissima **).

pupilla dilatata ***).

calor diminuitur.

pulsus latus.

respiratio lenta.

frigiditas extremitatum.

sitis inter frigus.

anorexia.

sapor acidus †).

frigidus frontis sudor.

moresitas, spei abjectio.

animi abjectio.

lacrymatio miserabilis ††).

5

10

13

*) Vel statim post potum opium usu venit, vel intra pri-
mum horae quadrantem.

**) Statim post propinatum opium surgit et statim iterum
evanescit.

***) Primis horis.

†) Dubius bacreo, utrum ad primi, an ad secundi ordinis
vires sit referendum.

††) Primis horis observatum.

ex joco offensio lacrymabunda.
sensibilitas diminuitur.

taciturnitas adiaphora, indolens *).
inagnitio necessariorum, objectorum solito-
rum.

- 5 inattentio rerum externarum.
somni species comatosi **), palpebris semicla-
sis, bulbis retortis, ore plus minus
aperto, inspiratione stertorosa.
coma vigilans.
caput reclinatum ***),
narcotica formicatio in digitis, dum aliquid
manu capessitur aucta.

- 10 dorsum rectum rigidum ***).
*gemitus vagitosi inter somnum ****),*
clamor miserabilis inter somnum.
somnus insomniis plenus.
incubus.

- 15 insomnia luculenta, taediosa, frustrationum et
offensionum variarum †).
blateratio futilis inter coma.
irritabilitas imminuta.
gravitas pedum post pastum ‡†).
motus tardus, vacillans.

- †††),
20 distentionis abdominis, maxime ventriculi, sen-
sus.

*) A minima dosi.

**) Post doses majores non multo post opium sumtum,
vel etiam confestim oritur.

***) Tetani species videtur; intra primam et secundam Lo-
ram observatum.

****) Secunda hora observatum.

†) Secunda hora observatum.

‡†) Post duas horas observatum.

†††) Sequentes dolorosae sensations, quamquam partim

cardialgia, pressio in ventriculo quasi a lapi-
de *).

ponderis sensus in abdomen circa umbilicum
cum angore, caloris volatice interni
sensu et infatuatione capitis **).

pulsatio in abdomen.

tormina quasi a purgante ***).

menstruatio aucta ****).

tormina quasi a refrigeratione.

tormina simplicis doloris, quasi a contusio-
ne †).

proctalgia pressorio distensiva, immanis ‡).

dolor immuniter pressorius in latere pectoris
dextro etiam extra respirationem, cum
lancinatu in eodem latere inter in-
spirationem †††).

lancinatus in sinistro latere abdominis, vel ex- 10
tra respirationem ††††).

dentum vacillatio (i).

odontalgia.

dolor maxillae superioris.

non diu post sumptum opium orientur, tamen ad vires
secundi ordinis pertinere videntur, quippe per minimas
doses evanescere, in quibus vires primi ordinis opii (stupo-
rificiae) opinione citius diffugunt insensiliter. In pree-
magnis opii dosibus vero vires primi ordinis ad sex et
octo horas, immo ad mortem usque durant, stupore
mentis omnes sensationes eujusvis generis opprimente,

* Post secundam horam observatum.

**) Post terciam obseruatim.

***) Post semihoram obseruatim.

****) Post duas horas observatum.

†) Secunda hora observatum.

‡) Intra quartam et sextam horam observatum.

††) Post primam horam observatum.

†††) Post tertiam horam observatum.

(i) Octava hora obseruatim,

dolor dentis nervi subtilis, exedens *).
 dolor strictorio lacerans in pectoris laterē.
 dolor strictorio lacerans in dorso.
 pruritus in cute hinc inde pungens.

— **).

5 pulsus fortior.

calor.

(animus contentus.)

(mens vivida.)

(desiderium veneris.)

10 (appetitus auctus.)

pupillae contractae.

diaphoresis aucta.

sudor universalis ***).

sapor insulsus et fere deletus †).

15 famis caninae accessus crebri ††).

alvi excretiones restrictae.

vulsiones singulae in temporum musculis.

vulsiones singulae in brachiis.

agitatio brachii alterutrius convulsiva.

— †††).

20 vicissitudines animi serenitatis, curarum expertis, et morositatis.

*) Hora octava observatum.

**) Quae sequuntur ad vires secundi ordinis sine dubio referenda.

***) Quarta hora observatum.

†) Tertia hora una cum fame canina observatum.

††) Pluries intra viginti quatuor horas etiam tertia hora observatum.

†††) Quae sequuntur, inter reliquias observavi. Haec partim secundi ordinis vires, partim sequelae nimiae doses (an teriiij cūjusdam ordinis vires ?) esse videntur. Ad posteriora referenda sunt sequelae post quotidianum opii abusum, inter nos interdum, maxime vero apud gentes orientales observandae.

- respiratio difficilis, angusta, maxime noctu.
dolor constrictorius sterni et dorsi, inter mo-
tum percipiendus.
raucitas pituitoso trachealis.
vicissitudines caloris temperati et frigiditatis.
pupillae dilatabiliores. 5
ventriculi debilitas.
stupor in pede narcoticus.
pes quasi rigidus et tam sensibilis, ut eo incedi
non possit.
tumor pedum.
termina ante et post sedem. 10
sensus in molimine ad alvum deponendam,
quasi via ad rectum praecluderetur
(paresis recti?).
sensus in mingendi molimine, quasi via ad
urethram praecluderetur (vesicae
paresis ?).
aeris liberi intolerantia, et sensus inde quasi
a refrigerio.
tussis post pastum invalescens.
-

[OBSERVATA ALIORUM.]

De la Croix, Journal de Med. Tom.
XXXIX.

(a granis duobus solutis et per clysterem injectis.)

Capitis obnubilatio *),
stupor dormituriens.
stertor.
pulsus magnus, rarus.
respiratio gravis, alta.
trismus.
abdomen tumidum.
vomitus viridis.
tussis inter deglutitionem **).

RÄDEMACHER, in Hufeland's Journ. d. pr.
A. Tom. IV, 5.

Dormitaritio palpebris semiclausis.
angor summus.
floccilegium.
vulsiones singulae brachiorum.

CRUMPE, Natur u. Eigensch. d. Op.
Respiratio lentior, difficilis, stertorosa.

*) Statim post ingestum opium.

**) Mors hora duodecima et tunc effluxus materiae albae,
spumosae ex ore; cadaver putidum maxime.

pulsus magnus, latus.
animus stupidus, erga objecta indifferens.

**Hist. de l'acad. des sc. à Paris. 1755. S.
6.**

(in juvēne a drachma.)

Maculae hinc inde in corpore lividae *).

**PYL, Aufsätze, Samml. I. S. 85.
(a drachma.)**

Corpus gelidum, rigidum.
trismus **).

Id. ibid. S. 94, 95.

Vomituritio longa.

facies collapsa, pallida.
oculi aperti, pupillis sursum retortis.
respiratio brevis, stertorosa, per semiminu-
tum identidem cessans.

constipatio decem dierum, fatalis.

10

**VICAT, pl. venen. de la Suisse, p. 226.
(in vīro a duabus drachmis Laudani.)**

Stupor, insensibilitas, et tamen apposite re-
spondet.
oculi fixi, stupidi, languidi, emorientis in-
star.
pulsus vehemens, celer, durus.
respiratio difficilis, impedita.

* Post quindecim horas.

**) Post nychthemum cadaver putidum.

sudor largus *).

WILLIS, de anima brut. pag. 298.

Cardialgia vehemens.

languor.

animi deliquium.

mens constans.

scotomia **).

Idem, pharmac. rat. P. I. p. 506.

Memoria penitus amissa.

Hist. de l'ac. des sc. 1755. P. 4.

(in juvene a drachma in vino data.)

Maculae lividae hinc inde in corpore ***).

HARGENS, in Hufel. Journ. d. pr. Arz.

Vol. IX. P. 2. p. 201.

Salivatio.

CLARCK, essays and obs. ph. and litt. Ed.

III, 1771.

10 Vertigo.

mentis perturbatio.

virium lapsus.

scintillae in visu.

visiones terrificae.

15 calor cum siti.

F. PLAT.

*) Duodecim horarum.

**) Et mors subsequens, tertia hora.

***) Decima quinta hora post captum opium; post mortem tubercula livida hinc inde in corpore et putredo praesentanea.

F. PLATER, Obs. lib. I. p. 159.

(a cylstere opiat.)

Linguae titubatio.

BAGLIVI, prax. med. lib. I. p. 65.

(ab opiatis nimiis.)

Paralysis.

SCHWEICKERT, in Hufel. Journ. d. pr.

Arz. XI, 2. p. 148.

Convulsiones cum facie livida.

asphyxia.

singultus convulsivus.

5

de RUEF, App. ad Act. Nov. N. C. Tom.

V. pag. 63.

Vis voluntatis minimo abigenda nutu.

tranquillitas mentis.

alacritas animi.

insomnia anxia.

insomnia hilaria.

10

REINECKS, in BLUMENBACHS med. Bibl. Vol.

II, 2. p. 574-584 —

Paralysis linguae.

flatulentia.

anorexia.

venae in facie tumidae.

spumia ante os.

15

salivatio.

haemorrhagia narum.

titubatio.

sui non conscius.

stupiditas.

memoriae lapsus.

indifferentia erga dolorem et voluptatem.

erga sensationes subtiliores et sensum modestiae stupiditas.

horrescentia.

periculi impavidus.

temeraria ferocitas.

anxietates intolerabiles *).

flacciditas, torpor.

infirmitas et collapsus virium.

impotentia virilis.

color luridus.

hydropicus corporis status.

stupet adstantes, oculis lacryma suffusis, nec tamen scit, quid agatur, nec agnoscit obvios.

ore aperto loqui nescit.

facta inepta patrat.

vacillatio.

balbuties.

de frigore querelae.

cibos appetit et morsu vix uno deglutito cetera fastidit.

*) Post nychthemerum ab opio capto.

[OPIUM.]

211

post ebrietatem ecstasis.
post ecstasin ex opio anxietas.
inquietudo, tremor.
ineptitudo ad omnia negotia.
frigiditas in re venerea.
nausea omnium rerum.

CHARDIN, voyage en Perse, Amst.
1771.

Ecstasis *).
post eestasin moestitia, animus abjectus.
frigiditas.
stupor.
omnium laborum impos.
languor, imbecillitas.
animi dotes omnes, sensus omnes hebetes.
dolores per medullam ossium penetrantes, de-
terrini.

J. JUNCKER et Fr. BÖHMER, Diss. cas.
matr. larg. opii usu tractatae, Hal.
1744.

In membris et nervis omnibus sensus tremulus,
modo ignis volatigi, modo aquae gelatae per
venas micantis sensus.
trunci curvatio arcus instar.
in corde ardor quasi a prunis et dolor quasi a
dilaceratione intestinorum ita ut pes-
sumdari sibi videretur.

O 2

*) Post primam ob opio capro horam nata, ad quinque us-
que horas durans.

SAM. BARD, Diss. de vir. opii. Edinb.
1765.

Pulsus quatuordecim ictibus lentior *),
pulsus triginta ictibus aucta **).

MUZELL, Wahrnehmungen II, p. 151.

Cephalalgia vehemens.

anxietas ingens.

5 dementia.

tetanus.

motus convulsivi.

epilepsia.

facies rubra, tumida.

10 respiratio gemebunda, lenta ***).

pulsus latus †).

sudor profusus.

insultus epileptici cum deliriis vehementibus.

F. C. GRIMM, Act. Nat. C. Vol. III,
obs. 19.

(a grano ante somnum capto in adulto.)

Somnus anxius, insomniis vexatus tristissimus,
ita ut somnolentus in perpetuo delirio
versari videretur.

15 respiratio crebra ‡), angusta, anxia.

pulsus frequens, debilior naturali.

sudor universalis ‡‡†).

diarrhoea lenis, foetidissima.

*) Intra primas quatuor horas.

**) Post circiter decem horas.

*** Post quatuor horas.

†) Per viginti circiter horas.

‡) Post duces horas.

‡‡) Post octo horas.

tumor faciei lividae luridaeque.
palpebrarum inferiorum tumor.
lingua alba.
cruram debilitas,
torpor.

§

(a granis tribus.)

moeror.
animae virium debilitas.
nisus in decubitus.
anxietas praecordiorum *).
dormituriens somnum capere non potest. 20
pulsus tardior.
hypochondriorum, in primis dextri dolor.
tensio hypochondriorum, tactu dolorificentio-
rum **).
respiratio inordinata, suffocationem minans.
spiritum summa molestia trahit, anxius, ore 15
aperto.
titubatio.
fames canina, cum abhorrentia ciborum.
urina citrini coloris, cum sedimento multo.
inter pulsum tardiorem et debiliorem pallor et
frigiditas artuum, sudore frigido per-
fusorum.
ructus ***).
raucedo cum faucibus siccissimis, lingua alba. 20
amaror oris.
nausea.
somnus anxius, insomniis obrutus †).

*) Secunda hora.

**) Quarta hora.

***) Quinta hora.

†) Hora septima.

sonnus parum reficiens inter sudorem universalem,
excrementa liquida spumosa, cum ani pruritu,
ardore, summoque tenesmo.
habitus corporis pallidus, lividusque.

G. Chph. SCHELHAMMER, Misc. Nat.
Cur. Dec. II. ann. 8. obs. 12.

(in viro a 3½ granis.)

- Seinnus insomniis gravis et turbulentus *).
5 post evigilationem linguae motus impeditus **),
siccitas oris ut verba vix proferre posset.
vertigo, circumgyrationis sensus ***).
capitis turbatio, vera notitia nullius rei, eorum
quae legit sensum assequi non pot-
est.
hallucinatio quasi in aere suspensus esset, aut
volitaret et omnia circumverteren-
tur.
10 hallucinatio, quasi oculos quater maiores ha-
beat, quasi corpus suum monstrosae
sit magnitudinis.
titubatio, progredi non potest nisi difficulter
et titubanter.
immobilitas artuum aucta,
ideae vagae.
obtusus animus, insensibilis, existentiae suaes
vix conscientius, apte tamen satis respon-
det.
15 praeter auditum et visum, privatio sensuum
gustus, olfactus, tactus quoad ob-

*) Statim.

**) Post quadrantem horae,

*** Hora exacta.

jecta externa, sui vero corporis frigiditatem sentit *).

frigiditas totius corporis, stuporem membrorum inducens **).

frigus in dorso.

pulsus suppressus, vix perceptibilis.

vix pedes movere, vix incedere potest coactus.

pulsus major ***).

somnus horribilis, oculis clausis amens sibi videtur esse.

coma, sopore oppressus jacebat.

pruritus, formicatio in omnibus membris †).

G. YOUNG, vom Opium, neue edinb.

Vers. Altenb. 1762. p. 148 etc.

(a 50 guttis Laudani.)

Lassitudo post somnum longa.

tumor faciei.

10

cutis sicca, calida.

interdum sudor lenis.

lingua alba.

constrictio pectoris, et quasi rigiditas, respiratione difficultas.

raucedo.

15

haemoptysis.

(a 40 guttis Laudani.)

raucedo maxima.

aurium susurrus.

*) Post sesquihoram.

**) Post duas horas.

***) Post tres horas.

†) Circa quintam horam; fricatione tactus sensus restituebatur.

vertigo.

turbatio capitis.

somnus successionibus terrorificis interruptus.
inquietudo.

5 inter evigilationem languor cordis.

sensus cruris fere deletus.

asthma spasmodicum,

somnus inquietus, gemebundus, suspiriosus.

post evigilationem nausea vomituriens *),

10 cephalalgia.

pulsus celer.

ventriculi dolor constrictorius, intolerabilis,
agonizans **).

STALPAART van der WIEL, Cent. II,
obs. 41.

(a semidrachma.)

Inter somnum priapismus.

e somno expergefacto impotentia virilis,

Idem, Cent. I. obs. 42.

(a pilula.)

**15 Sopor et stupor talis ut nec quidquam responsi
ipsi extorqueri posset.**

Cocq, apud eund. ibid.

(a tinctura opii.)

Memoria diu abolita,

*) Post duas horas.

**) Pilulis opiatis post prandium captis.

ANEMONE PRATENSIS, L. (*herbae totius succus sole inspissatus.*)

*V*is 80 ut plurimum horas durat.

Vertigo titubans quasi ab ebrietate cum calore
capitis interno, et pallore faciei, na-
turaliter calidae, maxime vesperi.

vertigo quasi ab ebrietate.

vertigo, consistere recte non posse putat *).

vertigo, capessere rem posse non putat **).

vertigiis accessus, ebrietas, calor.

vertiginis species, ab oculorum respiratione,
quasi casurus esset, vel quasi salta-
ret.

post pastum ebrietatis sensus.

inter pronationem sensus in capite, quasi pro-
lapsurus esset homo.

pupillam contrahit initio.

oscitatio.

frigiditas.

frigus immanc, postea caloris interni cum hor-
ripilatione sensus mixtus, postea cal-
or ardens universalis, pulsus citissi-
mus, respiratio citissima agonizans.

5

10

*}) Intra primam horam observatum.

**) Intra primam horam observatum.

horripilatio.

horripilatio reiterata.

horripilatio quasi a sudore erupturo.

cum tremore frigoris sensus, aliquot minutarum intervallo recurrens, calore parvo subsequo, sine sudore.

5 circa vesperam in cubiculo calido frigus, seu frigiditatis sensus, caloris volatichi sensu intermisto.

frigus sine cute anserina vespertinum.

adipsia.

fames canina*).

dolor exedens in ventriculo quasi 'a fame canina**).

10 appetentia ***) escarum, nescit quarum, nec grata sapit quo vescitur.

fames, sed appetitus rei certae nullus.

sensus quasi a vacuo in abdomen, quasi abdomen exenteratum esset.

vacillatio consilii, indeterminatio summa.

vox haeret, respondere tacet.

15 nullius rei amor, ex nulla offensio.

taedium, fastidium omnium rerum.

palpitatio et anxietas ingens, ita ut vestimenta abjici debeant.

anxietas quasi a calore aëris ambientis.

angustia nocturna inter evigilationem, quasi crimen commisisset.

20 *calor auxius quasi ab affusa aqua calida, fronte gelida.*

*) Statim post ingestam pulsatillam observavi, sed brevis temporis.

**) Etiam circa horam octavam observavi.

***) Statim post potam pulsatillam observavi.

manus haec calida, illa frigida.
caloris externi intolerantia, venae tumidae.
 afflatus quasi ab aëre nimis calido, cephalal-
 giam causans.
quasi a sanguinis ebullitione agrypnia,
 caloris sensus nocturnus sine siti *).
 per noctem angor quasi a calore,
 calor et dein horror.
 calor subitus cum faciei sudore magno, tremo-
 re artuum et scotomia syncopode.
 subitaneus rubor faciei, cum pedum horrore
 et trepidatione.
 calores volatiei **),
 calor totius corporis, exceptis manibus cum
 pressorio supra orbitam dolore et
 aestuatione ejulatoria.
 sudor mitis universalis,
 in faciei latere dextro sudor ***).
 agrypnia.
 aversatio negotiorum, indeterminatio, anhela 15
 respiratio, aestuatio.
hypochondriaca morositas, quaevis aegre
ferens.
 per morositatem obrigescit infans.
 circa exterua non incuriosus, sed negligens †).
 ideae permultae, sed instabiles ‡‡).
 anxietas, nescit quo se vertat †††).
 anxietas, annihilari, pessimumdari se putat ††††). 20

*). Aliquando post trigesimam sextam horam observavi.

**). Etiam seriorum horarum observatio, v. c. duodeci-
mae,

***). Etiam hora trigesima sexta observatum.

†). Circa primam horam observatum.

‡‡). Intra primam horam observatum.

†††). Intra primam horam observatum,

††††). Prima hora observatum.

anxietas tremula, quasi mors instaret *).
aegritudo animi **).

*ut ab ebrietate hesterna infatuatio et dolor
capitis.*

infatuatio capitis, cogitationes evanidae.

5 fatuitas et vertigo, motu excitata.

visus obtenebratio cum vonitiritione et pallo-
re.

visus obnubilatio brevis.

visus obnubilatio per aliquot dies repetens.

oculus alteruter candelae lucem tolerare non
potest lancinanti dolore affectus, fere
sine inflammatione albugineae, palpe-
bris conniventibus ***).

20 visus vitium, candelae flamma nimbo stipata
videtur, stellae instar.

visus duplex ****).

visus et auditus abolitus, cum dolore capitis
strictorio et gravitatis et formicationis
sensu in cerebro, tumque frigus.

cephalalgia quasi a cerebri arteriarum pulsatio-
ne †).

murmur in aure, modulatione pulsuum.

25 tinnitus aurium oscillans quasi a pulsatione ba-
culi ferrei ‡‡).

tinnitus aurium †††).

tinnitus in aure acutus.

plethora organi auditus ††††).

*) Prima hora observavi.

**) Etiam senioribus horis observavi.

***) Post tres horas observatum.

****) Aliquando etiam post plures horas observavi.

†) Post sex horas observatum.

‡‡) Post tres horas.

†††) Inde a quarta hora ad octavam observavi.

††††) Circa octavam horam observatum.

*auris externae calor, rubor, tumor *).*

circa aurem exteriorum calor, sudor.

anorexia sapore integrō.

(anorexia a ciborum sapore deleto et quasi a plenitudine ventriculi.)

*sapor in posteriori faucium parte herbaceus, 5
putridus.*

(mane putridus oris halitus.)

anorexia paoris veteris et carnis.

*sapor esculentorum omnium imminutus. } **).*

sapor carnis deletus.

*sapor omnium esculentorum amarus, tum fri- 10
gus cum sudore frigido.*

sapor amarus cum appetentia citri acidi.

*sapor amarus, biliosus, continuus, maxime
post cibum captum.*

*sapor terreus cum vomititione ***).*

sapor empyreumaticus in ore.

*sapor pituitae tussi ejjectae empyreumaticus in- 15
star juscui cancerorum vel olei taba-
ci †).*

ructus crebri cum sapore ingestorum.

regurgitatio amari liquoris ad fauces usque.

amaror in ore pest vomitum.

sensus quasi a corrupto ventriculo.

*sensus in ventriculo, quasi a nimia ingurgita- 20
tione escarum et regurgitatio escarum
quasi evomendae essent,*

salivatio.

*) Post aliquot horas.

**) Circa quartam, octavam et decimam sextam horam ob-
servata.

***) Etiam post primam horam observatum,

†) Post tres et sex horas observatum,

cum salivatione continua 24 horarum, vomitatio.

salivae aquae effluxus ex ore copiosus,
nausea vomituriens intolerabilis, sine vomitu^o**).

nausea vomituriens, sine vomitu, appetitu integro, cum menstruorum suppressione.

nausea vomituriens inter soporem (vel somnum) emergens, cum appetitu integro, vel panis fusi^o**).

vomitus cibi pridem capti.

vomiturio ab esca solida et spissiore, carne, pane.

nausea vomituriens cum ingrato sensu (dolore) ad gulam adscendente.

vomituriens nausea ad fauces usque tendens.

sensus quasi in gula reptet vermes.

vomitus escarum vespertinus, tuni amaror oris et dentes obtusi.

vomitus brevis biliosorum.

vomitus nocturnus cum dolore dorsi lancinanti strictorio versus scapulam.

post vomitum ardor in gula.

cum borborygmis in hypochondrio, vomitatio.

borborygmi in abdomen murmurantes ut a flabitibus.

diarrhoea primo viridis, dein mucosa.
excrementa alba ***).

*) Prima hora observatum.

**) Aliquando circa vigesimam horam observavi.

***) Etiam intra decimam octavam et vigesimam quartam horam vidi.

*sedes ex mera pituita lutescenti alba constantes, cum pauco sanguine intermixto *).*

sedes crebrae ex pituita constantes, cum terminibus tante singulam sedem, diarrhoea cum terminibus discedentibus. invitatio crebra ad alvum deponendam, quasi diarrhoea identidem eruptura esset.

sedes acres.

diresis.

micturitio.

urina subinde rubra.

urina fusca.

post mictum dolor in urethrae orificio pressorio formicans.

(virus venereum ex cancro praeputii in glandulas inguinis transferre et bubonem excitare videtur.)

post mictum formicatio et pressio in glande penis.

*sensus lancinanti pruriens sub praeputio **).*

leucorrhoea lactea cum tumore vulvae.

leucorrhoea lactea indolorifica,

leucorrhoea pituitae spissioris lactei coloris,¹⁵ indolorifica, maxime inter decubatum percipienda.

blennorrhoea colore et consistentia seminis humani cum ardentи dolore, maxime statim post mictionem.

titillatio continua in naribus.

*sternutatio ***).*

**) Nonnunquam circa duodecimam horam observavi.*

***) Etiam circa quadrantem horae post ingestam pulsatilam observatum.*

****) Circa quartam horam et ad duodecimam observatum.*

in nasi ala exulceratio superficialis serum fundens.

coryza cum gustus et olfactus jactura.

gravedo *) cum exulceratione narium.

nares obturatae, exulceratae.

5 (in nasi radice dolor inter pronationem quasi ab aposthemate interno.)

epistaxis.

sanguinis e naribus effluxus cum gravedine.

*tussis **).*

tussis cum expectoratione.

10 *tussis sanguinea.*

tussis nocturna lacinatum in latere gignens.

inter tussim dolor pectoris.

a tussi dolor in humero.

inter tussiendum lacinatus in dorso.

15 rancedo aphona.

pruritus in oculis.

fippitudo.

oculi in aere libero, frigido aqua suffusi.

oculo uno lacrymante dolor capitidis strictorius.

20 palpebrae mane conglutinatae.

siccitas palpebrarum ***).

in canto interiori oculorum dolor pressorius.

oculorum siccitas et sensus matutinus quasi a corpore alieno premente †).

hordeolum cum inflammatione albugineae modo unius, modo alterius canti oculorum

*) Dubius haereo, an gravedo ad vires secundi ordinis sit referenda. Sed monendum, pulsatillam plerumque ageat ita, ut vires primi et secundi ordinis per paroxysmos aliquot repeatant durante curriculo operationis.

**) Circa quartam horam observatum.

***) Circa duodecimiam horam observatum,

†) Etiam inter reliquias observatum.

rum et dolor strictorio tensivus in eo
a motu muscularum faciei — interna-
res exulceratas.

Iancinatus ex fronte per oculos penetrans.

in parotide dolor lancingans.

dolor glandularum submaxillarum.

dolor terebrans in glandulis submaxillaribus,
vel inter quietem partium *).

dolor strictorio tensivus in glandulis submaxil-
laribus.

dolor inter deglutiendum, quasi glandulae sub-
maxillares in faucibus prominenter et
quasi ab excoriatione dolerent **).

angina lancingans.

glandula parva dolorosa intra tragam auris et
articulationem maxillae.

sensus quasi a tumore in gula modo inferne mo-
do superne sedente ***).

dolor ut a vulnere in gingivis.

10

dolores vento aucti.

odontalgia lacerans †).

lacerantes ‡) dolores in maxilla inferiori.

strictorio vulsorius dolor in dentibus, a potu
frigido exasperatus.

dens inter mordendum dolorificus.

15

dolor dentium, quasi protruderentur.

dolor adstrictorius in maxillis ut ab acidis, cum
horripilatione et sudore faciei frigi-
do.

*) Post quartam horam observatum.

**) Post octo horas observatum.

***) Post sextam horam observatum.

†) An potius strictorio tensivus dolor? (quasi nervus in-
tendatur et per vices subito relaxetur) qui pulsatilla
propria est, et false pro lacerante venditatur.

dolorem dentium in gingivis (punctorium exdentem) maxime circa vesperam excitat, qui plumei lecti calore exasperatur, denudatione vero et aeris liberi frigidi afflatu lenitur, et somno vespertino deletur *).

inter dolores vespertinos frigus.

dolor lancinanti pruriens in aure interna **).

lancinatio in occipite per aures.

5 lacerationes vulsoriae singulae per aures ***).

vulsiones in auribus.

tumores parvi in calotta dolorosi quasi ab apostemate.

(exanthema pustularum tactu dolorosarum in collo sub mento.)

tumor nuchae, utrinque ad colli latus, usque ad carotides protensus, tactu tantum sed vehementer dolorosus quasi ab apostemate intus latente.

10 caput sustentare nequit.

cephalalgia strictorio tensiva in fronte supra orbitas, oculorum apertione aucta.

crepitus cerebri inter eundum, et ad pulsum arteriarum modulatus.

dolor capitis dissindens.

(hemicrania disruptoria, quasi oculi e capite casuri essent.)

15 dolor pressorius in capite in pronatione.

dolor capitis quasi a nimia ingluvie vel quasi a ventriculo carne nimis pingui ingurgitata corrupto.

*) Post sex horas observatum.

**) Post sex horas observatum.

***) In duodecima hora observatum.

*dolor capitis ut ab agrypnia vel crapula *).*
dolor capitis quasi a gravedine, vespertinus,
tum calor in lecto siccus et coma som-
nolentum cum phantasiis deliranti-
bis.

*dolor lancinans **) in occipite, decubitu ex-*
speratus, erectione trunci evanidus.

hemicerania lancinans.

dolor lancinans in nucha.

dolor strictorio tensivus in nucha.

dolores strictorio punctorii in nucha, intra sca-
pulas et in dorso.

dolor lancinans intra scapulas vel inter quie-
tem.

dolor intra scapulas inter motum lancinans, re-
*spirationem praeccludens ***).*

dolor pressorius in dorso sursum.

10

dolor punctorius dorsi †).

dorsi rigiditas dolorosa, asseris ad instar.

in quarta lumborum vertebra dolor pressorius,
maxime post itum.

dolor lancinans in osse sacro et abdomine cum
torminibus dissidentibus, respira-
tionem praecudentibus.

primo lancinatio in osse sacro, tum in abdomen 15
tendens dolor dissindens sit et lan-
cinans, respirationem praeccludens,
tum in capite formicatio, gravitas et
strictorius sensus, visum et auditum.

P 2

*) Aliquando duodecima hora observatum.

**) An punctorius interdum?

***) Pulsatillae est, etiam aliorum partium dolores excita-

re, quae respirationem angustant.

†) Secunda etiam hora observatum.

- aboliens, tum frigus quasi ab aquae
frigidæ perfusione.
- dolor in scrobiculo pressorio strictorius, mane,**
qui paulo post in latus pectoris mi-
grans, lacinans et demum in dorsum
progressus, lacerans fit *).
- pulsuum arteriarum sensus in scrobiculo.
- in pectoris alterutra parte dolor strictorio ten-
sivus, per respirationem auctus.
- in sterno dolor strictorio tensivus,
- 5 in pectore dolor lacinans inter motum corpo-
ris.
- dolor pectoris inter respirationem lacinans
durantibus menstruis.
- per transversum pectus spasmodicus sens u.
- Iacinatus in latere non nisi inter decubitum **).
- (dolor crampoides primo in dextro latere, tum
in sinistro, tum in pectore.)
- 10 **cardialgia.**
- cardialgia inter menstrua.
- pressio in abdomine.
- dolor strictorio tensivus in hypochondrio.
- dolor strictorio tensivus in abdomine ritu dolo-
rum spuriorum in partu ***).
- 15 dolores strictorii et strictorio tensivi ex abdo-
mine per vasa spermatica in testicu-
los penetrantes, testiculis alte pen-
ditibus †).
- dolores constrictorii in uteri sinistra parte, qua-
si ad partum.

* Non nisi vigesima quarta circiter hora observavi,

**) Plures pulsatillæ dolores non nisi inter quietem emer-
gent.

***) Etiam quarta et quinta hora observatum.

†) Post sextam horam observavi.

menstrua septem dies anticipata.

dolor strictorio tensivus in lumbis *).

dolores strictorio lacerantes hinc inde in toto
corpore repetitis sed parvis et volati-
cis accessibus.

(in flexione brachii, tendinum cubiti flexorum
dolor tensivus.

dolores strictorii **) in brachiis ab humero ad
carpum usque, parvis sed repetitis
accessibus.

in humeri junctura dolor lancinans inter bra-
chii motum citum.

dolor strictorio tensivus in brachiis internis ad
carpum usque.

(inter brachii pronationem dolor tensivus ten-
dinum pronatorum.)

dolor in humero a sublatione brachii.

supra cubiti flexuram tumores subcutanei (non ¹⁰
inflammati) tactu dolorosi.

dolor immanis pressorio disruptorius in femoris
et humeri musculosis partibus ***).

femoris inter eundum subita asthenia paralytica
volatica.

in glutaeis post sessum dolor simplex quasi a
contusione †).

pedum gravitas et stricterius in iis dolor, mi-
nus in brachiis.

pustulae in pede serum fundentes cum dolore ¹⁵
ardente.

* Lumbaginem artificialem dixeris.

**) Verosimile est, et hos dolores fuisse strictorio tensivos,
quasi nervus filo paulatim magis magisque attraheretur
et subito iterum relaxaretur, quales fere sunt in muscu-
lis a pulsatilla nati dolores.

***) Post secundam horam observatum.

†) Vel quasi ab apostemate interno?

fragor genu.

calor pedum.

tumor pedum.

tumor ruber calidus pedum (erythema) cum dolore tensivo, urente, inter consistendum lancinante.

5 dolor strictorio tensivus in suris.

in plantis a statu dolor formicanti punctorius, et quasi a narcosi.

Lancinatus singuli in plantis et digitorum apice inter quietem.

(dolor lacerans in plantis et supra genu.)

dolor surdus in vola, sive inferiori pollicis pedis facie.

10 in plantis pedum, supra genu, et in dorso lacerans dolor.

digitorum pedis dolor ut a pressurâ calcei.

dolor in plantae medio, dum insistitur, quasi ab excrescentia protuberante cum lancinatibus versus suram.

in calcaneo secans dolor inter lecti calorem.

dolor strictorio lacerans modo in uno, modo in altero artu, cum frigore et frigiditate.

15 dolor strictorio punctorius in artibus et articulationibus maxime, tactu quasi a contusione dolorosis.

vulsiones singulae artuum et totius corporis in somno.

in artibus tremoris sensus anxius, trepidatio.

(artus quasi contusi.)

in artibus anxietas tremula, sive trepidatio requie, decubitu, sessu aucta, motu diminuta.

in toto corpore sensus ingratissimus ad desperationem summam et impotentiam animi adigens, neque dormire, neque requiescere ullo modo sinens.

a strictoriis in artibus et toto corpore doloribus trepidatio.

sensus ingratus in toto corpore pernox quasi a vigilia longa cum capitis vappiditate ut a crapula *).

vulsorio strictorius dolor quasi a laqueo in artuum musculis, non in jncturis.

in corporis latere dextro sudor.

in corporis latere sinistro sudor **).

corporis immobilitas rigida,

gravitas totius corporis ***).

pulsatio arteriarum molesta in omni corporis parte, tactu maxime percipienda.

sensus pruriendi punc torius in cute quasi a pulicibus innumerabilibus.

ulcera, si quae sunt, sanguiniflua fiunt.

in ulcere dolor lancinans mordax, circumcirca pruritus.

furunculi hinc inde.

amenorrhoea cum frigiditate, horrescentia et tremore pedum.

menstruorum suppressio †).

constipatio pertinax.

dormituritio continua insomniosa.

15

* Duodecima hora observatum.

**) Post horam quadragesimam etiam observavi.

***) Post octo horas observatum.

†) In foemina 47 annorum, in altera 48 annorum et in aliis. Maximis tunc videbatur menstrua (bis et plures) supprimere, si in plenilunio redire consueverant. Sed vis hacc secundi ordinis esse videtur.

somnus comatosus, inquietus, agitatorius.
 somnus insomniosus,
blateratio inter somnum.
 in somno clamor de cane atro, feli.
agitatio in somno.
 terror, succussio inter somnum,
 experrectio successoria e somno et delirium de
 apibus abigendis.
 somnus nimis protractus, palpebris clausis,
 statim a principio comatosus, phan-
 tasticus, insomniis plenus,
 sitis aquae vespertinus,
 post calorem evanidum sitis intensissima, ma-
 xime cerevisiae et lingua albida,
 pupillam dilatat *).
 sensibilitas dolorifica abdominis, tactu exci-
 tanda **),

*) Frequentius in vi secundaria observavi, quanquam et
 interdum hora sexta dilatabiles maxime, interdum et
 post horam trigesimam sextam contractiores et parum di-
 latabiles viderint pupillas, neendum satis itaque constat,
 enjus ordinis ambo symptomata?

**) Non nisi inter reliquias observavi.

[OBSERVATA ALIORUM.]

ANT. STOERCK, von der Pulsatille,
Frft. 1771.

In lingua primo dolor mordens, tum calor diutinus.
 in brachio hinc inde dolores lancinantes.
 in brachio nocturnus pruritus.
 menstruatio ancta *).
 in brachio vesiculae, pure dein refertac et;
 squamis deciduae.
 vomitatio.
 enuresis **).
 sudor magnus, foetidus, nocturnus.
 ardor urinae molestus.
 materiae aquosae foetidae secessus ex urethra. 10
 oculi aqua suffusi, lacrymis abundantes, lippi ***).
 salivatio.
 dolor in oculo, quasi cultro radatur.
 lancinans in abdomine dolor.
 ardentes, lacerantes, vagi dolores a digitis per-
 dum ad inguen usque.
 haemorrhoides fluida †),

*) In multis.

**) In permultis.

***) In nonnullis.

†) Per tres dies,

tormina lacerantia.
diarrhoea *).
enuresis fere continua.
diarrhoea non debilitans.
5 dolores summi lacerantes, terebrantes, secantes in oculo.
menstruatio copiosa **).
purulenta excretio e nare sinistra.

SAUR in BERGII mat. med. p. 517.

(a vapore.)

Tumor et rubor palpebrarum.
obnubilatio visus.

HEYER in CRELL's chem. Journ. II. p. 502.

10 Capitis lancinans dolor.
enuresis.

BERGIUS, Materia med. p. 519.

(ab anemone hemorosa.)

Angustia pectoris.

HELLWING, flora campana, Lips. 1719.

Phthisis.

*) In multis.

**) In menstruorum suppressione.

R H E U M.

*V_{is}**Horror sine frigiditate externa^{*)}.**gravitas totius corporis, quasi e somno altissimo experrecti.**lassitudo femorum, quasi nimis defatigatorum.**taciturnitas indolens.**segnities taciturna.**constrictio pupillarum cum inquietudine qua-
daunt^{**) .}**cephalalgia strictorio distendens, obnubilans
et obtusa supra totum quidem cere-
brum, maxime tamen in vertice et
temporibus.**cephalalgia primo pressoria, dein lacerans ad
occiput usque.**cephalalgia pulsatoria.**termina ante et inter sedes, alvo deposita ces-
santia.**nausea vomituritiva.**anorexia coffeae nisi saccharo conditatur probe.*^{*)} Circa semihoram observatum.<sup>**) Si dosis magna fuerit, ad decimam sextam usque horam
durat, tunc dilatabiliores sunt.</sup>

sedes diarrhoicae excrementicci cum pituita.
sedes pituitae griseae.

animus varia efflagitans importuno modo et
fletu.

caloris universalis sensus sine siti *).

5 calor et venae tumidae manuum et pedum, nec
tamen brachiorum aut femorum, facie
minime calida.

*faciei sudor minus quam tepidus, egelidus,
maxime circa nasum et os **).*

somnolentia.

*inter somnum inspiratio stertorosa ***).*

somnus inquietus, ejulatorius, capite reclinato.

10 inter somnum vesperi delirium, ambulatio in
lecto, oculis clausis, tacitura, inter
calorem corporis magnum.

inter somnum manus supra caput protensae.

post somnum gravitas totius corporis.

post somnum palpebrae materia purulenta con-
glutinatae.

post somnum os internum muco foetido obdu-
ctum.

15 post somnum sapor putridus in ore.

post somnum halitus ex ore foetidus.

post somnum pressio in scrofula, inter inspi-
randum per sternum propagata, in
dolorem quasi a verberatione transi-
ens.

dolor in pollice lancinanti lacerans vehe-
mens †).

* Secunda hora observatum. Calor ex rheo inter vires
secundi ordinis sine dubio referendus.

**) Tertia hora observatum.

***) Prima hora observatum.

†) Tertia hora observatum.

*lancinatus singuli in pectore *).*
lancinatus singuli in brachiis.

*dolor simplex omnium articulationum intermovendum **).*

narcosis artuum quibus incumbitur.

*rigiditas genu inter movendum dolorosi ***).*

dolor dentium (cariosorum) diruens, elongatio,

vacillatio †).

ardor urinae ††).

anorexia.

plenitudo ventriculi, quasi animia satietate †††).

*) Sexta hora observatum.

**) Inde a duodecima per plures horas observavi.

***) Circa vigesimam horam a magna dosi observatum.

†) A duodecima ad vigesimam quartam horam usque observatum.

††) Circa vigesimam horam a magna dosi observatum.

†††) Ab octava ad duodecimam usque horam observabatur, hoc demum interdum sequebatur somnolentia.

[OBSERVATA ALIORUM.]

MURRAY, Appar. Med. Tom. IV. p.
590 — 596.

Sudor copiosus *).

purgat et postea alvum adstringit.

sanguinis cursum accelerat, febris auctior,
respirandi difficultas et anxietas auctior.

nausea.

molestiae ventris.

sonnifera virtus **).

tormina et inflatio abdominis ***).

deliria.

pectoris compressio. } †).
virium prostratio.

ardor in renibus, vesica. FALLOPIUS.

vertigo. SIM. PAULLI.

*) Colore luteo ex MENZEL et TILLINGIUS. odore rhubarbarino ex MENZEL.

**) Ex FORDYCE et LENTIN.

***) Ex BAKER.

†) Ex BROCKELSBY.

DATURA STRAMONIUM, L. (*sucus foliorum solis calore inspissatus.*)

*V*is plerumque 24 horas durat, ad summum 36 horas.

Frigiditas extremitatum.

frigiditas totius corporis.

frigiditas et frigus octo horarum.

animi abjectio.

lacrymatio involuntaria.

ebrietas *).

languor, pedes fessi.

propensio in decubitum pertinax.

evacuationes suppressae omnes.

siccitas faecium.

indeglutitio,

constrictio gulæ.

difficultas deglutiendi cum dolore punctorio
in gula.

difficultas deglutiendi cum dolore (pressorio)
in glandulis submaxillaribus.

sensus in abdomen quasi ab expansione summa.

intumescentia abdominis non dura.

* Aliquando post octo horas observatum.

appetitus prostratus.

nausea.

vomitus biliosus post levem motum, vel in lecto trunci erectionem.

ptyalismus.

5 *narcosis artuum.*

catalepsis volaticea.

(pressio in scrofula.)

dolor lacerans in abdomen, quasi umbilicum evulsuris sit, dein in pectus tendens.

dolores strictorio lacerantes in dorso et epigastrio *).

10 dolor strictorius in spinae dorsalis medio cum dolore strictorio in posteriori parte ventriculi, illi respondente,

dolor strictorius in spinae dorsalis medio,

respiratio gravis.

respiratio angusta.

sensus circumvolutionis in pectore et tum calor in facie.

15 post decabitum noctu dolor dissindens in sternone, flatum secessu evanescens, sed repetens.

dolor pectoris, sterni pressorius, loquendo excitatus.

bubo.

rubor faciei.

caloris sensus in facie post frigus et frigiditatem.

20 dolor capitis constrictorius.

amentia loquax, conquestio de cane pectus mordicus dilacerantibus,

tumor unius, plurium membrorum.

den-

*) Exacta una hora observatum.

dentium dolor pulsatorius, quasi pars dentium
casura esset.

dolores in osse sacro strictorii.

dolores in femoribus strictorii.

incalescentia.

miliaris rubra eruptio cutis.

calor, sudor universalis maximus, sine siti *).

inter calorem obvolvi stragulis apprime gestit,
et si vel digitum e lecto emitit, dolo-
rum redditu feroci excruciatur.

somnus turbulentus.

insomnia historica.

convulsiones artuum **).

dolor in dorso parvi spatii (lancinanti?) stri-
ctorius, vel tactu dolorosi. 10

dolor dorsi et una abdominis quasi a contusio-
ne, motu excitandus ***).

dolores dorsi, humeri quasi a verberatione †).

macula in dorso dolorifica per se et tactu.

appetitus auctus.

sensus oris interni, quasi ab excoriatione ††). 15

memoria imminuta.

haemorrhoides plures dies fluens.

*) Quinta hora observatum.

**) An ad vires secundi ordinis referendum?

***) Duodecima hora observatum.

†) Duodecima hora observatum.

††) Circa vigesimam quartam horam observatum.

†††) Sequentia non nisi inter reliquias observavi, qua-
rum quae ad vires primi, quae ad secundi ordinis vires
pertineant, nondum mili liquet.

sanguis grumosus ex ano secedens.
menstrua aucta, sanguine menstruali frustis
magnis, grumosis secedens.
menstrua nimia, haemorrhagia uteri, cum do-
loribus strictoriis in abdomen, femo-
ribus et artubus.

[OBSERVATA ALIORUM.]

D. CRÜGER, Misc. Nat. C. Dec. III. ann.
2. obs. 68.

(a semine in adulto.)

Fauces constrictae.
vertigo, ut quasi temulentus hinc inde vacilla-
ret.
mentis vacillatio,
variae phantasiae obversantes.
ecstasis.

5

J. C. GRIMM, Eph. Nat. C. Cent. 9. obs.
94.

(a semine in pueri 3 annorum.)

Insania *).
saltatio.
gesticulatio.
cachinnus.
cantus.
sudor largior.
somnus longus **).

10

KELLNER, Bresl. Samml. 1727.

(a seminis decocto.)

Abolitio sensuum, visus, auditus.

Q. 2

*) Post 3 horas.

**) Viginti quatuor horarum.

tremores.
 agitationes artuum.
 stridor dentium.
 facies inflata, sanguine turgida.
 oculorum contorsio.
 pulsus tremulus, debilis, inaequalis, interdum
 intermittens.
 murmura ventris *).
 —
 mentis absentia **).
 delirium leve.

Abr. SWAINE, neue edinb. Vers. II, S.

279.

(a decocto pericarpiorum trium.)

10 Vertigo.

aeris liberi appetentia.
 temula vacillatio, ebrii instar.
 timor ne cadat.
 timor ne mente privetur.

15 decubitus.

siccitatis ingentis in lingua et faucibus sensus.
 siccitatis sensus in pectore.
 pectoris constrictio horizontalis summa,
 balbuties ***).

20 insensilitas.

inquietudo.
 müssitatio.

frigiditas maxima universalis, artuum, truncorum.
 pulsus exilis, celer.

25 geniculatio, in genua erectio.

*) Mors post sedecim horas.

**) Per viginti quatuor horas.

***) Post semihoram,

brachiorum protensio.	
manus quaeritantes.	
oculi rigidi, soporosi.	
aphonia *).	
torpor, pulsu fere deleto.	5
artus paralytici.	
stupiditas **).	
furor immanis, vix contineri patiens, insur-	
gens, feriens, arripere obvios ges-	
tiens.	
garrulitas delirans, inconcinna blateratio.	
vicissitudines sanae mentis et insaniae.	10
excretionum lotii et alvi suppressio.	} ***).
agrypnia.	

KAAW BOERHAVE, impet. fac. hippocr.

L. B. 1745. p. 282.

Ebrietas.	
pupillarum dilatatio.	
oculi splendentes.	15
rubor faciei.	
cantus.	
lascivia, impudicitia.	
balbuties.	
oculi horridi, fixi, immobiles.	20
tremor labiorum, manuum, pedum.	
stridor dentium.	
convulsiones.	
dementia.	

*) Post aliquot tempus.

**) Per sex vel septem horas.

***) Per quatuordecim ipsas horas, quas beneficium dura-
verat.

decubitus in dorso *), oculis late apertis,
fixis.

trismus, labiis occlusis.

manus, nec tamen pollices, in pugnum con-
tractae, extensiles tamen.

contractiones et extensiones artuum lentae,
iterantes.

5 inspiratio lenta, exspiratio celerrima.

pulsus celer, intermittens.

sensuum et motum voluntariorum abolitio
(catalepsis), deglutitione tamen il-
laesa.

vomitus artificialis inter artuum spasmos.

somnus altus, stertorosus, cum contractione
cruris rara.

VICAT, plant. venen. de la Suisse, p.
248.

(a fructibus.)

10 Tristitia.

aphonia.

pulsus deletus.

artus paralytici.

furor.

15 vertigines.

insensibilitas.

delira blateratio.

pulsus parvus, celer, tandem vix perceptibilis.
crura paralytica.

20 furor.

exanthema pruriens.

pupillae dilatatio.

*) Post horam.

J. F. LOBSTEIN, obs. de stram. sem.
virt. ven. in App. Diss. GUERIN —
SPIELMAN de pl. ven. Alsat. Argent.
1766.

(a seminibus in duobus infantibus.)

Artuum lassitudo *).

nisus in decubitum.

calor magnus cum blateratione in somno.

tumor faciei, genis et labiis praerubris **).

oculi tumore clausi, pupillis summe dilatatis, §
bulbis motitatis quaqua versum.

abdomen tumidum, nec tamen durum.

contractiones manuum et pedum alternantes.

convulsiones et deliria tactu maxime excitanda,
debilitate mox subsequā.

lingua tumida, ex ore protensa.

sauces praestriktæ, quasi a suffocatione vel †
apoplexia nascitura.

somnus tranquillus inter convulsionum mitigationem.

calor magnus, sudore miti, pulsu celeri,
molli.

horror liquorum aquosorum, hydrophobiae
instar, in furem summum transiens,
dum labia iis madefiebant.

pulsus magis latus ***), respiratione liberiore,
tumore evanido, convulsionibus et
deliriis restantibus †).

* Post quatuor horas.

**) Post quatuordecim horas.

***) Post octodecim horas.

†) Pupillæ dilatatae et immobiles cum delirio ad triginta
usque horas durabant.

Comment. de reb. in sc. nat. et med.
gest. Vol. II. p. 241.

Sitis molestissima cum ptyalismo.

GREDING, in LUDWIGII Adversar. med.
pr. Vol. I. p. 259.

Caput cum dolore obnubilatum *).

visus varie vitiatus,

visus hebes,

s³ anxietas,

alvus segnior, obstructa,

alvus laxa,

appetitus auctus,

somnus turbulentus,

s²⁰ somnus tranquillus,

sudor saepe profusus,

febris.

Iargum letii profluvium,

lippitudo.

s²⁵ convulsiones oculorum,

sitis intensa,

ptyalismus,

tormina,

singultus,

s³⁰ dolores rheumatici.

pruritus totius corporis,

formicatio,

purpura.

GARDANE, Gazette de santé 1773, 1774.

p. 143.

Incalescentia corporis magna.

*) Quae sequuntur symptomata variis temporibus et diversis in hominibus subinde a Gredingio observata,

KRAMER, *Commerc. lit. nor.* 1753. p. 251.

(*a tinctura spirituosa seminum.*)

Delirium ferox.

DÖDERLIN, *Comm. lit. nor.* 1744. p. 15.

(*a foliorum decocto.*)

Mordicans in ventriculo sensus.

cephalaea.

rubor faciei.

narcosis.

convulsiones.

FOWLER, *Medical and philos. Comment.*

Vol. V. p. 161.

(*a sesquidrachma seminum in puella sexenni.*)

Stupiditas.

tumor ventris.

tumor faciei, oculorum, linguae.

insania.

cephalaea.

10

(*a semidrachma in puella trienni*) ibid.

cephalalgia.

singultus.

tumor faciei.

vomituritio.

15

Van EEMS, in H. BOERHAAVE *prael. de morb.*

nerv. T. I. p. 257.

(*a pulvere naribus attracto.*)

In mento horror.

BÜCHNER, bresl. *Samml.* 1727.

(*a seminibus in adulta.*)

Convulsiones.

apoplexia.

SCHROER, in HUFEL. Journ. d. pr. Arz. Vol. X. P. I. p. 195.

(a seminibus.)

Mania ferox, incoercibilis.

manibus captat.

ridet.

volutatio reptans in lecto.

5 pedibus insistere nequit.

pupilla dilatata immobilis.

congestio sanguinis ad caput *).

CAPIT. a COSTA, ap. Schencklib. VII. obs.

159.

Mentis alienatio.

risus.

10 ejulatio.

somnus.

alteri, quem non agnovit, colloquitur et respondet, colloquiū tamen immemor, postquam ad se redit.

STOERCK, lib. de Stram. Acon. Hyosc.

Vien. 1762. p. 5.

(a vapore.)

Dolor capitis obtusus.

* Symptoma viginti quatuor horas durarunt.

VALERIANA OFFICINALIS, L.(Tinctura radicis.)

V_is

Frigiditas.

vomituriens nausea, quasi a filo pendens, ab umbilico oriens et sensim ad fauces adscendens, affluxum salivae copiosum ciens.

odontalgia.

dolores vagi punctorii in dentibus, collo extero, supra orbitas, in scrobiculo, in umbilico.

scintillae in visu.

5

palpitatio.

vomituritio.

vomitus.

purgatio.

synochus.

10

dolor pressorius in abdomine.

dolor forficans in abdomine.

in abdomine sensus expansionis summus, quasi ad disruptionem usque.

abdomen durum *).

torpor paralyticus in artibus.

15

*) Quarta hora observatum.

- dolor quasi a contusione in artubus.
cephalalgia lancinans.
cephalaea octo horarum pressorio lancinans.
dolores rheumatici in scapulis.
5 dolores rheumatici in artubus.
dolor strictrius in dorso.
dolor vulsorius in pectore.
calor auctus.
agrypnia.
10 jactatio.
-

[OBSERVATA ALIORUM.]

Temulentia, ab odore. (HILL, on Valerian.)
anxietas. (TISSOT, traité de l'épilepsie S. 309.)
vomitus. } (RAY, hist. pl. Tom. I. S. 588.
alvi profluvium. } DODONAEUS, Pempt. S. 262.)
labefactatio ventriculi. (ANDRÉE, Cas. of epilep-
sy. S. 262.)
diuresis. (C. HOFFMANN, Off. S. 583. CARMINATI,
Opusc. therap. Vol. I. S. 227.)
pulsus arteriarum auctus. } (CARMINATI, ibid.
calor auctus. } S. 258.)
sudor copiosus. (MARCHANT, Mem. de l'ac. d. s.
de Paris 1706.)

VERATRUM ALBUM, L. (Tinctura radicis.)

*V*is nychthemerum fere durat.

Tussicula sicca ob titillationem in ima sterni
parte *).

*frigiditas totius corporis **).*

*frigiditas pedum, quasi ab aqua frigida in iis
circulante, cum tremore.*

*frigoris sensus in vertice capitis et simul in pe-
dibus ***).*

5 *vertigo.*

pupillae ad summam coarctationem pronae.

nitus in decubitum.

imbecillitas maxima.

gressus vacillans.

10 *viribus cassus collabitur.*

virium lapsus.

animi deliquium.

facies hippocratica.

languor quasi nimio calore confecti.

15 *aer molestus, ut ex morbo gravi convalescenti
atmosphaera molesta est.*

*) Statim post ingestum veratrum observatum.

**) Post panca minuta observatum.

***) Post primam horam observatum.

ratio deficit.

*delirium mite, frigido corpore, oculis apertis,
vultu sereno, interdum risorio, de
rebus religiosis, de votis solvendis,
de precibus, cum erronea de domi-
cilio opinione (alio esse credit) *).*

rationis status quasi per insomnia.

taciturnitas.

aphonia.

memoriae lapsus.

spuma ante os.

oculi revulsi.

*coma vigilans, oculis hoc aperto, illo clauso,
semiclauso, cum succussionibus qua-
si a terrore **).*

*somnolentia cum terrificis succussionibus som- 10
num impedientibus, postea febriles
motus.*

sudor frigidus.

sudor frigidus frontis.

*strangulationis, suffocationis accessus, ocu-
lis prominentibus ***).*

respiratio intercepta.

respiratio fere deleta.

*spasticae constrictiones gulæ, pupilla con- 15
tractiore.*

trismus.

constrictiones gulæ quasi a pyri austeri esu.

*spasmodica contractio muscularum intercosta-
lium in sinistrum latuſ cum respiratio-
ne intercepta †).*

*) Post primam horam observatum,

**) Post semihoram observatum.

***) Post semihoram observatum.

†) Tertia hora observatum.

- constrictio pectoris dolorifica.
anxietas summa, respirationem intercipiens.
 anxietas in deponenda alvo, quae metum apoplexiae incutit.
 ante alvum deponendam sensus quasi a syncope
 nascitura in abdomen inflmo.
 5 angor suspiriosus. { *).
 suspiria aestuantia. } *).
 spei abjectio, animus desperans.
 angor, quasi ex mala conscientia.
 angor, quasi a divinatione fati impendentis **).
 10 tremor totius corporis.
 susurrus aurium ***).
 obturatio auris alterutrius.
*siccitas palpebrarum summa ****).*
 palpebrae siccae maxime post somnum, dolentes
 quasi ab attritu, rigidae, conglutinatae.
 15 palpebrae conglutinatae in somno †).
 inter somnum brachia pone caput porrecta ††).
 palpebrarum siccitatis sensus.
 febriles motus.
 horripilatio cutem perreptans v. c. faciei †††).
 20 oscitatio.
 singultus.
 ardor in gula ††††).
rasonis sensus in gula.
-

aspri-

- *) Secunda et tertia hora observatum.
 **) Octava hora obsevatum.
 ***) Post duas horas observatum.
 ****) Post semihoram observatum.
 †) Post quartam horam observatum.
 ††) Intra primas horas observatum.
 †††) Circa secundam horam observatum.
 ††††) Post secundam horam observatum.

aspritudo saucium.

gulæ coarctatio quasi a tumore interno pre-
mente, anginae species.

*gustus imminutus, sapor pultaceus in ore *).*

sapor insulsus, insipidus.

*siccitas saucium, potulentis non sedanda **).* 5

appetentia fructuum horaeorum, citri acidi,

appetentia pomorum.

sapor putridus instar fimi.

*fimi foetoris sensus ***).*

Jabia fissilia.

dentium vacillatio.

*siccitatis narium internarum sensus et irrita-
tio ea quæ a pulvere viarum ari-
darum in naribus oriri solet ****).*

sensus quasi ab ulcere in naribus.

rheumatica nuchæ rigiditas, vertiginem acciens,
maxime inter movendum.

capitis dolor interrupte pulsatorius †).

capitis dolor pulsatorius supra oculum sinistrum
per quadrantem horæ ††).

capitis dolor pressorio pulsatorius.

capitis dolor obtuse pressorius in vertice
(mane) post somnum.

capitis dolor quasi fractum sit cerebrum aut
pars ejus.

hemicrania pressoria cum ventriculi dolore 20
connexa †††).

*) Jam primo quadrante horæ observatum.

**) Sexta hora observatum.

***) Circa horam decimam sextam observatum.

****) Tertia hora observatum.

†) Sexta hora et a majori dosi observatum.

††) Prima hora observatum.

†††) Post quartam horam a minori dosi observatum.

congestio ad caput inter pronationem *).
dolores ex pressione et contritione compositi
*hinc inde in cerebro, interrupti **).*
*stomachus non sine proritatione ***).*
 animus vitia aliorum conquirens.
 convicia irritati, alias taciturnitas.
 ructus inanes.
 ructus amari.
vomituritio cum sapore bilioso in ore.
 vomitus primo biliosus, dein pituitae maxime
 tenacis.
 ante vomitum semper horror supra totum cor-
 pus.
effluxus salivae aqueae copiosus, quasi a
 verminatione.
 cardialgia.
 cardialgia quasi a fame canina.
pressio in scrobiculo vehemens, ad sternum,
 hypochondria et ossa ilei propaga-
 ta†).
 dolor tensivus in hypochondriis quasi a flatibus.
 dolores circa praecordia pressorii, strictorii.
dolor in abdomen hinc inde, cultris quasi
 disscindens ††).
colica flatuosa hinc inde intestina lacessens
 et totum abdomen occupans, flati-
 bis quo serius, eo rarius et diffici-
 lius abeuntibus †††).

*) Octava hora observatum.

**) Post primam et plures horas observatum.

***) Quarta hora observatum.

†) Octava hora observatum.

††) Statim post ingestum veratrum observatum.

†††) A sexta inde hora ad duodecimam usque horam obser-
 vatum; transitus a primo ad secundum virium ordinem.

dolor tractorio lacerans per minuta, in infimo
abdomine, maxime supra os pubis *).
tormina disseindentia **).
secessus flatum copiosus ***).
flatum eruptio tumultuosa deorsum.
sedes citae, crebrae, moliores ****).
ardor ani in alvo deponenda †).
acredo exerementorum ‡‡).
herniae molinina.
herniam incarcerare tentat.
inter tussim lancinans dolor ex abdomine per 10
funiculum spermaticum penetrans †††).
haemorrhoides coeca ††††).
ardor urinae.
acredo urinae.
sensus strictorius in testiculis.
intertrigo praeputii (1).
coryza (2).
titillatio in infima bronchiorum parte tussi- 15
fera, expectoratione levi (3).
dolor in musculosis corporis partibus expres-
sione et contritione compositus.
dolor strictorius in artibus.

R 2

*) Prima hora observatum.

**) Duodecima hora observatum.

***) Primis horis.

****) Primis horis observatum.

†) Duodecima hora observatum.

††) Duodecima hora observatum.

†††) Circa tertiam horam observatum.

††††) Decima hora observatum.

(1) Post 6 horas.

(2) Octava hora observatum.

(3) Prima et sexta hora observatum.

dolor omnium membrorum, quasi fatigatio-
ne confecta essent.

*sensus in ossibus quasi contrita essent *),*
*pressio in sterno **).*

dolor in pectore sinistro, parvo spatio circum-
*scriptus, punctorio pulsatorius ***).*

§ dolor in sterno pressorius a cibo, potu.

sensus in brachio, quasi nimis plenum seu tumi-

dum esset.

narcesis artuum.

fornicatio in digitis.

narcosis digitorum †).

¶ fornicatio in digitis angorem procreans,

ardenti pruriens dolor in digitis minimis prima
phalange, ut a gelu ‡‡).

quasi a luxatione dolor in pollicis articulo.

dolor rheumaticus per motum sensibilis intra
scapulas et a nucha ad os sacrum, ma-
xime inter alvum deponendam sensi-
bilis.

dolor arthriticus in musculo deltoide et in genu.

¶§ dolor gravatus crurum, quasi a lassitudi-
ne,

fragor genu.

crampus surarum,

pedes subito tumidi, post aliquot horas detu-
mescentes.

post sessum inter motum dolor paralyticus et

* Secunda hora observatum.

**) Secunda hora observatum.

***) Quinta hora observatum.

†† Prima hora observatum.

††† Sexta hora observatum.

quasi a contusione articulationum genu et ossis sacri *).

In pollice pedis lancinantes dolores **).

inter sessum dolor lacerans muscularum
extensorum,
(dolor lacerans in auriculis.)
(oculi inflammatio, cum dolore lacerante.)
oculi albugineac inflammatio cum dolore
lacerante in eo. } ***).
— ****).

pupillae dilatatae.

(somnus nimis altus.)

pruritus cutis exedens †).

eruptiones cutaneae, scabiei species,

pustulae acervatim conglomeratae, dolorificae, to
miliare exanthema per calorem etiam interdiu
pruriens (solum in juncturarum regio
ne?) post fricatum arenas, inter erup
tionem tuberculorum urticarium.

constipatio ob crassitatem et duritatem excre
mentorum alvinorum ††).

excretiones omnes suppressae †††).

intestina labefactata quasi et contrita, flatibus
abire recusantibus,

flatus, meteorismus surde terminosus, inque- 15

*) Octava hora observatum; an ad secundum ordinem
referendum?

**) Quinta hora observatum.

***) Haec an ad secundi ordinis vires sint referenda, non
liquet.

****) Quae sequuntur ad vires secundi ordinis videntur re
ferenda.

†) Duodecima hora observatum.

††) Tertia et decima quarta hora observatum.

†††) A nimis magna dosi per aliquot dies observatum.

tudo et tensio abdominis quasi ab alvo
constipata.

dolor in hypochondriis et pectore a flatibus ab-
ire recusantibus.

titillatio in ima bronchiorum parte, sine expe-
ctoratione *).

agilitas et pathorum et dolorum immi-
nuiο. } **).

inquietudo negotiosa.

slaboris amor.

hyperesthesia, mentis status exaltatus.
animi effusio.

febricula †) plurium dierum, interdum chro-
nica.

chronica debilitas.

sosopor, coma vigilans.

metus.

idearum penuria.

motus corporis tardus.

succussiones quasi electricae cum dolore sub-
sequo genu et cubiti quasi a contusio-
ne.

* pedagram restituit.

*) Post nychthemerum observatum.

**) Haec transitum in secundum virium ordinem parare vi-
dentur.

***) Quae sequuntur tanquam reliquias observavi, ex ni-
miis dosibus.

†) Interdum matutinam observavi, interdum vesperti-
num.

[OBSERVATA ALIORUM.]

BENIVENIUS, apud SCHENCK, lib. VII;
obs. 174.

Crebra et vehemens alvi dejectio *).
spiritus attractio summe gravis ac difficilis ad
mortem usque, post sex horas inse-
quentem.

Idem apud eundem, obs 175.

Vomitus primo bilis ac pituitae, tum nigrae bi-
lis, postremo sanguinis.
imbecillitas maxima.
sudor frigidus in toto capite et thorace ema-
nans.

FORESTUS, apud SCHENCK, ib. obs. 176.
Convulsio.

(in alio ab infuso vinoso.)

vomitus enormis.

*) Statim.

cholera.

animi defectus.

anhelitus praefocatio.

L. SCHOLZIUS, apud SCHENCK, ibid.
obs. 178.

(a pulvere, condimenti loco.)

Quasi strangulati hospites in suffocationis periculo versabantur.

S. LEDELIUS, Misc. Nat. Cur. Dec. III,
ann. 1, obs. 65.

§ Vomitus *).

alvi fluor copiosissimus, dolorosus.

vertigo, post semihoram.

dolor capitis.

convulsiones.

(a granis decem.)

10 tensio artuum.

circumgyratio capitis cum gravitate.

R. LENTILIUS, Misc. Nat. Cur. Dec. III,
ann. 1, app. S. 150.

Vomitus horrendi.

alvi excretiones.

convulsiones epilepticae.

15 tanta tormenta **), ut sanguis per unguium rimas
transsudaret.

S. GRAS-

*) Statim.

**) Dolores, anxietas.

S. GRASSIUS, Misc. Nat. Cur. Dec. I. ann.

4. S. 95.

Balbuties,

delirium leve.

aestus internus cum potus denegatione.

J. de MURALTO, Misc. Nat. Cur. Dec.

II. ann. 2. S. 240.

(a foemina 30 annorum ab infuso vinoso.)

Singultus *).

strangulatio circa gulam.

anxietas.

incendium circa praecordia.

sternutationes fortes, frequentissimae.

vomitus.

spasmus.

convulsiones **).

5

10

15

REIMAN, Bresl. Samml. 1724. S. 555.

(a semidrachma.)

Anxietas.

cardialgia.

strangulatio, constrictiones spasticae gulae,

vertigo summa.

cholera.

inflatio oesophagi.

inflatio abdominis.

sudor frigidus.

crampus surarum.

S

20

*) Post quadrantem horae.

**) Mors post duodecim horas.

DOBOLENSKY, Misc. Nat. Cur. Dec. I.
ann. 2.

Apoplexia.

BORRICHITIS, Acta havn. T. VI, S. 145.

Oculorum intorsiones.

visus abolitus.

P. J. BERGIUS, Mat. med. S. 872.

Ardor faucium.

sensatio corrodens cardialgica.

oppressio pectoris.

lancinantes imi ventris dolores.

lancinantes vagi dolores.

piperis sensus in faucibus.

CONR. GESNER, epist. med. f. 69.

(ab infuso aliquot granorum.)

10 Ardor circa scapulas.

ardor in facie, capiteque.

fervor linguae et gutturis.

inflatio oesophagi cum suffocationis sensu.

singultus per semihoram.

15 hilaritas.

acies ingenii.

ETTMÜLLER, op. Tom. II. P. II. S. 435.

Vomitus violentissimi.

dejectiones alvinae, violentae, sanguineae.

SMETIUS, Misc. med. S. 565.

Epidermidis desquamatio.

LOR

Synco

faucri

stoma

anxiet

vomitu

crampl

convul

J. E.

Vomit

phlog

eruptio

macula

pleurit

calor c

sitis di

cephal

formic

insudat

enures

salivati

salivae

menstr

SMYT

Vertig

singult

nausea

Tur

RY, de Melanchol. II. S. 312 — 315.

pes metus.
m strangulatio.
chi et intestinorum cruciatus.

ates.
is enormis.
us surarum.
siones.

. GREDING *), vermischtte Schr. S. 30.

us viridis muci, bilis viridis.
osis in facie, naso, oculo, ore, lingua.
ones cutaneae. 16
ne cutaneae.
ica symptomata.
corporis cum rubore et calore faciei.
ra.
algia dira. 15
ationes in digitis, manibus.
tio.
is.
o.
profluvium multum. 20
ruatio in amenorrhoea.

TH, med. communic. Vol. I. S. 207.

o.
us.
i.

S 2

multuarious observator, enormes doses urgens.

vomitio,
debilitas summa.

KALM, N. amer. resa, Tom. III, S. 49.
(ab externo usu.)

Ardoris sensus,
enuresis,

VICAT, plant. venen. d. l. Suisse, S. 167.
(loco condimenti in escis.)

5 Frigiditas universalis,
gelidus sudor totius corporis,
imbecillitas extrema.
sensus fere evanidi,
pulsus fere evanidus,
10 vomitus ferox.
crura trementia,

WINTER, Bresl. Samml. 1724, S. 268.

Constrictio gulæ.
convulsiones artuum,

DESENNIUS, Compos. med. lib. X, S. 422.
Diarrhoea sanguinea,

RÖDDER in ALBERTI, med. leg, obs. 15,
15 Frigus universale,
anxietates,
hypercatharsis,
vox deficiens,
sudor frigidus,

pulsus inperceptibilis,
convulsiones.

ALSTON, lect. on mat. med.
(ab infuso semidrachmae.)

Vomitus niger,

Bey dem Buchhändler Joh. Ambr. Barth
in Leipzig sind auch folgende Bücher erschien-
nen und um beygesetzte Preise zu haben.

*Beckers, Dr. G. W., Neue Haus- und Reise-Apotheke
oder medicinisches Noth- und Hülfsbücklein, nebst ei-
ner genauen Untersuchung aller wirksamen und überall
zu habenden Hausmittel, 2te sehr verbess. Auflage, 8.
1803. 22 gr.*

Dies Büchelchen zeigt seinen Inhalt sehr deutlich
auf dem Titel an, und der Verf. hat nichts unterlassen,
was dasselbe sehr brauchbar für jeden Hausvater, Oe-
konomen, Landprediger, Landleute und Reisende
macht, diese Brauchbarkeit wurde auch hinlänglich
anerkannt, da schon im zweyten Jahr nach seiner Er-
scheinung die 2te sehr verbess. Auflage erfolgte.

*Dasselben populäre Menschenkunde in jeder Hinsicht, ein
Handbuch für die erwachsenere Jugend beyderley Ge-
schlechts, ihre Erzieher, und jeden, der sich selbst ken-
nen lernen will, 2 Theile, 1803. 2 thl.*

Sowohl der physische als intellectuelle Theil des
Menschen wird jedem hier in den verschiedenartigsten
Beziehungen vor Augen gelegt. Je schwieriger die
Begriffe davon oft sind, die der Mensch aus sich selbst
zu abstrahiren hat, desto deutlicher suchte der Verf.
seinen Lesern zu werden und Niemand wird das Buch
ohne bereicherte Kenntnisse aus der Hand legen.

*Consbruch, Dr. G. W. und Dr. J. Chr. Ebermaiers allge-
meine Encyclopädie für Aerzte und Wundärzte, 1ster,
2r, 3r, 4r, 7r, 9r Theil. 8. 1802 - 1804, welche unter
folgenden einzelnen Titeln erschien und in allen kri-
tischen Blättern mit allgemeinem Beyfall aufs brauch-
barste empfohlen worden ist, als:*

*Anatomisches Taschenbuch für Aerzte und Wundärzte,
von Dr. Consbruch, 8. 1 thl.*

*Physiologisches Taschenbuch für Aerzte und Liebhaber
der Antropologie, von Dr. Consbruch, 8. 1 thl.*

Beyde Theile enthalten in gedrängter Kürze eine
deutliche und fassliche Uebersicht aller Verbindungen
der Theile des menschl. Körpers, mit steter Rück-
sicht auf die neuesten Forschungen und Erweiterun-

Ac 68365

gen dieser Wissenschaften, wodurch sie selbst dem erfahrenen Arzt nicht ohne Interesse geblieben sind.
Diätetisches Taschenbuch für Aerzte und Nichtärzte, von Dr. Consbruch, 8. 1 thl. 12 gr.

Es würde nicht genug seyn, wenn dieses nützliche Buch den Aerzten allein bekannt bleiben sollte, da es besonders dazu mit bestimmt ist, dass es von jedem, dem darum zu thun ist, seine Gesundheit zu bewahren, zu erhöhen und über die Gefahren, die der Gesundheit drohen, belehrt seyn will, gebraucht und beherzigt werde. Der Verf. hat deshalb den Sinn der Diätetik in dem weitesten Umfange nach einer ganz systematischen Ordnung aufgestellt, und jeder wird sich bald überzeugen, dass er mit erhöhter Zufriedenheit dem Verf. zu folgen berechtigt sey, wenn ihn an Erfahrung der Gesundheit gelegen ist.
Taschenbuch der Arzneimittellehre für praktische Aerzte und Wundärzte, von Dr. Consbruch, 8. 1804. 20 gr.

Auch dieses enthält eine vollständig gedrängte Uebersicht aller Erfahrungen, welche bis jetzt in der Arzneimittellehre gemacht worden sind.

Klinisches Taschenbuch für angehende praktische Aerzte von Dr. Consbruch, 2 Bände, 4te sehr verbesserte Auflage, 8. 3 thl.

Dieses Buch ist seit seiner Erscheinung in 3 Auflagen zu bekannt, dass nur die neue vierte Auflage genannt werden darf, die durchaus Zusätze und Verbesserungen erhalten hat, indess ist es Pflicht für den ungerechten Nachdruck nach der dritten Auflage zu warnen, in welchem diese wesentlichen Verbesserungen ganz fehlen. Diese Warnungsanzeige findet jeder auf dem Titel der wahren verbesserten 4ten Aufl.
Taschenbuch der Chirurgie für Aerzte und Wundärzte, von Dr. Ebermaier, 2 Bände, 8. 3 thl. 12 gr.

Angehende Wundärzte, die selten kritische Blätter lesen, in welchen dies Werk als brauchbarste empfohlen worden ist, werden gern erfahren, dass sie in demselben mit allen Vorkenntnissen und Handgriffen dieser Wissenschaft, so wie mit den Krankheiten und ihrer Behandlung selbst genauen und deutlichen Unterricht finden. Der Verf. hat den Werth desselben dadurch noch sehr erhöhet, dass er bei jeder Krankheit zeigt, wo und wie die innere Heilkunst zu Hilfe kommen müsse.