




Laatste lijst van Nederlandsche schildvleugelige insecten (insecta coleoptera)

<https://hdl.handle.net/1874/235967>



mm 13085

0DZ 316





G. A. Lass

Geo. V. Bonham del.

yc

ODZ 316 7/20
~~Hg 10~~

LAATSTE LIJST

VAN

NEDERLANDSCHE SCHILDVLEUGELIGE INSECTEN,

(INSECTA COLEOPTERA.)

OPGEMAAKT DOOR

Mr. S. C. SNELLEN VAN VOLLENHOVEN, Ph. n. Dr.

Lid van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, te Haarlem.

(UITGEGEVEN DOOR DE HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ DER WETENSCHAPPEN, TE HAARLEM.)

HAARLEM,
DE ERVEN LOOSJES.
1870.



RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT



1661 4095

VOORREDE.

Onder de orden der Insecten zijn die der Lepidoptera en Coleoptera het meest bekend en bearbeid. De eerste daarvan zag reeds jaren geleden hier te lande door den ijver van Goedaert, Ladmiral, Cramer en Sepp zeer merkwaardige werken op zijn gebied in het licht geven. Voor de tweede kan men, indien men eene parallel wil trekken, alleen het werk van Voet opnoemen; de inlandsche torren werden slechts hier en daar ter loops beschreven.

Een onzer ijverigste entomologen, de heer P. C. T. Snellen, zich aan de spits stellende der beschrijvers naar het wetenschappelijk stelsel, heeft onze Nederlandsche entomologische fauna geopend door de uitgave van een lijvig boekdeel, behelzende de stelselmatige beschrijving onzer Macrolepidoptera. Wegens den vrij gelijken gang der kennis van beide genoemde orden in het westen van Europa, of beter gezegd in het meest beschaafde gedeelte van ons werelddeel, verwacht men nu natuurlijker wijze, dat er ook spoedig eene systematische beschrijving van alle inlandsche kevers het licht zal zien.

Evenwel, zoo men zich niet met een' zeer onvolledigen arbeid wil te vrede stellen, vrees ik dat men nog vele jaren geduld zal moeten oefenen.

De moeite en bezwaren van den arbeid staan namelijk niet geheel gelijk. De eigenlijk onverdedigbare, maar gemakshalve aangenomen scheiding der Schubvleugelige Insecten in *Macro-* en *Microlepidoptera* is den heer Snellen uitmuntend te stade gekomen en hij zal wel zelf erkennen,

dat indien hij de Micro's gelijktijdig met de Macro's zou hebben moeten bewerken, hij nog een zeker aantal jaren met de publicatie zou hebben gewacht. De Coleoptera nu, die zoodanige indeeling niet toelaten, moeten in eens, *d'un jet*, behandeld worden. Wie het reuzenwerk der beschrijving van die orde onderneemt, moet het geheel overzien van den aanvang af. Daarom veronderstel ik ook dat men zich waarschijnlijk wel bepalen zal tot het geven van analytische tabellen en zeer korte beschrijvingen, welke dan ook geheel voldoende kunnen zijn, indien zij gepaard gaan met omtrekken in houtsneden en verwijzingen naar zeer goede (*niet* langdradige) beschrijvingen bij vreemde schrijvers.

De vele bezigheden, mij door mijne betrekking aan 's Rijks Museum opgelegd, en de uitgave mijner Monographien over Oost-Indische insecten-familien maken het mij onmogelijk aan dergelijken veelomvattenden arbeid als de Coleopteren-fauna van ons land de hand te slaan. Ik laat er de zorg en tevens de eer van aan anderen over en bepaal er mij bij, hun te hulp te komen door het in 't licht geven eener derde naamlijst van inlandsche kevers. Wenschte ik nu reeds met de beschrijving der soorten een' aanvang te maken, dan zou ik bovendien stuiten op de geringheid der kennis, die wij tot heden hebben van het insecten-leven in eenigen onzer provinciën, kennis die evenwel, dank zij de bemoeijngen van de heeren Heylaerts en Maurissen, voor de provinciën Brabant en Limburg jaarlijks toeneemt.

De lezer ontvangt dus slechts eene lijst; maar eene lijst, tweemaal rijker dan die welke ik in 1848 te Haarlem bij van Arum uitgaf en 500 soorten meer bevattende dan de tweede Naamlijst, later in de „Bouwstoffen” verschenen. Deze derde zal, naar ik vermoed, wel de laatste zijn. Wat aan deze nog ontbreekt, zal wel van tijd tot tijd in het *Tijdschrift voor Entomologie* opgenomen worden, tot eindelijk het *magnum opus*, de Coleopteren-fauna van Nederland het licht zal zien.

Heeren Directeuren van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem, die vroeger den eersten stoot gaven door het uitschrijven der prijsvraag, waarop de heeren Bennett en Olivier hun (later gedrukt) antwoord inzonden, hebben ook welwillend de uitgave dezer derde naamlijst op zich genomen, waarvoor hun mijne erkentelijke dankbetuiging wordt toegebracht. Moge de schrijver der te wachten Fauna later in hen even welwillende Maecenaten vinden.

De vermeerdering van het aantal soorten sedert mijn' vorigen arbeid ben ik behalve aan eigen onderzoek, aan verschillende personen verschuldigd, en vooreerst aan de ijverige exploratien door de heeren Kinker en Six in de omstreken van Amsterdam en Utrecht gedaan, ten anderen aan de bereidvaardige hulp en mededeelzaamheid der heeren de Gavere, Snellen, van Hasselt, Heylaerts, Steenberg, Koppeschaar, Maurissen, Everts en de Man, voor welke ik hun mijnen welgemeenden dank betuig. Indien hunne lofwaardige pogingen ter aanvulling onzer kennis in dezen nog eenige jaren worden voorgezet, zullen wij eindelijk den eindpaal van onzen cursus, het doel van ons streven bereikt hebben.

De hoofdzaak te dezen opzichte is nu voortaan het onderzoek der nog weinig bekende oorden in ons vaderland, met name de oostelijke grenzen, de oevers der Zuiderzee, de boorden der Zeeuwsche eilanden, het zuidelijk gedeelte van Noord-Brabant en schier geheel Limburg, — indien men deze laatste provincie faunastisch tot ons land rekent te behooren, welke quaestie tot heden sub judice ligt.

In de nu verschijnende lijst heb ik mij aan de volgorde gehouden van den *Catalogus Coleopterorum Europae et Confinium* van den abt de Marseul, omdat deze Catalogoog de volledigste is en het voordeel oplevert om met cijfers te kunnen worden aangehaald. Men zal achter iederen soortnaam een M. aantreffen met twee getallen, 't geen beteekent: Catalogus van Marseul, zooveelste genus (het eerste getal), zooveelste soort (het tweede getal). Ondertusschen bespeurde ik onder het gebruik met leedwezen dat de Marseul niet altijd de prioriteit had geëerbiedigd, zoodat ik mij verplicht zag enkele namen te veranderen. Ook heb ik hier en daar een enkel genus met kenmerken van uiterst geringe waarde geschrapt en de soorten weder ingelijfd bij het genus, waaruit zij ontleend waren.

Verlangend bovendien wegens het aanzienlijk getal soorten de meest mogelijke bondigheid te betrachten, heb ik de schrijvers niet aangehaald, waarnaar de soorten gedetermineerd zijn. Bij eenigen zou mij dit ook moeilijk zijn gevallen, daar enkelen niet door mij bestemd zijn, maar door de heeren Alb. Fauvel, Putzeys, Roelofs en Mink. Het getal dezer species is niet groot, en zooverre het mij mogelijk was, heb ik mij van hunne determinatie rekenschap gegeven. De namen dezer entomologen zijn overigens reeds voldoende waarborgen.

Ik haal dus in den regel bij elke soort slechts aan :

het nummer van mijne lijst in de Bouwstoffen (N. n. = nieuwe naamlijst); of het nummer der „Bijvoegselen tot de Naamlijst van Nederlandsche Schildvleugeligen Insecten” die opgenomen zijn in het *Tijdschrift voor Entomologie*, 1^e Serie, Deel VI, bladz. 90;

het nummer van genus en species in den Catalogus van de Marseul;

de twee zeer verschillende uitgaven van het werk van L. Redtenbacher, *Fauna Austriaca*, die Käfer, Wien 1849 en 1858.

Een sterretje, gedrukt voor den soortsnaam, toont aan dat de soort op dezen oogenblik ontbreekt aan de verzameling van Inlandsche Insecten, bijeengebragt door de Nederlandsche Entomologische Vereeniging. Misschien wekt het gezigt dier sterretjes eenige insecten-jagers op om de ontbrekende soorten ten geschenke te geven aan de Standaard-Collectie, die eenmaal alle inlandsche soorten bevatten moet.

S. v. V.

VERKLARING DER VERKORTINGEN.

v. Bemm.....	<i>beteekent</i>	<i>gevangen</i>	<i>door</i>	A. A. van Bemmelen, thans te Rotterdam.
v. Br.....	"	"	"E. vom Bruck, toen gelogeed te Scheveningen.
Buse.....	"	"	"Dr. Buse, toen te Haarlem.
Everts.....	"	"	"Jhr. E. Everts, te 's Gravenhage.
v. Eyndh.....	"	"	"J. A. van Eyndhoven, toen te Empe.
G.....	"	"	"J. H. Gerlach, te Middelburg.
de Gav.....	"	"	"Dr. C. de Gavere, thans te Batavia.
Gockinga.....	"	"	"Gockinga, te Groningen.
de Gr.....	"	"	"Mr. H. W. de Graaf, te Rotterdam.
Groll.....	"	"	"H. W. Groll, thans te 's Gravenhage.
Gijsb. H.....	"	"	"Gijsberti Hodenpijl, notaris te Rotterdam.
v. Hass.....	"	"	"Dr. A. W. M. van Hasselt, te Amsterdam.
Heyl.....	"	"	"F. J. M. Heylaerts Jr., te Breda.
v. Itt.....	"	"	"A. R. J. Baron van Ittersum, te Brummen.
Kink.....	"	"	"J. Kiuker, te Amsterdam.
Kopp.....	"	"	"Koppeschaar, toen te Leyden.
Lewe.....	"	"	"H. Baron Lewe van Middelstum, te Beck.
Maitl.....	"	"	"R. T. Maitland, te 's Gravenhage.
de Man.....	"	"	"J. G. de Man, <i>Phil. nat. stud.</i> , te Leyden.
Mart.....	"	"	"Jhr. Mr. J. C. Martens, aan de Meern, bij Utrecht.
Cl. Muld.....	"	"	"Prof. Claas Mulder, te Groningen.
Piag.....	"	"	"Dr. E. Piaget, te Rotterdam.
Rits.....	"	"	"C. Ritsema Cz., <i>Phil. nat. stud.</i> , te Leyden.
Roel.....	"	"	"W. Roelofs, te Brussel.
S.....	"	"	"T. D. Schubart, te Utrecht.
Six.....	"	"	"G. A. Six, te Utrecht.
Sn.....	"	"	"P. C. T. Snellen, te Rotterdam.
Steenbergen.....	"	"	"A. Steenbergen, te Hoogeveen.
Steenhuyzen.....	"	"	"P. D. Steenhuyzen, te Leyden.
V.....	"	"	"Dr. M. C. en Mr. H. Ver Loren, toen te Utrecht.
v. V.....	"	"	"Mr. S. C. Snellen van Vollenhoven, te Leyden.
W.....	"	"	"Dr. P. H. J. Wellenbergh, te Utrecht.
v. W.....	"	"	"J. A. C. van Walchren, te Brummen.
v. d. W.....	"	"	"F. M. van der Wulp, te 's Gravenhage.
Wtt.....	"	"	"Dr. J. Wittewaall, toen te Voorst.

NEDERLANDSCHE COLEOPTERA.

CICINDELETAE.

Cicindela L.

- 1 *Campestris*, L. N. n. 1. M. 2, 12. Redt. 65 — 2 ed. 3.
Op de heidevelden en zandwegen in Utrecht, Gelderland, Drenthe, Overijssel en Noord-Brabant. — Bij Nijmegen, Maitl. en v. V. — Op Rhienderstein bij Brummen en te Rozendaal, v. V. — Bij Velp, de Roo. — In Drenthe, Gockinga. — Bij Hoogeveen, Steenberg. — Dezelfde aldaar eene purperkleurige verscheidenheid.
- 2 *Hybrida*, L. N. n. 3. M. 2, 17. Redt. 65 — 2 ed. 4.
Gemeen in drooge en zanderige streken, gedurende een groot deel van den zomer. Zij varieert met groenachtige dekschilden. Dr. Wellenbergh heeft bij Katwijk een exemplaar gevonden met een paarsch en een groen dekschild.
- 3 *Maritima*, Dej. N. n. 4.
Wordt alleen op de laatste rij duinen, aan het strand, aangetroffen. Zij is in tamelijk aantal gevangen bij Katwijk en Scheveningen.
- 4 *Sylvatica*, L. N. n. 2. M. 2, 28. Redt. 65 — 2 ed. 4.
In heideachtige streken waargenomen bij Amersfoort (v. V.), Dribergen (Six), Rozendaal, Dieren (Sn. en v. V.), Rhede (v. V.), Hoogeveen (Steenb.), en Nijmegen (Maitl.). Eene fraaije var. op de Galdersche heide bij Breda, Heylaerts.
- 5 *Germanica*, L. N. n. 5. M. 2, 61. Redt. 65 — 2 ed. 4.
Bij Ede, Maitl. — Bij Ruurlo in Julij, Snell.

CARABICINA.

Omophron LATR.

- *6 *Limbatum*, Latr. M. 3, 1. Redt. 67 — 2 ed. 7.
In Junij 1868 aan den ouden oesterput bij Scheveningen, Everts. *sch. 6. 1868*

Notiophilus DUM.

- 7 *Aquaticus*, L. N. n. 11. M. 4, 1. Redt. 67 — 2 ed. 6.
Schijnt zeldzaam, doch werd eenmaal in aantal bij den Haag aangetroffen (v. V.). — Bij Nunspeet onder zeewier, Roelofs.
- *8 *Palustris*, Dfts. M. 4., 4. Redt. 67 — 2 ed. 6.
Bij Nunspeet aan het strand onder zeewier, Roelofs.
- 9 *Semipunctatus*, Dfts. N. n. 12. M. 4, 5. Redt. 67 — 2 ed. 6.
Zeer gemeen in Holland, v. V. — In Zeeland, H. — Bij Rotterdam, Snell. — Gemeen in de omstreken van Utrecht, Six en v. Hass. — Bij Zutphen, v. Eyndh.

Elaphrus L.

- 10 *Uliginosus*, F. N. n. 6. M. 5, 1. Redt. 66 — 2 ed. 5.
Op vochtige gronden. — Tot heden alleen waargenomen in Noord- en Zuid-Holland.
- 11 *Cupreus*, Dfts. N. n. 7. M. 5, 2. Redt. 66 — 2 ed. 5.
Op drassige wegen, v. V. en H. — Op het eiland Walcheren, G. — Bij Utrecht, Maitl. en v. Hass. — Te Brummen, v. Itt. — Bij Groningen, de Gav.
- 12 *Riparius*, F. N. n. 8. M. 5, 4. Redt. 66 — 2 ed. 5.
Buiten Rotterdam, Gijsb. H. (Zie v. d. Hoeven, *Syst. Besch.*) — Vrij gemeen op vochtige gronden en aan den kant der slooten, v. V. — Bij Ede en Utrecht, Maitl. — Op Walcheren, G. — Brummen, v. Itt. — Bij Rotterdam, Sn. — Eenige exx. waaronder eene var. bij Katwijk, Piag. — Aan het strand te Nunspeet, Roelofs.
- 13 *Aureus* Müll. N. n. 9 (*littoralis* Dej). M. 5, 6. Redt. 66 — 2 ed. 5.
In de tweede week van Julij, te Brummen, v. V. — Mede aldaar, v. Itt.

Blethisa BON.

- 14 *Multipunctata*, L. N. n. 10. M. 6, 2. Redt. 66 — 2 ed. 5.
Zeldzaam. — Bij Driebergen en in Noord-Brabant, v. Itt. — Bij Hoogeveen, Steenb. — Bij Raalte in Mei, Snell.

Nebria LATR.

- *15 *Lateralis*, F. N. n. 14. M. 9. 2. Var. *Livida* L. Redt. 2 ed. 7.
Bij Utrecht, V. en aan de Meern, Mart.
- 16 *Brevicollis*, F. N. n. 13. M. 9, 10. Redt. 68 — 2 ed. 8.
Zeer gemeen onder afgevallen bladeren en steenen, v. V. H. Six. — In Febr. onder mos te Burgst in N.-Brab. Heyl. — De var. *Fuscata* Bon. te Rotterdam, Sn.

Leistus FRÖHL.

- *17 *Spinibarbis*, F. N. n. 16. M. 10, 1. Redt. 68 — 2 ed. 10.
In Friesland, G. — Gemeen in het Haagsche bosch in Junij en Julij, Everts. — In een dennenbosch bij Breda, Heyl.
- 18 *Spinilabris*, F. N. n. 15. Mars. 10, 12. (*ferrugineus* L.) Redt. 69 — 2 ed. 9.
Bij Wassenaar, W. — In Friesland, G. — Bij den Haag, Maitl.
- *19 *Rufescens*, F. Bijvoegs. n^o. 16^a. M. 10, 13. Redt. 69 — 2 ed. 9.
Een voorwerp onder een steen bij Zutphen den 22^{en} Mei, Snell.

Procrustes BON.

- 20 *Coriaceus*, L. N. n. 18. M. 12, 1. Redt. 69 — 2 ed. 10.
Uitsluitend bij Nijmegen, doch aldaar gemeen, de Man en Maitl.

Carabus L.

- 21 *Catenulatus*, Scop. N. n. 23. M. 13, 36. Redt. 72 — 2 ed. 12.
Bij Wageningen, W. — Op zandgrond bij Utrecht, V. en S. — Bij Brummen, v. Itt. — Bij Ede, Maitl. — Aan den Bezuidenhoutschen weg bij den Haag, v. d. W. — In het Haagsche bosch in Aug. en Sept. onder boomschors vrij gemeen, Sn. — Omstreken van Breda, Heyl.
- 22 *Monilis*, F. N. n. 24. M. 13, 44. Redt. 2 ed. 14.
In Gelderland, G. en v. W. — De var. *Consitus* Panz. bij Brummen, v. V.
- 23 *Arvensis*, F. N. n. 25. M. 13, 45. Redt. 72 — 2 ed. 13.
Eenmaal bij Amersfoort, V.
- 24 *Cancellatus*, Ill. N. n. 26. M. 13, 73. Redt. 70 — 2 ed. 11.
In Gelderland, G. — Bij Wageningen, W. — Niet zeldzaam in de omstreken van Utrecht, V. — Te Brummen, v. Itt. — Eene var. met koraalroode dijen bij Zeist, Mart.
- 25 *Granulatus*, L. N. n. 27. M. 13, 77. Redt. 70 — 2 ed. 11.
Gemeen door het geheele land. — Bij Hoogeveen, Steenb. — In Febr. onder mos te Burgst, Heyl.
- 26 *Clathratus*, L. N. n. 28. M. 13, 80. Redt. 2 ed. 10.
Zeldzaam, W. — Bij Kampen, v. Itt. — Bij 's Gravenhage, Maitl. — Bij Amsterdam in Febr. onder mos aan de wortels van wilgen, Kink.
- 27 *Auratus*, L. N. n. 29. M. 13, 83. Redt. 70 — 2 ed. 11.
Utrecht en Gelderland, V. en v. W. — Holland, W. en v. V. — Zeeland, H. — Bij Katwijk, Maitl. — Rotterd., Sn. — Hoogeveen, Steenb. — Bij IJselstein, Sn. — Bij Utrecht, Six.
- 28 *Nitens*, L. N. n. 30. M. 13, 91. Redt. 2 ed. 11.
In Gelderland op heidevelden onder afgestoken plaggen, v. W. en v. V. — Aan de Vuursche en bij Zwol, V. — In Noord-Brabant, Maitl. — Drenthe, Gock. — Bij Hoogeveen, Steenb.

- *29 *Purpurascens*, F. N. n. 19. M. 13, 106. Redt. 71 — 2 ed. 12.
Eenmaal bij Brummen, v. W.
- *30 *Glabratus*, Payk. N. n. 20. M. 13, 113. Redt. 71 — 2 ed. 12.
Bij Dieren in een hollen dennenboom, v. W.
- 31 *Nemoralis*, Ill. N. n. 22. M. 13, 136. Redt. 71 — 2 ed. 12.
In tuinen en boomgaarden, v. V. — Zeist, Mart. — Utrecht, Six. — Bij den Haag, Maitl. en v. V. — Bij Rotterdam en den Haag, Sn. — Bij Hoogeveen, Steenb. — In Febr. onder mos te Burgst, Heyl.
- *32 *Convexus*, F. N. n. 21. M. 13, 138. Redt. 71 — 2 ed. 12.
Bezuidenhoutsche weg bij den Haag, v. d. W. — Te Burgst in Noord-Brab. onder mos in de maand Februarij, Heyl.
- 33 *Intricatus*, L. Bijvoegs. n^o. 30^a. M. 13, 159. Redt. 71 — 2 ed. 11.
Bij Arnhem in Julij een mannetje, Snell.

Calosoma WEB.

- 34 *Sycophanta*, L. N. n. 31. M. 14, 1. Redt. 73 — 2 ed. 14.
Bij Wageningen, G. — Bij Utrecht zeldzaam, V. — Bij Nijkerk, Snell. — Bij Noordwijk in Junij, de jager van den Heer Verster.
- 35 *Inquisitor*, L. N. n. 32. M. 14, 2. Redt. 73 — 2 ed. 14.
Bij Breda in Junij, Gijsb. H. en Snell. — Bij Katwijk, Drechsler. — Bij Brummen, v. V. — Hoogeveen, Steenb.

Cychrus F.

- 36 *Rostratus*, L. N. n. 17. M. 15, 6. Redt. 69 — 2 ed. 9.
In de eerste week van Julij 1852 op Rhienderstein bij Brummen een exempl., v. V.

Odacantha PAYK.

- 37 *Melanura*, L. N. n. 39. M. 16, 1. Redt. 73 — 2 ed. 14.
Aan de kanten van slooten en op riet, gewoonlijk zeldzaam, doch in het jaar 1835 zeer gemeen bij Leyden, v. V. — Bij Rotterdam in September, Sn.

Brachinus WEB.

- 38 *Crepitans*, L. M. 23, 17. Redt. 77 — 2 ed. 22.
Twee voorwerpen in April onder stroo op kleigrond aan den IJkant bij Amsterdam, Kinker.

Cymindis LATR.

- *39 *Macularis*, Dej. N. n. 55. M. 26, 41. Redt. 74 — 2 ed. 16.
Een voorwerp onder een steen bij Lochem, v. W.

Aëtophorus SCHM. GÜB.

- 40 *Imperialis*, Germ. Bijvoegs. n^o. 41^a. M. 33, 1. Redt. 75 — 2 ed. 17.
In April en September aan de plassen bij Rotterdam, Sn.

Demetrius BON.

- 41 *Unipunctatus*, Germ. N. n. 41. M. 34, 2. Redt. 74 — 2 ed. 17.
Bij Katwijk, Maitl. — Bij Domburg, G. — Bij Rotterdam en bij den Haag in April, Sn. — Omstreken van Utrecht, v. Hass.
- 42 *Atricapillus*, L. N. n. 40. M. 34, 4. Redt. 74 — 2 ed. 16.
Bij Rotterdam, Gijsb. H. en Sn. — In Zuid-Holl. v. d. W. — Bij Utrecht in Maart, Six. — In Januarij en Febr. onder schors bij Breda en te Burgst, Heyl.

Dromius BON.

- 43 *Longiceps*, Dej. N. n. 43. M. 35, 1. Redt. 2 ed. 17.
In Zuid-Holland, v. d. W. — Te Rotterdam in Aug., Sn.
- 44 *Linearis*, Oliv. N. n. 42. M. 35, 3. Redt. 75 — 2 ed. 17.
In Holland, Gerdes. — Bij Leyden, Maitl. — In Maart en April bij den Haag, Snell. — In Maart in de omstreken van Utrecht, Six en v. Hass. — Te Nunspeet, Roel. — Te Wassenaar, Piag. — In Jan. onder schors en mos bij Breda, Heyl.
- 45 *Agilis*, F. N. n. 44. M. 35, 8. Redt. 76 — 2 ed. 18.
In het voorjaar onder mos, Maitl. en v. V. — Bij den Haag, Snell — Bij Noordwijk den 27^{en} Oct. v. V. — Bij Breda, Heyl.
- 46 *Quadrinotatus*, L. N. n. 45. M. 35, 10. Redt. 76 — 2 ed. 18.
Bij Leyden in het voorjaar onder mos, v. V. — Op verschillende plaatsen door anderen gevangen in dezelfde omstandigheden.
- 47 *Quadrinotatus*, Panz. N. n. 46. M. 35, 13. Redt. 76 — 2 ed. 18.
In Zuid-Holland, v. d. W. — Te Heemstede in Aug. v. V. — Bij den Haag, Snell. — Schijnt veel zeldzamer te zijn dan de voorgaande, doch komt evenwel misschien door het geheele land voor.
- *48 *Fasciatus*, F. N. n. 47. M. 35, 16. Redt. 76 — 2 ed. 18.
Bij Leyden, Maitl. — In de omstreken van Amsterdam aan den IJkant onder aangespoeld riet, Kink.
- 49 *Sigma*, Rossi. N. n. 48. M. 35, 18. Redt. 76 — 2 ed. 18.
Gevangen door Gijsb. Hodenpijl, waarschijnlijk bij Rott. — Aan den IJkant met den voorgaanden, Kink.
- 50 *Melanocephalus*, Dej. N. n. 49. M. 35, 20. Redt. 75 — 2 ed. 18.
Een ex. 20 Junij 1852 in de duinen bij den Haag, v. V. — In April bij den Haag, waarschijnlijk mede aan den duinkant, Sn. — In Febr. onder mos te Burgst, Heyl. — Te Hillegom in Maart onder dorre bladeren, Kink.

Blechrus MOTSCH.

- *51 *Glabratus*, Dfts. M. 36. 2. Dej. *Spec.* I. 1. 244. Sturm *Fauna*, VII. 54. t. 171. c. C.
Redt. 2 ed. 18.
In Januarij onder boomschors bij Breda, Heyl.

Metabletus SCHMIDT.

- *52 *Obscuroguttatus*,
Dfts. N. n. 51. M. 37, 3. Redt. 76 — 2 ed. 19.
In de omstreken van den Haag en bij Ede, Maitl.
- *53 *Pallipes*, Dej. N. n. 50. M. 37, 9. Redt. 75 — 2 ed. 19.
Bij Ede, Maitl.
- 54 *Truncatellus*, L. N. n. 53. M. 37, 10. Redt. 75 — 2 ed. 19.
Niet zeldzaam. — Bij Bennebroek in Mei, v. V. — Bij Utrecht,
Six. — In Maart onder afgevallen bladeren, Kink.
- 55 *Foveola*, Gyll. N. n. 52. M. 37, 11. Redt. 75 — 2 ed. 19.
Onder steenen en dorre bladeren; bij Heemstede in April, v. V. —
Bij den Haag, v. d. W. en Maitl. — Omstreken van Utrecht,
Six. — Te Nunspeet aan het strand onder aangespoeld wier, Roel.

Lebia LATR.

- 56 *Chlorocephala*, Dfts. N. n. 54. M. 42, 7. Redt. 77 — 2 ed. 20.
In Holland, v. W. — Aan den Oosterdokdijk bij Amsterdam niet
zeldzaam in Mei, Kink. — Bij Utrecht, Six. — Te Groningen,
Lewe. — In Drenthe, Gock. — In de bosschen om Breda onder mos, Heyl.

Masoreus DEJ.

- 57 *Wetterhalii*, Gyll. M. 45. 2. Redt. 78 — 2 ed. 21. Sturm, *Fauna*, VI. 103, 22. t. 150. d. D.
Meer dan eenmaal in de duinen bij den Haag in Julij gevangen,
Snell. en v. d. W.

Clivina LATR.

- 58 *Fossor*, L. N. n. 56. M. 59, 1. Redt. 78 — 2 ed. 23.
Niet zeldzaam op vochtige en zandige plaatsen. — Bij Rott., Gijsb.
H. — Bij Leyden, v. V. — Rotterdam en den Haag, Snell. — Den
Haag en Ede, Maitl. — Aan het strand bij Nunspeet, Roel.

Dyschirius BON.

- *59 *Thoracicus*, F. N. n. 57. M. 61. 3. Redt. 78 — 2 ed. 24.
In Zuid-Holland, v. d. W. — Bij Leyden, Maitl.
- 60 *Gibbus*, F. N. n. 61. M. 61, 17 (*globosus* Herbst). Redt. 79 — 2 ed. 25.
Gevonden in het voorjaar bij Rotterdam onder mos (Zie v. d.
Hoeven, *Syst. Besch.*) — In Friesland, Gerl. — Zeer veelvuldig voorko-
mende in het voorjaar op bepaalde plaatsen bij den Haag, onder
steenen en graszoden, v. d. W. — Bij Rotterdam in Sept., Sn. — In
Julij bij Brummen, v. V. — Bij Driebergen, Six.

- *61 *Aeneus*, Dej. N. n. 60. M. 61, 25. Redt. 79 — 2 ed. 25.
In Junij bij Heemstede, v. V. — Bij Leyden, Maitl.
- 62 *Salinus*, Schaum. M. 61, 36. Redt. 79 — 2 ed. 24.
Aan het strand bij Noordwijk in Aug., Kink.
- *63 *Politus*, Dej. N. n. 59, M. 61, 46. Redt. 79 — 2 ed. 24.
Eenmaal bij Leyden, v. V. — In Mei bij Zeyst, Kink.
- *64 *Nitidus*, Dej. N. n. 58. M. 61, 48. Redt. 79 — 2 ed. 25.
Mede zeldzaam. — Eens bij Leyden, Maitl. — Bij Amsterdam
in Maart, Kink.

Loricera LATR.

- 65 *Pilicornis*, F. N. n. 35. M. 62, 1. Redt. 80 — 2 ed. 28.
Vrij gemeen onder steenen en afgevalen loof. — Bij Leyden, H. en
v. V. — Bij Zeist, Mart. — Bij Driebergen, Six. — In Sept. bij
Rotterd., Snell. — Te Nunspeet, Roel.

Panagaeus LATR.

- 66 *Crux-major*, L. N. n. 33. M. 63, 1. Redt. 80 — 2 ed. 28.
Zeldzaam in Zuid-Holland, v. V. — Bij Rott., Sn. — Bij Breda, Heyl.
- 67 *Quadripustulatus*,
Sturm. N. n. 34. M. 63, 2. Redt. 80 — 2 ed. 28.
Te Heemstede, en in Junij bij den Haag, v. V. — Drie voorwer-
pen in de duinen van Wassenaar, Piag.

Chlaenius BON.

- 68 *Vestitus*, Payk. N. n. 117. M. 65, 24. Redt. 81 — 2 ed. 29.
Zeer zeldzaam. — Alleen in Holland gevangen door v. W.
- 69 *Schrankii*, Dfts. N. n. 116. M. 65, 31. Redt. 81 — 2 ed. 29.
Bij Utrecht in April, Six. — In Zuid-Holland, v. d. W. —
In de bosschen in de omstreken van Breda, Heyl.
- 70 *Nigricornis*, F. N. n. 115. M. 65, 36. Redt. 81 — 2 ed. 29.
Bij Rotterdam zeldzaam, Snell. — Bij Zeist, Mart. — In Mei te Drie-
bergen, Six. — In de gemeente Haarlemmermeer, v. Bemm. — In Gel-
derland, Wtt. — In April in de bosschen van Noord-Brabant, Heyl.

Oodes BON.

- 71 *Helopioides*, F. Bijvoegs. 114a. M. 67, 1. Redt. 82 — 2 ed. 30. *Helopioides*
In April door Six en Wttewaall bij Utrecht gevangen en in Maart
bij Rotterdam door Snellen.

Licinus LATR.

- *72 *Depressus*, Payk. N. n. 36. M. 68, 9. Redt. 81 — 2 ed. 30.
Slechts eenmaal aangetroffen; op Walcheren, H.

Badister CLAIRV.

- 73 *Bipustulatus*, F. N. n. 37. M. 71, 2. Redt. 82 — 2 ed. 31.
 Gevonden in het voorjaar bij Rotterdam onder mos (Zie v. d. Hoeven, *Syst. Besch.*) — Op Zandgrond bij Heemstede, v. V. — Bij Rotterdam, Sn. — Bij Leyden, Maitl. en Kopp. — Bij Utrecht in Maart en April, Six. — Bij Amsterdam door Smit en Grebner. — In Februarij onder eikenschors te Burgst, Heyl.
- *74 *Humeralis*, Bon. N. n. 38. M. 71, 6. Redt. 82 — 2 ed. 31.
 In April op de Glijphoeve, v. V. — Aan de Vogelenzang in Mei, en onder aanspoelsel bij Amsterdam aan den Schinkel in April, Kink.

Brosceus PANZ.

- 75 *Cephalotes*, L. N. n. 99. M. 72, 4. Redt. 92 — 2 ed. 45.
 Op de duinen bij Katwijk, Piag. en v. V. — Op die bij den Haag, Everts. — Niet zeldzaam bij Utrecht, V. en Six. — Bij Haarlem, Sn. — Bij Overveen in Junij, Kink. — Op de heide achter Brummen, v. W. — Bij Nijmegen, Maitl. — Hoogeveen, Steenb. — Drenthe, Gock.

Stomis CLAIRV.

- 76 *Pumicatus*, Ill. N. n. 98. M. 76, 3. Redt. 93 — 2 ed. 46.
 In Friesland, G. — Twee voorwerpen bij Rotterdam, Sn. — In de provincie Utrecht, Wtt.

Anisodactylus DEJ.

- 77 *Binotatus*, F. N. n. 62. M. 79, 3. Redt. 97 — 2 ed. 54.
 Onder steenen en afgevallen bladeren in Zuid- en Noord-Holland niet zeldzaam, v. V. — Bij Heemstede in April, bij den Haag in Junij, v. V. — Bij Utrecht, Six. en Maitl. — Gemeen, ook de verscheidenheid met roode pooten, Kink. — Bij Nunspeet, Roel. — Te Groningen, de Gav.
- *78 *Poeciloides*, Steph. M. 79. 6. Volgens determinatie van den Heer Putzeys.
 In de omstreken van Nunspeet, Roel.

Diachromus ERICHS.

- *79 *Germanus*, L. N. n. 63. M. 80, 1. Redt. 97 — 2 ed. 55.
 Uitsluitend gevangen bij Ede, in Augustus, Maitl.

Dichirotrichus DUV.

- 80 *Pubescens*, Payk. M. 82, 7. Redt. 2 ed. 65 (*Bradycellus*).
 In April aan den IJkant bij Amst., Kink. — Op Walcheren, de Bruyne. — Te Nunspeet onder zeewier, Roel.

Bradycellus ERICHS.

- 81 *Collaris*, Payk. N. n. 84. M. 83, 9. Redt. 103 — 2 ed. 64.
 In Zuid-Holland, v. d. W. — In Maart onder afgevallen bladeren te Noordwijk, Kink. — Te Haren in April, de Gav.

Harpalus DEJ.

- *82 *Sabulicola*, Panz. N. n. 77. M. 84, 3. Redt. 98 — 2 ed. 56.
Eenmaal bij Rotterdam een klein exemplaar, v. W.
- *83 *Azureus*, Ill. N. n. 64. M. 85, 21. Redt. 98 — 2 ed. 55.
Bij Rotterdam, v. W. — Te Brummen, v. Itt.
- 84 *Cordatus*, Dfts. N. n. 79. M. 84, 35. Redt. 98 — 2 ed. 56.
immaculatus - fuscus nigrescens
In Zuid-Holland, v. d. W. — Bij Wassenaar, v. Bemm. — Bij Leyden, Kopp. — In Aug. bij Ede, Maitl.
- *85 *Puncticollis*, Payk. N. n. 76. M. 84, 38. Redt. 98 — 2 ed. 56.
Bij Brummen, v. Itt. — In Aug. bij Ede, Maitl.
- *86 *Rufibarbis*, F. N. n. 65 (*Brevicollis* Dej.). M. 84, 40. Redt. 99 — 2 ed. 56.
In Mei en Julij op de Glijphoeve, v. V. — Bij den Haag, v. d. W. — Bij Leyden, Drechsler.
- 87 *Ruficornis*, F. N. n. 66. M. 84, 57. Redt. 99 — 2 ed. 56.
Alom gemeen. — Niet zeldzaam bij Rotterdam, Snell.; eveneens bij den Haag, v. d. W. en v. V. — Gemeen in den Bommelerwaard, v. d. W. — Bij Zeist, Six en Maitl. — Bij Hoogeveen, Steenb.
- 88 *Griseus*, Panz. Bijvoegs. 66%. M. 84, 58. Redt. 99 — 2 ed. 56.
Dikwijls met den vorigen verward. — Bij Leyden, Drechsler. — In Gelderland, ter Meer. -- Aan het huis ter Heyde, Piaget. — Komt misschien even veelvuldig voor als *Ruficornis*.
- 89 *Aeneus*, F. N. n. 67. M. 84, 90. Redt. 99 — 2 ed. 57.
Mede eene gemeene soort. — In het voorjaar in Noord- en Zuid-Holland, in Julij en Aug. te Brummen, v. V. — Aan het huis ter Heyde, Piaget. — In Febr. onder het mos der oude stammen te Burgst, Heyl. — Bij Houten, Wtt. — Op Sterkenburg bij Driebergen, v. V. — In April aan den IJkant bij Amst., Kink. — Te Nunspeet, Roel.
- 90 *Piger*, Creutz. N. n. 78. M. 84, 99 (*neglectus* Dej.). Redt. 101 — 2 ed. 61.
Te Brummen, v. W.
- *91 *Descoidens*, F. N. n. 68. M. 84, 100. Redt. 100 — 2 ed. 59.
Bij Rotterdam zeldzaam, v. W. — Bij den Haag, v. d. W. — Bij Utrecht een wijfje, Six.
- *92 *Hottentotta*, Dfts. M. 84, 110. Redt. 100 — 2 ed. 58. Sturm, *Fauna*, IV, 25. t. 81 C.
Tegen het eind van Mei in de omstreken van Zutphen, v. Eyndh.
- *93 *Fulvipes*, F. N. n. 70. M. 84, 112 (*Latus*, L.). Redt. 101 — 2 ed. 59.
Bij Brummen en Rotterdam, v. W. — Ook de varieteit *flaviventris* St. bij Rotterdam, v. W.
- 94 *Luteicornis*, Dfts. N. n. 71. M. 84, 117. Redt. 101 — 2 ed. 59.
In Junij bij Heemstede v. V. — Zeldzaam, in Maart onder afgevallen bladeren, Kink. — In Friesland, G.

- 95 *Rubripes*, Dfts. N. n. 69. M. 84, 120. Redt. 99 — 2 ed. 57.
Een mannetje bij Ede, Maitl. — Een wijfje in Junij op de heide bij Amersfoort, v. V. — Te Brummen, v. Itt. — Bij Leyden, Kopp. — Omstreken van Utrecht, Wtt.
- 96 *Impiger*, Dfts. N. n. 72. M. 84, 134. Redt. 101 — 2 ed. 59.
In Junij bij Amersfoort, in April bij Bennebroek, v. V. — Bij Brummen, v. Itt. — De varieteit *inunctus* St. bij laatstgenoemde plaats, v. W.
- 97 *Tardus*, Panz. N. n. 73. M. 84, 139. Redt. 101 — 2 ed. 60.
In Aug. te Ede, Maitl. — Aan het huis ter Heyde, Piag. — In Mei bij Amsterdam onder steenen aan den IJkant, Kink.
- *98 *Serripes*, Dfts. M. 84, 140. Redt. 101 — 2 ed. 61.
Omstreken van den Haag, v. d. W. — Bij Hillegom in Sept., zeldzaam, Kinker.
- 99 *Froehlichii*, Strm. N. n. 74. M. 84, 143. Redt. 101 — 2 ed. 60.
Bij Rotterdam, v. W. — In Junij bij Bennebroek en den Haag, in Julij bij Brummen, v. V.
- *100 *Ancius*, Dfts. N. n. 75. M. 84, 151. Redt. 101 — 2 ed. 61.
Bij Ede in Aug. Maitl.
- 101 *Servus*, Dfts. M. 84, 153. Redt. 101 — 2 ed. 60.
In Maart op de duinen bij Hillegom onder dorre bladeren, Kink.
- 102 *Picipennis*, Dfts. M. 84, 159. Redt. 101 — 2 ed. 60.
In Junij bij den Haag, in Mei bij Hillegom, Kink. — In Sept. nabij Rotterdam, Snell.
- Stenolophus** DEJ.
- *103 *Vaporariorum*, F. N. n. 80. M. 85, 1 (*Teutonius* Schr.). Redt. 102 — 2 ed. 62.
Eenmaal bij Schiedam, v. W. — In Aug. bij Ede, Maitl.
- *104 *Melanocephalus*, Heer. Bijvoegs. 81^a. M. 85, 3 (*Skrinshiranus* Steph.). Redt. 102 — 2 ed. 62.
Een voorwerp gevangen door P. C. T. Snellen.
- 105 *Vespertinus*, Ill. N. n. 81. M. 85, 6. Redt. 102 — 2 ed. 62.
Bij Rotterdam, Gijsb. H. — Bij den Haag in Mei, v. d. W. — In het voorjaar niet zeldzaam in de omstreken van Amsterdam onder ruigte op vochtige gronden, Kink. — In Aug. te Ede, Maitl.
- Acupalpus** LATR.
- 106 *Consputus*, Dfts. N. n. 82. M. 86, 1. Redt. 102 — 2 ed. 62.
Eenmaal in Aug. op de Glijphoeve, v. V.
- 107 *Meridianus*, L. N. n. 83. M. 86, 5. Redt. 102 — 2 ed. 63.
Vrij gemeen bij Rotterdam, Snell. — In Mei onder steenen bij Leyden, v. V. — Bij Utrecht, v. Hass. — Aldaar in April, Six. — In Friesland, G.

- 108 *Dorsalis*, F. M. 86, 6. Redt. 102 — 2 ed. 63.
In April bij Amsterdam en Overveen, Kink. — In Mei bij Utrecht, Six. — Aan het strand te Nunspeet, Roel.
- *109 *Exiguus*, Dej. M. 86, 14. Redt. 103 — 2 ed. 63.
Een enkel voorwerp onder het mos der boomen op Rozenburg bij Amsterdam, Kink.

Feronia LATR.

- 110 *Cuprea*, L. N. n. 85. M. 93, 5. Redt. 88 — 2 ed. 39.
Zeer gemeen. — In het voorjaar in Noord- en Zuid-Holland, v. V. — Bij Rotterdam en den Haag, Snell. — Bij den Haag in Mei, v. d. W. — Bij Utrecht, Schub. en Six. — Bij Zeist, Mart. — Bij Brummen, v. Itt. — In Februarij onder boomschors bij Breda, Heyl. — Bij Groningen, de Gav.
- 111 *Dimidiata*, Oliv. N. n. 87. M. 93, 12. Redt. 88 — 2 ed. 39.
Bij Utrecht, Schub. — In den Haarlemmermeer-polder en te Groningen, v. Bemm.
- 112 *Lepida*, F. N. n. 86. M. 93, 15. Redt. 88 — 2 ed. 39.
Op de heide bij Amersfoort en te Brummen, v. W. — Bij Amersfoort in Junij, v. V. — Bij Ede, Maitl. — Op de Veluwe, Snell. — Bij Brummen, v. Itt.
- *113 *Picimana*, Dfts. M. 93, 44. Redt. 90 — 2 ed. 42.
In April op kleigrond aan het IJ bij Amsterdam, Kink.
- 114 *Vernalis*, F. N. n. 94. M. 93, 58. Redt. 92 — 2 ed. 43.
Te Rotterdam, Snell. — Bij Amsterdam in Mei, Kink. — In Aug. bij Ede, Maitl. — In tamelijk groot aantal bij Groningen, de Gav.
- 115 *Nigra*, F. N. n. 89. M. 93, 76. Redt. 90 — 2 ed. 42.
Onder afgevallen bladeren in Zuid-Holland niet zelden, v. V. — Bij Rotterdam, Snell. — Bij Brummen, v. W. — In de omstreken van Groningen, de Gav. — Op de Galdersche heide in N.-Brabant in Junij, Heyl.
- 116 *Vulgaris*, L. N. n. 90 (*Melanaria*, Ill.). M. 93, 79. Redt. 91 — 2 ed. 42.
Onder steenen en rottende planten in het voorjaar; in Julij bij den Haag en bij Brummen, v. V. — Op verschillende plaatsen door anderen.
- 117 *Nigrita*, F. N. n. 91. M. 93, 87. Redt. 90 — 2 ed. 42.
Vrij gemeen in het voorjaar onder bladeren en steenen, v. V. — Bij Noordwijk, Piag. — Te Nunspeet, Roel. *bij de Haag 2. 21*
- 118 *Anthracina*, Ill. N. n. 92. M. 93, 88. Redt. 90 — 2 ed. 42.
Ter zelfder plaatse met den vorigen, doch niet zoo gemeen, v. V. — Bij Rotterdam en den Haag, Snell.

- 119 *Minor*, Gyll. N. n. 93. M. 93, 98. Redt. 91 — 2 ed. 43.
Bij Rotterdam, Gijsb. H. — Gemeen bij den Haag, v. d. W. —
In April aan den IJkant bij Amsterdam, Kink.
- 120 *Strenua*, Panz. M. 93, 104. *Erichs.* M, B. p. 74, Panz. 38, 6. Redt. 92 — 2 ed. 44.
In Maart en April bij Amst., Kink. — In Mei bij Groningen, de
Gav. — In Febr. onder het mos der boomen te Burgst, Heyl. *by 21 May 1815 near ed*
- *121 *Diligens*, Sturm. M. 93, 105. Gedetermineerd door den heer Putzeys.
Te Nunspeet in Sept. aan het strand der zee, Roelofs.
- 122 *Oblongopunctata*,
F. N. n. 95. M. 93, 109. Redt. 90 — 2 ed. 42.
In Mei bij Heemstede en in Aug. op Schothorst bij Amersfoort,
v. V. — Bij Utrecht en Ede, Maitl. — In Febr. onder mos aan
den wortel der boomen te Burgst, Heyl.
- 123 *Madida*, F. M. 93, 116. Redt. 2 ed. 40. *under mos op de grand Dried. bosch bij*
Te Ede gevangen door Maitland en te Rhederoord door Kinker.
- *124 *Illigeri*, Dfts. N. n. 96. M. 93, 126. Redt. 89 — 2 ed. 40.
In Aug. bij Ede, Maitl. — Te Wolfheze de type en een zwart
voorwerp met roode pooten, Piag.
- 125 *Striola*, F. N. n. 88. M. 93, 208. Redt. 89 — 2 ed. 41.
Zeldzaam in Holland v. V. — In Junij onder plaggen op de
Galdersche heide in N.-Brabant, Heyl.
- *126 *Terricola*, F. N. n. 97. M. 93, 236. Redt. 91 — 2 ed. 42.
Alleen gevonden door den heer Maitland in Aug. bij Ede.

Zabrus CLAIRV.

- 127 *Gibbus*, F. N. n. 100. M. 94, 52. Redt. 93 — 2 ed. 47.
In Gelderland, v. W. en Wtt. — Te Brummen, v. Bemm. — In
Limburg, Snell. — In Aug. op de wallen van Breda, Heyl.

Amara BON.

- 128 *Tricuspidata*, Dej. M. 95, 6. Redt. 95 — 2 ed. 49.
In de omstreken van Zutphen, v. Eyndh.
- 129 *Plebeja*, Gyll. N. n. 104. M. 95, 8. Redt. 95 — 2 ed. 49.
Zeer zeldzaam; in Holland gevangen, v. V.
- 130 *Similata*, Gyll. N. n. 105. M. 95, 12. Redt. 96 — 2 ed. 49.
Zeldzaam; in Mei op de Gliphoeve, v. V. — In April aan den
IJkant bij Amsterdam, Kink.
- 131 *Obsoleta*, Dej. N. n. 106. M. 95, 15 (*Ovata*, Fish). Redt. 96 — 2 ed. 50.
Gemeen op zonnige wegen in het vroege voorjaar, v. V. — Bij
den Haag in Sept., Snell. — In April bij Amsterdam, Kink. — In
Gelderland, v. W. — Bij Brummen, v. Itt.
- 132 *Communis*, F. N. n. 109. M. 95, 20. Redt. 96 — 2 ed. 50.
Vrij algemeen op zonnige wegen, v. V.

- *133 *Trivialis*, Gyll. M. 95, 28. Redt. 95 — 2 ed. 50.
In de omstreken van den Haag, v. d. W.
- *134 *Spreta*, Dej. M. 95, 30. Redt. 96 — 2 ed. 52. Bestemd door den heer Putzeys.
Bij den Haag, v. d. W. — In Sept. te Nunspeet, Roel.
- 135 *Acuminata*, Payk. N. n. 107. M. 95, 32. Redt. 96 — 2 ed. 50.
Gemeen in Holland op zonnige wegen in het voorjaar, v. V. —
Bij Utrecht, Wtt.
- 136 *Familiaris*, Dfts. N. n. 110. M. 95, 33. Redt. 95 — 2 ed. 51.
In April bij Amsterdam, Kink. — In September bij den Haag,
Snell. — In Gelderland, v. W. — Bij Brummen, v. Itt. *by a large p. 3.*
- 137 *Gemina*, Zimm. N. n. 111. M. 95, 35 (*Lucida*, Dfts.). Redt. 95 — 2 ed. 51.
In Julij bij den Haag, v. V. — Bij Rott., Sn. — Bij Ede in Mei, Kink.
- 138 *Bifrons*, Gyll. N. n. 113. M. 95, 53. Redt. 95 — 2 ed. 48.
Niet zeldzaam in de omstreken van den Haag, v. d. W. — Bij het
huis ter Heyde, Piag. — Twee voorwerpen te Brummen, v. W.
- *139 *Rufocincta*, Sahlb. N. n. 114. M. 95, 56. Redt. 2 ed. 52.
Zeer zeldzaam; alleen bij Leyden gevangen, Maitl.
- 140 *Aulica*, Panz. M. 95, 101. Redt. 2 ed. 59.
Bij den Haag, v. d. W.
- 141 *Convexiuscula*, Marsh. M. 95, 107. Redt. 2 ed. 53.
In April en weder in Oct. onder riet aan den IJkant bij Amst.,
Kink. — In Sept. aan het strand te Nunspeet, Roel.
- *142 *Consularis*, Dfts. N. n. 103. M. 95, 119. Redt. 94 — 2 ed. 51.
Gevangen door Gijsb. Hod.
- 143 *Ferruginea*, L. N. n. 101. M. 25, 120 (*Fulva*, de G.). Redt. 94 — 2 ed. 51.
Vrij gemeen — Op zonnige wegen in het voorjaar in Holland, en
in Aug. onder steenen, v. V. — Bij Zeist, Mart. — Bij Brummen,
v. W. — Bij Hoogeveen, Steenb. — In Drenthe, Gock. — In
Groningen, Cl. Mulder. — In Julij te Haren, de Gav. — Bij
Nunspeet, Roel. — In Febr. onder mos bij Burgst, Heyl.
- 144 *Apricaria*, F. N. n. 102. M. 95, 121. Redt. 94 — 2 ed. 51.
In Zuid-Holland, v. V. — In Junij op de dijken aan het IJ,
Kink. — In April bij Haren, de Gav.
- *145 *Patricia*, Dfts. N. n. 112. M. 95, 126. Redt. 94 — 2 ed. 48.
Slechts eenmaal gevangen; in April bij Bennebroek, v. V.

Pristonychus DEJ.

- 146 *Subcyaneus*, Ill. N. n. 126. M. 96, 48. Redt. 83 — 2 ed. 31.
Meermaals, waarschijnlijk te Rotterdam, Gijsb. H. — Niet zeld-
zaam binnen Leyden, v. V. — In Junij in een kelder te Amsterdam,
Kink. — Bij Rotterdam 3 exx., Snell. — Bij Zeist, Mart. — Bij
Zutphen van Itt.

* *Amara lucida*

*Red p. 51. naar aan familie
S. Hoog. p. 3.)*

Calathus BON.

- 147 *Cisteloides*, Ill. N. n. 119. M. 97, 8. Redt. 84 — 2 ed. 32.
Somtijds vrij gemeen op de duinen, v. d. W. — Bij Utrecht, S. — Aan de Bildt, de Gr. — Op de heide bij Velp, v. V. — Te Groningen, v. Bemm. — Bij Nunspeet, Roel.
- 148 *Fulvipes*, Gyll. N. n. 120. M. 97, 15. Redt. 84 — 2 ed. 32.
In Holland, v. V. — Bij Leyden, Kopp. — Bij den Haag, v. d. W. — Bij Wassenaar en aan het huis ter Heyde, Piag. — Te Utrecht, Wtt. — Te Nunspeet in Sept., Roel. — In Noord-Brabant, Maitl. — Bij Breda en Roermond, Snell.
- *149 *Fuscus*, F. N. n. 121. M. 97, 17. Redt. 84 — 2 ed. 32.
Bij Leyden, v. V. — In Zuid-Holland, v. d. W. — Te Zandvoort aan het zeestrand in Aug., Kinker. — Bij Brummen, v. Itt.
- 150 *Melanocephalus*, L. N. n. 124. M. 97, 25. Redt. 84 — 2 ed. 32.
Bij Leyden, v. V. — Bij den Haag, Maitl. — Niet zeldzaam bij Scheveningen, v. d. W. en v. V. — Bij Overveen in Junij, Kink. — Huis ter Heyde, Piag. — Bij Zeist in Sept., v. V. — Aan de Rhedersteeg, W. — Op het strand bij Nunspeet, Roel. — In Febr. onder boommos te Burgst, Heyl.
- 151 *Ochropterus*, Dfts. N. n. 123. M. 97, 25. *var.* Redt. 84 — 2 ed. 32.
Op Walcheren, H. — Bij Overveen in Junij, Kink. — Te Groningen, de Gav.
- *152 *Micropterus*, Dfts. N. n. 122. M. 97, 30. Redt. 84 — 2 ed. 32.
In Maart op de Glijphoeve, in Aug. en Sept. in het duin onder steenen, v. V. — Te Arnhem 10 exx. bijeen in Aug., Snell.

Taphria BON.

- 153 *Vivalis*, Ill. N. n. 118. M. 100, 1. Redt. 84. (*Synuchus*) — 2 ed. 33.
Bij Leyden, v. V. — Gemeen bij den Haag, en ook gevangen te Apeldoorn in Julij, v. d. W.

Dolichus BON.

- 154 *Flavicornis*, F. N. n. 125. M. 101, 1. Redt. 83 — 2 ed. 31.
Schijnt uitsluitend aan Gelderland eigen. — Bij Ede, Maitl. — Nijmegen, Snell.

Anchomenus BON.

- *155 *Scrobiculatus*, F. N. n. 127. M. 103, 10. Redt. 85 — 2 ed. 34.
Bij Arnhem, Maitl.

- 156 *Angusticollis*, F. N. n. 128. M. 103, 16. Redt. 85 — 2 ed. 34.
Onder afgevallen bladeren in Holland, v. V. — Bij Leyden, Kopp. — In Maart bij Amsterdam, Kink. — Te Maarsbergen, Piag. — Bij Ede, Maitl. — In Febr. onder mos te Burgst, Heyl. — Bij Groningen, v. Bemm.
- 157 *Prasinus*, F. N. n. 136. M. 103, 20. Redt. 85 — 2 ed. 34.
In Zuid-Holland zeldzaam; bij den Haag., Maitl. — Bij Leyden, Steenhuizen. — Schijnt meer in de provincie Utrecht dan elders voor te komen; aldaar S. en Six in April. — Eenmaal in groot aantal aan den IJkant gevonden onder aangespoeld riet in April, Kink. — In Friesland, G.
- 158 *Alhipes*, F. N. n. 137. M. 103, 22. Redt. 85 — 2 ed. 34.
Binnen Leyden in tuinen, W. en v. V. — Aldaar, Kopp. — In Mei bij Amsterdam, Kink. — Bij Utrecht en den Haag, Maitl. — Bij IJsselstein in Mei, Snell. — Bij Burgst, Heyl.
- 159 *Oblongus*, F. N. n. 138. M. 103, 23. Redt. 85 — 2 ed. 34.
Bij Rotterdam Snell. — In Februarij onder mos bij Wassenaar, v. V. — In dezelfde omstandigheden te Burgst, Heyl. — Bij Ede, Maitl. — Vrij gemeen in de omstreken van Zutphen, v. Eyndh. — Bij Groningen, Cl. Mulder.
- 160 *Marginatus*, L. N. n. 129. M. 103, 26. Redt. 86 — 2 ed. 35.
Bij Rotterdam, in September onder bladeren zeer zeldzaam, Snell. — Eenmaal vrij gemeen aan een poel in de duinen bij Scheveningen, v. V. — Vijf exx. te Katwijk, de Gr. — Terzelfder plaatse, Kopp. — In Sept. te Buiksloot, Kink. — In den Haarlemmermeerpolder, v. Bemm. — In Maart bij Utrecht, Six.
- *161 *Impressus*, Panz. N. n. 130. M. 103, 27. Redt. 85 — 2 ed. 35.
Eenmaal in Holland, v. W.
- 162 *Sex-punctatus*, L. N. n. 131. M. 103, 28. Redt. 85 — 2 ed. 35.
In Holland zeldzaam, v. V. — Te Hillegom, Kink. — Bij Utrecht, Six. — In Maart onder boomschors bij Breda, Heyl. — Bij Ede, Maitl. — Bij Hoogeveen, Steenb.
- 163 *Parumpunctatus*, L. N. n. 132. M. 103, 31. Redt. 86 — 2 ed. 36.
Onder steenen en mos in Holland, vrij gemeen, v. V. — Bij Rotterdam, Snell. — Bij Driebergen in Oct., Six. — Bij Ede, Maitl. — In Friesl., G.
- 164 *Viduus*, Ill. N. n. 134. M. 103, 39. Redt. 86 — 2 ed. 35.
Onder afgevallen bladeren in Holland, v. V. — In Mei te Zeist, Kink.
- 165 *Moestus*, Dfts. N. n. 133. Redt. 86 — 2 ed. 35.
In Holland in het voorjaar onder bladeren, v. V. — Bij Rotterdam, Snell. — Bij den Haag, Snell. en v. d. W. — Vrij gemeen te Haren en Groningen in April en Mei, de Gav.

- 166 *Micans*, Nic. M. 103, 49. Redt. 86 — 2 ed. 36. Sturm, *Fauna*. V. 194 t. 135, b. B.
Eenmaal bij Katwijk, Piag.
- 167 *Gracilis*, Sturm. N. n. 135. M. 103, 52. Redt. 87 — 2 ed. 36.
Bij Rotterdam onder steenen, Sn. — In April bij Hillegom, Kink. —
Te Brummen, v. Itt. — Te Groningen, de Gav.
- 168 *Fuliginosus*, Panz. M. 103, 53. Redt. 86 — 2 ed. 36. Panz. *Fn.* 108, 5. Erichs. *Käf.*
M. Brand. p. 117, n^o. 20.
Op het laatst van Maart te Rotterdam in riet, Snell. — Te Buik-
sloot in Mei, Kinker. — Bij Utrecht, Six. — In Febr. onder mos
te Burgst, Heyl.
- 169 *Thoreyi*, Dej. M. 103, 56. Redt. 2 ed. 37.
In April onder steenen aan den oever van den Schinkel bij Am-
sterdam, Kink.

Olisthopus DEJ.

- *170 *Rotundatus*, Payk. N. n. 139. M. 104, 2. Redt. 87 — 2 ed. 37.
In Zuid-Holland, v. d. W. — Een voorwerp in Aug. te Cuyk
in Noord-Brabant, Everts.

Patrobis DEJ.

- 171 *Excavatus*, Payk. N. n. 142. M. 106, 1. Redt. 83 — 2 ed. 76. *Centrop. pl. 132 (algemeen)*
zucht. bij v. d. W. v. d. W.
Bij Rotterdam, Gijsb. Hoc. — Aldaar zeldzaam, Snell. — Bij den
Haag, v. V. — Bij Ede, Maitl.

Pogonus DEJ.

- *172 *Luridipennis*, Ahr. N. n. 140. M. 108, 3. Redt. 82 — 2 ed. 66.
Bij Ede, Maitl.
- 173 *Chalceus*, Marsh. N. n. 141. (*Halophilus*, Germ.) M. 108, 6. Redt. 2 ed. 66.
Onder steenen bij Rotterdam, zeldzaam, Sn.

Trechus CLAIRV.

- *174 *Discus*, F. N. n. 143. M. 109, 1. Redt. 104 — 2 ed. 67.
Bij Leyden, Maitl. — Bij Rotterdam, Sn.
- 175 *Minutus*, F. N. n. 144. M. 109, 25. Redt. 105 — 2 ed. 69.
Bij Rotterdam, Gijsb. H. — Bij den Haag, v. d. W. — Bij Overveen,
Noordwijk en op Beekhuizen, gedurende den geheelen zomer, Kink. —
Bij Utrecht, Six. — Aan het huis ter Heyde, Piag. — In Aug. in heide-
achtige gronden te Wort-Rhede, v. V. — Op Walcheren, G.
- 176 *Obtusius*, Erichs. N. n. 145. M. 109, 28. Redt. 2 ed. 70.
Eenmaal zeer gemeen in Aug. en Sept. bij Heemstede, doch sedert
niet meer aangetroffen, v. V.
- 177 *Glacialis*, Heer. M. 109, 45. Redt. 2 ed. 75.
~~In Maart aan den Oosterdijk, bij Amsterdam, Kink.~~
- *178 *Secalis*, Payk. N. n. 146. M. 109, 60. Redt. 105 — 2 ed. 70.
Slechts te Brummen gevonden, in Julij, v. V.

Tachypus DEJ.

- 179 *Flavipes*, L. N. n. 147. M. 116, 1. Redt. 106 — 2 ed. 72.
Op vochtige weiden in Holland niet zeldzaam, v. V. — Bij Leyden, Kopp. — In Maart bij Utrecht, Six.
- *180 *Pallipes*, Dfts. M. 116, 3. Redt. 106 — 2 ed. 72.
In April bij Haarlem, Groll.

Bembidium LATR.

- 181 *Paludosum*, Panz. N. n. 148. M. 117, 1. Redt. 107 — 2 ed. 72.
In Gelderland, v. W. — Te Brummen, v. Itt. — Aan den oever van een plasje in de heide bij Aalten, Sn.
- 182 *Impressum*, Panz. N. n. 149. M. 117, 3. Redt. 107 — 2 ed. 72.
In Junij bij den Haag, v. V. — Te Brummen, v. Itt.
- 183 *Pallidipenne*, Ill. M. 117, 11. Redt. 2 ed. 82.
In de duinen bij den Haag in Julij, Everts en v. d. W.
- 184 *Bipunctatum*, L. M. 117, 16. Redt. 106 — 2 ed. 73.
In April aan den IJkant bij Amsterdam, Kink. — In Sept. aan het strand der Zuiderzee bij Nunspeet, Roel.
- 185 *Pygmaeum*, F. N. n. 154. M. 117, 23. Redt. 112 — 2 ed. 75.
In de omstreken van Zutphen, v. Eyndh. — In Maart bij Amsterdam, Kink. — Bij Rotterdam, Gijsb. H.
- 186 *Lampros*, Herbst. N. n. 156 (*Celere* F.). M. 117, 24. Redt. 110 — 2 ed. 75.
Vrij gemeen in de provincie Holland en Utrecht, v. d. W., v. V., Six. — In Januarij onder boomschors bij Breda, Heyl.
- 187 *Pusillum*, Gyll. M. 117, 44. Redt. 109 — 2 ed. 76.
Op de dokdijken bij Amsterdam in April, Kink.
- 188 *Doris*, Ill. N. n. 157. M. 117, 46. Redt. 112 — 2 ed. 74.
Aan den oever der voormalige Haarlemmermeer in Julij, v. V. — Sedert niet meer aangetroffen.
- 189 *Sturmii*, Panz. N. n. 159. M. 117, 48. Redt. 109 — 2 ed. 74.
Twee exx. in Julij te Katwijk, Piag. — In Aug. bij Ede, Maitl.
- 190 *Articulatum*, Pz. N. n. 158. M. 117, 50. Redt. 109 — 2 ed. 74.
Bij Leyden en Katwijk, Maitl. en Kopp. — Bij Brummen, v. W. — Te Groningen, de Gav.
- 191 *Quadriguttatum*, F. N. n. 161. M. 117, 52. Redt. 111 — 2 ed. 78.
Bij den Haag, Maitl. — Bij Leyden, Kopp. — In Mei aan de boorden van een plasje in de heide bij Aalten, Sn.
- 192 *Quadrinaculatum*, L. N. n. 160. M. 117, 56. Redt. 109 — 2 ed. 74.
Bij Leyden onder mos en in Aug. op de Glijphoeve, v. V. — De soort schijnt zeldzaam.

- *193 *Decorum*, Dfts. M. 117, 83. Redt. 110 — 2 ed. 76
In April onder steenen in de omstreken van Amst., Kink.
- *194 *Tibiale*, Dfts. M. 117, 97. Redt. 110 — 2 ed. 79.
In Mei aan den IJkant bij Amsterdam onder aangespoeld riet, Kink.
- 195 *Obsoletum*, Dej. Bijvoegs. 151^e. M. 117, 103. Redt. 111 — 2 ed. 78.
Bij Amsterdam, Kink. — Te Zutphen, v. Eynth. — Bij Utrecht, Six.
- *196 *Bruxellense* Wsm. Bijvoegs. 151^b. M. 117, 106. Redt. 2 ed. 87.
Te Bruumen, v. Itt. — Op Sterkenburg bij Driebergen in Julij, v. V.
- 197 *Femoratum*, St. Bijvoegs. 151^a. M. 117, 107. Redt. 111 — 2 ed. 79.
Bij Utrecht, v. Hasselt. — Aldaar in April in een tuin, Six. —
In Julij bij den Haag, v. d. W.
- 198 *Andreae*, F. N. n. 151. M. 117, 110. Redt. 112 — 2 ed. 78.
Zeer gemeen in de omstreken van Leyden, Herkl. Kopp. en v. V. —
In Mei bij Amst., Kink. — In Maart aan de Bildt bij Utrecht, Six. —
In Febr. te Burgst onder het mos der boomen, Heyl.
- 199 *Rupestre*, Ill. M. 117, 115 (*Ustulatum* L.). Redt. 2 ed. 78.
In Maart bij Amst., Kink. — In de omstreken van Utrecht, Groll.
- 200 *Lunatum*, Dfts. M. 117, 116. Redt. 112 — 2 ed. 76.
Te Nunspeet onder zeewier aan het strand in Sept., Roel. — In April
aan den IJkant en in Febr. onder het mos der boomen, bij Amst., Kink.
- 201 *Varium*, Oliv. N. n. 150 (*Ustulatum* F.). M. 117, 132. Redt. 108 — 2 ed. 80.
In de omstreken van Leyden, Kopp. — In Febr. te Hillegom onder mos
en in April onder steenen en riet aan den IJkant bij Amst., Kink. —
Bij Utrecht, Six. — Te Nunspeet in Sept. aan het strand, Roel.
- *202 *Flammulatum*,
Clairv. M. 117, 133. Redt. 2 ed. 80.
Een voorwerp onder steenen in April te Frankendael bij Amst., Kink.
- 203 *Fumigatum*, Dej. M. 117, 136. Redt. 108 — 2 ed. 80.
Te Katwijk, v. B. — Te Hillegom in Maart onder afgevallen bladeren, Kink.
- 204 *Assimile*, Gyll. M. 117, 137. Redt. 109 — 2 ed. 80.
In Maart aan den Schinkel onder aangespoelde ruigte, Kink. —
- 205 *Biguttatum*, F. N. n. 152. M. 117, 142. Redt. 108 — 2 ed. 80.
Aan oevers onder aangespoeld riet en ruigte, v. V. — Te Leyden,
Mail. — In Maart en Aug. bij Rotterdam, Snell. — Bij Utrecht,
Six. — In Mei te Groningen, de Gav.
- *206 *Aeneum*, Germ. M. 117, 144. Gedetermineerd door den heer Putzeys.
Te Nunspeet in Sept., Roel.
- 207 *Guttula*, F. N. n. 153. M. 117, 146. Redt. 113 — 2 ed. 81.
Gemeen in Zuid-Holland op grashalmen in het voorjaar, v. V. —
Bij Brummen, v. Itt.
- *208 *Obtusum*, Strm. M. 117, 151. Redt. 109 — 2 ed. 151.
Aan den IJkant in Mei onder aangespoeld riet, Kinker.

HYDROCANTHARI.

Cybister CURT.

- 209 *Roeselii*, F. N. n. 162. M. 121, 1. Redt. 115 — 2 ed. 98.
Op Walcheren gevonden, G. — Door den heer F. A. Hartsen in de omstreken van Amsterdam gevangen.

Dytiscus L.

- *210 *Latissimus*, L. M. 122, 1. Redt. 113 — 2 ed. 98.
Uitsluitend bij Zutphen gevangen; door den heer M. Harmsen.
- 211 *Marginalis*, L. N. n. 170. M. 122, 2. Redt. 114 — 2 ed. 99.
Bij Leyden in staande wateren, v. V. — Bij Rotterdam gemeen, Sn. — Bij Zwol en Utrecht, V. — Bij Brummen, v. V. — Een wijfje met gladde dekschilden bij Zutphen, v. Eyndh.
- 212 *Circumcinctus*, Ahr. N. n. 169. M. 122, 4. Redt. 114 — 2 ed. 99.
Bij Bleiswijk in menigte, v. V. — Bij Groningen, de Gav.
- *213 *Circumflexus*, F. N. n. 168. M. 122, 5. Redt. 114 — 2 ed. 99.
Eenmaal in Holland, v. V. — Gemeen bij Rotterdam, Sn. — Schijnt evenwel zeldzamer voor te komen dan de vorigen.
- 214 *Dimidiatus*, Ill. N. n. 171. M. 122, 8. Redt. 113 — 2 ed. 99.
In Zuid-Holland, v. d. W. — Een mannetje bij Zutphen, v. Eyndh.
- 215 *Punctulatus*, F. N. n. 172. M. 122, 9. Redt. 113 — 2 ed. 99.
Zeldzaam in Zuid-Holland, v. V. — Zeldzaam in Zeeland, H. — Gemeen in de slootjes te Brummen, v. V. — Gemeen te Zwol, V.

Acilius LEACH.

- 216 *Sulcatus*, L. N. n. 163. M. 124, 1. Redt. 114 — 2 ed. 100.
Alom in slooten vrij gemeen, vooral bij Bleiswijk en Brummen, v. V. — Bij Zeist, Mart. — In Noord-Brabant, Roel.
- 217 *Fasciatus*, de G. N. n. 164. M. 124, 3. Redt. 114 — 2 ed. 100.
Twee mannetjes bij Leyden, Kopp. — Bij Rotterdam, Sn. — Groningen, de Gav.

Hydaticus LEACH.

- 218 *Transversalis*, F. N. n. 167. M. 125, 2. Redt. 115 — 2 ed. 100.
Bij den Haag, v. d. W. — Bij Rotterdam, Sn. — In Junij aan de Nieuwersluis, Kink. — Te Utrecht, Sn. en Six. — In Mei bij Breda, Heyl. — In Friesl., G.
- 219 *Hybneri*, F. N. n. 166. M. 125, 3. Redt. 115 — 2 ed. 100.
In April in de omstreken van Leyden, v. V. — Bij Utrecht, zeldzaam, V. — Bij Haren, in het vroege voorjaar, de Gav.

- *220 *Cinereus*, L. M. 125, 8. Redt. 115 — 2 ed. 100. Panz. *Fn.* 31, f. 11. Erichs. *Käfer. M. Br.* p. 143. n^o. 3.
Een wijfje bij Zutphen, v. Eyndh. — Twee mannetjes bij Leyden, Piag.
- *221 *Bilineatus*, de G. M. 125, 9. Redt. 115 — 2 ed. 100. Sturm *Faun.* VIII. 41. t. 191 a A.
Twee mannetjes en evenveel wijfjes in de omstreken van Zutphen gevangen, v. Eyndh.
- *222 *Zonatus*, Hopp. M. 125, 10. Redt. 115 — 2 ed. 100.
Een voorwerp aangetroffen in eene verzameling van inlandsche kevers, met het etiket 9 April 1831, Kink.

Colymbetes CLAIRV.

- 223 *Fuscus*, L. N. n. 173. M. 126, 4. Redt. 116 — 2 ed. 93.
Bij Leyden in het voorjaar, v. V. — In Zuid-Holland, v. d. W. — Bij Leyden, Kopp. — Bij Rotterdam gemeen, Snell. — In Junij bij Breda, Heyl. — Omstreken van Groningen, de Gav.
- 224 *Striatus*, L. Bijvoegs. 173^a. M. 126, 6. Redt. 116 — 2 ed. 93.
Bij den Haag, v. d. W. — Utrecht, Six.
- 225 *Pulverosus*, St. N. n. 174. M. 126, 9. Redt. 116 — 2 ed. 94.
In staande wateren in Zuid-Holland, zeldzaam, v. V. — Bij Zutphen, v. Eyndh.
- 226 *Notatus*, F. N. n. 175. M. 126, 11. Redt. 116 — 2 ed. 94.
In de omstreken van Katwijk, Piag. — In April aan de Bildt, Six. — In Friesland, G.
- 227 *Collaris*, Payk. N. n. 176. M. 126, 13. Redt. 116 — 2 ed. 94.
In Zuid-Holland, v. d. W. — Zeer gemeen in de omstreken van Leyden, Kopp. — In Friesland, G.
- *228 *Adpersus*, F. N. n. 177. M. 126, 17. Redt. 116 — 2 ed. 94.
Bij Brummen, v. W.
- 229 *Grapii*, Gyll. N. n. 178. M. 126, 19. Redt. 116 — 2 ed. 94.
Zeldzaam in Holland, v. V. — In Zeeland gemeen, H. — Bij Driebergen in Mei, Six.

Ilybius ERICHS.

- 230 *Ater*, F. N. n. 179. M. 127, 1. Redt. 117 — 2 ed. 95.
Niet ongemeen in staande wateren in Holland; bij Brummen zeldzaam, v. V. — In April bij Amsterdam en in Junij aan de Nieuwersluis, Kink. — In Noord-Brabant, Roel.
- *231 *Quadriguttatus*, Bsd. N. n. 180. M. 127, 3 (*Obscurus* Marsh.). Redt. 117 — 2 ed. 95.
Alleen bij Brummen gevangen, v. W.
- 232 *Fenestratus*, F. N. n. 181. M. 127, 6. Redt. 117 — 2 ed. 95.
In Holland, v. V. — Bij Utrecht, S. en Six. — Bij Nieuwersluis in Junij, Kink. — Bij Utrecht, Six.

- *233 *Subaeneus*, Er. Bijvoegs. 180^b. M. 127, 8. Redt. 117 — 2 ed. 95.
Te Noordwijk, v. Bemm.
- 234 *Guttiger*, Gyll. Bijvoegs. 180^a. M. 127, 9. Redt. *ibid*.
In Noord-Brabant, Roel.
- 235 *Fuliginosus*, F. N. n. 182. M. 127, 11. Redt. *ibid*.
In Friesland, G. — Bij Utrecht, Six. — Te Hillegom in April,
Kink. — In Noord-Brabant, Roel.

Agabus LEACH.

- 236 *Agilis*, F. N. n. 187. M. 128, 2. Redt. 118 — 2 ed. 96.
In slooten in Zuid-Holland, vroeger niet zeldzaam, v. V. — In
Noord-Brabant, Roel.
- 237 *Sturmi*, Schh. N. n. 185. M. 128, 12. Redt. 118 — 2 ed. 96.
Bij Hoogeveen, Steenb. — In Friesland, G. — In Junij aan de
Nieuwersluis, Kink.
- 238 *Neglectus*, Er. N. n. 184. M. 128, 16. Redt. 2 ed. 98.
Bij Rotterdam, Sn.
- *239 *Maculatus*, L. Bijvoegs. 186^a. M. 128, 17. Redt. 118 — 2 ed. 96.
Eenmaal te Wassenaar, v. Bemm.
- 240 *Abbreviatus*, F. N. n. 186. M. 128, 21. Redt. 119 — 2 ed. 97.
In Holland, v. V. en de Haan. — Te Leyden, Kopp. — In
Junij aan de Nieuwersluis, Kink.
- 241 *Didymus*, Oliv. M. 128, 22. Redt. 119 — 2 ed. 96.
In Junij te Wolfheze, Groll.
- 242 *Paludosus*, F. M. 128, 25. Redt. 118 — 2 ed. 96.
In de omstreken van Leyden in April, v. V. — In Junij te
Wolfheze, Groll.
- 243 *Bipustulatus*, L. N. n. 183. M. 128, 49. Redt. 118 — 2 ed. 97.
Gemeen in Holland, v. V. — Zeer gemeen bij Leyden, Kopp. —
In Mei bij Zeist, Kink. — In Mei bij Breda, Heyl. — Te Gro-
ningen in Mei, de Gav. — In Noord-Brabant, Roel.

Noterus CLAIRV.

- 244 *Sparsus*, Marsh. N. n. 191 (*Semipunctatus* F.). M. 130, 1. Redt. 119 — 2 ed. 93.
Bij Leyden zeldzaam, Kopp. en v. V. — Bij Utrecht, S. —
Aldaar in Aug. Six.
- 245 *Crassicornis*, F. N. n. 190. M. 130, 2. Redt. 119 — 2 ed. 93.
Meer algemeen dan de vorige. — Bij Leyden, v. V. — Bij Haar-
lem, Buse. — Bij den Haag, v. d. W. — Bij Utrecht gemeen, S. —
In Noord-Brabant, Roel. — In Friesl., G.

Laccophilus LEACH.

246 *Hyalinus*, de G. N. n. 188. M. 132, 2. Redt. 119 — 2 ed. 93.
 Zeer gemeen op vele plaatsen. — In slooten in Holland en Gelderland, v. V. — Bij Utrecht, S. en Six. — Te Groningen, v. Bemm. — Bij Breda, Heyl. — En in Noord-Brabant, Roel.

247 *Minutus*, L. N. n. 189. M. 132, 3. Redt. *ibid.*
 Bij Rotterdam gemeen, Sn. — Op de Glijphoeve in Mei, v. V. — Omstreken van Leyden, Kopp. — Op Walcheren, G. — In Mei bij Breda, Heyl. — In Noord-Brabant, Roel.

Hyphydrus ILL.

248 *Ovatus*, L. N. n. 192. M. 133, 2. (*ferrugineus* L.) Redt. 124 — 2 ed. 85.
 Zeer gemeen in staande en stroomende wateren in Holland, Utrecht, Gelderland, v. V. — Bij Driebergen, Six. — Bij Hoogeveen, Steenb.

Hydroporus CLAIRV.

249 *Inaequalis*, F. N. 193. M. 134 (5), 1. Redt. 120 — 2 ed. 86.
 Zeer gemeen in Zuid-Holland, v. V. — Zeer gemeen in de omstreken van Utrecht, Six.

250 *Reticulatus*, F. N. n. 194. M. 134, 2. Redt. 120 — 2 ed. 86.
 Bij Utrecht, S. en Six. — In Julij bij Heemstede, v. V. — Bij Leyden, Kopp. — In Noord-Brabant, Roel.

*251 *Decoratus*, Gyll. Bijvoegs. 194^a. M. 134, 6. Redt. 2 ed. 86.
 Bij Utrecht, Six.

*252 *Geminus*, F. Bijvoegs. 207^b. M. 134, 12. Redt. 121 — 2 ed. 87.
 Bij de Bildt in Julij, Six.

253 *Unistriatus*, Ill. Bijvoegs. 207^a. M. 134, 19. Redt. 121 — 2 ed. 87.
 Bij Utrecht en bepaaldelijk aan de Bildt, Six.

254 *12-pustulatus*, F. Bijvoegs. 193^b. M. 134, 24. Redt. 2 ed. 979.
 In Noord-Brabant, Roelofs. — Vrij gemeen in de vijvers van Sterkenburg, Knepelhout v. Sterk. — Omstreken van Utrecht, Six.

255 *Depressus*, F. Bijvoegs. 193^a. M. 134, 26. Redt. 121 — 2 ed. 87.
 Eenmaal in Sept. te Driebergen, Six.

256 *Halensis*, F. N. n. 207. M. 134, 41. Redt. 122 — 2 ed. 88.
 In Zuid-Holland, de Gr. — Bij Wassenaar, v. V. — Omstreken van Leyden, Kopp. — Bij Utrecht, Six.

257 *Picipes*, F. N. n. 195, M. 134, 50. Redt. 122 — 2 ed. 89.
 In Zuid-Holland, v. V. — Bij Utrecht, Six. — In Noord-Brabant, Roel.

*258 *Parallelogrammus*, Knoch. N. n. 196. M. 134, 54. Redt. 122 — 2 ed. 89.
 Uitsluitend op Walcheren gevangen, G.

- 259 *Dorsalis*, F. Bijvoegs. 196^a. M. 134, 65. Redt. 123 — 2 ed. 89.
In Noord-Brabant, Roel. — Bij Utrecht, Six.
- 260 *Ovatus*, Sturm. N. n. 197. M. 134, 74. Redt. 2 ed. 89.
In Zuid-Holland, v. d. W.
- 261 *Palustris*, L. N. n. 204. M. 134, 78. Redt. 123 — 2 ed. 90.
Gemeen in Holland, (v. V.), in Utrecht, (Six.) en in Noord-Brabant, Roel. — In Mei bij Breda, Heyl.
- 262 *Erythrocephalus*, L. Bijvoegs. 198^a. M. 134, 82. Redt. 123 — 2 ed. 89.
Bij Utrecht, Six. — In Noord-Brabant, Roel. — In Julij bij Groningen, de Gav.
- 263 *Rufifrons*, Dfts. N. n. 198. M. 134, 83. Redt. 123 — 2 ed. 89.
In Friesland, G. — Een enkel voorwerp bij Leyden, v. V.
- 264 *Plannus*, F. N. n. 199. M. 134, 89. Redt. 123 — 2 ed. 89.
Vrij gemeen in Holland, v. V. — Bij Rotterdam, Snell. — Utrecht, Six. — Noord-Brabant, Roel.
- 265 *Pubescens*, Gyll. N. n. 200 (*piceus*, Strm.) M. 134, 91. Redt. 2 ed. 91.
Zeldzaam in Zuid-Holland, H. — In Noord-Brabant, Roel.
- 266 *Gyllenhalii*,
Schiöd. M. 134, 105. Redt. 2 ed. 92.
In de omstreken van Utrecht, Six.
- 267 *Tristis*, Payk. N. n. 202. M. 134, 118. Redt. 2 ed. 91.
Bij Utrecht, Six. — In Friesland, G.
- 268 *Elongatulus*,
Sturm. N. n. 201. M. 134, 119. Redt. 2 ed. 89.
Eenmaal in April aan de Glijphoeve, v. V.
- *269 *Notatus*, Sturm. N. n. 203. M. 134, 126. Redt. 2 ed. 92.
In Holland, v. V. — In Friesland, G.
- 270 *Lineatus*, F. N. n. 205. M. 134, 127. Redt. 122 — 2 ed. 89.
In Friesland, G. — In tamelijk aantal bij Zuylen, Six.
- *271 *Bilineatus*, Sturm. N. n. 206. M. 134, 135. Redt. 121 — 2 ed. 86.
Uitsluitend gevangen bij Brummen, v. W.
- 272 *Pictus*, F. Bijvoegs. 206^a. M. 134, 140. Redt. 121 — 2 ed. 86.
Bij Utrecht, Six. — Bij Wassenaar, v. V.

Pelobius SCHÖNH.

- 273 *Hermanni*, F. N. n. 208. M. 135, 1. Redt. 102 — 2 ed. 85.
Eenmaal op Walcheren, G. — Sedert heb ik meer voorwerpen gezien, in Zeeland gevangen en toebehoorende aan het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, v. V.

Halipus LATR.

- 274 *Fulvus*, F. M. 136, 6. Redt. 125 — 2 ed. 84. Sturm, *Fn.* VIII, 148. t. 201.
Bij Utrecht, Six. — In Julij bij Hengelo, Groll.

- *275 *Flavicollis*, Sturm. M. 136, 8. Redt. 2 ed. 84.
Te Hattem in Julij, Groll.
- 276 *Ruficollis*, d. G. N. n. 209. M. 136, 15. Redt. 124 — 2 ed. 84.
Zeer gemeen. — Met veel verschil in teekening in de slooten van Zuid- en Noord-Holland, v. V. — In menigte bij Utrecht, S. en Six. — Bij Groningen, de Gav.
- 277 *Lineatocollis*, Marsh. Bijvoegs. 209^a. M. 136, 19. Redt. 125 — 2 ed. 84.
Uitsluitend gevonden bij Utrecht in April, Six.
- Cnemidotus** ILL.
- 278 *Caesus*, Dfts. N. n. 210. M. 137, 1. Redt. 125 — 2 ed. 85.
Eenmaal, waarschijnlijk in Holland, v. V. — Bij Utrecht, S. en Six; schijnt over het algemeen zeldzaam.
- Gyrinus** L.
- 279 *Natator*, L. N. n. 212. M. 138, 1. Redt. 126 — 2 ed. 101.
Gemeen in Holland, v. V. — Gemeen bij Wassenaar, de Gr. — Bij Groningen, Cl. Mulder. — In Noord-Brabant, Roel.
- 280 *Mergus*, Ahr. N. n. 213. Redt. 126 — 2 ed. 101.
Gemeen bij Rotterdam, Snellen. — Bij Utrecht, Six. — Te Eelderswolde in Groningen, de Gav.
- 281 *Minutus*, F. Bijvoegs. 214^a. M. 138, 7. Redt. 126 — 2 ed. 101.
Bij Katwijk, v. Bemm. — In het Rijzenburgsche bosch in October, Six.
- 282 *Marinus*, Gyll. N. n. 211. M. 138, 8. Redt. 126 — 2 ed. 101.
Gemeen in den vijver van het Slot Teylingen te Sassenheim, bij Bennebroek en Heemstede in Julij, v. V. — Gemeen in de omstreken van Leyden, H. — Bij Rotterdam, Snell. — In Noord-Brabant, Roel. — De var. *Dorsalis*, is eenmaal in eenige exemplaren op Walcheren gevangen, G.
- 283 *Strigipennis*, Suffr. Bijvoegs. 214^b. M. 138, 14 (*Concinuus* Kl.). Redt. 768 — 2 ed. 102.
In den Krommen Rijn bij Utrecht, Roel.

PALPICORNIA.

Hydrophilus GEOFFR.

- 284 *Piceus*, F. N. n. 226. M. 141, 1. Redt. 181 — 2 ed. 102.
Deze soort komt enkele jaren plaatselijk in zeer groot aantal voor en is in andere jaren schier overal zeldzaam. Eenmaal was zij zeer gemeen in slooten aan de Morsch bij Leyden, v. V. — Te Groningen ving haar de Gav. — Bij den Haag, v. d. W. — Bij Rotterdam, Sn. — Op de Glijphoeve in Junij en Sept., v. V. — Bij Utrecht, S. — Bij Hoogeveen, Steenb.

Hydrous BRULLÉ.

- 285 *Caraboides*, L. N. n. 227. M. 143, 1. Redt. 131 — 2 ed. 103.
 Bij Rotterdam niet zeldzaam, Sn. en v. V. — Bij 's Gravenhage v. d. W. en v. V. — Bij Leyden, Kopp. — Bij Utrecht, Wtt. — Bij Hoozeveen, Steenb. — In de provincie Groningen, Cl. Muld.

Hydrobius LEACH.

- *286 *Oblongus*, Herbst. N. n. 228. M. 144, 3. Redt. 132 — 2 ed. 104.
 Zeldzaam in Holland, v. V.
- 287 *Fuscipes*, L. N. n. 229. M. 144, 4. Redt. 132 — 2 ed. 103.
 Zeer gemeen, in het geheele land en door eene menigte personen gevangen.
- *288 *Bicolor*, Payk. N. n. 232. M. 144, 5. Redt. 132 — 2 ed. 103.
 Zeldzaam in Zuid-Holland, v. V.
- 289 *Limbatus*, F. N. n. 230. M. 144, 8 (*Globulus* Payk.). Redt. 132 — 2 ed. 103.
 In Friesland, G. — In April op de Gliphoeve, v. V. — Bij Rotterdam, Sn. — In de omstreken van Utrecht schijnt hij vrij gemeen en werd hij dikwijls gevangen, Six. — In April aan den IJkant bij Amsterdam, Kinker.

Phillydrus ¹⁾ SOL.

- 290 *Testaceus*, F. N. n. 231. M. 146, 1. Redt. 132 — 2 ed. 105.
 In Zuid-Holland, v. V. — Bij Rotterdam in Julij, Snell. — Bij Amsterdam in Mei, Kink. — Bij Utrecht niet ongemeen, Six. — Vele voorwerpen bij Groningen in Julij, de Gav.
- 291 *Melanocephalus*, F. N. n. 233. M. 146, 3. Redt. 2 ed. 105.
 In Zuid-Holland, v. V. — Bij Leyden Kopp. — Bij Nieuwer-sluis in Junij, Kink. — Bij den Haag, v. d. W. — Bij Utrecht, Six.
- *292 *Nigricans*, Zett. N. n. 234. M. 146, 4. Redt. 2 ed. 105. (*Frontalis* Er.).
 Op Walcheren, G. — Bij Utrecht, Six.
- 293 *Marginellus*, F. N. n. 235. M. 146, 5. Redt. 132 — 2 ed. 105.
 Op Walcheren, G. — In April op de Gliphoeve, v. V. — In Mei en Augustus in de omstreken van Utrecht, Six. — Omstreken van Leyden, Kopp.
- 294 *Griseus*, F. N. n. 236. M. 147, 1 (*Helochares lividus*, Forst.). Redt. 132 — 2 ed. 104.
 Een der gemeenste soorten van dit geslacht. — Gliphoeve in April, v. V. — Bij Rott., Sn. — Den Haag, v. d. W. — Leyden, v. V. — Haarlem, Buse. — Utrecht, Six. — Noord-Brabant, Roel.

¹⁾ Solier en Schaum schrijven dit woord *Phillydrus*, 't geen tegen den aard der Grieksche taal strijdt, in welke de *h* slechts eene adspiratie is aan het begin van een woord, welke bij zamenstelling achter sommige letters, b. v. de *l* verloren gaat. De Stettiner Catalogus heeft *Philydrus* en Redtenbacher *Phylhidrus*.

Laccobius ERICHS.

- 295 *Minutus*, L. N. n. 224. M. 148, 1. Redt. 130 — 2 ed. 105.
Gemeen in Noord- en Zuid-Holland, v. V. — Bij Rotterdam, Sn. — Gemeen in de omstreken van Utrecht, Six.

Berosus LEACH.

- 296 *Luridus*, L. N. n. 225. M. 149, 6. Redt. 131 — 2 ed. 106.
Bij Schiedam, v. W. — Bij Driebergen, Six. — In Noord-Brabant, Roel.

Linnebius LEACH.

- 297 *Truncatellus*, Thunb. N. n. 223. M. 150, 1. Redt. 130 — 2 ed. 106.
Bij Wassenaar, E. Gerdes. — Aan de Bildt in Aug., Six. — In Julij in poelen te Hoogland, v. V.
- 298 *Atomus*, Dfts. Bijvoegs. 223^a (*minutissimus* Germ.). Redt. 130 — 2 ed. 106.
Twee voorwerpen in eene beek bij Driebergen in Sept., Six. — In Julij op Schothorst te Hoogland, v. V. — In Mei bij Breda, Heyl.

Cyllidium ER.

- 299 *Seminulum*, Payk. M. 151, 1. Redt. 133 — 2 ed. 107.
Onder aangespoeld riet in Febr. en Maart aan den Schinkel bij Amsterdam, Kink. — Aan den kant van den vijver in het Haagsche bosch in Julij, Everts.

Spercheus F.

- 300 *Emarginatus*, F. N. n. 215. M. 152, 1. Redt. 127 — 2 ed. 107.
Zeer gemeen bij Rotterdam, Sn. en v. V. — Aldaar ook de cocons aan grasstengels en daaruit de parasiet, een sluipwesp, v. V. — Sedert 1847 veelvuldig bij 's Gravenhage gevonden, vroeg in het voorjaar onder steenen aan den kant der slooten, v. d. W. — Bij Leyden, Drechsl. — Met de cocons aan den kant der vaarten en slooten rond Haarlem, Rits.

Helophorus L.

- 301 *Nubilus*, F. N. n. 216. M. 153, 2. Redt. 127 — 2 ed. 107.
Ofschoon in verschillende provinciën gevangen, schijnt deze soort in het algemeen toch zeldzaam. — Bij Leyden, v. V. — Bij Utrecht, Six. — Bij Brummen, v. Itt. — In Noord-Brabant, Roel. — Te Breda, Heyl.
- 302 *Fennicus*, Payk. N. n. 221. M. 153, 9. Niet bij Redtenbacher.
In October te Brummen, v. V. — Bij Utrecht, Six.
- 303 *Grandis*, Ill. N. n. 217. Redt. 127 — 2 ed. 107.
Zeer gemeen in de staande wateren van Holland, v. V. — In April bij Utrecht, Six. — In October te Leyden en te Brummen, v. V.

- *304 *Aquaticus*, L. (Erichs). N. n. 218. M. 153, 12 (?) Redt. 128 — 2 ed. 108.
Bij Utrecht, S. en Six. — Bij Brummen, v. W.
- 305 *Granularis*, L. N. n. 219. M. 153, 18. Redt. 128 — 2 ed. 108.
Vrij gemeen in Holland, v. V. — In Friesland, G. — In Gelderland, v. W.
- 306 *Griseus*, Herbst. N. n. 220. M. 153, 20. Redt. 128 — 2 ed. 108.
In gering aantal in Holland, v. V. — In April bij Utrecht, Six.
- 307 *Nannus*, Sturm. M. 153, 22. Redt. 127 — 2 ed. 109.
In de slooten rond Utrecht, Six.

Hydrochus LEACH.

- 308 *Carinatus*, Germ. N. n. 222. M. 154, 2. Redt. 128 — 2 ed. 110.
In Augustus te Brummen, v. V. — Bij Utrecht, Six.
- 309 *Angustatus*, Germ. Bijvoegs. n^o. 222^a. M. 154, 4. Redt. 128 — 2 ed. 109.
Bij Utrecht in Mei, Six.

Ochthebius LEACH.

- 310 *Pygmaeus*, F. Bijvoegs. n^o. 222^b. M. 155, 13. Redt. 129 — 2 ed. 111.
Bij Utrecht, Six. — In Maart bij Amsterdam, Kink.
- 311 *Metallescens*, Rosenh. M. 155, 22. Redt. 2 ed. 111.
In April in het gras aan den IJkant bij Amsterdam, Kinker.

Hydraena KUGEL.

- 312 *Riparia*, Kug. Bijvoegs. 222^c. M. 156, 5. Redt. 130 — 2 ed. 112.
Bij Utrecht, Six.

Cyclonotum ERICHS.

- 313 *Orbiculare*, F. N. n. 237. M. 157, 3. Redt. 133 — 2 ed. 113.
Bij Heemstede en Leyden. v. V. — In Mei bij Rotterdam tusschen rietpollen, Sn. — In Friesland, G.

Sphaeridium F.

- 314 *Scarabaeoides*, L. N. n. 238. M. 159, 1. Redt. 133 — 2 ed. 114.
Alom bij mest zeer gemeen; de var. *Lunatum*, minder gemeen, werd onder anderen ook te Brummen gevangen door den Baron van Ittersum.
- 315 *Marginatum*, F. N. n. 239. M. 159, 3 (*bipustulatum* F.). Redt. 133 — 2 ed. 114.
Bij Leyden zeldzaam, v. V. — Bij Katwijk, W. — Eenmaal in het laatst van April zeer gemeen op de laan van Meerdervoort bij 's Gravenhage, v. V. — In Junij bij Breda, Heyl.

Cercyon LEACH.

- 316 *Obsoletum*, Gyll. M. 160, 1. Redt. 2 ed. 115.
Onder aangespoeld riet bij Amsterdam en aan de Vogelenzang in mest, in Mei, Kink. — Te Utrecht in Mei, Groll.

- 317 *Haemorrhoidale*, F. N. n. 240. M. 160, 2. Redt. 134 — 2 ed. 115.
Bij Rotterdam, Sn. — In Maart bij den Haag, v. d. W. —
Bij Utrecht, Six.
- 318 *Haemorrhoum*, Gyll. N. n. 241. M. 160, 4. Redt. 134 — 2 ed. 115.
Gemeen bij Rotterdam, Sn. — Bij den Haag, v. d. W. en v.
V. — Utrecht, v. Hass.
- 319 *Anale*, Payk. N. n. 246. M. 160, 6. Redt. 134 — 2 ed. 114.
In April bij Leyden, in Julij aan den oever van de Haarlem-
mermeer, en in Aug. bij den Haag, v. V. — Bij Amst., Kink. —
In Junij in de omstreken van Breda, Heyl.
- 320 *Pygmaeum*, Ill. N. n. 245. M. 160, 9. Redt. 135 — 2 ed. 116.
Eenige exx. in koemest, de Haan. — Bij Rotterdam niet gemeen,
Sn. — Bij Haarlem, Buse. — In Febr. en April bij Amsterdam,
Kink. — In Mei bij Bennebroek, v. V.
- 321 *Littorale*, Gyll. Bijvoegs. n°. 242^a. M. 160, 10. Redt. 2 ed. 116.
Bij Scheveningen onder doode visch, v. Br. en v. V. — Aan
het strand bij Zandvoort in Aug., Kinker.
- 322 *Melanocephalum*, F. N. n. 243. M. 160, 13. Redt. 134 — 2 ed. 115.
Bij Leyden gemeen en in April bij Heemstede, v. V. — Bij den
Haag, Snell. — In April bij Overveen in paardenmest en in Maart
bij Amsterdam, onder riet en dorre bladeren, Kink. — Bij Utrecht,
Six. — In Maart onder eikenschors bij Breda, Heyl.
- *323 *Quisquiliium*, L. M. 160, 15. Redt. 2 ed. 114.
In Maart onder aangespoeld riet aan den IJkant, Kink.
- 324 *Unipunctatum*, L. N. n. 244. M. 160, 17. Redt. 134 — 2 ed. 114.
Bij Leyden niet zeldzaam en in Mei bij den Haag, v. V. — Bij
Rotterdam, Sn. — Bij Brummen, v. W. — Het mannetje te Utrecht,
v. Hass. — Omstreken van Amsterdam, Kinker.
- 325 *Flavipes*, F. N. n. 242. M. 160, 19. Redt. 135 — 2 ed. 115.
De gemeenste der Cercyons, die overal aan te treffen is.
- 326 *Minutum*, F. N. n. 247. M. 160, 23. Redt. 135 — 2 ed. 116.
In Mei bij den Haag, v. V. — In Maart bij Amsterdam, Kink.
- *327 *Lugubre*, Payk. Bijvoegs. 248^a. M. 160, 24. Redt. 135 — 2 ed. 116.
Bij Utrecht, Six.
- 328 *Granarium*, Er. M. 160, 25. Redt. 2 ed. 116.
Onder aanspoelsel in April aan de oevers van den Schinkel bij
Amsterdam, Kink.
- Megasternum** MULS.
- 329 *Boletophagum*, Marsh. M. 161, 1. Redt. 135 — 2 ed. 117.
Met den vorigen ter zelfder plaatse, Kink. — Bij Utrecht in Junij,
Six. — Bij Leyden in Junij, v. V.

Cryptopleurum MULS.

- 330 *Atomarium*, F. N. n. 248. M. 162, 1. Redt. 135 — 2 ed. 117.
Twee exemplaren bij Brummen in Julij, v. V. — Bij Rotterdam,
Sn. — In April in de omstreken van Amsterdam, Kinker.

BRACHELYTRA.**Autalia** LEACH.

- 331 *Impressa*, Oliv. N. n. 287. M. 163, 1. Redt. 650 — 2 ed. 118.
In Sept in een *Agaricus* in het Haagsche bosch, v. V. — Bij
Overveen in Junij en bij Hillegom in Oct, Kink.
- 332 *Rivularis*, Grav. M. 163, 2. Redt. 650 — 2 ed. 118.
Gevonden in Mei in paddestoelen op Frankendaal bij Amsterdam
en in Aug. aan de oevers van den Schinkel, Kink.

Falagria LEACH.

- 333 *Thoracica*, Curt. N. n. 290. M. 165, 2. Redt. 650 — 2 ed. 118.
In Augustus en Sept. niet ongemeen onder mos en planten op de
Gliphoeve, doch elders nog niet aangetroffen, v. V.
- 334 *Sulcata*, Payk. N. n. 289 (*Caesa* Er.). M. 165, 4. Redt. 651 — 2 ed. 119.
Te Brummen, v. W. — In Mei bij Heemstede, v. V. — In Fe-
bruarij en Maart bij Amst. onder riet en rottende bladeren, Kink.
- *335 *Sulcatula*, Grav. N. n. 288 (*Sulcata* Payk). M. 165, 5. Redt. *ibid.*
In April, Junij en September op de Gliphoeve; sedert niet meer
gevangen, v. V.
- 336 *Obscura*, Grav. M. 165, 6. Redt. *ibid.*
In Maart en April onder steenen en afgevallen bladeren in de
omstreken van Amsterdam, Kinker. — In April te Leyden bij een
mesthoop, v. V.

Bolitochara MANN.

- *337 *Lunulata*, Payk. M. 167. 3 Redt. 651 — 2 ed. 122.
In Aug. in de omstreken van Naarden in paddestoelen, Kink.

Phytosus MANN.

- *338 *Spinifer*, Curt. M. 168, 1. Redt. 2 ed. 142.
Te Zandvoort aan het strand in Augustus, Kink.
- 339 *Nigriventris*, Chev. M. 168, 4. Redt. 2 ed. 142.
In overgroote menigte onder doode visch aan het strand te
Scheveningen in September, v. V.

Silusa ERICHS.

- *340 *Rubra*, Erichs. M. 170, 3. Redt. 676 — 2 ed. 164.
In Augustus in paddestoelen bij Naarden, Kink.

Ocalea ERICHS.

- *341 *Badia*, Erichs. M. 171, 8. Redt. 652 — 2 ed. 149.
In April aan de oevers van den Schinkel bij Amsterdam, Kinker.

Aleochara GRAV.

- *342 *Fuscipes*, F. N. n. 299. M. 179, 4. Redt. 669 — 2 ed. 155.
Bij Rotterdam, Gijsb. H. — Bij Leyden, v. V. en Steenhuyzen. —
In Friesland, G. — Bij den Haag, v. d. W. — In Aug. bij Noord-
wijk, Kink. — In Gelderland, v. W. en ter Meer.
- 343 *Rufipennis*, Er. M. 179, 14. Redt. 669 — 2 ed. 156.
In Sept. te Renkum, v. V.
- 344 *Tristis*, Grav. N. n. 301. M. 179, 17. Redt. 670 — 2 ed. 156.
Bij Rotterdam gemeen, Snell. — In koemest te Naarden, de H.
- 345 *Fumata*, Grav. N. n. 302. M. 179, 27. Redt. 669 — 2 ed. 155.
Vroeger gemeen bij Leyden, v. V. — Te Noordwijk in Augustus
in paddestoelen, Kink.
- 346 *Lanuginosa*, Gr. N. n. 300. M. 179, 28. Redt. 671 — 2 ed. 156.
Bij Rotterdam, Gysb. Hod. — Op de Glijphoeve in April gemeen
en te Leyden aangetroffen, v. V. — Ook door den heer de Haan
gevangen. — De gemeenste soort van het genus, Kink.
- *347 *Obscurella*, Grav. Bijvoegs. 302a. M. 179, 36. Redt. 2 ed. 157.
In October bij Scheveningen, v. Br.
- 348 *Moesta*, Grav. M. 179, 40. Redt. 671 — 2 ed. 157.
In Holland, v. d. W.
- *349 *Bilineata*, Gyll. M. 179, 54. Redt. 2 ed. 154.
In Augustus op de duinen van Zandvoort, Kink.
- 350 *Nitida*, Grav. M. 179, 56. Redt. 668 — 2 ed. 154.
Met den vorigen te Zandvoort, Kink. — In menigte bij den
Haag gevangen, v. d. W.
- 351 *Morion*, Grav. M. 179, 61. Redt. 669 — 2 ed. 155.
Zeldzaam in Febr. en Maart onder aangespoeld riet en dorre bla-
deren bij Amsterdam, Kinker.
- 352 *Pulla*, Grav. M. 178, 3. Redt. 670 — 2 ed. 158.
Te Renkum in September in paddestoelen, v. V.

Lomechusa GRAV.

- 353 *Emarginata*, Payk. M. 183, 6. Redt. 675 — 2 ed. 159. Erichs. *Käf. M. Br.* p. 367, n^o. 2.
Den 31^{en} Julij 1868 bij Velp gevangen, v. V.

Myrmedonia ERICHS.

- 354 *Funesta*, Grav. M. 185, 15. Redt. 649 — 2 ed. 121.
Te Noordwijk in Maart, bij eene colonie van *Lasius fuliginosus*, Kink.
- *355 *Similis*, Märk. N. n. 285. M. 185, 16. Redt. 2 ed. 121.
Uitsluitend gevonden bij Rotterdam, v. V.
- 356 *Limbata*, Payk. N. n. 284. M. 185, 17. Redt. 649 — 2 ed. 120.
Bij Haarlem, Buse. — Bij Leyden, v. V. — Bij Utrecht in Maart, Six.
- *357 *Lugens*, Grav. M. 185, 18. Redt. 2 ed. 120.
Met *Funesta* in Maart te Noordwijk, Kink.
- *358 *Laticollis*, Märk. M. 185, 22. Redt. 2 ed. 120.
Als de vorige, Kinker.
- 359 *Canaliculata*, F. N. n. 286. M. 185, 30. Redt. 648 — 2 ed. 119.
Vrij gemeen bij Utrecht en Brummen, v. V. — In April bij den Haag, Sn. — Bij Haarlem, Buse. — Bij Zutphen, v. Eyndh. — In Maart en April bij Hillegom en Amsterdam, Kinker.

Callicerus GRAV.

- *360 *Obscurus*, Grav. M. 188, 3. Redt. 658 (*Homalota Call.*) — 2 ed. 119.
In April in de omstreken van den Haag, v. d. W.

Calodera MANN.

- *361 *Aethiops*, Grav. M. 189, 15. Redt. 654 — 2 ed. 151.
In Maart te Noordwijk onder afgevalen bladeren, Kink.

Tachyusa ERICHS.

- 362 *Atra*, Grav. M. 190, 12. Redt. 656 — 2 ed. 124.
In Maart aan het strand van Noordwijk onder doode visch en in Augustus te Muiderberg aan het strand, Kink.

Oxypoda MANN.

- 363 *Lividipennis*, Mann. Bijvoegs. 296^a. (*Luteipennis* Er.) M. 193, 3. Redt. 664 — 2 ed. 142.
Bij den Haag, v. d. Wulp. — In Holland, de Haan. — Te Noordwijk in Maart en bij Zeist in Mei, Kink. — Twee exemplaren bij Utrecht, Six.
- *364 *Opaca*, Grav. N. n. 297. M. 193, 10. Redt. 665 — 2 ed. 143.
Bij den Haag, v. V. — In Februarij bij Amsterdam, Kinker.
- 365 *Longiuscula*, Er. M. 193, 17. Redt. 666 — 2 ed. 143.
In Maart onder dorre bladeren en in September onder aangespoeld riet aan den IJkant bij Amsterdam, Kink.
- *366 *Lentula*, Erichs. N. n. 298. M. 193, 21. Redt. 665 — 2 ed. 143.
In Junij bij den Haag, v. V.

Lepidusa ruficollis Erichs. (1821, 1822) Selys, bij Er. 1876.

- *367 *Umbrata*, Gyll. M. 193, 29. Redt. 666 — 2 ed. 143.
In Februarij onder aangespoeld riet aan den oever van den Schinkel, Kinker.
- 368 *Togata*, Erichs. M. 193, 32. Redt. 666 — 2 ed. 144. Erichs. *Käf. d. M. Brand.* 346, 3.
In Mei in de omstreken van Zutphen, v. Eyndh. — In Junij in groot aantal onder mos op de duinen bij Velzen, Kink.
- *369 *Alternans*, Gr. M. 193, 45. Redt. 666 — 2 ed. 144.
In October in de omstreken van Hillegom in paddestoelen gevonden, Kinker.
- *370 *Exoleta*, Er. M. 193, 49. Redt. 667 — 2 ed. 144.
In April aan den IJkant bij Amsterdam, Kinker.
- *371 *Formiceticola*, Märk. Bijvoegs. 298^a. M. 193, 60. Redt. 667 — 2 ed. 144.
Slechts eenmaal aangetroffen, bij Utrecht in April, Six.

Homalota MANN.

- 372 *Ebenina*, Fauv. Gedetermineerd door den heer Alb. Fauvel.
Te Driebergen in November, Six. — In April te Leyden, v. V. — In Febr. en Maart onder boommos bij Amsterdam en onder aangespoelde ruigte aan den oever van den Schinkel, Kink.
- *373 *Umbonata*, Er. M. 195, 15. Redt. 660 — 2 ed. 128.
Te Rozenburg bij Amsterdam onder mos aan boomstammen en te Frankendaal in Mei onder paddestoelen, Kinker.
- 374 *Graminicola*, Er. M. 195, 22. Redt. 658 — 2 ed. 125.
In Maart onder dorre bladeren en ruigte bij Amsterdam, Kink.
- *375 *Pavens*, Erichs. M. 195, 24. Redt. 659 — 2 ed. 127.
In Maart onder het mos der boomstammen bij Amsterdam, Kink.
- 376 *Elongatula*, Grav. M. 195, 29. Redt. 660 — 2 ed. 129.
In April in mijn tuin te Leyden, v. V. — In Maart onder dorre bladeren bij Amsterdam, Kinker.
- 377 *Hygrobia*, Thoms. M. 195, 38. Redt. 2 ed. 136. = *hygrotopora*, Kr.
Vrij gemeen in Maart onder afgevallen bladeren bij Amsterdam en in September onder steenen op den dijk langs het IJ, Kinker.
- *378 *Fluviatilis*, Kraatz. M. 195, 41. Redt. 2 ed. 136.
Met den vorigen in Maart, Kink.
- 379 *Meridionalis*, Muls. M. 195, 46. Redt. 2 ed. 136.
In April onder aangespoeld riet en ruigte aan het IJ bij Amst., Kink.
- *380 *Velata*, Erichs. M. 195, 47. Redt. 661 — 2 ed. 126.
In April aan den IJkant bij Amst. tusschen het gras, Kink.
- *381 *Labilis*, Erichs. M. 195, 48. Redt. 657 — 2 ed. 125.
In Maart aan den IJkant bij Amsterdam en in Augustus te Muidersberg aan het strand der Zuiderzee, Kinker.

- 382 *Incana*, Erichs. M. 195, 61. Redt. 2 ed. 125.
In Julij aan den oever van den Schinkel, bij Amst., tusschen de bladeren van *Typha latifolia*, Kink. -- Bij Rott. aan den kant der plassen, Sn.
- 383 *Linearis*, Grav. M. 195, 70. Redt. 659 — 2 ed. 127.
In April bij Amsterdam in het gras aan de boorden van den Schinkel, Kinker.
- *384 *Gemina*, Erichs. N. n. 292. M. 195, 98. Redt. 659 — 2 ed. 128.
Te Brummen in Gelderland in Boleten, v. V.
- 385 *Analix*, Grav. N. n. 293. M. 195, 99. Redt. 660 — 2 ed. 128.
Zeer gemeen in de eerste voorjaarsdagen, rondvliegende in den zonneshijn. — Ook in Julij te Brummen, v. V.
- *386 *Vilis*, Erichs. N. n. 291. M. 195, 103. Redt. 2 ed. 128.
In September bij Utrecht, in April bij den Haag, v. V.
- *387 *Esilis*, Erichs. N. n. 294. M. 195, 106. Redt. 661 — 2 ed. 131.
Meermalen in Holland gevangen, v. V. — Aan den oever van den Schinkel in Maart onder aangespoeld riet, Kinker.
- 388 *Talpa*, Heer. M. 195, 111. Redt. 2 ed. 130 (*parallela* Mann.).
In Maart met den vorigen, Kink.
- 389 *Merdaria*, Thoms. M. 195, 121. Gedetermineerd door den heer W. Mink.
Aan de Rhedersteeg in Gelderland in Julij in paddestoelen, Kink.
- *390 *Validicornis*, Märk. M. 195, 124. Redt. 2 ed. 130.
Te Noordwijk in Augustus mede in paddestoelen, Kink.
- 391 *Fungicola*, Thoms. M. 195, 128. Redt. 2 ed. 138.
Vrij gemeen in Julij en Aug. in champignons aan de Rhedersteeg, te Soest en Noordwijk, en in October te Overveen, Kink.
- *392 *Nigritula*, Grav. M. 195, 132. Redt. 2 ed. 138.
Te Hillegom in Maart onder het mos der boomen, Kink.
- *393 *Pubescens*, Heer. M. 195, 133. Gedetermineerd door den heer A. Fauvel.
In Aug. te Naarden in champignons, Kink.
- 394 *Divisa*, Märk. M. 195, 140. Redt. 2 ed. 126.
In Maart te Noordwijk onder afgevallen loover, Kink.
- 395 *Thomsoni*, Jans. (*Nigricornis* Thoms.) M. 195, 143. Redt. 2 ed. 139.
In Mei in de omstreken van Rotterdam, Snell.
- *396 *Coriaria*, Kraatz. M. 195, 144. Redt. 2 ed. 131.
In paddestoelen te Overveen in Junij en bij Rhederoord in Julij, Kink.
- 397 *Gagatina*, Baud. M. 195, 149. Gedetermineerd door den heer A. Fauvel.
Bij Soest, Muiderberg en Noordwijk in paddestoelen, Kink.
- 398 *Nigra*, Kraatz. M. 195, 155. Redt. 2 ed. 139.
In Febr. onder 't mos der boomstammen te Rozenburg bij Amst., Kink.
- *399 *Sericea*, Muls. M. 195, 168. Redt. 2 ed. 140.
In Mei te Frankendaal bij Amst., in champignons, Kink.

- 400 *Sordidula*, Erichs. M. 195, 170. Redt. 2 ed. 126.
In April onder dood riet bij Amsterdam en in Mei met den
vorigen, Kink.
- 401 *Longicornis*, Gr. M. 195, 176. Redt. 664 — 2 ed. 134.
In Febr. te Hillegom en bij Amsterdam onder het mos der boomen
en in Mei aan den IJkant in het gras, Kink.
- *402 *Atramentaria*,
Gyll. M. 195, 178. Redt. 2 ed. 140.
In Maart te Hillegom onder het mos der boomen, in April te
Overveen in mest en bij Amsterdam onder steenen, Kink.
- 403 *Lividipennis*,
Mann. M. 195, 190 (*Melanaria* Sahlb.). Redt. 664 — 2 ed. 140.
In Holland, de Haan. — In Sept. aan den IJkant onder riet, Kink.
- *404 *Aterrima*, Grav. M. 195, 196. Redt. 663 — 2 ed. 133.
In October bij Scheveningen aan het strand, v. Br.
- *405 *Pygmaea*, Grav. M. 195, 198. Gedetermineerd door den heer A. Fauvel met de
varieteit *Obfuscata*.
In Maart te Rozenburg bij Amsterdam en te Noordwijk onder
het mos der boomen, Kink.
- *406 *Parens*, Muls. M. 195, 199. Redt. 2 ed. 133.
In Maart bij Amst. en te Hillegom onder dorre bladeren, Kink.
- 407 *Fusca*, Sahl. M. 195, 201. Redt. 663 (*vernacula* Erichs.) — 2 ed. 133.
In April bij Amsterdam onder afgevallen bladeren, Kink.
- *408 *Subsinuata*, Er. M. 195, 203. Redt. 2 ed. 141.
In April bij Amsterdam in den zonneshijn vliegende, Kink.
- *409 *Stercoraria*,
Kraatz. M. 195, 208. Redt. 2 ed. 141.
In April bij Amsterdam onder aangespoeld riet, Kink.
- 410 *Fungi*, Grav. M. 195, 211. Redt. 663 — 2 ed. 133.
In Maart onder steenen en riet aan den IJkant; ook onder het
mos der boomstammen, Kink.
- *411 *Orbata*, Erichs. N. n. 295. M. 195, 213. Redt. 663 — 2 ed. 134.
Te Scheveningen in October aan het strand, v. Bruck. — In
Maart te Hillegom onder dorre bladeren, Kink.
- 412 *Clientula*, Er. M. 195, 214. Redt. 2 ed. 134.
In April te Leyden, v. V. — Te Hillegom met den vorigen, Kink.
- *413 *Orphana*, Erichs. M. 195, 216. Redt. 663 — 2 ed. 134.
In Maart en April onder afgevallen bladeren te Amsterdam en te
Hillegom, Kink.

Placusa ERICHS.

- *414 *Complanata*, Er. Bijvoegs. 395^a. M. 196, 1. Redt. 673 — 2 ed. 163.
Bij de Bildt in Augustus, Six.

Oligota MANN.

- 415 *Pusillima*, Grav. | M. 202, 4. Redt. 671 — 2 ed. 153.
In April aan den IJkant bij Amsterdam in het gras, Kink.

Gyrophæna MANN.

- 416 *Nana*, Payk. | N. n. 303. M. 203, 7. Redt. 672 — 2 ed. 161.
Zeer gemeen in *Agaricus* in Junij bij Heemstede, v. V. — In Augustus te Noordwijk mede in paddestoelen, Kink. — In Junij in een boomzwam bij Wassenaar, v. V.
- 417 *Congrua*, Erichs. | N. n. 304. M. 203, 9. Redt. *ibid.*
In Boleten, de Haan. — Te Overveen in Junij, Kink. — Meermalen in September in zwammen op de Glijphoeve, v. V.
- *418 *Minima*, Erichs. | M. 203, 12. Redt. 2 ed. 161.
Te Noordwijk in Aug. in champignons, Kink.
- *419 *Polita*, Grav. | N. n. 305. M. 203, 14. Redt. 673 — 2 ed. 161.
Zeer gemeen in Aug. in zwammen op de Glijphoeve (v. V.) en te Noordwijk (Kink.).

Myllaena ERICHS.

- *420 *Intermedia*, Er. | M. 206, 3. Redt. 677 — 2 ed. 165.
In Maart onder boommos bij Hillegom en bij Amsterdam onder aangespoeld riet, zeldzaam, Kink.

Hypocyptus MANN.

- 421 *Laevisculus*,
Mann. | M. 209, 8. Redt. 678 — 2 ed. 167.
In April bij Amsterdam onder steenen en in Mei en October in het gras op de dijken, Kink.

Tachinus GRAV.

- *422 *Silphoides*, L. | N. n. 311. M. 212, 1. Redt. 683 — 2 ed. 171.
Zeldzaam; in Aug. op de Glijphoeve, v. V. — Bij den Haag, v. d. W.
- 423 *Saginitus*, Grav. | M. 214, 1. Redt. 680 — 2 ed. 169. Erichs. *Käf. M. Brand.* 393. 9.
In October in de omstreken van Driebergen, Six.
- 424 *Humeralis*, Grav. | M. 215, 1. Redt. 684 — 2 ed. 173.
Bij Utrecht, Six. — In October bij Hillegom in boleten, Kink.
- 425 *Rufipes*, de G. | N. n. 312. M. 215, 3. Redt. 683 — 2 ed. 172.
Gemeen in Holland, v. V. — Gemeen bij Rotterdam, Snell. — In Maart te Utrecht, Six. — In de spleten van rottende iepen, de Haan. — In April te Haren, de Gav. — In Friesland, G.
- 426 *Flavipes*, F. | N. n. 316 (*fulvipes*). M. 215, 6. Redt. 683 — 2 ed. 172.
Bij 's Gravenhage in Junij, Sn. — Bij Zutphen, v. Eyndh. — In Junij te Utrecht, Wtt. — Te Noordwijk in Maart onder dorre bladeren, Kink. — Vrij gemeen te Brummen in Mei, v. V.

- *427 *Bipustulatus*, F. N. n. 315. M. 215, 13. Redt. 684 — 2 ed. 172.
In Zuid-Holland, v. V.
- 428 *Subterraneus*, L. M. 215, 15. Redt. 2 ed. 172. Erichs. *Gen. et Sp. Staph.* 259, n^o. 26.
In de omstreken van 's Gravenhage in April, v. d. W.
- 429 *Fimetarius*, Gr. N. n. 313. M. 215, 16. Redt. 684 — 2 ed. 172.
Bij Leyden en in Mei te Heemstede, v. V. — In genoemde maand ook te Beek bij Nijmegen, Six.
- 430 *Marginellus*, F. N. n. 314. M. 215, 18. Redt. 684 — 2 ed. 173.
In Zuid-Holland, v. d. W. — In Noord-Holland in Mei en Julij, v. V. — Bij Brummen in Oct., v. V. — In Oct. te Overveen, Kink.
- 431 *Collaris*, Grav. M. 215, 22. Redt. 683 — 2 ed. 172.
In het voorjaar in de omstreken van Amsterdam aan den waterkant onder aanspoelsel, Kink.

Tachyporus GRAV.

- 432 *Obtusus*, L. N. n. 306. M. 216, 1. Redt. 682 — 2 ed. 171.
Zeer gemeen door het geheele land, onder mos, rottende planten en dergelijken.
- *433 *Abdominalis*, Gyll. M. 216, 4. Redt. 682 — 2 ed. 171.
Zeer zeldzaam; in Maart aan het IJ bij Amsterdam onder aangespoeld riet, Kink.
- 434 *Chrysomelinus*, L. N. n. 307. M. 216, 8. Redt. 680 — 2 ed. 169.
Bijna zoo gemeen als *Obtusus*.
- 435 *Hypnorum*, F. N. n. 308. M. 216, 11. Redt. 681 — 2 ed. 170.
In April bij Heemstede en Leyden, v. V. — Bij Rotterdam, Sn. — Bij Utrecht in Maart, Six. — Op Wikkenburg bij Houten in September, Wtt. — Bij Brummen, v. W.
- 436 *Humerosus*, Er. M. 216, 14. Redt. 681 — 2 ed. 170.
In Mei bij Amsterdam, Kink.
- *437 *Scitulus*, Er. N. n. 310 (*Pulchellus* Heer). M. 216, 17. Redt. 681 — 2 ed. 170.
Alleen gevonden in Sept. bij Scheveningen door den heer vom Bruck.
- 438 *Pusillus*, Grav. N. n. 309. M. 216, 18. Redt. *ibid.*
Bij Leyden gemeen, v. V. — Bij Rotterdam gemeen, Sn. — Bij Utrecht in April, te Beek in Mei en te Driebergen in Oct., Six. — Bij Amsterdam in Maart en October, Kink.
- 439 *Brunneus*, F. Bijvoegs. 310^a. M. 216, 19. Redt. *ibid.*
Als de laatst voorgaande, Kink. — Bij Utrecht, Six. — In April in de omstreken van Rotterdam, Snell. — In Oct. te Leyden, v. V.

Conurus STEPH.

- *440 *Littoreus*, L. Bijvoegs. 305^b. M. 217, 1. Redt. 679 — 2 ed. 168.
Te Arnhem in Aug. 4 of 5 voorwerpen bij een, Snell.

- 441 *Pubescens*, Grav. Bijvoegs. 305^e. M. 217, 2. Redt. 679 — 2 ed. 168.
 Bij Driebergen in Junij, Six. — In Mei bij Amsterdam, Kink.
- 442 *Pedicularius*, Grav. M. 217, 5. Redt. 679 — 2 ed. 168.
 In Maart op de duinen te Hillegom tusschen dorre bladeren, Kink.
- *443 *Lividus*, Erichs. M. 217, 6. Gedetermineerd door den heer A. Fauvel.
 Met den voorgaanden, Kink.

Boletobius STEPH.

- 444 *Analix*, Payk. Bijvoegs. 317^a. M. 218, 1. Redt. 686 — 2 ed. 175.
 In Holland, de Haan. — Eens bij Rotterdam, Snell. — Te Hillegom in April onder afgevallen bladeren, Kink.
- 445 *Atricapillus*, F. N. n. 317. M. 218, 9. Redt. 687 — 2 ed. 167.
 Zeer gemeen in boleten te Brummen, en in Julij op Sterkenburg bij Driebergen, v. V. — Gemeen te Rhederoord en Soest in Julij en Aug., Kink. — Bij Groningen, de Gav.
- 446 *Exoletus*, Erichs. M. 218, 17. Redt. 687 — 2 ed. 176.
 In Augustus te Noordwijk en Muiderberg in boleten, Kink.
- 447 *Pygmaeus*, F. N. n. 318. M. 218, 18. Redt. 686 — 2 ed. 176.
 Bij Rotterdam, Gijsb. H. — Te Leyden, bij Utrecht en in Julij te Brummen, v. V. — In Junij bij Overveen en in Augustus te Soest, Muiderberg en Noordwijk, Kink. — In October te Driebergen, Six.

Mycetoporus MANN.

- *448 *Lucidus*, Grav. N. n. 322. M. 219, 7. Redt. 689 — 2 ed. 178.
 Uitsluitend gevonden in Junij bij den Haag, v. V.
- 449 *Punctus*, Gyll. Bijvoegs. 318^a. M. 219, 10. Redt. 688 — 2 ed. 177.
 Kleine exemplaren te Utrecht in April, Six. — In Maart bij Amsterdam onder dorre bladeren, Kink.
- *450 *Splendens*, Marsh. N. n. 319. M. 219, 12. Redt. 688 — 2 ed. 178.
 Alleen te Brummen aangetroffen door v. W.
- 451 *Lepidus*, Gr. N. n. 320. M. 219, 16. Redt. 688 — 2 ed. 177.
 In een tuin in de Veenlaan, bij den Haag, v. V. — In Maart bij Amsterdam onder dorre bladeren, Kink. — In October in de omstreken van Driebergen, Six.
- *452 *Splendidus*, Gr. N. n. 321. M. 219, 25. Redt. 688 — 2 ed. 178.
 In Aug. te Brummen, v. V. — Omstreken van Utrecht, Six. — Bij Amst. en Hillegom in Maart tusschen dorre bladeren, Kink.

Heterothops STEPH.

- 453 *Dissimilis*, Grav. M. 223, 6. Redt. 712 — 2 ed. 199.
 In Maart bij Amsterdam, Kinker.

- *454 *Quadripunctulus*, Grav. M. 223, 7. Redt. 712 (*quadripunctatus*) — 2 ed. 199.
In Maart aan den oever van den Schinkel bij Amsterdam onder aangespoelde ruigte, Kink.

Quedius STEPH.

- 455 *Lateralis*, Grav. M. 224, 2. Redt. 708 — 2 ed. 201. Gyll. *Ins. Succ.*, IV. p. 477. —
Erichs. *Köf. M. Brand.* 485, n^o. 2. — Curt. *Brit. ent.* XIV. 638.
Deze fraaije en uiterst zeldzame soort werd door den heer G. A. Six bij Driebergen gevangen.
- 456 *Fulgidus*, F. N. n. 368. M. 224, 3. Redt. 708 — 2 ed. 201.
Niet zeldzaam bij Leyden, v. V. en Kopp. — In April en Mei op de Gliphoeve, v. V. — Bij Rotterdam, Snell. — Bij Brummen, v. W.
- *457 *Cruentus*, Oliv. N. n. 374. M. 224, 8. Redt. 708 — 2 ed. 200.
Slechts eenmaal bij Leyden, v. V.
- 458 *Impressus*, Panz. N. n. 372. M. 224, 16. Redt. 709 — 2 ed. 201.
In November te Leyden, v. V. — Te Beek den 1^{sten} of 2^{den} Mei, Six.
- 459 *Molochinus*, Gr. N. n. 369. M. 224, 20. Redt. 709 — 2 ed. 201.
Eenmaal in Zuid-Holland, v. V. — Eenmaal in groot aantal aan den IJkant tegenover Amsterdam, Kink.
- 460 *Fuliginosus*, Gr. N. n. 370. M. 224, 26. Redt. 710 — 2 ed. 203.
Schijnt de minst zeldzame soort van het Genus. — Gemeen bij Rotterdam, Snell. — Gemeen in Januarij en Februarij op de Gliphoeve onder mos, v. V. — In April te Utrecht, Six.
- *461 *Fimbriatus*, Er. N. n. 375. M. 224, 33. Redt. 710 — 2 ed. 203.
In Mei bij den Haag, v. V. — In Maart te Noordwijk onder dorre bladeren, Kink.
- 462 *Semiobscurus*, Er. M. 224, 52. Redt. 2 ed. 202.
Bij Driebergen, v. V.
- *463 *Attenuatus*, Gyll. M. 224, 55. Redt. 710 — 2 ed. 202.
In Maart onder aangespoeld riet aan de boorden van het IJ bij Amsterdam, Kink.
- *464 *Boops*, Grav. N. n. 371. M. 224, 61. Redt. 709 — 2 ed. 202.
In September bij Heemstede, en in April bij den Haag, v. V.
- *465 *Scintillans*, Grav. N. n. 373. M. 224, 68. Redt. 2 ed. 203.
Uitsluitend bij Rotterdam, doch aldaar dikwijls gevangen, Sn.

Staphylinus L.

- 466 *Maxillosus*, F. N. n. 332. M. 226, 1. Redt. 694 — 2 ed. 184.
In krogen aan den waterkant, v. V. — Bij Rotterdam en den Haag, Sn. — Bij Leyden, Kopp. — Bij Wassenaar, v. Bemm. — Bij Amsterdam, Grebn. — Bij Ede in Mei en Noordwijk in Augustus, Kink. — Bij Woerden, de Gr. — Bij Utrecht, S. en Six.

- 467 *Hirtus*, L. N. n. 331. M. 226, 3. Redt. 694 — 2 ed. 184.
Een voorwerp in September bij Rotterdam; 3 in Junij bij den Haag, Sn. — Bij Hoogeveen, Steenb. — In de omstreken van Groningen, de Gav. — Deze prachtige soort is zeldzaam.
- 468 *Nebulosus*, F. N. n. 333. M. 226, 4. Redt. 695 — 2 ed. 184.
In Zuid-Holland, v. d. W. — Bij Wassenaar, v. Bemm. — In Oct. bij Leyden, v. V. — Bij Rotterdam zeldzaam, Sn. en Piag. — Bij Haren, de Gav. — Bij Brummen, v. Itt.
- 469 *Murinus*, L. N. n. 334. M. 226, 5. Redt. 695 — 2 ed. 184.
Bij Rotterdam, Gijsb. H. — In Zeeland, H. — In April op de Glijphoeve, v. V. — In Junij bij den Haag, Sn. — Bij Zeist, Mart. — In Mei bij Utrecht, Wtt. — Bij Soest in September, Kink. — In Julij bij Arnhem, de Gav.
- *470 *Stercorarius*, Oliv. M. 226, 8. Redt. 696 — 2 ed. 185.
In October gevonden te Overveen, loopende op het zand der duinen, Kink.
- 471 *Pubescens*, F. N. n. 335. M. 226, 19. Redt. 695 — 2 ed. 184.
In het vroege voorjaar op zonnige wegen, v. V. — Bij 's Gravenhage, Sn. — Te Hoogeveen, Steenb.
- 472 *Erythropterus*, L. N. n. 336. M. 226, 20. Redt. 696 — 2 ed. 185.
Bij Leyden zeldzaam, H., Kopp. en v. V. — Bij Wassenaar, de Gr. — Bij Rotterdam, Snell. — Bij Amsterdam in Sept. Kink. — Bij Utrecht, v. Hass. — Aldaar in Sept. niet ongemeen, en in April op den straatweg in het Haagsche bosch gevangen, v. V. — Omstreken van Groningen, de Gav.
- 473 *Caesarius*, Ced. N. n. 337. M. 226, 21. Redt. 696 — 2 ed. 185.
Tamelijk gemeen in het voorjaar, v. V. — Bij Haarlem in Sept., Rits. — Op Walcheren, H.
- Oecypus** KIRBY.
- 474 *Oleus*, F. N. n. 338. M. 227, 1. Redt. 698 — 2 ed. 187.
Bij Rotterdam in tuinen onder planken vrij gemeen, v. V. — Aldaar, meestal een paar bij een, Snell. — Bij Leyden, v. Bemm. — Bij Woerden, de Gr. — Aan het huis ter Heyde, Piag. — Bij Amsterdam in Sept., Grebn. en in April, Kink.
- 475 *Cyaneus*, Payk. N. n. 339. M. 227, 8. Redt. 698 — 2 ed. 187.
Bij Utrecht, Six. — Zes exempl. in Sept. nabij het huis ter Heyde, Piag. — In Gelderland, G. en Sn.
- 476 *Brunnipes*, F. N. n. 340. M. 227, 12. Redt. 698 — 2 ed. 188.
Onder mos in Febr., April en Mei op de Glijphoeve onder Heemstede, v. V. — Bij den Haag, v. d. W. — Bij Wassenaar, de Gr. — Bij Soest in Aug., in paddestoelen, Kink.

- *477 *Picipennis*, F. N. n. 341. M. 227, 15. Redt. 698 — 2 ed. 188
In Sept. bij Scheveningen, v. Br. — In Sept. bij den Haag, Sn.
- 478 *Cupreus*, Ross. N. n. 342. M. 227, 17. Redt. 698 — 2 ed. 188.
Eenmaal bij Rotterdam, Snell. — In April bij Leyden, in Sept. bij Heemstede, in Oct. bij Brummen en den Haag, v. V. — In Sept. bij Amst., Kink. — Bij Leyden, v. Bemm. — Bij Utrecht, Six. — Bij Zeist, Mart. — In Friesland, G.
- *479 *Ater*, Grav. N. n. 343. M. 227, 28. Redt. 697 — 2 ed. 186.
In Julij aan den IJkant, Kink. — In Sept. bij den Haag, v. V. — Bij Brummen, v. W. — In den Bommelerwaard, v. d. W.
- 480 *Morio*, Grav. N. n. 344. M. 227, 35. Redt. 696 — 2 ed. 186.
Onder steenen en bladeren, H. — Bij Rotterdam, Sn. — Bij den Haag, v. d. W. — In Oct. te Leyden, v. V. — In Friesland, G. — Te Zutphen, v. Bemm. — Te Vorden, de Gav.

Philonthus LEACH.

- 481 *Splendens*, F. N. n. 346. M. 228, 1. Redt. 699 — 2 ed. 189.
Vrij gemeen in het vroege voorjaar bij Leyden en Haarlem, v. V. — Bij Rotterdam, Sn. — Bij 's Gravenhage, v. d. W. — Waarschijnlijk elders niet zeldzaam.
- 482 *Laminatus*, Cr. N. n. 345. M. 228, 3. Redt. 700 — 2 ed. 189.
Zeer gemeen op straatwegen in Maart en April, als het zonnig weder is. — Den eersten Januarij 1851 met een thermometerstand van 52° F. loopende gevonden in het Haagsche bosch, v. V. *24 Sept. 1851*
- *483 *Nitidus*, F. Bijvoegs. 346^a. M. 228, 8. Redt. 700 — 2 ed. 190.
Deze soort, ofschoon zeer na verwant aan de beide vorigen, is zeer zeldzaam; een ex. werd door den heer Snellen in Aug. bij Rotterdam onder een steen aangetroffen.
- 484 *Carbonarius*, Gyll. N. n. 347. M. 228, 10. Redt. 2 ed. 190.
Gemeen bij Rotterdam, Sn. — Bij Amsterdam in April onder dorre bladeren, Kink.
- *485 *Succicola*, Thoms. M. 228, 11. Gedetermineerd door den heer A. Fauvel.
Eenmaal in Junij te Frankendaal bij Amst. in een paddestoel, Kink.
- 486 *Aeneus*, Rossi. N. n. 348. M. 228, 12. Redt. 701 — 2 ed. 191.
Niet zeldzaam in April op straatwegen in Holland; met name bij Leyden en Noordwijk, v. V. — Bij Amst., Grebn. — Mede te Groningen, de Gav. — Bij Brummen, v. W.
- 487 *Politus*, F. N. n. 350. M. 228, 21. Redt. 701 — 2 ed. 191.
Misschien de gemeenste soort uit het Genus. Op straatwegen en onder rottende plantestoffen in het voorjaar en den herfst. — Bij Leyden, Noordwijk, den Haag, Amsterdam, Utrecht, Zutphen, Groningen, Middelburg, enz. *3 Oct. 1851*

- 488 *Luceus*, Nrdm. N. n. 349. M. 228, 24. Redt. 701 — 2 ed. 191.
Eenmaal in Mei bij Heemstede, v. V. — In April in de omstreken van Amsterdam, Kink.
- 489 *Atratus*, Grav. M. 228, 25. Redt. 700 — 2 ed. 190. Erichs. *Käf. M. Brand.* 450, 7 en 439, 18. Grav. *Micr.* 21, 23.
Bij Rotterdam, Sn. — In Julij te Noordwijk en in October te Wassenaar, v. V. — In Maart aan den oever van den Schinkel en op de duinen te Hillegom; ook te Muiderberg in Aug. Kink.
- 490 *Aerosus*, Kiesw. M. 228, 26. Redt. 2 ed. 191. Kiesenw. *Ann. Soc. ent. de Fr.* Ser. 2. t. IX. p. 416.
In April te Noordwijk, v. V.
- 491 *Marginatus*, F. N. n. 351. M. 228, 27. Redt. 702 — 2 ed. 192.
Onder steenen en bladeren, H. en v. V. — Bij Zeist gemeen, Mart. — Bij Driebergen, Six. — In Maart bij Amst. Kink. — In Mei in de omstreken van 's Gravenhage, v. d. W. — Bij Groningen, de Gav.
- *492 *Umbratilis*, Gr. M. 228, 28. Redt. 2 ed. 193.
In Zuid-Holland, Kink.
- 493 *Varius*, Gyll. N. n. 352. M. 228, 30. Redt. 702 — 2 ed. 193.
Gemeen in het voorjaar bij mest; ook in Oct. te Heemstede, v. V. — Uit eene pop gekweekt, die in koemest aangetroffen was, de H. — In Aug. bij Amsterdam, Kink.
- 494 *Sparsus*, Luc. M. 228, 41. Gedetermineerd door den heer A. Fauvel.
Te Leyden in December onder mest, v. V.
- 495 *Fimctarius*, Gr. M. 228, 42. Redt. 703 — 2 ed. 193. Erichs. *Käf. M. Brand.* 460. n°. 21.
Bij den Haag, v. d. W. — Te Sterkenburg in Sept., v. V. — In Maart op Frankendaal bij Amsterdam in champignons en in Oct. op de duinen van Overveen, Kink.
- *496 *Cephalotes*, Grav. M. 228, 43. Redt. 701 — 2 ed. 190.
In Mei te Frankendaal in boleten, Kink.
- *497 *Fuscus*, Grav. N. n. 353. M. 228, 45. Redt. 702 — 2 ed. 192.
Eenmaal in Mei op de Glijphoeve, v. V.
- 498 *Xantholoma*, Gr. N. n. 365. M. 228, 46. Redt. 2 ed. 192.
In Sept. aan het strand te Scheveningen, v. Br. — In Aug. te Noordwijk aan Zee, Kink.
- *499 *Fumigatus*, Er. N. n. 355. M. 228, 57. Redt. 703 — 2 ed. 194.
Een ex. bij Leyden, v. V.
- 500 *Bipustulatus*,
Panz. N. n. 357. M. 228, 60. Redt. 704 — 2 ed. 194.
In Zuid-Holland, v. V. — In Friesland, G. — Te Katwijk, v. Bemm. — Te Muiderberg aan het strand der Zuiderzee in Aug., Kink.
- 501 *Sanguinolentus*,
Grav. N. n. 356. M. 228, 61. Redt. 704 — 2 ed. 194.
Uitsluitend gevonden in het Haagsche bosch, doch aldaar eenmaal niet zeldzaam, v. V.

- 502 *Varians*, Payk. N. n. 358. M. 228, 64 (*Opacus* Gyll.). Redt. 2 ed. 195.
Bij Rott.gemeen, Sn.— In April bij Heemstede vrij gemeen, v. V.— In Maart, April en Sept. op verschillende plaatsen in de omstreken van Amst., Kink.
- *503 *Proteus*, Fauv. Gedetermineerd door den heer A. Fauvel.
Te Ede in Mei, Kink.
- *504 *Debilis*, Grav. N. n. 359. M. 228, 66. Redt. 705 — 2 ed. 195.
Bij den Haag, v. d. W.
- *505 *Ventralis*, Grav. N. n. 360. M. 228, 67. Redt. 705 — 2 ed. 195.
Bij Brummen, v. W.
- *506 *Discoideus*, Grav. N. n. 361. M. 228, 68. Redt. 703 — 2 ed. 193.
Alleen bij Leyden, v. V.
- 507 *Quisquiliarius*, Gyll. M. 228, 73. Redt. 703 — 2 ed. 193. Gyll. *Ins. Suec.* II, 335.
Bij Groningen, de Gav. — In Maart bij Amsterdam en te Hillegom onder dorre bladeren, Kink.
- 508 *Nigrila*, Grav. M. 228, 81. Redt. 2 ed. 198.
In April in het gras aan de oevers van den Schinkel, Kink. — Bij Groningen, de Gav.
- 509 *Micans*, Grav. N. n. 362. M. 228, 84. Redt. 706 — 2 ed. 196.
Bij Rotterdam, v. V. — Bij Leyden, Drechsler. — Tamelijk gemeen in April en Mei in de omstreken van Groning. en Haren, de Gav.
- 510 *Fulvipes*, F. Bijvoegs. n°. 362^a. M. 228, 89. Redt. 706 — 2 ed. 196.
Bij Utrecht in een tuin in April, Six. — In Junij bij den Haag, v. d. W.
- 511 *Nigrifulus*, Grav. N. n. 364 (*aterrimus*). M. 228, 96. Redt. 706 — 2 ed. 196.
In April bij Rotterdam, Snell.— Bij den Haag, v. d. W.— In April op de Glijphoeve en in Junij te Goes, v. V. — In Maart bij Amst. aan den oever van den Schinkel en in Aug. te Muiderberg en Zandvoort, Kink. 24/2 28. 27/3
- *512 *Tennis*, F. N. n. 363. M. 228, 98. Redt. 706 — 2 ed. 196.
Slechts eenmaal, v. V.
- *513 *Punctus*, Grav. M. 228, 99. Redt. 702 — 2 ed. 197.
In April aan den rand van den Oosterdokdijk onder aangespoelde ruigte, Kink. — Bij den Haag, v. d. W. — De verscheidenheid *Binotatus* Grav., Redt 2 ed. 197, in Maart onder aangespoeld riet aan den oever van den Schinkel, Kink.
- 514 *Dimidiatipennis*, Erichs. M. 228, 105. Erichs. *Gen. et Spec. Staph.*, p. 500, n°. 128.
Bij Sloterdijk in Mei, Kink.

Xantholinus DAHL.

- *515 *Glabratus*, Grav. N. n. 326. M. 230, 1. Redt. 691 — 2 ed. 181.
In het Soester bosch, v. d. W. — In Junij bij Hillegom, Kink.
- 516 *Ochropterus*, Nrdm. M. 230, 2. (*Rebucens* Gr.) Redt. ibid.
In April bij Rotterdam, Snell.

- 517 *Punctulatus*, Payk. N. n. 327. M. 230, 3. Redt. 692 — 2 ed. 182.
Gemeen in April en Mei in Zuid-Holland, v. V. — In April in een tuin bij Utrecht, Six. — Aan de plassen bij Rotterd. Sn.
- *518 *Ochraceus*, Gyll. N. n. 328. M. 230, 4. Redt. 2 ed. 983.
Tamelijk gemeen in Zuid-Holland, v. V. — In April in de omstreken van Amsterdam, Kink. — Te Groningen, de Gav.
- 519 *Tricolor*, F. N. n. 329. M. 230, 7. Redt. 692 — 2 ed. 182.
Bij Utrecht, V. — Bij Driebergen, v. Bemm. — Te Soest in Aug., Kink. — Eene var. in Aug. op de Glijphoeve, v. V.
- 520 *Linearis*, F. N. n. 330. M. 230, 16. Redt. 693 — 2 ed. 182.
Bij Rotterdam, Snell. — In Maart, Mei en Aug. op de Glijphoeve, in April bij den Haag en Leyden, v. V. — Bij Doesb. en Groningen, de Gav.
- *521 *Fulgidus*, F. N. n. 325. M. 230, 22. Redt. 691 — 2 ed. 180.
Zeldzaam; aan slootkanten, v. V. — Bij Leyden, W.

Leptacinus ERICHS.

- 522 *Batychnus*, Gyll. M. 133, 2. Redt. 693 — 2 ed. 183. Gyll. *Ins. Suec.* IV. 480. Erichs. *Käf. M. Br.* 429.
In April in de omstreken van Rotterdam, Snell. en Piag. — In Julij op Schothorst bij Amersfoort, v. V.

Othius LEACH.

- *523 *Fulvipennis*, F. N. n. 324. M. 235, 2. Redt. 690 — 2 ed. 179.
In Maart op de Glijphoeve onder mos, in April bij den Haag, v. V.
- *524 *Myrmecophilus*, Kiesw. M. 235, 10. Redt. 2 ed. 179.
In Maart bij Noordwijk onder dorre bladeren, Kink.

Lathrobium GRAV.

- 525 *Brunnipes*, F. N. n. 377. M. 240 1. Redt. 716 — 2 ed. 209.
In Holland, de Haan. — Onder steenen bij Rotterdam, Snell. — Bij Leyden meermaals en in Oct. bij den Haag, v. V. — Aan de Bildt bij Utrecht. Six. — In April bij Groningen en Helpman, de Gav.
- 526 *Elongatum*, L. N. n. 378. M. 240, 2. Redt. 715 — 2 ed. 209.
Des winters onder steenen bij Rott., Snell. — Te Leyden in het voorjaar, onder anderen tegen vochtige muren, v. V. — Te Utrecht en Driebergen, Six. — Bij Muiderberg in Aug., Kink. — Bij Groningen en Harendermolen, de Gav.
- 527 *Fulvipenne*, Grav. M. 240, 4. Redt. 715 — 2 ed. 208.
In de omstreken van Utrecht, Six. — Te Groningen en bij Haren in April, de Gav.
- 528 *Multipunctum*, Grav. N. n. 379. M. 240, 11. Redt. 715 — 2 ed. 208.
Twee exemplaren in Sept. op de Glijphoeve, v. V. — Drie bij Rott. Snell. — Bij Utrecht, Six.

- 529 *Quadratnm*, Payk. Bijvoegs. 397^a. M. 240, 18. Redt. 717 — 2 ed. 210.
Bij Utrecht, Six. — In Maart bij Amsterdam en Noordwijk, Kink.
- *530 *Filiforme*, Grav. M. 240, 25. Redt. 716 — 2 ed. 209.
In Febr. bij Amsterdam onder aangespoeld riet, Kink.
- 531 *Longulum*, Grav. N. n. 380. Bijvoegs. 380^a. M. 240, 28. Redt. 716 — 2 ed. 209.
In Julij bij den Haag, v. V. — Bij Rotterdam, Snell. — In Febr. aan den oever van den Schinkel bij Amsterdam, Kink.

Cryptobium MANN.

- 532 *Fracticorne*, Payk. M. 244, 1. Redt. 713 — 2 ed. 206.
In Maart onder aangespoelde ruigte aan den oever van den Schinkel, Kinker.

Stilicus LATR.

- *533 *Fragilis*, Grav. Bijvoegs. 385^a. M. 245, 2. Redt. 720 — 2 ed. 214.
Bij Rotterdam onder bladeren, zeldzaam, Snell.
- 534 *Rufipes*, Germ. Bijvoegs. 385^b. M. 245, 4. Redt. 721 — 2 ed. 214.
In Holland, de Haan. — Bij Rotterdam onder bladeren in April en September 5 ex., Snell. — 's Gravenhage in April, v. d. W.
- *535 *Subtilis*, Erichs. N. n. 385. M. 245, 5. Redt. *ibid.*
Eenmaal bij Rotterdam, Gijsb. H. — In Febr. te Leyden, v. V.
- *536 *Similis*, Erichs. Bijvoegs. 385^d. M. 245, 7. Redt. 720 — 2 ed. 214.
Eenmaal in Aug. bij Roozendaal in Gelderland, v. V.
- 537 *Geniculatus*, Er. Bijvoegs. 385^c. M. 245, 8. Redt. *ibid.*
Bij den Haag in April, v. d. W.
- 538 *Affinis*, Erichs. Bijvoegs. 385^e. M. 245, 10. Redt. *ibid.*
Bij Haarlem, Buse. — In het voorjaar onder steenen aan den IJkant en te Noordwijk aan het strand, Kruk. — In Febr. te Leyden onder dorre bladeren, v. V.

Lithocharis DEJ.

- *539 *Brunnea*, Er. Bijvoegs. 381^a. M. 247, 9. Redt. 719 — 2 ed. 212.
Bij Rotterdam, Snell.
- 540 *Melanocephala*, F. N. n. 381. M. 247, 20. Redt. 719 — 2 ed. 212.
In het voorjaar in Zuid-Holland, zelden, v. V. — Bij Rotterdam, Snell. — In Mei aan den Oosterdokdijk onder steenen, bij Amst., Kink.

Sunius LEACH.

- 541 *Intermedius*, Er. N. n. 386. M. 249, 13. Redt. 2 ed. 215.
Eenmaal in Junij bij Amersfoort, v. V. — Eenmaal bij Utrecht, Six. — Te Beekhuizen bij Velp in Julij, Kink.
- *542 *Angustatus*, F. Bijvoegs. 386^a. M. 249, 18. Redt. 721 — 2 ed. 215.
Aan de Bildt in Mei, Six. — Eenmaal in Mei te Frankendaal bij Amsterdam met het sleepnet uit het gras geschept, Kink.

Paederus F.

- 543 *Littoralis*, Grav. M. 250, 4. Redt. 722 — 2 ed. 216. Erichs. *Käf. M. Br.* 519. 3 et 650, 1.
Bij Utrecht, doch zeldzaam, Six.
- 544 *Riparius*, L. N. n. 383. M. 250, 7. Redt. 722 — 2 ed. 216.
Niet zeer gemeen. — Op riet in April in de omstreken van Leyden, v. V. — Bij Rotterdam, Snell. en Piag.
- 545 *Longipennis*, Er. N. n. 382. M. 250, 8. Redt. 722 — 2 ed. 216.
Bij Heemstede tweemaal aangetroffen in Oct., eens aldaar in Aug. en in Sept. aan den oever van de Haarlemmermeer, v. V. — Bij Utrecht, V. — Vrij gemeen aan den oever van den Schinkel bij Amsterdam, Kink.
- 546 *Ruficollis*, F. N. n. 384. M. 250, 15. Redt. *ibid.*
Eenmaal in zeer groot aantal aan den zoom van een poel in de duinen bij 's Gravenhage in Mei; bij Heemstede in April; zeer gemeen aan den oever van de Haarlemmermeer in de eerste helft van Julij 1850 en te Oosterwijk aan den rand der vennen op de heide, v. V. — Te Aalten in Mei, Snell.

Evaesthetus GRAV.

- 547 *Scaber*, Grav. M. 254, 1. Redt. 731 — 2 ed. 227.
In Febr. te Rozenburg bij Amsterdam onder dorre bladeren en in Maart aan den oever van den Schinkel onder aangespoelde ruigte, Kink.

Stenus F.

- 548 *Biguttatus*, L. N. n. 387. M. 256, 1. Redt. 723 — 2 ed. 218.
Dikwijls in het voorjaar bij Rotterdam onder mos gevangen (zie v. d. Hoeven, *System. Beschrijving*). — Bij Leyden zeldzaam, doch vrij gemeen in Julij 1850 aan den oever van de Haarlemmermeer en bij Brummen in Julij, v. V. — In de omstreken van Utrecht, Six.
- *549 *Bipunctatus*, Er. N. n. 388. M. 256, 2. Redt. *ibid.*
In Julij bij den Haag, v. V. — Bij Rott. in de Oude Plantage, Piag.
- *550 *Guttula*, Müll. M. 256, 5. Redt. 724 — 2 ed. 218. Germ. *Mag. d. Ent.* IV, 225, 23.
Erichs. *Käf. M. Brand.* 531, n^o. 3.
In het Overmaassche, Piag.
- 551 *Bimaculatus*, Gyll. N. n. 389. M. 256, 9. Redt. 724 — 2 ed. 219.
Een mannetje in Mei op de Glijphoeve in het gras, v. V. — Onder steenen bij Rotterdam, Snell.
- 552 *Juno*, F. N. n. 390. M. 256, 10. Redt. *ibid.*
Onder steenen en planken in de tuinen binnen Leyden veelvuldig voorkomende, v. V. — In April bij den Haag v. d. W. — Gedurende het geheele voorjaar en in November de gemeenste soort van *Stenus* in de omstreken van Amsterdam, Kink.

- 553 *Ater*, Mann. N. n. 391. M. 256, 14. Redt. *ibid.*
Eenmaal in April bij den Haag, v. V.
- 554 *Buphthalmus*, Grav. M. 256, 25. Redt. 724 — 2 ed. 219.
In Febr., Maart, April en November bij Amsterdam, Kinker.
- *555 *Niger*, Mannb. M. 256, 27 (*Carbonarius* Gyll.). Redt. 2 ed. 226.
In Maart aan den oever van den Schinkel bij Amsterdam, Kink.
- 556 *Nitidus*, Lac. M. 256, 32. Redt. 2 ed. 219
In April aan den IJkant, Kink.
- 557 *Morio*, Grav. M. 256, 35. Redt. 725 — 2 ed. 220.
In Mei te Frankendaal bij Amst. in het gras, Kink. — Vrij gemeen in de omstreken van Gron., de Gav. — In Oct. te Driebergen, Six.
- 558 *Speculator*, Bsd. N. n. 393. M. 256, 47. Redt. 726 — 2 ed. 221.
In Mei bij den Haag, v. V. — Bij Haarlem, Buse. — Bij Driebergen, Six. — In het voorjaar onder dorre bladeren bij Amsterdam, Overveen en Hillegom, Kink. — Bij Groningen, de Gav.
- 559 *Providus*, Erichs. N. n. 392. M. 256, 50. Redt. *ibid.*
Met den vorigen in het voorjaar, Kink. — Bij Leyden in Sept. v. V. — In April bij Utrecht aan waterkanten, Six. — Bij Velp in Julij, Kink.
- *560 *Vafellus*, Er. N. n. 394. M. 256, 68. Redt. 727 — 2 ed. 222.
In Friesland, G.
- *561 *Circularis*, Grav. N. n. 395. M. 256, 73. Redt. 727 — 2 ed. 222.
In Mei bij den Haag, v. V. — In Febr. aan den oever van den Schinkel, Kink.
- 562 *Declaratus*, Er. M. 256, 74. Redt. *ibid.*
In Febr. en Maart aan de oevers van den Schinkel, Kink. — Bij Utrecht in Mei, Six.
- *563 *Nigritulus*, Gyll. N. n. 396. M. 256, 76. Redt. 728 — 2 ed. 222.
Bij Brummen, v. W. — Bij den Haag, v. V.
- 564 *Unicolor*, Erichs. M. 256, 79. Redt. 728 — 2 ed. 223.
In Maart aan de oevers van den Schinkel in het gras, Kink.
- *565 *Binotatus*, Ljung. Bijvoegs. 396^a. M. 256, 87. Redt. 728 — 2 ed. 223.
Alleen bij Haarlem gevonden door den heer Buse.
- *566 *Plantaris*, Er. N. n. 397. M. 256, 88. Redt. *ibid.*
Slechts eenmaal bij Leyden, v. V.
- *567 *Plaucus*, Er. Bijvoegs. 397^a. M. 256, 90 (*bifoveolatus* Gyll.). Redt. 729 — 2 ed. 224.
Bij Rotterdam in het najaar onder bladeren, Snell.
- 568 *Tempestivus*, Er. M. 256, 98. Redt. 729 — 2 ed. 224. Erichs. *Käf. M. Br.* 563, 40.
In Augustus te Amersfoort en in October te Driebergen, Six.
- 569 *Impressus*, Germ. N. n. 398. M. 256, 108. Redt. 729 — 2 ed. 224.
In Sept. onder mos te Heemstede en in Junij bij den Haag, v. V. — In Maart en April bij Hillegom en Noordwijk, Kink.

- 570 *Flavipes*, Erichs. M. 256, 119. Redt. 730 — 2 ed. 224.
Bij Utrecht in Junij, Six.
- *571 *Filum*, Erichs. N. n. 403. M. 256, 123. Redt. 730 — 2 ed. 225.
In Julij bij den Haag, v. V. — Bij Wassenaar, Piag.
- 572 *Tarsalis*, Ljung. N. n. 399 et 402 (*Roscidus*). M. 256, 127. Redt. 730 — 2 ed. 225.
Onder mos en bij wortels van boomen zeer gemeen te Rott., ook bij Leyden aangetroffen en in Mei op de Gliphoeve, v. V. — Bij Amersfoort en Utrecht, Six. — Bij den Haag, v. d. W.
- 573 *Oculatus*, Grav. N. n. 400. M. 256, 129. Redt. 730 — 2 ed. 225.
Bij Leyden, in Mei en Junij op de Gliphoeve en in Oct. te Noordwijk, v. V. — Bij Haarlem, Buse. — In Junij bij Amsterdam, Kink. — Bij Utrecht, Six. — Bij Maastricht, Maur.
- 574 *Cicindeloides*, Gr. N. n. 401. M. 256, 132. Redt. *ibid.*
Zeldzaam in Zuid-Holland, v. V. — In April bij Utrecht, Six. — Bij Kralingen, Piag. — Aan de oevers van den Schinkel in Nov., Kink.
- 575 *Paganus*, Erichs. M. 256, 133. Redt. *ibid.*
Bij Velzen in Junij, Kink. — In Julij in het Bloemendaalsche bosch, Rits.
- 576 *Latifrons*, Erichs. Bijvoegs. 403^a. M. 256, 134. Redt. 731 — 2 ed. 225.
Bij Utrecht in Maart en Junij, Six.
- 577 *Contractus*, Er. M. 256, 135. Redt. *ibid.*
In de omstreken van Utrecht, Six.

Oxyporus F.

- 578 *Rufus*, L. N. 376. M. 257, 1. Redt. 713 — 2 ed. 206.
Gemeen in Sept. te Brummen in paddestoelen; ook in Aug. te Roozendaal bij Velp gevangen, v. V. — Te Voorst in Julij, Wtt. — In Gelderland, ter Meer. — Bij Hoogeveen, Steenb. — In Noord-Brabant, Roel.

Bledius LEACH.

- 579 *Tricornis*, Herbst. N. n. 404. M. 258, 15 v. Redt. 733 — 2 ed. 228.
In Mei bij Noordwijk, v. V. — In de omstreken van Amst. in April, Mei en Julij, Kink. — In Julij te Brummen, v. V. — Op Walcheren, G.
- 580 *Opacus*, Block. N. n. 406. M. 258, 31. Redt. 734 — 2 ed. 229.
In Junij des avonds op de Meerdervoortsche duinen bij den Haag vliegende gevangen; ook in Julij bij Leiden, v. V.
- 581 *Longulus*, Erichs. N. n. 405. M. 258, 36. Redt. 734 — 2 ed. 229.
In Maart op Crocus gevangen, alsmede in Mei bij den Haag, v. V. — Bij Groningen, de Gav. *Wing. die bij de eerste ontdekking*
- 582 *Rufipennis*, Er. M. 258, 41. Redt. *ibid.*
In de omstreken van den Haag, v. V.

Platystethus MANN.

- *583 *Cornutus*, Grav. N. n. 407. M. 259, 4. Redt. 735 — 2 ed. 231.
 Bij Rotterdam, Gijsb. H. en Snell. — In Maart aan de oevers van den ringvaart der Haarlemmermeer onder aangespoeld riet, Kink. — Bij Utrecht, Six. — Bij Brummen beide sexen, v. W.
- 584 *Morsitans*, Payk. Bijvoegs. 406^a. M. 259, 7. Redt. ibid.
 Bij Utrecht en bij de Bildt in Aug., Six. — Op Sterkenburg bij Driebergen mede in Aug., v. V.
- 585 *Nodifrons*, Sahlb. N. n. 408. M. 259, 9. Redt. ibid.
 Eenmaal bij Rotterdam, Gijsb. H. — Bij Utrecht in Junij, Six. — In de omstreken van Zutphen, v. Eyndh.

Oxytelus GRAV.

- 586 *Rugosus*, F. N. n. 409. M. 260, 1. Redt. 736 — 2 ed. 231.
 Een der gemeenste soorten onder steenen en mos, v. V. — Bij Amsterdam onder het mos der boomen en dorre bladeren, Kink. — Gemeen bij Rott., Snell. — In April in de omstreken van den Haag, v. d. W. — In April te Haren en zoowel in Julij als in Sept. niet zeldzaam op de wegen om Groningen, de Gav.
- *587 *Fulvipes*, Er. N. n. 414. M. 260, 4. Redt. 736 — 2 ed. 232.
 Bij Rotterdam, Snell.
- 588 *Piceus*, L. N. n. 410. M. 260, 6. Redt. 737 — 2 ed. 232.
 Onder koemest, de Haan. — Bij Leyden in Mei, v. V. — In Friesland, G. — Bij Driebergen, Six. — Te Amsterdam in April onder steenen, Kink.
- *589 *Luteipennis*, Er. N. n. 413. M. 260, 7. Redt. ibid.
 In Friesland, G. — In Holland, v. V.
- 590 *Sculptus*, Grav. N. n. 411. M. 260, 8. Redt. ibid.
 In Aug. op de Glijphoeve, v. V. — Bij Rotterdam, Sn. — Bij Voorschoten in Sept., Piag.
- 591 *Inustus*, Grav. Bijvoegs. 411^a. M. 260, 9. Redt. ibid.
 In grooten getale in den zonneschijn vliegende gevangen den 22 October op den Engelenburg bij Brummen, v. V. — In Aug. op de duinen bij Zandvoort, Kink.
- *592 *Sculpturatus*, Grav. N. n. 412. M. 260, 13. Redt. 737 — 2 ed. 233.
 In Friesland, G.
- *593 *Maritimus*, Thoms. M. 260, 14. Gedetermineerd door den heer A. Fauvel.
 In Maart te Noordwijk aan Zee, Kink.
- *594 *Complanatus*, Erichs. N. n. 416. M. 260, 15. Redt. 738 — 2 ed. 233.
 In Julij bij den Haag, v. V.

595 *Nitidulus*, Grav. | M. 260, 19. Redt. 738 — 2 ed. 233. Panz. *Fn.* 104, f. 13. Gyll.
Ins. Succ. II, p. 458. Erichs. *Käf. d. M. Brand*, p. 594, n^o. 9.
In Mei te Leyden, v. V. — In Holland, de Haan.

596 *Depressus*, Grav. | N. n. 415. M. 260, 21. Redt. *ibid.*
In Holland, de Haan. — In het voorjaar op bloemen, v. V. —
In Maart en April bij Amsterdam onder dorre bladeren, Kink. —
In de omstreken van Zutphen, v. Eyndh.

Haploderus STEPH.

*597 *Caelatus*, Grav. | Bijvoegs. 416^a. (*Phloeonaeus cael.*) M. 261, 1. Redt. 739 — 2 ed. 230.
Bij Brummen, v. Itt.

Trogophloeus MANN.

598 *Riparius*, Boisd. | M. 262, 7. Redt. 741 — 2 ed. 236.
In Maart en April onder aanspoelsel aan den IJkant bij Amst. Kink.

*599 *Bilineatus*, Steph. | M. 262, 9. Gedetermineerd door den heer W. Mink.
Ter zelfder plaatse, Kink.

*600 *Elongatulus*, Er. | M. 262, 13. Redt. 741 — 2 ed. 236.

In Maart onder riet aan den oever van den Schinkel, Kink.

601 *Fuliginosus*, Grav. | N. n. 418. M. 262, 15. Redt. 741 — 2 ed. 236.

In Febr. in vrij groot aantal bij Amsterdam, Kink.

602 *Corticinus*, Er. | N. n. 419. M. 262, 19. Redt. 740 — 2 ed. 235.

Bij Leyden onder rottende bladeren, v. V. — In tamelijk aantal
in April bij Amsterdam, Kink.

603 *Foveolatus*, Sahlb. | M. 262, 24. Redt. 740 — 2 ed. 235.

In Maart en April onder riet aan de oevers van den Schinkel
en het IJ, Kink. *24/3 27/10 2000*

Syntomium CURT.

*604 *Aeneum*, Mull. | M. 266, 1. Redt. 743 — 2 ed. 239. Curt. *Brit. Ent.* V. f. 228.

In Maart onder mos te Rozenburg bij Amsterdam, Kink.

Coprophilus LATR.

605 *Striatulus*, F. | N. n. 420. M. 267, 1. Redt. 742 — 2 ed. 237.

In Friesland, G. — In April onder steenen bij Amst. Kink. —
Te Driebergen, Six. — In Maart in den zonneshijn rondvliegende
over de straatwegen in den omtrek van Leyden, v. V.

Lesteva LATR.

606 *Pubescens*, Mann. | N. n. 422. M. 274, 2. Redt. 748 — 2 ed. 244.

In Junij bij den Haag, v. V. — Bij Driebergen in Mei, Six. —
In Friesland, G.

607 *Bicolor*, F. | Bijvoegs. 421^a. M. 274, 6. Redt. 747 — 2 ed. 244.

Aan den Maasoever bij Rotterdam in Sept., Snell. — In April
bij Utrecht, Six.

Acidota MANN.

- 608 *Crenata*, F. M. 275, 1. Redt. 748 — 2 ed. 247. Erichs. *Käf. M. Brand.* 620, n^o. 1.
Een enkel voorwerp, behoorende tot de var. *Rufa* Germ. bij Groningen, de Gav.

Olophrum ERICHS.

- 609 *Piceum*, Gyll. Bijvoegs. 422^a. M. 276, 1. Redt. 749 — 2 ed. 247.
Bij Utrecht, V. — Bij Driebergen, Six. — In Maart te Noordwijk onder dorre bladeren, Kink.
- *610 *Fuscum*, Grav. Bijvoegs. 422^b. M. 276, 2. Redt. 2 ed. 248.
Eenmaal bij den Haag, v. V.
- *611 *Assimile*, Payk. M. 276, 7. Redt. 749 — 2 ed. 248.
In Maart bij Hillegom onder dorre bladeren, Kink.

Lathrimaeum ERICHS.

- 612 *Atrocephalum*, Gyll. Bijvoegs. 423^a. M. 277, 3. Redt. 749 — 2 ed. 248.
Onder een steen in Mei bij den Haag een voorwerp, Snell. — Bij Amst. en Hillegom in Maart onder dorre bladeren, Kink.
- 613 *Fusculum*, Er. N. n. 423. M. 277, 4. Redt. 2 ed. 248.
In Mei bij den Haag op bloemen, v. V. — Gemeen in de omstreken van Haarlem, Buse.

Arpedium ERICHS.

- 614 *Subpebescens*, Hal. Gedetermineerd door den Heer A. Fauvel.
In April in het gras bij Rotterdam, Snell.

Omalium GRAV.

- 615 *Rivulare*, Payk. N. n. 424. M. 290, 5. Redt. 751 — 2 ed. 251.
In April, Mei en Junij op de Glyphoeve en bij den Haag, gemeen in eikenzwammen; in Mei bij Leyden en in October aldaar bij windstille dagen in den zonneshijn zwerrende, v. V. — In het voorjaar bij Amsterdam en bij Hillegom in October in paddestoelen, Kink.
- *616 *Fossulatum*, Er. N. n. 425. M. 290, 8. Redt. 752 — 2 ed. 251.
Eenmaal gemeen in Zuid-Holland, doch in de laatste jaren niet teruggevonden, v. V.
- *617 *Ferrugineum*, Kr. M. 290, 12. Gedetermineerd door den heer W. Mink.
In Februarij onder dorre bladeren te Rozenburg bij Amst., Kink.
- 618 *Caesum*, Grav. M. 290, 14. Redt. 752 — 2 ed. 251.
Te Frankendaal bij Amsterdam in champignons, Kink.
- 619 *Minimum*, Er. M. 290, 22. Redt. 2 ed. 253. Bestemd door den heer Fauvel.
In Holland, de Haan.
- 620 *Deplanatum*, Gyll. N. n. 427. M. 290, 31. Redt. 753 — 2 ed. 253.
Mede door den Heer de Haan in Holland aangetroffen. — In Junij en Sept. bij den Haag, in Aug. op de Glyphoeve, v. V.

- 621 *Concinnum*, Er. M. 290, 33. Redt. 752 — 2 ed. 252. Bestemd door den heer Fauvel.
In Holland, de Haan.
- 622 *Salicis*, Gyll. M. 290, 38. Redt. 2 ed. 253. Bestemd door den heer Fauvel.
In de omstreken van den Haag, Snell.
- *623 *Lucidum*, Erichs. N. n. 426. M. 290, 41. Redt. 751 — 2 ed. 250.
Bij Rotterdam op bloemen, Snell.

Anthobium LEACH.

- 624 *Triviale*, Erichs. N. n. 429. M. 291, 1. Redt. 755 — 2 ed. 256.
In April aan de Glip, v. V. — In April bij den Haag, Snell.
- *625 *Abdominale*, Gr. N. n. 430. M. 292, 2. Redt. 754 — 2 ed. 255.
In Mei bij Heemstede, v. V.
- *626 *Minutum*, F. N. n. 428. M. 292, 10. Redt. 755 — 2 ed. 256.
Op bloesem, vooral van lijsterbessen bij Rotterdam, Snell.
- 627 *Scutellare*, Erichs. Bijvoegs. n^o. 430^a. M. 292, 34. Redt. 754 — 2 ed. 255.
In Holland, de Haan. — Op de duinen, Piag. — Te Frankendaal
bij Amsterdam, Kink. — Bij Utrecht, Six.
- 628 *Ophthalmicum*, M. 292, 40. Redt. 753 — 2 ed. 254. Erichs. *Käf. M. Brand.* 894. 8.
Payk. In de omstreken van Utrecht, Six.
- 629 *Sorbi*, Gyll. N. n. 431. M. 292, 44. Redt. 754 — 2 ed. 255.
In Holland, de Haan. — In de omstreken van Zutphen, v. Eynth.

Proteinus LATR.

- 630 *Brachypterus*, F. N. n. 432. M. 293, 2. Redt. 657 — 2 ed. 257.
Deze soort is vrij gemeen. Men vond haar: in April bij Bennen-
broek en den Haag, v. V. — In Maart onder het mos der boomen
en dorre bladeren bij Amsterdam en in Oct. te Hillegom in padde-
stoelen, Kink. — Tegen het einde van April en in Oct. te Driebergen, Six.
- 631 *Atomarius*, Er. M. 293, 4. Redt. ibid. Erichs. *Gen. Staph.* 904. n^o. 4.
v. v. macropterus Gyll.
In Junij bij Leyden, v. V.

Megarthus STEPH.

- 632 *Depressus*, Payk. Bijvoegs. n^o. 432^a. M. 294, 1. Redt. 756 — 2 ed. 258.
In Friesland, G. — Te Utrecht, Six. — Meermalen in Holland,
de Haan en v. V. — In Maart en April bij Amsterdam, Kink.
- *633 *Denticollis*, Ill. M. 294, 4. Redt. 756 — 2 ed. 257.
In Mei te Frankendaal bij Amsterdam in boleten, Kink.

Phloeobium ERICHS.

- 634 *Clypeatum*, Müll. M. 295, 1. Redt. 757 — 2 ed. 258.
In Mei gevonden in den Aerenhout bij Haarlem, verborgen in de
holligheid van den stam van een' ouden wilgenboom, Kink. — In
Mei bij Haarlem, Groll.

Phloeocharis MANN.

- *635 *Subtilissima*, Mann. | N. n. 421. M. 297, 1. Redt. 744 — 2 ed. 241.
Slechts eenmaal in Junij bij Amersfoort, v. V.

Micropeplus LATR.

- 636 *Porcatus*, F. | N. n. 433. M. 301, 1. Redt. 758 — 2 ed. 259.
In Zuid-Holland, v. V. — Den 25^{en} April bij Utrecht, Six.

PSELAPHIDEA.

Pselaphus HERBST.

- 637 *Heisei*, Herbst. | N. n. 279. M. 309, 1. Redt. 640 — 2 ed. 262.
Bij Brummen, v. W. — Bij Driebergen, Six.

Tychus LEACH.

- 638 *Niger*, Payk. | M. 310, 2. Redt. 644 — 2 ed. 262.
In April te Noordwijk onder dorre bladeren, Kink. — In tamelijke
hoeveelheid in een tuin te Utrecht onder afval en bladeren, Six.

Bryaxis LEACH.

- 639 *Sanguinea*, F. | Bijvoegs. n^o. 280^a. (*Longicornis* Leach ♂) en 281^a ♀. M. 314, 1.
Redt. 641 — 2 ed. 265.
Beide sexen in Mei bij Utrecht, Six. — Bij Haarlem, Buse. —
In Mei aan de Vogelenzang, Kink.
- 640 *Fossulata*, Reich. | N. n. 281. M. 314, 3. Redt. 642 — 2 ed. 265.
Eenmaal in Mei op mos, v. V. — In Mei op den Oosterdokdijk
bij Amst. tusschen het gras, Kink. — In Oct. in het Drieberger bosch, Six.
- *641 *Haemoptera*, Aub. | M. 314, 7. Redt. 2 ed. 265.
In Maart aan de oevers van den Schinkel en het IJ onder aan-
gespoelde ruigte, Kink.
- 642 *Haematica*, Reich. | N. n. 280. M. 314, 16. Redt. 664 — 2 ed. 265.
Eenmaal in Julij op de Glijphoeve, v. V. — In Maart onder stee-
nen en in Mei langs den Oosterdokdijk bij Amsterdam, Kink.
- *643 *Juncorum*, Leach. | Bijvoegs. 281^b. M. 314, 19. Redt. 642 — 2 ed. 266.
Alleen bij Utrecht gevonden door den heer Six.

Bythinus LEACH.

- 644 *Chevolatii*, Aub. | Aubé, Mon. 41, 12. Pl. 87, f. 4. Erichs. *Käf. der M. Brand*, 276, n^o. 7.
Te Utrecht, Six.
- *645 *Burellii*, Denny. | N. n. 282 (*Macropalpus* Aub. = ♀). M. 316, 33. Redt. 643 — 2 ed. 267.
Het wijfe eenmaal bij Leyden, v. V.

Euplectus LEACH.

- *646 *Signatus*, Reich. N. n. 283. M. 317, 6. Redt. 646 — 2 ed. 269.
In Augustus te Brummen, v. V.
- 647 *Karstenii*, Reich. M. 317, 8. Redt. 646 — 2 ed. 268. Aubé, *Mon. Psel.* 56 pl. 92 f. 2.
Een enkel voorwerp vliegende in mijn tuin gevangen, terwijl de
lucht zeer electrisch was, den 9^{en} Junij 1866, v. V. — Bij Utrecht, Six.
- *648 *Nanus*, Reich. Bijvoegs. 283^a. M. 317, 12. (*Kirbyi* Waterh.). Redt. 646 — 2 ed. 268.
Bij Amsterdam in April onder dorre bladeren, Kink. — In de
omstreken van Utrecht, Six.
- 649 *Ambiguus*, Reich. M. 317, 14. Redt. 646 — 2 ed. 269. Aubé, *Mon. Psel.* p. 58, pl. 93. f. 2.
Meer dan eenmaal bij Utrecht gevangen, Six.

SCYDMÆNIDEA.**Scydmaenus** STEPH.

- *650 *Godartii*, Latr. N. n. 278. M. 325, 1. Redt. 2 ed. 273.
Op Walcheren, G. — In Mei in een tuin te 's Gravenhage, v. V.
- 651 *Collaris*, M. et K. M. 325, 5. Redt. 638 — 2 ed. 274.
In April aan den oever van den Schinkel bij Amsterdam onder aange-
spoeld riet en op de duinen van Overveen onder dorre bladeren, Kink.
- *652 *Pusillus*, M. et K. Bijvoegs. 278^b. M. 325, 8. Redt. *ibid.*
Bij Utrecht, Six.
- 653 *Sparshalli*, Den. M. 325, 22. Redt. 2 ed. 274.
In het gras aan den IJkant bij Amsterdam in Mei, Kink.
- 654 *Pubicollis*, M. et K. M. 325, 29. Redt. 636 — 2 ed. 272. Sturm. *D. Fauna*, XIII, 19,
7. Tab. 262, f. B.
In Februarij te Leyden onder dorre bladeren, v. V.
- 655 *Oblongus*, Sturm. M. 325, 31. Redt. *ibid.* Sturm, *D. Fauna*, XIII, 20. Tab. 262. f. C.
In October te Driebergen, Six.
- 656 *Horticollis*, Ill. M. 325, 43. Redt. 637 — 2 ed. 273.
In April te Leeuwarden, W. Albarda. — Bij Amsterdam onder
een hoop dorre bladeren, Kink.
- 657 *Tarsatus*, M. et K. Bijvoegs. n^o. 278^a. M. 325, 65. Redt. 636 — 2 ed. 271.
In April met den vorigen bij Amsterdam, eenmaal in groote hoe-
veelheid, Kink. — Bij Utrecht in Julij, Six.

Cephennium M. en K.

- *658 *Thoracicum*, M. en K. M. 329, 4. Redt. 639 — 2 ed. 275.
In April bij Utrecht, Groll.

CLAVICORNIA.

Necrophorus F.

- 659 *Germanicus*, L. N. n. 249. M. 335, 1. Redt. 140 — 2 ed. 289.
Bij Brummen, v. W. — Bij Beek, Dr. Rombouts. — Bij Nijmegen, G.
- 660 *Humator*, F. N. n. 250. M. 335, 3. Redt. 140 — 2 ed. 289.
Bij Leyden, Kopp. — Te Bleiswijk en in Mei op de Glijphoeve, v. V. — Te Nieuwer-Amstel in Junij, Grebn. — Bij Amsterdam, Snell. — Bij Zeist, Mart. — Onder zoden bij Groningen, Cl. Muld. — Te Hoogeveen, Steenb. — Gemeen in Friesland, G. — Deze soort schijnt bij voorkeur vogelkrenge te begraven.
- 661 *Vespillo*, L. N. n. 251. M. 335, 6. Redt. 140 — 2 ed. 289.
Vrij gemeen onder doode kleine zoogdieren. — In Holland en te Voorst in Junij, v. V. — Bij Leyden, Kopp. — In de omstreken van Utrecht, Six. — Bij Hoogeveen, Steenb.
- 662 *Vestigator*, Hersch. N. n. 252. M. 335, 7. Redt. 140 — 2 ed. 289.
Zeldzaam in Holland, W. — Meermalen te Brummen, v. Itt. en v. W. — Drie voorwerpen bij elkander in Junij 1858 te Voorst, v. V. — Acht exemplaren te Ubbergen bij Nijmegen, Maitl. — In Noord-Brabant, Roel.
- *663 *Fossor*, Erichs. N. n. 253. M. 335, 8. Redt. 140 — 2 ed. 289.
Slechts eenmaal gevangen, v. V.
- *664 *Ruspator*, Er. N. n. 254. M. 335, 10. Redt. ibid.
Bij Leyden, H. — Bij Zeist, Mart. — Bij Brummen, v. W. — Bij Beek, Dr. Rombouts.
- *665 *Sepultor*, Charp. N. n. 255. M. 335, 12. Redt. ibid.
In Julij bij Heemstede, v. V. — Bij den Haag, v. d. W.
- 666 *Mortuorum*, F. N. n. 256. M. 335, 14. Redt. ibid.
In het Haagsche bosch, W. en v. V. — Bij Rotterdam en den Haag, Sn. — In Zuid-Holland, Blume. — Bij Utrecht, Six.

Silpha L.

- 667 *Littoralis*, L. N. n. 257. M. 336, 1. Redt. 141 — 2 ed. 287.
Gemeen in groote krenge van zoogdieren, doch de mannetjes zijn zeldzaam, v. V. — Bij Hoogeveen, Steenb.
- 668 *Thoracica*, L. N. n. 258. M. 336, 2. Redt. ibid.
Met den vorigen gevangen, v. V. — Bij Wassenaar, v. Benm. — Bij Leyden, Kopp. — Bij Hillegom in Mei en bij Soest in April, Kinker. — Bij Hoogeveen Steenb. — Omstreken van Groningen, de Gav.

- 669 *Rugosa*, L. N. n. 259. M. 336, 5. Redt. 141 — 2 ed. 288.
In Holland vrij gemeen, v. V. — Bij Wassenaar, v. Bemm. — Bij Leyden, Kopp. — Omstreken van Groningen, de Gav. — Hoogeveen, Steenb.
- 670 *Sinuata*, F. N. n. 260. M. 336, 8. Redt. 141 — 2 ed. 288.
Mede tamelijk gemeen in kregen, v. V. — Te Leyden, Kopp. — In Maart bij Rotterdam, Snell. -- Bij Zeist, Mart. — Groningen, de Gav. — Hoogeveen, Steenb.
- 671 *Dispar*, Herbst. N. n. 261. M. 336, 9. Redt. 142 — 2 ed. 288.
Bij Utrecht, S. en Six. — Eene verscheidenheid in Maart bij Rotterdam, Snell.
- 672 *Opaca*, L. N. n. 262. M. 336, 11. Redt. 141 — 2 ed. 288.
Vrij gemeen in rottend aas in Zuid-Holland, v. V. — Gemeen bij Zeist, Mart. — In Julij aan de Bildt, Six. — Op Walcheren en in Friesland, G. — Bij Hoogeveen, Steenb.
- 673 *4-punctata*, L. N. n. 263. M. 336, 12. Redt. 141 — 2 ed. 287.
Leeft van rupsen en jaagt ze voornamelijk op eiken na, v. V. — In het Haagsche bosch in Mei, Rits. en v. V. — Bij den Haag Sn. — In Mei op eiken te Hillegom, Kink.
- 674 *Carinata*, L. N. n. 264. M. 336, 13. Redt. 142 — 2 ed. 288.
In Holland, v. W. — Bij Driebergen, v. Bemm. — Bij Amersfoort in Junij, v. V. — Bij Utrecht, v. d. W.
- *675 *Reticulata*, F. N. n. 267. M. 336, 24. Redt. *ibid.*
Zeldzaam in Holland, v. V. — Bij Brummen, id. — Te Uden, Sn.
- 676 *Tristis*, Illig. N. n. 265. M. 336, 32. Redt. *ibid.*
In Zuid-Holland, v. d. W.
- 677 *Obscura*, L. N. n. 266. M. 336, 35. Redt. *ibid.*
In Zuid-Holland en te Brummen, v. V. — Bij Zeist gemeen, Mart. — Omstreken van Utrecht, S. en Six. — Bij Hoogeveen, Steenb.
- 678 *Atrata*, L. N. n. 268. M. 336, 40. Redt. *ibid.*
Waarschijnlijk door het geheele rijk de gemeenste der Silphen, ook des winters onder boomschors en mos aan te treffen, zoowel de type als de bruine varieteit.

Choleva LATR.

- 679 *Angustata*, F. N. n. 269. M. 341, 2. Redt. 143 — 2 ed. 280.
Te Brummen, v. W. — Aldaar in Oct., v. V. — In Junij bij den Haag een ♀ en den 1^{en} April 1852 aldaar een ♂ met tandjes aan heupen en dijen der achterpooten. Vergelijk Erichson, *Käf. M. Brand*, var. 1 en 2, v. V. — Bij Utrecht, Six.

- *680 *Cisteloides*,
Froehl. Bijvoegs. n^o. 269^a (*Catops castaneus* St.). M. 341, 4. Redt. 143 —
2 ed. 280.
Omstreken van Utrecht, v. Hass.
- 681 *Agilis*, Illig. N. n. 270. M. 341, 4. Redt. 143 — 2 ed. 280.
Eenmaal in Mei op de Glijphoeve, v. V. — Zeldzaam bij Rot-
terdam, Snell.

Catops PAYK.

- *682 *Picipes*, F. N. n. 271. M. 342, 4. Redt. 144 — 2 ed. 280.
Een wijfje bij Heemstede in Mei, v. V.
- *683 *Nigricans*, Spenc. M. 342, 5. Redt. 144 — 2 ed. 281.
In Oct. te Hillegom in paddestoelen, Kink.
- *684 *Morio*, F. N. n. 274. M. 342, 9. Redt. 144 — 2 ed. 281.
In Holland, doch in de laatste 12 jaren niet gevangen, v. V.
- *685 *Tristis*, Panz. N. n. 273. M. 342, 13. Redt. *ibid*.
In menigte onder een dooden mol in Julij op de Glijphoeve, v. V.
- *686 *Grandicollis*, Er. N. n. 272. M. 342, 15. Redt. 144 — 2 ed. 280.
Een ♂ in Oct. in het Haagsche bosch, v. V. — In April aan
den oever van den Schinkel bij Amsterdam, Kink.
- 687 *Chrysomeloides*,
Panz. N. n. 277. M. 342, 19. Redt. 144 — 2 ed. 281.
Eenmaal bij Leyden, v. V. — In Oct. bij den Haag, v. d. W. —
In de omstreken van Utrecht, v. Hass. en Six. — Bij Amsterdam
onder steenen in Mei en te Hillegom in Mei en Oct., Kink.
- 688 *Fumatus*, Er. N. n. 275. M. 342, 20 (*Watsoni* Sp.). Redt. 144 — 2 ed. 280.
In Aug. op de Glijphoeve, in Sept. bij den Haag en te Leyden in
Junij, v. V. — In de omstreken van Breda, Heyl. — Bij Brummen, v. W.
- *689 *Velox*, Spenc. M. 342, 30. Redt. 144 — 2 ed. 282.
In Febr. bij Amsterdam onder dorre bladeren, Kink.
- 690 *Anisotomoides*,
Spenc. M. 342, 36. Redt. 145 — 2 ed. 282.
In Februarij bij Amsterdam met den vorigen en in Mei te Fran-
kendaal in champignons, Kink.
- 691 *Sericeus*, F. N. n. 276. M. 342, 44. Redt. 143 — 2 ed. 282.
Op Walcheren, G. — Bij Brummen, v. W. — Te Utrecht, Six.

Anisotoma ILL.

- 692 *Rugosa*, Steph. Bijvoegs. n^o. 468^a. M. 349, 4. Redt. 152 — 2 ed. 290.
Omstreken van Utrecht, v. Hass.
- 693 *Dubia*, Panz. N. n. 458. M. 349, 12. Redt. 153 — 2 ed. 291.
In Julij bij den Haag, v. V. — In Julij te Abcoude in het gras
aangetroffen, Kink. — Te Driebergen in Oct., Six.
- *694 *Ovalis*, Schmidt. N. n. 459. M. 349, 23. Redt. 154 — 2 ed. 292.
Een wijfje in Mei bij den Haag, v. V.

andp. h. 1880. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

- *695 *Rubiginosa*, Schmidt. | N. n. 460. M. 349, 25. Redt. 153 — 2 ed. 291.
In Aug. en Sept. op de Gliphoeve, v. V.

Liodes LATR.

- *696 *Humeralis*, F. | N. n. 461. M. 353, 1. Redt. 155 — 2 ed. 294.
Eenmaal, v. V.
- *697 *Orbicularis*, Herbst. | N. n. 462. M. 353, 6. Redt. 156 — 2 ed. 295.
Vroeger bij Leyden niet zeldzaam, v. V.

Amphicyllis ERICHS.

- *698 *Globus*, F. | M. 354, 1. Redt. 156 — 2 ed. 295.
In Junij tusschen een hoop zwarte mieren aan de Vogelenzang, Kink.

Agathidium ILL.

- *699 *Atratum*, St. | N. n. 463. Sturm. *D. Fauna* II. p. 63. tab. 38 d.
Eenmaal in Augustus op de Gliphoeve, v. V.
- *700 *Laevigatum*, Er. | N. n. 464. M. 355, 7. Redt. 157 — 2 ed. 296.
In September bij Scheveningen, v. Br.

Clambus FISCH.

- 701 *Pubescens*, Redt. | M. 356, 2. Redt. 158 — 2 ed. 298.
In Februarij en Maart aan de zoomen van den Schinkel bij Amsterdam onder aangespoelde ruigte, Kink.

Calyptomerus REDT.

- *702 *Alpestris*, Redt. | M. 358, 1. Redt. 159 — 2 ed. 298.
In Julij in een huis te Utrecht, Groll.

Arthrolips WOLL.

- *703 *Obscurus*, Shlb. | M. 360, 1. Redt. 2 ed. 957.
Te Noordwijk in April onder dorre bladeren, Kink.

Corylophus STEPH.

- 704 *Cassidioides*, Marsh. | M. 363, 1. Redt. 574 — 2 ed. 957.
In Maart te Hillegom onder dorre bladeren, Kink.

Trichopteryx KIRB.

- 705 *Atomaria*, de Geer. | M. 370, 5. Redt. 149 — 2 ed. 301.
In Maart bij Amsterdam onder aanspoelsel, Kink.
- *706 *Fascicularis*, Herbst. | N. n. 456. M. 370, 7. Redt. 148 — 2 ed. 300 (*Grandicollis* Er.).
Bij Leyden onder rottende bladeren, v. V. — Bij Amsterdam in Mei in een' paddestoel, Kink. — Bij Utrecht meermaals, Six.
- *707 *Intermedia*, Gillm. | N. n. 457. Redt. 149 — 2 ed. 301.
Bij Brunnen in Augustus, v. V.
- *708 *Depressa*, Gillm. | Bijvoegs. n^o. 457^a. M. 370, 13 (*Sericans* Heer). Redt. 149 — 2 ed. 301.
Met den vorigen, v. V.

- *709 *Curta*, Gillm. | Bijvoegs. n^o. 457^b. M. 372, 1 (*Nephanes abbreviatellus* Heer). Redt. 2 ed. 302.
Bij Utrecht, Six.

Ptilium GYLL.

- 710 *Kunzei*, Heer. | M. 373, 2. Redt. 151 — 2 ed. 303.
In de omstreken van Amst. in Junij binnen een champignon, Kink.

Ptenidium ERICHS.

- 711 *Pusillum*, Gyll. | M. 375, 2. Redt. 151 — 2 ed. 304.
In Maart bij Amsterdam aan den waterkant onder riet en dorre bladeren, Kink.

Scaphium KIRBY.

- 712 *Inmaculatum*, Ol. | N. n. 455. M. 378, 1. Redt. 147 — 2 ed. 305.
In Sept. vele exemplaren in *Agaricus* op de Gliphoeve, v. V. —
In Julij bij de duinen, Piag. — In Mei op paddestoelen, Kink.

Scaphisoma LEACH.

- *713 *Agaricinum*, L. | M. 379, 1. Redt. 147 — 2 ed. 316.
In Junij te Frankendaal in champignons, Kink. — In Julij en Aug. in eikenzwammen in het Haagsche bosch, Everts.

Hister L.

- 714 *Unicolor*, L. | N. n. 434. M. 385, 12. Redt. 233 — 2 ed. 308.
Bij Brummen, v. W. — Bij den Haag, v. d. W.
- 715 *Cadaverinus*, Payk. | N. n. 435. M. 385, 16. Redt. 233 — 2 ed. 309.
Eenmaal de roodbruine varieteit in groote menigte bij Rhijnsburg gevonden, de zwarte type in September op de Gliphoeve, v. V. — Bij Leyden, Kopp. — In de omstreken van den Haag, v. d. W. — Bij Utrecht, Six. — Bij Rhederoord in Julij, Kink. — Onder een dooden mol bij Groningen in Julij, Cl. M.
- 716 *Terricola*, Germ. | N. n. 437. M. 385, 18. Redt. 233 — 2 ed. 308.
Bij Rotterdam, Snell.
- 717 *Merdarius*, Payk. | N. n. 436. M. 385, 19. Redt. 233 — 2 ed. 309.
Te Brummen, v. Itt. — Eenmaal in April bij Heemstede, v. V.
- *718 *Sinuatus*, F. | N. n. 438. M. 385, 30 (*Fimetarius* Herbst). Redt. 234 — 2 ed. 309.
Bij Zeist, Mart. — Bij Brummen, v. W. — In Junij op versch gemest land te Made in Noord-Brabant, Heyl.
- 719 *Neglectus*, Germ. | N. n. 439. M. 385, 32. Redt. 234 — 2 ed. 309.
In Junij bij den Haag, v. d. W. — Vrij gemeen bij den Haag in April, Mei en Junij, v. V. — Bij Utrecht, Six. — Bij Rott. in Junij Snell. — Bij Brummen, v. Itt. — In de omstreken van Breda, Heyl.

- 720 *Carbonarius*, Payk. N. n. 440. M. 385, 35. Redt. *ibid.*
Tamelijk gemeen in mest in Zuid-Holland, v. V. — Bij Rotterdam, Snell. — Bij Breda, Heyl.
- 721 *Purpurascens*, Herbst. N. n. 441. M. 385, 38. Redt. 233 — 2 ed. 309.
In Mei bij den Haag, v. d. W. — In Junij bij Leyden, v. V. — Bij Rotterdam, Snellen. — Onder dood riet aan den IJkant bij Amsterdam in Junij, Kink. — In Augustus bij Breda, Heyl. — Te Hoogeveen, Steenb.
- *722 *Stercorarius*, Payk. N. n. 442. M. 385, 43. Redt. 234 — 2 ed. 309.
In Friesland, G. — In Mei bij den Haag, v. d. W.
- 723 *Bissexstriatus*, F. N. n. 443. M. 385, 55. Redt. 233 — 2 ed. 309.
Eenmaal in Mei op de duinen bij den Haag, v. V. — In April aan den oever van den Schinkel bij Amsterdam, Kink.
- 724 *Bimaculatus*, L. N. n. 444. M. 385, 59. Redt. 234 — 2 ed. 310.
Eenmaal bij Leyden, G. — Eene zeer zeldzame soort.
- *725 *12-striatus*, Schr. N. n. 445. M. 385, 60. Redt. *ibid.*
In de duinen van Holland bij de zeedorpen in de mest- en afvalputten tamelijk gemeen, v. V. — In Zeeland, de Bruyne.
- Saprinus** ERICHS.
- 726 *Nitidulus*, F. N. n. 446. M. 393, 23. Redt. 237 — 2 ed. 314.
Somtjids gemeen aan het strand te Katwijk, Kopp. en v. V. — In Aug. te Noordwijk onder doode visschen, Kink.
- 727 *Immundus*, Gyll. N. n. 447. M. 393, 33. Redt. 2 ed. 314.
In Oct. aan het strand te Scheveningen, v. Br. en v. V. — Te Zandvoort in Aug. onder uitwerpselen, Kink.
- 728 *Speculifer*, Latr. M. 393, 36. Redt. 237 — 2 ed. 314.
Bij Wassenaar, H.
- 729 *Aeneus*, F. N. n. 448. M. 393, 37. Redt. *ibid.*
Gemeen op de duinen bij de zeedorpen, v. V. — Bij Katwijk, Kopp. — Bij Utrecht, Six.
- *730 *Lautus*, Er. N. n. 449. M. 393, 48. Redt. 2 ed. 316.
Twee voorwerpen bij Brummen, v. W.
- 731 *4-striatus*, Payk. N. n. 451. M. 393, 88. Redt. 238 — 2 ed. 315.
In de Hollandsche duinen bij de zeedorpen, v. V. — Bij Katwijk, Kopp. en v. Bemm.
- *732 *Maritimus*, Steph. N. n. 454. M. 393, 90. Niet bij Redt.
In October aan het strand te Scheveningen, v. Br. — In Aug. bij Zandvoort, Kink.
- *733 *Rugifrons*, Payk. N. n. 452. M. 393, 94. Redt. 237 — 2 ed. 315.
Op de duinen en aan het strand van Zuid-Holland, zeldzaam, v. V.

- 734 *Metallicus*, F. N. n. 453. M. 393, 95. Redt. 238 — 2 ed. 315.
Zeer gemeen in Junij op de duinen; ook in April bij Bennebroek aangetroffen, v. V.
- 735 *Rotundatus*, Ill. N. n. 450. M. 393, 102. Redt. 237 — 2 ed. 314.
Een klein voorwerp in Holland aangetroffen, een van normale grootte in Aug. op Schothorst, een buitengoed te Hoogland, v. V. — Gemeen in Friesland, G.
- Onthophilus** LEACH.
- *736 *Striatus*, F. Bijvoegs. n^o. 454^a. M. 398, 3. Redt. 239 — 2 ed. 318.
Bij Utrecht, Six. *gelyk met op veldes van maasvlies*
- Abraeus** LEACH.
- 737 *Granulum*, Er. M. 400, 3. Redt. 241 — 2 ed. 318.
Bij Amsterdam in Maart onder steenen, Kink.
- Phalacrus** PAYK.
- 738 *Corruscus*, Payk. N. n. 466. M. 402, 2. Redt. 160 — 2 ed. 320.
In Junij nu en dan op bloemen in Zuid-Holland; gemeen in Oct. te Brummen, v. V. — In de omstreken van Utrecht, v. Hass.
- 739 *Caricis*, Sturm. M. 402, 7. Redt. 160 — 2 ed. 320.
Te Hillegom in Maart en Mei onder mos, Kink.
- Olibrus** ERICHS.
- 740 *Corticalis*, Pauz. N. n. 467. M. 404, 1. Redt. 160 — 2 ed. 321.
In April bij Heemstede en den Haag op de eerste bloemen, v. V. — In de omstreken van Utrecht, v. Hass. — In Dec. onder eikenschors in het Valkenburg te Breda, Heyl. *negem = 10*
- 741 *Aeneus*, F. N. n. 468. M. 404, 3. Redt. *ibid*.
Niet zeldzaam op voorjaarsbloemen, v. V. — In Febr. en Maart bij Amst. en Hillegom, Kink. — In Oct. te Driebergen, Six.
- 742 *Bicolor*, F. N. n. 469. M. 404, 4. Redt. 161 — 2 ed. 321.
Gemeen in paardenbloemen in het voorjaar, v. V. — Bij Utrecht in September en te Driebergen in October, Six.
- *743 *Affinis*, Sturm. N. n. 470. M. 404, 8. Redt. *ibid*.
In Sept. bij Scheveningen, v. Br. — In Julij bij den Haag, v. V. — Te Amsterdam en Hillegom in April onder rottend riet en ruigte, Kink. -- Omstreken van Utrecht, Six.
- *744 *Millefolii*, Payk. N. n. 471. M. 404, 10. Redt. 161 — 2 ed. 322.
In September bij Scheveningen, v. Br.
- 745 *Geminus*, Illig. N. n. 472. M. 404, 12. Redt. 161 — 2 ed. 322.
Bij Rotterdam in April op gras, Snell. — In Augustus bij Heemstede, v. V.

Cercus LATR.

- 746 *Pedicularius*, L. N. n. 473. M. 405, 1. Redt. 162 — 2 ed. 323.
 Vrij gemeen in Zuid-Holland, v. V. — Bij Rotterdam op een'
 dooden rat in Junij, Sn. — Bij Wassenaar, Piaget. — In April
 aan de oevers van den Schinkel bij Amsterdam, in het gras, Kink. —
 Bij Utrecht in April, Six. — In Gelderland, v. W. — Bij Breda,
 Heyl. — Op Walcheren, G. — Te Groningen, de Gav.

Brachypterus KUGEL.

- *747 *Gravidus*, Ill. N. n. 474. M. 406, 1. Redt. 162 — 2 ed. 324.
 Eenmaal aan de Vogelenzang in menigte gevonden in de bloemen
 van *Anthirrhinum linaria*, v. V.
 *748 *Pubescens*, Er. N. n. 475. M. 406, 18. Redt. *ibid.*
 Op de bloesem van brandnetelen bij Leyden, v. V. — Bij Am-
 sterdam en Velsen in Junij, Kink.
 749 *Urticae*, F. N. n. 476. M. 406, 18. Redt. *ibid.*
 In Augustus op bloeiende brandnetelen, Sn. en v. V.
 *750 *Rubiginosus*, Er. Bijvoegs. n°. 476^a. M. 406, 21. Redt. 2 ed. 324.
 Bij Utrecht, Six.

Carpophilus LEACH.

- 751 *Hemipterus*, L. N. n. 477. M. 407, 5. Redt. 2 ed. 325.
 Door den heer van Iterson in den Haag op vijgen gevonden. —
 In vijgentonnen te Rotterdam, Snell. — In October te Leyden
 gevangen, v. V.

Epuraea ERICHS.

- *752 *Decemguttata*, F. Bijvoegs. n°. 477^a. M. 409, 1. Redt. 164 — 2 ed. 325.
 Eenmaal bij Breda, Snell. — Bij Cuyk in Aug., Everts.
 753 *Aestiva*, L. N. n. 478. M. 409, 4. Redt. 165 — 2 ed. 326.
 In paardebloemen, v. V. — Bij Utrecht in Mei, Six. — In
 het Overmaassche land, Piag. — In Mei bij Amsterdam en Hille-
 gom, Kinker.
 *754 *Obsoleta*, F. N. n. 479. M. 409, 12. Redt. 164 — 2 ed. 326.
 Bij Leyden in April, v. V.
 *755 *Parvula*, Sturm. Bijvoegs. n°. 479^a. M. 409, 14. Redt. 164 — 2 ed. 326.
 Bij Utrecht, Six.
 756 *Pusilla*, Ill. M. 409, 18. Sturm. tab. 295, D. Redt. 165 — 2 ed. 326.
 Bij Driebergen, Six.

Nitidula F.

757 *Bipustulata*, L. N. n. 480. M. 410, 1. Redt. 165 — 2 ed. 328.
Deze soort, in Holland nog niet gevangen, schijnt vrij gemeen in Gelderland. — In Junij vrij gemeen te Brummen, v. W. — In Junij bij Voorst, v. V. — Bij Utrecht en Zwolle, V. — Bij Hoogeveen. Steenb.

*758 *Quadripustulata*, F. M. 410, 4. Redt. *ibid.*
Twee voorwerpen in Julij gevonden in de duinen van Scheveningen op een' dooden egel, Everts.

Soronia ERICHS.

759 *Punctatissima*, Illig. M. 411, 1. Redt. 166 — 2 ed. 328. Sturm. D. Ins. Tab. 299 A.
In Aug. op Schothorst nabij Amersfoort, v. V. — Bij Haarlem, Rits — In December onder de schors der populieren in Noord-Brabant, Heyl.

760 *Grisea*, L. N. n. 481. M. 411, 3 Redt *ibid.*
Onder de schors van dennen, de Haan. — Onder wilgenschors, Sn. — Te Hillegom in Maart onder mos, Kink. — In Julij bij den Haag, v. d. W. — Bij Utrecht in Julij, Six. — In menigte op pruimen in Sept. te Houten, Wtt.

Amphotis ERICHS.

*761 *Marginata*, F. M. 412, 1. Redt. 166 — 2 ed. 329.
Te Bloemendaal bij Haarlem, Groll. — Te Noordwijk in April en te Velzen in Mei in de nesten van *Formica fuliginosa*, Kink.

Omosita ERICHS.

762 *Colon*, L. N. n. 482. M. 413, 2. Redt. 167 — 2 ed. 329.
Gemeen in krogen in Zuid-Holland, v. V. — Te Amsterdam aan den IJkant, in September, Kink.

763 *Discoidea*, F. Bijvoegs. n^o. 482^a. M. 413, 3. Redt. *ibid.*
In April bij Amsterdam, Kink. — In April te Utrecht, Six. — In November onder een hoop beenderen bij den Haag, Everts.

Thalycra ERICHS.

*764 *Sericea*, Sturm. N. n. 490. M. 414, 1 (*Fervida* OL). Redt. 171 — 2 ed. 329.
Eenmaal in Julij te Brummen, v. V. — Te Overveen in Junij, Kink.

Pria KIRB.

765 *Dulcamarae*, Ill. N. n. 483. M. 415, 1. Redt. 167 — 2 ed. 331.
In Maart bij Heemstede, v. V.

Meligethes KIRB.

*766 *Rufipes*, Gyll. N. n. 484. M. 416, 1. Redt. 168 — 2 ed. 331.
Bij Rotterdam, Gijsb. H.

- 767 *Aeneus*, F. N. n. 485. M. 416, 11. Redt. *ibid.*
 Zeer gemeen, het geheele jaar door in velerlei bloemen te vinden.
- 768 *Viridescens*, F. N. n. 486. M. 416, 18. Redt. *ibid.*
 Als de vorige.
- *769 *Symphyti*, Heer. N. n. 487. M. 416, 32. Redt. 168 — 2 ed. 332.
 Bij Rotterdam gemeen, Gijsb. H. — Bij Zeist, Mart.
- *770 *Difficilis*, Heer. N. n. 488. M. 416, 35. Redt. 169 — 2 ed. 332.
 Bij den Haag, v. d. W.
- *771 *Viduatus*, Sturm. M. 416, 42. Redt. *ibid.*
 In het gras aan den IJkant bij Amsterdam in April, Kink.
- *772 *Umbrosus*, Sturm. N. n. 489. M. 416, 54. Redt. 169 — 2 ed. 333.
 Bij Rotterdam, Gijsb. H.
- *773 *Maurus*, Sturm. Bijvoegs. n^o. 489^a. M. 416, 55. Redt. *ibid.*
 Op de bloesems van het pijpkruid in Junij bij Rotterdam, Snell.
- *774 *Incanus*, Sturm. M. 416, 56. Redt. 2 ed. 335.
 In Augustus aan den oever van den Schinkel bij Amst., Kink.
- *775 *Flavipes*, Sturm. M. 416, 73. Redt. 2 ed. 334.
 Te Hillegom in Mei op bloesem van lijsterbessen, Kink.

Cychramus KUG.

- *776 *Luteus*, F. M. 419, 2. Redt. 171 — 2 ed. 337. Panz. *Faun.* 83, 3. Shuck. pl. 29.
 In een dennenbosch bij Breda in Julij, Heyl.

Cryptarcha SHUCK.

- 777 *Strigata*, F. N. n. 491. M. 422, 1. Redt. 172 — 2 ed. 338.
 Onder boomschors in Julij bij den Haag, v. d. W. — In Mei bij Breda, Snell.

Ips F.

- *778 *Quadripunctata*,
 Herbst. Bijvoegs. 492^a. M. 423, 2. Redt. 173 — 2 ed. 338.
 Bij Hoogeveen, Steenb.
- *779 *Ferruginea*, L. N. n. 492. M. 423, 4. Redt. *ibid.*
 Bij Brummen, v. Itt. en v. W.

Rhizophagus HERBST.

- 780 *Depressus*, F. N. n. 493. M. 424, 3. Redt. 174 — 2 ed. 339.
 Bij den Haag in Mei, v. V. — Onder dennenbast bij Hillegom in Maart, Kink. — Bij Amersfoort, zeldzaam, v. W.
- *781 *Ferrugineus*, Payk. N. n. 494. M. 424, 6. Redt. 174 — 2 ed. 340.
 Eenmaal bij Brummen, v. V. — In Zeeland, de Bruyne.
- *782 *Parallellocollis*,
 Gyll. Bijvoegs. 494^a. M. 424, 8. Redt. *ibid.*
 In Holland onder dennenbast, de Haan. — In Julij onder boomschors bij Breda, Heyl.

- *783 *Dispar*, Payk. | Bijvoegs. 494^b. M. 424, 10. Redt. 174 — 2 ed. 339.
Op rottende wortelen bij Utrecht, Six.
- *784 *Bipustulatus*, F. | M. 424, 11. Redt. *ibid.*
In Julij in het Haagsche bosch onder beukenschors, Everts.

Trogosita OLIV.

- 785 *Mauritanica*, L. | N. n. 495. M. 427, 1. Redt. 175 — 2 ed. 342.
Te Brummen en te Leyden, v. V. — In laatstgenoemde stad, Drechsler. —
Te 's Gravenhage, v. d. W. — Te Groningen in Junij, de Gav.

Sarrotrium ILLIG.

- 786 *Clavicornis*, L. | N. n. 496. M. 430, 1. Redt. 177 — 2 ed. 341.
Op de duinen bij Katwijk en Scheveningen, v. V. — Eenige
voorwerpen bij Wassenaar, v. d. W. — Vrij gemeen in de Meerder-
voortsche duinen bij den Haag in Junij, Everts.

Bothrideres DEJ.

- *787 *Contractus*, F. | N. n. 497. M. 447, 1. Redt. 182 — 2 ed. 349.
Eenmaal bij Leyden, v. V.

Cerylon LATR.

- *788 *Histeroides*, F. | Bijvoegs. n^o. 497^a. M. 452, 1. Redt. 181 — 2 ed. 351.
Bij Utrecht onder dennenbast in Junij, Six.

Laemophloeus ERICHS.

- *789 *Ferrugineus*, | N. n. 498 (*ferr.* Cr). M. 459, 13. Redt. 185 — 2 ed. 354.
Steph. | Te Utrecht eenige exemplaren in het abdomen van een' dooden
Hylotrupes bajulus, V. — In Junij te Leyden, v. V.
- 790 *Pusillus*, Sch. | M. 459, 12. Redt. 185 — 2 ed. 354.
In rijst gevonden, de Haan.
- *791 *Corticinus*, Er. | M. 459, 20. Redt. 2 ed. 355.
In een pakhuis van victualien te Amsterdam, Kink.

Pediacus SHUCK.

- *792 *Dermestoides*, F. | N. n. 499. M. 461, 2. Redt. 185 — 2 ed. 355.
Op Walcheren, G. — In Julij op een zolder te Rotterdam, Snell.

Sylvanus LATR.

- 793 *Frumentarius*, F. | N. n. 500. M. 463, 1. Redt. 186 — 2 ed. 357.
In Friesland, G. — In den Haag op vijgen aangetroffen door den heer
van Iterson. — In Februarij op de Glijphoeve op de provisiekamer, v. V. —
Te Rotterdam, Snell. — Meermalen te Leyden, v. V. — In rijst, de Haan.

Psammoeus BOUD.

- 794 *Bipunctatus*, F. | Bijvoegs. 500^a. M. 467, 1. Redt. 187 — 2 ed. 356.
Bij Rotterdam op half vergaen riet in Sept. tamelijk gemeen en
ter zelfder plaatse in April binnen in het riet, Snell.

Telmatophilus HEER.

- 795 *Typhae*, Fall. N. n. 502. M. 468, 2. Redt. 189 — 2 ed. 360.
In groene biezen bij Rotterdam, Snell. — In Februarij bij Amsterdam, onder afgestorven riet, Kink.
- *796 *Caricis*, Oliv. M. 468, 3 (*Obscurus*). Redt. 189 — 2 ed. 360.
In April bij Amsterdam onder afgebroken rietstengels, Kink.

Antherophagus KNOCH.

- 797 *Nigricornis*, F. N. n. 503. M. 469, 1. Redt. 189 — 2 ed. 360.
Zeldzaam te Brummen, v. W. — Bij Driebergen in Junij op jasmijn, Six.
- 798 *Silaceus*, Herbst. M. 469, 2. Redt. *ibid.* Erichs. *Ins. D.* III, pag. 344, n^o. 2.
~~De~~ Eermaal bij Utrecht, Six. — Bij Wassenaar in Julij, Piag.
- 799 *Pallens*, Oliv. N. n. 504. M. 469, 3. Redt. 190 — 2 ed. 360. *afgek. bij riet als *Spizzen* lastacten*
Tamelijk gemeen in Zuid-Holland, v. V. — In Mei bij Utrecht, Wtt. en Six.

Cryptophagus HERBST.

- 800 *Lycoperdi*, F. N. n. 505. M. 472, 1. Redt. 190 — 2 ed. 361.
Bij Utrecht in paddestoelen, V. — Bij den Haag, v. d. W. en v. V. — In Aug. te Soest in champignons, Kink. — In Aug. op de Glijphoeve in een bovist, v. V.
- 801 *Pilosus*, Gyll. N. n. 506. M. 472, 8. Redt. 190 — 2 ed. 361.
Bij Leyden in Junij, v. V.
- *802 *Scanicus*, L. Bijvoegs. 506^a. M. 472, 16. Redt. 191 — 2 ed. 362.
Bij Utrecht, Six. — In April bij Amsterdam, Kink. — In Dec. onder boomschors te Burgst, Heyl.
- 803 *Badius*, Sturm. N. n. 507. M. 472, 17. Redt. 191 — 2 ed. 361.
In April bij Heemstede, v. V. — Bij Utrecht, Six. — In een paddestoel bij Amsterdam in Mei, Kink.
- 804 *Affinis*, Sturm. Bijvoegs. n^o. 507^a. M. 472, 21. Redt. 192 — 2 ed. 363.
Bij Utrecht in Mei, Six.
- *805 *Cellaris*, Scop. N. n. 508. M. 472, 23. Redt. 192 — 2 ed. 363.
In Zuid-Holland v, V.
- 806 *Acutangulus*, Gyll. M. 472, 24. Redt. 192 — 2 ed. 362.
Bij Driebergen, v. Bemm.
- *807 *Dentatus*, Herbst. N. n. 509. M. 472, 31. Redt. 193 — 2 ed. 363.
Bij Amsterdam in Mei, Kink. — In April bij den Haag, in Aug. op de Glijphoeve, v. V.
- *808 *Distinguendus*, Sturm. N. n. 510. M. 472, 33. Redt. 192 — 2 ed. 363.
Tweemaal bij Leyden gevangen, v. V.

- *809 *Vini*, Panz. N. n. 511. M. 472, 42. Redt. 191 — 2 ed. 362.
In September bij Scheveningen, v. Br.
- 810 *Crenulatus*, Er. M. 472, 44. Erichs. *Ins. D.* III. 369, 23. Redt. 191 — 2 ed. 362.
In de omstreken van Utrecht, v. Hass.
- *811 *Serratus*, Gyll. N. n. 512. M. 472, 57. Redt. 193 (*Paramecosoma*) — 2 ed. 364.
Bij Leyden, v. V.

Paramecosoma CURT.

- *812 *Pilosula*, Er. N. n. 512*. M. 474, 2. Redt. 2 ed. 365.
In September bij Scheveningen, v. Br.

Atomaria KIRBY.

- 813 *Linearis*, Steph. M. 476, 17. Redt. 195 — 2 ed. 367.
In het gras aan den IJkant bij Amsterdam in Mei, Kink.
- 814 *Mesomelas*, Herbst. N. n. 513. M. 476, 20. Redt. *ibid.*
Bij Rotterdam in Sept., Snell. — Bij Leyden, v. V. — Bij Amst.
aan den IJkant onder aangespoelde ruigte in Maart en Aug., Kink.
- *815 *Gutta*, Steph. M. 476, 21. Redt. 195 — 2 ed. 368.
In Februarij onder aangespoeld riet aan den oever van den
Schinkel, Kinker.
- 816 *Fuscipes*, Gyll. N. n. 514. M. 476, 23. Redt. 195 — 2 ed. 367.
Bij Leyden in het gras, v. V. — Met den vorigen in Febr., Kink.
- *817 *Basalis*, Er. M. 476, 32. Redt. 196 — 2 ed. 369.
Te Rozenburg bij Amsterdam in Maart onder mos, Kink.
- *818 *Atra*, Herbst. N. n. 515. M. 476, 34. Redt. *ibid.*
In Maart te Noordwijk onder dorre bladeren, Kink.
- 819 *Fuscata*, Schh. M. 476, 37. Redt. 195 — 2 ed. 368. Sturm. *D. Ins.*, XVIII, 43. t. 334 A.
In Sept. aan den IJkant, Kink. — In Augustus bij Utrecht, Six.
- *820 *Salicicola*, Kratz. M. 476, 39. Redt. 2 ed. 367.
Bij Amst. en te Noordwijk in Maart onder dorre bladeren, Kink.
- *821 *Apicalis*, Er. M. 476, 40. Redt. 2 ed. 368.
In Maart te Noordwijk onder afgevallen bladeren, Kink.
- 822 *Atricapilla*, Steph. M. 476, 44. Redt. 196 (*nigriceps* Er.) — 2 ed. 369.
In April onder kruiden in de omstreken van Amsterdam, Kink.
- *823 *Pusilla*, Payk. N. n. 516. M. 476, 45. Redt. 196 — 2 ed. 369.
Vier voorwerpen in Augustus te Brummen, v. V.
- *824 *Terminata*, Com. M. 476, 49. (*ruficornis* Marsh.) Redt. 196 — 2 ed. 369.
In Maart te Rozenburg bij Amsterdam in mos, Kink.

Epistemus WESTW.

- 825 *Globosus*, Waltl. M. 477, 1. Redt. 197 — 2 ed. 370.
In de maanden Maart en April onder ruigte aan den oever van
den Schinkel bij Amsterdam, Kink. *11. 11. 1861. Six.*

- 826 *Dimidiatus*, Steph. | M. 477, 2 (*gyrinoides* Mars.). Redt. ibid.
Met den vorigen, Kink.
- Lathridius** HERBST.
- 827 *Lardarius*, de G. | N. n. 520. M. 486, 1. Redt. 205 — 2 ed. 381.
In huizen binnen Leyden en in Mei op de Glijphoeve, v. V. —
Te Amsterdam in Maart, Kink.
- *828 *Angusticollis*, | Bijvoegs. n^o. 520^b. M. 486, 5. Redt. 205 — 2 ed. 382.
Gyll. Twee exemplaren bij Utrecht, Six.
- 829 *Carinatus*, Gyll. | Bijvoegs. n^o. 520^a. M. 486, 15. Redt. 205 — 2 ed. 381.
Bij Utrecht, Six.
- *830 *Exilis*, Mannh. | Bijvoegs. n^o. 523^a. M. 486, 21. Redt. 206 — 2 ed. 382.
Bij Utrecht, Six.
- *831 *Nanulus*, Mannh. | N. n. 521. M. 486, 22. Redt. ibid.
In huizen in den Haag in menigte, v. V. — Te Brummen bij
honderden, v. Itt. — Te Zutphen, v. Eyndh.
- 832 *Transversus*, Oliv. | N. n. 522. M. 486, 29. Redt. 207 — 2 ed. 384.
Bij Zeist, Mart. — Meermalen in den Haag, v. V. — Bij Am-
sterdam en Hillegom in Maart onder mos, Kink. — In December
onder den bast der eiken te Burgst, Heyl.
- 833 *Minutus*, L. | N. n. 523. M. 486, 31. Redt. 206 — 2 ed. 383.
Bij Haarlem in Mei, Kink. — Te Brummen in groot aantal, v.
Itt. — Te Leyden meermaals en op de Glijphoeve in Junij en Aug.
v. V. — Bij den Haag, v. d. W. — Bij Utrecht, v. Hass. — In
Maart te Rotterdam in menigte, Snell.
- *834 *Nodifer*, Westw. | M. 486, 46 (*testaceus* Steph.)
In April aan den oever van den Schinkel, Kink. Friedr. v. d. ...
Zutphen 1850
- Corticaria** MARSH.
- *835 *Pubescens*, Ill. | N. n. 524. M. 487, 1. Redt. 208 — 2 ed. 385.
In Friesland, G. — In Julij bij den Haag, v. V.
- *836 *Piligera*, Mannh. | M. 487, 2. Redt. 210 — 2 ed. 387.
In Februarij en Maart te Noordwijk en bij Amsterdam onder aan-
gespoeld riet, Kink.
- 837 *Bella*, Redt. | M. 487, 17. Redt. 2 ed. 386.
In Maart bij Amsterdam onder mos, Kink.
- 838 *Gibbosa*, Herbst. | N. n. 525. M. 487, 42. Redt. 211 — 2 ed. 388.
Gemeen in Maart te Amsterdam, Kink. — Te Leyden en in Aug.
te Heemstede, v. V.
- 839 *Transversalis*, | N. n. 526. M. 487, 43. Redt. ibid.
Gyll. In Zuid-Holland, v. d. W. — In Maart bij den Haag, Snell. —
In Mei op de Glijphoeve, v. V. — Bij Utrecht, Six.

- *840 *Fuscula*, Meg. N. n. 527. M. 487, 51. Redt. 212 — 2 ed. 389.
In September bij Scheveningen v. Br.
- *841 *Trifoveolata*, Redt. N. n. 528. M. 487, 51. v. Redt. 211 — 2 ed. 388.
Aldaar met den vorigen, v. Br. — In Maart onder mos bij Amsterdam, Kink.
- *842 *Similata*, Gyll. M. 487, 52. Redt. 212 — 2 ed. 389.
Te Hillegom in Februarij onder mos, Kink. *J. Hag. Riv.*
- *843 *Truncatella*, Mannh. N. n. 529. M. 487, 56. Redt. 211 — 2 ed. 389.
In September te Scheveningen, v. Br. — In Maart te Hillegom onder mos, Kink.

Monotoma HERBST.

- *844 *Picipes*, Herbst. M. 489, 8. Redt. 203 — 2 ed. 378.
In April onder aangespoeld riet aan den oever van het IJ bij Amsterdam, Kink. — Te Haarlem in Mei, Groll.
- *845 *Quadricollis*, Aubé. M. 489, 12. Redt. 203 — 2 ed. 378.
In Mei onder bladeren te Nieuw-Rozenburg, Kink.

Mycetaea STEPH.

- 846 *Hirta*, Marsh. N. n. 517. M. 491, 1. Redt. 197 — 2 ed. 371.
Eenige exx. op kurken van Madera-flesschen te Utrecht, V. — Ook op kurken in een' kelder te 's Gravenhage, v. V. — Aldaar, Everts. — Te Leyden, de Gav.

Mycetophagus HELLW.

- *847 *Piceus*, F. N. n. 530. M. 494, 2. Redt. 214 — 2 ed. 391.
Bij Rotterdam, Gijsb. H.
- *848 *Multipunctatus*, Hellw. M. 494, 5. Redt. *ibid.*
Onder boomschors te Amsterdam, Groll.

Triphyllus MEG.

- *849 *Punctatus*, F. N. n. 531. M. 495, 1. Redt. 214 — 2 ed. 392.
Eenmaal in Julij in het Haagsche bosch, v. V. — Ter zelfder plaatse op boomzwam in Julij, Everts.
- 850 *Ferrugineus*, Marsh. Shuck. *Col. delin.* 26, 236. Pl. XXXI, fig. 5.
In Julij bij den Haag, Everts.

Typhaea KIRBY.

- 851 *Fumata*, L. N. n. 532. M. 449, 1. Redt. 215 — 2 ed. 393.
Bij den Haag, v. V. — Bij Noordwijk in Maart, Kinker.

Byturus LATR.

- 852 *Fumatus*, L. N. n. 533. M. 504, 1 (*Sambuci* Scop.). Redt. 216 — 2 ed. 395.
Gemeen in Noord- en Zuid-Holland, v. V. — In Friesland, G. — Bij Rotterdam, Snell. — Gemeen in de Haagsche duinen in Mei, Piaget en Snell. — Te Haarlem in Mei op bloesem van *Rubus*, Kink. — Te Haren, de Gav. — Deze soort treft men meer op den bloesem van ranonkeltjes en bramen aan, de volgende meer op framposen.
- 853 *Tomentosus*, F. N. n. 534. M. 504, 2. Redt. *ibid.*
Even gemeen als de vorige. — Utrecht, Six. — Voorst, Wtt.

Dermestes L.

- 854 *Vulpinus*, F. N. n. 535. M. 505, 1. Redt. 218 — 2 ed. 397.
Twee voorwerpen bij den Haag, Sn. — Bij Katwijk, v. V. — Te Breda, Heyl.
- *855 *Frischii*, Kug. N. n. 536. M. 505, 5. Redt. *ibid.*
In September bij Scheveningen, v. Br. — Te Haarlem, Buse.
- *856 *Murinus*, L. N. n. 537. M. 505, 8. Redt. 217 — 2 ed. 396.
Bij Amersfoort en Brummen, v. W. — Bij den Haag, v. d. W.
- *857 *Undulatus*, Brahm. N. n. 538. M. 505, 14. Redt. 218 — 2 ed. 397.
Bij den Haag, v. d. W. — Bij Brummen, v. Itt. — Te Haarlem, Buse.
- *858 *Laniarius*, Ill. N. n. 539. M. 505, 18. Redt. *ibid.*
Eenmaal bij Leyden, v. V.
- 859 *Lardarius*, L. N. n. 540. M. 505, 23. Redt. 217 — 2 ed. 396.
Algemeen bekend en lastig in de plaatsen waar men varkensvleesch en spek bewaart.

Attagenus LATR.

2207. 860 *Pellio*, L. N. n. 541. M. 506, 1. Redt. 218 — 2 ed. 398.
Zeer gemeen in het voorjaar. — Groningen, de Gav.

Megatoma HERBST.

- 861 *Undata*, L. N. n. 542. M. 507, 1. Redt. 219 — 2 ed. 398.
In de vederen van een opgezette vogel, v. V. — Te Brummen, v. Itt. en v. W. — Twee exemplaren op een zolder, Snell. — Bij Utrecht, Six.

Tiresias STEPH.

- *862 *Serra*, F. N. n. 547. M. 510, 1. Redt. 223 — 2 ed. 400.
Een paar bij Brummen, v. W.

Anthrenus GEOFFR.

- *863 *Scrophulariae*, L. N. n. 543. M. 511, 1. Redt. 221 — 2 ed. 400.
Op appel- en perenbloesem, v. V. — Te Breda, Heyl.
- 864 *Pimpinellae*, F. N. n. 544. M. 511, 3. Redt. 221 — 2 ed. 401.
Vrij zeldzaam in Holland, v. V. — In de omstreken van Arnhem en in Julij te Brummen, v. V. — Ter laatstgenoemde plaats, v. V. Itt. — In Julij te Beek bij Nijmegen, Dr. Rombouts.
- 865 *Varius*, F. Bijvoegs. n^o. 544^a. M. 511, 6. Redt. ibid.
In Julij in den Haag een en bij Leyden drie voorwerpen, v. V.
- 866 *Musaeorum*, L. N. n. 545. M. 511, 9. Redt. ibid.
Zeer gemeen in huizen in Junij en Aug., alsmede op bloemen vooral van *Spiraea*; schadelijk in verzamelingen van natuurlijke geschiedenis.
- 867 *Claviger*, Er. N. n. 546. M. 511, 12. Redt. ibid.
Met den vorigen, doch minder algemeen.

Byrrhus L.

- 868 *Pilula*, L. N. n. 550. M. 517, 18. Redt. 229 — 2 ed. 406.
Bij Leyden, v. V. — Bij Woerden, de Gr. — Bij Brummen, v. W. en v. Itt. — In Maart onder eikenschors in de omstreken van Breda, Heyl.
- *869 *Arietinus*, Steff. Bijvoegs. n^o. 550^a. M. 517, 18. Redt. ibid.
Bij Gieten of Rolde in Drenthe, Gock. — Met den vorigen te Breda, Heyl.
- 870 *Fasciatus*, F. N. n. 551. M. 517, 20. Redt. ibid.
Eenmaal in Holland, v. V. — Bij Zeist, Mart. — Met de varieteit *Cinctus*, St. en *Dorsalis*, Pz. bij Brummen, v. W.
- 871 *Dorsalis*, F. N. n. 552. M. 517, 22. Redt. ibid.
Bij Brummen, v. W. — In Maart te Breda onder den schors der boomen, Heyl. — In April te Leyden en in Julij bij Rozendaal in Gelderland, v. V. *Apr. d. Bildt bij v. G.*
- 872 *Murinus*, F. M. 517, 23. Redt. 229 — 2 ed. 406.
In April aan de Bildt bij Utrecht, Six.

Cytilus ERICHS.

- 873 *Varius*, F. N. n. 553. M. 518, 1. Redt. 229 — 2 ed. 407.
Bij Leyden, Utrecht en bij Heemstede in Mei aan grashalmen v. V. — Bij Leyden of Katwijk, Kopp. — Onder den bast der eiken in Maart bij Breda, Heyl.

Morychus ERICHS.

- 874 *Aeneus*, F. N. n. 554. M. 519, 1. Redt. 230 — 2 ed. 407.
Bij Zeist op de heide, op de duinen bij den Haag en te Noord-
wijk, in April, v. V. — In Junij bij Driebergen, Six.
- *875 *Nitens*, Panz. N. n. 555. M. 519, 4. Redt. *ibid.*
Bij Brummen, v. W. — Bij den Haag, v. d. W. — Op de
heide bij Zeist, v. V.

Simplocaria MARSH.

- 876 *Semistriata*, F. N. n. 549. M. 520, 1. Redt. 226 — 2 ed. 408.
Eenmaal in Maart tegen het huis op de Glijphoeve, v. V. — In de
omstreken van Rott. in Mei, Snell. — Te Haren in April, de Gav.

Linnichus LATR.

- *877 *Pygmaeus*, Strm. N. n. 548. M. 521, 3. Redt. 225 — 2 ed. 409.
Eenmaal in September op riet bij den Cruquius, v. V.

Georyssus LATR.

- 878 *Pygmaeus*, F. Bijvoegs. n^o. 547^a. M. 523, 1. Redt. 223 — 2 ed. 410.
Tweemaal in Utrecht en aan de Bildt in Julij, Six.

Parnus F.

- 879 *Prolifericornis*, F. N. n. 556. M. 525, 1. Redt. 137 — 2 ed. 411.
In Junij op de Glijphoeve, v. V. — Bij Utrecht, Six. — Bij
Leyden, Kopp. — In de omstreken van Katwijk, de Gr.
- *880 *Lutulentus*, Er. M. 525, 6. Redt. 2 ed. 411.
Aan de Bildt in Julij, Groll.
- 881 *Auriculatus*, Ill. N. n. 557. M. 525, 12. Redt. 137 — 2 ed. 411.
Bij Leyden niet zeldzaam, v. V. en Kopp. — In de omstreken
van Amsterdam in April, Kink. — Bij Utrecht, V. en Six.
- *882 *Nitidulus*, Heer. M. 525, 13. Redt. 2 ed. 412.
Te Utrecht in Julij, Groll.

Elmis LATR.

- 883 *Parallelopedus*,
Müll. Bijvoegs. n^o. 557^a. M. 527, 14. Redt. 138 — 2 ed. 413.
Vrij gemeen in eene beek te Driebergen in September, Six.
- 884 *Tuberculatus*,
Müll. M. 527, 18. Redt. 137 — 2 ed. 413.
In April in de omstreken van Utrecht, Groll.

Heterocerus F.

- *885 *Femoralis*, Kies. M. 531, 5. Redt. 139 — 2 ed. 415.
Te Muiderberg in Augustus aan het strand onder zeewier, Kink.
- 886 *Marginatus*, F. M. 531, 6. Redt. 139 — 2 ed. 416.
Bij Utrecht, Six.

- *887 *Hispidulus*, Kies. N. n. 558. M. 531, 11. Redt. 139 — 2 ed. 416.
Eenmaal, v. V. — (Zie ook Kiesenwetter in Germar's *Zeitschrift*, IV, p. 212.)
- *888 *Obsoletus*, Curt. M. 531, 14. Redt. 139 — 2 ed. 416. Curtis, *Brit. Ent.* 224.
In Maart onder aangespoeld riet aan den zeedijk bij Amst., Kink.
- 889 *Laevigatus*, Panz. M. 531, 16. Redt. *ibid.*
Bij Amsterdam in Maart en April onder aangespoeld riet aan den IJkant, Kinker.

LAMELLICORNIA.

Lucanus L.

- 890 *Cervus*, L. N. n. 560 en 561 (*Capreolus*). M. 532, 1. Redt. 243 — 2 ed. 417.
In het Soerensche bosch en aan de Steeg, V. — Bij Patten, de zonen van den heer Schubärt. — Te Beekbergen in Julij, v. Eyndh. — Bij Dieren en Delden, W. — Bij Hoogeveen, Steenb. — Bij Deventer, M. Breukelman. — Bij Brummen, Dr. Ontijd.
De varieteit *Capreolus* bij Breda gevangen, Gijsb. H.

Platycerus GEOFFR.

- 891 *Caraboides*, L. N. n. 559. M. 534, 1. Redt. 242 — 2 ed. 417.
Bij Brummen, v. W. en v. V. — Bij Zeist, V. — Bij Amersfoort, v. W. — Bij den Haag, v. d. W.

Sinodendron F.

- *892 *Cylindricum*, L. Bijvoegs. n°. 561^a. M. 537, 1. Redt. 245 — 2 ed. 419.
Bij Amersfoort, Drechsler.

Copris GEOFFR.

- 893 *Lunaris*, L. N. n. 568. M. 541, 2. Redt. 248 — 2 ed. 421.
Volgens Voet in Nederland, maar vooral in Friesland. — Bij Brummen, v. W. — Bij Zutphen, v. Eyndh. — Zes exx. in koe-mest in de duinen bij Scheveningen, Everts.

Oonthophagus LATR.

- 894 *Coenobila*, Herbst. N. n. 569. M. 544, 16. Redt. 250 — 2 ed. 423.
Bij Leyden en op de Gliphoeve, v. V. — Bij Katwijk, Kopp. — Bij Utrecht, Six. — Bij Rotterdam zeldzaam, Snell.
- 895 *Fracticornis*, F. N. n. 570. M. 544, 17. Redt. 250 — 2 ed. 424.
Zeer gemeen op de duinen bij Katwijk in mest, v. V. — Bij den Haag in de duinen gemeen, Sn. — Bij Amersfoort in Junij, v. V. — Bij Zeist in Mei en te Velp in Julij, Kink. — In Gelderl. en te Roermond, Snell. — Beide sexen te Rocagne, Piag. — Bij Groningen, de Gav.

- + 896 *Nuchicornis*, L. N. n. 571. M. 544, 21. Redt. 251 — 2 ed. 424.
Op de duinen bij Katwijk, v. V. — Te Woerden, de Gr. — In den Bommelerwaard, v. d. W. — In Mei bij Brummen, v. V. — Bij Utrecht, v. Hass. — Omstreken van Leyden, Kopp.
- *897 *Ovatus*, L. N. n. 572. M. 544, 39. Redt. 250 — 2 ed. 423.
Eenmaal bij Leyden, v. V.
- Aphodius** L.L.
- 898 *Erraticus*, L. N. n. 573. M. 546, 1. Redt. 252 — 2 ed. 425.
In Zuid-Holland, v. V. — Omstreken van Utrecht, Six. — Bij Brummen, v. Itt.
- 899 *Subterraneus*, L. N. n. 574. M. 546, 3. Redt. 253 — 2 ed. 426.
Bij Rotterdam, Snell. — In Maart bij den Haag, in Mei en Julij bij Heemstede en in Aug. te Velp, v. V. — Bij Leyden, Kopp. — Aan het zeestrand, de Haan, — Aan de Vogelenzang in Mei, Kink.
- 900 *Fossor*, L. N. n. 576. M. 546, 4. Redt. *ibid.*
Niet zelden in Holland, v. V. — Bij Rotterdam, Sn. — In Mei bij den Haag, v. d. W. — Te Utrecht, Six. — Bij Breda, Heyl. — Bij Hoogeveen, St. — Te Groningen, de Gav.
- *901 *Haemorrhoidalis*, L. N. n. 575. M. 546, 5. Redt. *ibid.*
In Zuid-Holland, v. V. — Gemeen bij Rotterdam, Sn. — In Augustus tusschen het gras aan den oever van den Schinkel bij Amsterdam, Kink.
- 902 *Scybalarius*, F. N. n. 577. M. 546, 8. Redt. 255 — 2 ed. 427.
Omstreken van Leyden, Kopp. — Op de Glijphoeve in April, v. V. — Te Groningen en bij Arnhem in Julij, de Gav.
De varieteit *Conflagratus* vrij gemeen in het voorjaar op de duinen bij den Haag, v. V.
- *903 *Foetens*, F. N. n. 578. M. 546, 9. Redt. *ibid.*
In koeijen- en paardenmest, doch zeldzaam, v. V. — Bij Hoogeveen, Steenb.
- 904 *Fimelarius*, L. N. n. 579. M. 546, 11. Redt. *ibid.*
Alom zeer gemeen, vooral in het voorjaar.
- 905 *Terrestris*, F. N. n. 580. M. 546, 14 (*Ater*, de Geer). Redt. 256 — 2 ed. 428.
Niet gemeen. — Bij Leyden, v. V. — In Mei bij den Haag, v. d. W. — In Maart aan den oever van den Schinkel, Kink. — Bij Linschoten, Piag.
- + 906 *Granarius*, L. N. n. 581. M. 546, 17. Redt. 254 — 2 ed. 427.
Zeer gemeen in het voorjaar, v. V. — Bij Leyden, Kopp. — Bij Rotterdam, Sn. — Bij Amsterdam en Hillegom in Mei, Kink. — Bij Brummen, v. Itt. — Te Voorst, v. Bemm.

- 907 *Sordidus*, F. N. n. 583. M. 546, 34. Redt. 255 — 2 ed. 427.
In Holland zeldzaam, v. V. — Bij Sassenheim, Sn. — Bij Dalfsen, V. — Bij Soest in Julij, Kink. — Te Brummen, v. Itt. — Bij Breda, Heyl.
- *908 *Plagiatus*, L. M. 546, 48. Redt. 258 — 2 ed. 429.
In Maart aan den oever van den Schinkel onder aangespoeld riet, Kinker.
- *909 *Niger*, Panz. M. 546, 49. Redt. 258 (var. van *bimaculatus*) — 2 ed. 429.
Ter zelfder plaatse en met den vorigen, Kink. *Scheveningen*
- 910 *Inquinatus*, F. N. n. 585. M. 546, 57. Redt. 260 — 2 ed. 430.
Een der meest gemeene soorten, v. V.
- 911 *Sticticus*, Panz. M. 546, 60. Panz. *Fn.* 58, 4. Redt. 259 — 2 ed. 430.
In Mei in de omstreken van den Haag, v. d. W. — Bij Breda, Heyl.
- 912 *Porcus*, F. N. n. 586. M. 546, 76. Redt. 2 ed. 431.
In September en October te Scheveningen, v. Br.
- *913 *Pusillus*, Herbst. N. n. 582. M. 546, 82. Redt. 257 — 2 ed. 432.
Bij Leyden gevangen, v. V. *Op strand van de Schelde te Rotterdam*
- 914 *Merdarius*, F. N. n. 584. M. 546, 90. Redt. 257 — 2 ed. 431.
In de eerste voorjaarsdagen op zandwegen, v. V. — Bij Leyden, Kopp., — In Mei bij de Vogelenzang, Kink. — Te Doetinchem in Mei, Snell. — Op Walcheren en in Friesland, G.
- 915 *Prodromus*,
Brahm. N. n. 590. M. 546, 95. Redt. 261 — 2 ed. 433.
Zeer gemeen, misschien de gemeenste van alle *Aphodii*.
- *916 *Contaminatus*,
Herbst. N. n. 591. M. 546, 104. Redt. *ibid.*
In Zuid-Holland, v. V. — Bij den Haag, Sn. — Te Brummen, v. Itt. — Te Hoogeveen, Steenb.
- 917 *Rufipes*, L. N. n. 587. M. 546, 115. Redt. 260 — 2 ed. 434.
Bij Leyden, v. V. — Vroeger gemeen bij Rotterdam, Sn. — Bij Amsterdam, Kink. — Bij den Haag, v. d. W. — Bij Zeist, Mart. — Bij Voorst, Wtt. — Te Dalfsen in Overijssel, V. — In Drenthe, Gock.
- 918 *Luridus*, F. N. n. 588. et 589. M. 546, 118. Redt. *ibid.*
Meermalen bij Rott., v. V. — In de omstreken van Leyden, Kopp.
De var. *Nigripes* zeldzaam in Zuid-Holland, v. V.
- 919 *Sus*, F. Bijvoegs. n°. 591^a. M. 546, 127. Redt. 262 — 2 ed. 434.
Bij den Haag in Junij zeven exx., Snell.
- 920 *Porcatus*, F. N. n. 592. M. 546, 133. Redt. *ibid.*
Tamelijk gemeen in het voorjaar; bij den Haag en Leyden in Junij; in Julij in Gelderland, v. V. — Te Doetinchem, Sn. — In Noord-Brabant, Wtt. — In April bij Utrecht, Six. — Bij Amst., Kink.
- *921 *Asper*, F. N. n. 593. M. 548, 2 (*Rhyss. germanus*, L.). Redt. 262 — 2 ed. 436.
Eenmaal in Zuid-Holland, v. V.

Psammodius GYLL.

- 922 *Sulcicollis*, Ill. N. n. 594. M. 550, 4. Redt. 262 — 2 ed. 438.
In Mei bij den Haag, v. V. — Aldaar in Oct., v. d. W. — Bij Katwijk, Schultes. — Vier voorwerpen te Brummen, v. Itt. — In Febr. onder den bast der eiken in de omstreken van Breda, Heyl.

Aegialia LATR.

- *923 *Rufa*, F. N. n. 596. M. 551, 2. Redt. 2 ed. 438.
Zeer zeldzaam. — In Zuid-Holland op de duinen, v. W. — Een ex. op de laatste rij duinen bij Scheveningen in Julij, Everts.
- + 924 *Globosa*, Ill. N. n. 595. M. 552, 3 (*Arenaria*, F.) Redt. 2 ed. 438.
Zeer gemeen op de laatste rij duinen aan het strand, v. V. — Bij Naarden in Aug. aan het strand der Zuiderzee, Kink.

Geotrupes LATR.

- 925 *Typhaeus*, L. N. n. 562. M. 560, 5. Redt. 246 — 2 ed. 441.
Bij Wassenaar, W. — Op de heide tusschen Utrecht en Amersfoort, v. V. — Bij Zeist een ♀ in Aug., Snell. — Aan de Rhedersteeg, W. — Bij Velp, V. — Te Hoogeveen, Steenb. — In Mei bij Breda, Heyl. — In Drenthe, Gock en Cl. Muld. — In Groningen, Cl. Muld.
- 926 *Stercorarius*, L. N. n. 563. M. 560, 34. Redt. 245 — 2 ed. 442.
Vliegt in den zomer des avonds op straatwegen en bij mesthoopen, v. V.
- 927 *Putridarius*, Esch. N. n. 564. M. 560, 35. Redt. *ibid.*
Bij Leyden in Oct. en bij Heemstede in Aug. en Sept., v. V. — Te Zutphen, v. Eyndh. — In de omstreken van Breda, Heyl.
- 928 *Mutator*, Marsh. N. n. 565. M. 560, 36. Redt. 2 ed. 442.
Meermalen te Brummen, v. W. — In vrij groote hoeveelheid te Hilversum, v. Bemm. — In de omstreken van Breda, Heyl.
- + 929 *Sylvaticus*, F. N. n. 566. M. 560, 38. Redt. 245 — 2 ed. 442.
Vrij gemeen in dennenbosschen. — Te Soest in September, Kink. — In het Soesterbosch, v. d. W. — Bij Beek in Julij, Dr. Rombouts. — Bij Amerongen en bij Brummen in Junij en weder in September, v. V. — Een exempl. met een blaauwzwart (linker) en rood (regter) dekschild te Brummen, v. Itt.
- 930 *Vernalis*, L. N. n. 567. M. 560, 40. Redt. *ibid.*
Te Soest met den vorigen, Kink. — Op de heide te Wolfheze, v. V. — Te Uden, Snell. — Te Hoogeveen, Steenb. — In Julij te Zuid-Laren, de Gav. — Op de duinen bij Noordwijk, v. V.

Trox F.

- *931 *Sabulosus*, L. Bijvoegs. n^o. 596^a. M. 562, 8. Redt. 263 — 2 ed. 444.
Bij Hoogeveen, Steenb.
- 932 *Scaber*, L. N. n. 597 (*Arenarius*, F.) M. 562, 12. Redt. 263 — 2 ed. 443.
Eenmaal bij Rotterdam, Snell. — Op de Glijphoeve in Junij, op de duinen bij Katwijk en in zeer groot aantal in het voorjaar tusschen den Haag en Scheveningen, v. V. — In de laatstgenoemde streek, Everts.

Hoplia ILL.

- 933 *Argentea*, F. N. n. 610. M. 576, 1. Redt. 270 — 2 ed. 447 (*Philanthus*, Sulz.).
Op bloemen in Friesland, G. — Bij den Haag, v. d. W. — In Julij bij Leyden, bij de voormalige Haarlemmermeer en op de Glijphoeve, v. V. — Op de heide bij Maartensdijk, Mart. — Op Walcheren, G. — Te Groningen, de Gav.
- *934 *Praticola*, Dfts. N. n. 611. M. 576, 2. Redt. *ibid.*
Uitsluitend op Walcheren aangetroffen door G.

Homalopia MEG.

- 935 *Brunnea*, L. N. n. 609. M. 571, 4. Redt. 269 — 2 ed. 449.
Vliegt des nachts. — Op populieren aan den duinkant bij den Haag; bij Wassenaar aan het duin, op de Glijphoeve en bij Haarlem, v. V. — Bij Utrecht, S. — In Augustus te Soest, Kink. — Bij Zeist, Mart. — Bij Hoogeveen, Steenb.

Rhizotrogus LATR.

- *936 *Ater*, F. N. n. 605. M. 577, 80. Redt. 2 ed. 451.
Eenmaal in Noord-Brabant, v. Itt.
- 937 *Solstitialis*, L. N. n. 604. M. 577, 81. Redt. 267 — 2 ed. 451.
Op de Doorwerth in menigte, G. — Bij Zeist, Mart. en V. — Bij Velp in Aug., de Roo. — Bij Brummen, v. W. — Bij Hoogeveen, Steenb.

Polyphylla HARR.

- 938 *Fullo*, L. N. n. 600. M. 581, 1. Redt. 265 — 2 ed. 453.
Op de duinen bij Scheveningen in Julij, v. V. — Bij Noordwijk aan Zee, Verster. — Op Schouwen, H. — In de provincie Groningen, de Gav.

Melolontha F.

- 939 *Vulgaris*, F. N. n. 601. M. 582, 1. Redt. 265 — 2 ed. 454.
Alom bekend; gemeen, doch bovenal in Gelderland.
- 940 *Albida*, Dej. N. n. 602. M. 582, 2 (*Pectoralis*, Germ.). Redt *ibid.*
Zeer zeldzaam. — Bij den Haag en bij Doesburg, Snell.

- 941 *Hippocastani*, F. | N. n. 603. M. 582, 4. Redt. 266 — 2 ed. 454.
Gemeen, voornamelijk in Holland.

Anisoplia MEG.

- 942 *Fruticola*, F. | Bijvoegs. n^o. 608^a. M. 585, 2. Redt. 269 — 2 ed. 456. *Feb 13 '88*
In Noord-Brabant, Wtt. — Bij Eindhoven in Julij zeer gemeen op rogge, Snell.

Anomala MEG.

- 943 *Julii*, F. | N. n. 606 et 607 (*Frischii*, F.). M. 586, 15. Redt. 267 — 2 ed. 458.
Vrij gemeen op heide- en duinstreken, v. V. — In Gelderland, v. Itt. en G. — De var. *Frischii* is veel zeldzamer; zij werd te Walcheren op de duinen aangetroffen, H. — Bij Haarlem op de duinen in Julij, v. V. — Bij Zeist, Mart. — Bij den Haag, Sn. — Bij Brummen, v. W. — Te Hoogeveen, Steenb.

Phyllopertha KIRBY.

- 944 *Horticola*, L. | N. n. 608. M. 587, 6. Redt. 268 — 2 ed. 457.
Zeer gemeen, behalve in moerassige streken.

Oryctes ILL.

- *945 *Silenus*, F. | N. n. 599. M. 595, 1. Redt. 2 ed. 495.
Eenmaal in Zeeland, H. — Nimmer terug gevonden.
- 946 *Nasicornis*, L. | N. n. 598. M. 596, 1. Redt. 264 — 2 ed. 460.
Tamelijk gemeen in de run der broeikasten.

Cetonia F.

- *947 *Stictica*, L. | N. n. 614. M. 597, 12. Redt. 272 — 2 ed. 461.
In Noord-Brabant, wie? Zie de aantekeningen.
- 948 *Aurata*, L. | N. n. 613. M. 597, 47. Redt. 271 — 2 ed. 462.
Tamelijk gemeen in Julij op rozen, vlierbloemen en bloeiende *Spiraeën*.
De var. *Piligera* in eene oude verzameling van inlandsche insecten.
- 949 *Aenea*, Gyll. | N. n. 612. M. 597, 50 (*Floricola* Herbst.). Redt. 272 — 2 ed. 462.
Bij Utrecht, Six. — Bij Driebergen, v. Bemm. — Bij Amersfoort, v. W. — Op Ananaskasten bij Rhederoord, v. Itt.

Osmoderma LEPEL.

- *950 *Eremita*, L. | Bijvoegs. n^o. 616^a. M. 599, 1. Redt. 273 — 2 ed. 463.
Een enkel voorwerp aangetroffen, kruipende in den gang van een huis te Zutphen, v. Eynth.

Gnorimus LEPEL.

- 951 *Nobilis*, L. | N. n. 617. M. 600, 3. Redt. 274 — 2 ed. 463.
Bij Heusden op rozen, G. — Bij Utrecht, V. — Te Groningen, de Gav.

Trichius F.

- 952 *Fasciatus*, F. | N. n. 616. M. 601, 1. Redt. 274 — 2 ed. 463.
In maandrozen, v. V. — Sommige jaren bij Rotterdam gemeen,
Snell. — Bij Leyden, Kopp. — Te Amsterdam, Steenb.

Valgus SCRIBA.

- 953 *Hemipterus*, L. | N. n. 615. M. 602, 1. Redt. 273 — 2 ed. 464.
Bij den Haag, Maitl. — Bij Brummen, v. W. — Een wijfe in
Junij te Voorst, v. V. — In Limburg, Snell.

STERNOXI.

Chrysobothrys CURT.

- *954 *Chrysostigma*, L. | M. 623, 1. Redt. 281 — 2 ed. 471.
In Mei bij Amsterdam, Kink.

Agrilus MEG.

- *955 *Sinuatus*, Oliv. | M. 625, 7. Kiesenw. *Ins. D.* IV. 129, n°. 4. Lap. et Gory, *Bupr.*
11, 43. Pl. X, f. 56. Redt. 287 — 2 ed. 477.
Onder een perenboom in een tuin te Breda, Heyl.

- 956 *Viridis*, L. | N. n. 623. Bijvoegs. n°. 623^a. M. 625, 10. Redt. 287 — 2 ed. 478.
De varieteit *Nocivus*, Ratz. bij Amersfoort, v. W. en bij Utrecht,
Six. — De varieteit *Fagi*, Ratz. bij Hoogeveen, Steenb.

- *957 *Coeruleus*, Ross. | N. n. 620 (*Cyanescens*, Ratz.) M. 625, 13). Redt. 285 — 2 ed. 478.
Dikwijls bij Amersfoort gevangen, v. W. — Te Voorst in Junij, v. V.

- *958 *Tennis*, Ratz. | N. n. 618. M. 625, 18. Redt. 285 — 2 ed. 477.
Zeldzaam bij Amersfoort, v. W.

- 959 *Angustulus*, Ill. | N. n. 619. M. 625, 19. Redt. *ibid.*

Bij Amersfoort, v. W. — In Mei bij den Haag, v. d. W. (*an. l. v. V. 2^e*)

- 960 *Laticornis*, Ill. | N. n. 621. M. 625, 20. Redt. *ibid.*

Eenmaal bij den Haag, v. V. — Te Hillegom in Mei, Kink. —
Twee voorwerpen in Aug. te Wort-Rhede, v. V.

- 961 *Aurichalceus*, | M. 625, 45. Redt. 286 — 2 ed. 479.

Ratz. Bij het huis ter Heyde, Piag. — In de omstreken van Utrecht,
Six. — In Julij op eiken bij Breda, Heyl.

- 962 *Rugicollis*, Ratz. | N. n. 622. M. 625, 54. Redt. 2 ed. 479.

Eenige exemplaren bij Amersfoort, v. W. en v. V.

Trachys F.

- 963 *Minuta*, L. | N. n. 624. M. 628, 2. Redt. 289 — 2 ed. 481.

Bij Amersfoort en Brummen, v. W. — Bij Brummen in het laatst
van Augustus, v. V. — Te Borculo in Mei op wilgen, Snell. —
In Junij te Driebergen, Six.

- 964 *Pygmaea*, F. M. 628, 3. Redt. 288 — 2 ed. 482.
In Junij te Driebergen, Six.

Aphanisticus LATR.

- *965 *Emarginatus*, F. Bijvoegs. 623^b. M. 629, 4. Redt. 288 — 2 ed. 481.
Bij Driebergen, Six.

Throscus LATR.

- 966 *Dermestoides*, L. M. 630, 1. Redt. 231 — 2 ed. 402.
In Mei te Utrecht, Groll. — In Junij te Driebergen, Six. —
In Zeeland, de Bruyne.
- *967 *Obtusus*, Curt. M. 630, 9. Redt. 2 ed. 403.
In April aan den IJkant bij Amsterdam onder aangespoelde
ruigte, Kink.

Lacon LAP.

- 968 *Murinus*, L. N. n. 628. M. 650, 1. Redt. 296 — 2 ed. 490.
Overal zeer gemeen.

Elater L.

- *969 *Sanguineus*, L. N. n. 642. M. 657, 1. Redt. 302 — 2 ed. 498.
Bij Zeist, v. en v. V. — Bij Rotterdam, J. M. Smit. — Te Eindhoven
in Junij, Snell. — Op Walcheren, G. — Te Hoogeveen, Steenb.
- 970 *Sanguinolentus*, M. 657, 5. Redt. 302 (*Ephippinum* F.) — 2 ed. 498.
Schr. Op een berk in een bosch bij Breda in Junij, Heyl.
- 971 *Pomorum*, Geoff. Bijvoegs. n^o. 642^a. M. 657, 8. Redt. ibid.
Bij Gieten en Rolde in Drenthe, Gock. — Bij Voorst in Junij,
v. V. — In het Overmaassche land, Piag. — Te Burgst in April
onder den bast van eiken, Heyl.
- 972 *Elongatulus*, F. N. n. 644. M. 657, 13. Redt. 303 — 2 ed. 499.
In Zuid-Holland, v. V. — Bij Utrecht, Six. — Bij den Haag, v. d. W.
- *973 *Balteatus*, L. N. n. 643. M. 657, 15. Redt. ibid.
Eenmaal in het Zeister bosch dood in een spinneweb hangende
gevonden, v. V. — Bij Brummen, v. Itt. en v. W. — Bij Hooge-
veen, Steenb.
- *974 *Nigrinus*, Payk. N. n. 645. M. 657, 27. Redt. 2 ed. 500.
In Zuid-Holland, v. d. W.

Crypthypnus ¹⁾ ESCHS.

- 975 *Pulchellus*, L. N. n. 646. M. 661, 14. Redt. 306 — 2 ed. 502.
Bij Wassenaar, Gerd. — In Mei op de Glijphoeve, v. V. — Niet
zeldzaam, bij den Haag, v. d. W.

¹⁾ De zamenstelling *Crypthypnus* strijdt tegen den aard der Grieksche taal.

Cardiophorus Eschs.

- 976 *Thoracicus*, F. N. n. 640. M. 662, 1. Redt. 300 — 2 ed. 496.
Eenmaal, zoo ik mij wel herinner, bij Zeist, v. V.
- 977 *Ruficollis*, L. Bijvoegs. n^o. 640^a. M. 662, 11. Redt. ibid.
Bij Utrecht, Six.
- 978 *Cinereus*, Herbst. N. n. 641. M. 662, 48. Redt. 301 — 2 ed. 497.
Bij Leyden, Kopp. — Aldaar en bij Bennebroek in Mei in het duin, v. V. — Bij Rotterdam en den Haag, Snell. — In Noord-Brabant, Roel.
- 979 *Musculus*, Er. M. 662, 35. Redt. ibid.
In menigte te Noordwijk, op een' zonnigen dag in Mei, v. V. — In April bij Breda, Heyl.

Melanotus Eschs.

- 980 *Niger*, F. N. n. 626. M. 663, 1. Redt. 294 — 2 ed. 488.
In Zuid-Holland, v. d. W. — In Maart bij Noordwijk, Kink.
- 981 *Castanipes*, Payk. N. n. 627. M. 663, 9. Redt. ibid.
In Zuid-Holland, v. V. — Bij Utrecht, S.
- 982 *Rufipes*, Herbst. M. 663, 11. Redt. ibid. Herbst. *Käfer*, X, 46. tab. 162, f. 2. Shuck.
Brit. Col. pl. 47, f. 10.
Bij Zutphen, v. Eyndh. — Te Groningen, de Gav.
- 983 *Crassicollis*, Er. M. 663, 13. Redt. ibid. Germ. *Zeitschr.* III, p. 98.
In Junij bij Amsterdam, Grebn.

Limonius Eschs.

- 984 *Cylindricus*, Payk. N. n. 637. M. 664, 5. Redt. 299 — 2 ed. 495.
Eene der gemeenste soorten. — Ook in Overijssel aangetroffen, Snell.
- 985 *Minutus*, L. M. 664, 8. Redt. ibid. Gyll. *Ins. Suec.* I, pag. 398, n^o. 27.
In de omstreken van Zutphen, v. Eyndh. — In Mei te Brummen, v. V.
- *986 *Parvulus*, Panz. N. n. 638. M. 664, 10. Redt. ibid.
Een ex. in Augustus bij Rhederoord, v. V.

Athous Eschs.

- *987 *Rufus*, de Geer. N. n. 629. M. 665, 1. Redt. 296 — 2 ed. 491.
Bij Breda en in Gelderland, v. W. — In Julij op elzen bij Breda, Heyl.
- *988 *Rhombeus*, Ol. Bijvoegs. n^o. 629^a. M. 665, 3. Redt. ibid.
Te Rotterdam in Julij 1854 in huis gevangen, Snell.
- 989 *Hirtus*, Herbst. N. n. 630. M. 665, 2. Redt. ibid.
Bij Rotterdam zeer gemeen, Gijsb. H. — Op de Glijphoeve in Junij, v. V. — Bij Utrecht, Six. — Bij Leyden, Kopp. — In Noord-Brabant, Roel. — In Junij te Breda, Heyl. — Bij Groningen, de Gav.
- 990 *Haemorrhoidalis*, F. N. n. 633. M. 665, 8. Redt. 297 — 2 ed. 492.
Eene der gemeenste keversoorten.

- 991 *Vittatus*, L. M. 665, 12. Redt. *ibid.*
In de omstreken van Groningen, de Gav. — In April onder mos
in de omstreken van Breda, Heyl.
- *992 *Longicollis*, Ol. N. n. 632. M. 665, 17. Redt. *ibid.*
Te Rotterdam, v. W. — Bij Leyden, v. V. — Op Walcheren, G.
- *993 *Subfuscus*, Müll. M. 665, 27. Redt. 2 ed. 493.
In Mei te Zeist, Kinker.

Corymbites LATR.

- *994 *Pectinicornis*, L. N. n. 650. M. 666, 1. Redt. 307 — 2 ed. 505.
Bij Brummen, v. Itt.
- *995 *Haematodes*, F. N. n. 648. M. 666, 5. Redt. 307 — 2 ed. 504.
Bij Brummen, v. Itt.
- 996 *Castaneus*, L. N. n. 649. M. 666, 7. Redt. 307 — 2 ed. 505.
Bij IJsselstein, Six.
- 997 *Tesselatus*, L. N. n. 651. M. 666, 12. Redt. 308 — 2 ed. 505.
Eenmaal te Brummen, v. W.
- 998 *Holosericeus*, F. N. n. 652. M. 666, 25. Redt. 309 — 2 ed. 507.
Bij Leyden, Noordwijk en op de duinen bij den Haag in Junij,
v. V. — Ter laatstgenoemde plaats, v. d. W. — Bij Utrecht,
V. — Bij Hillegom en te Ede in Mei, Kink. — In Gelderland,
Gijsb. H. — In Junij te Voorst vrij gemeen, v. V. — Te Ren-
kum in Mei, Wtt. — Bij Brummen, v. W. — Gemeen in Junij
in de omstreken van Breda, Heyl.
- 999 *Aeneus*, L. N. n. 654. M. 666, 29. Redt. 309 — 2 ed. 506.
Vrij gemeen door het geheele land. — De blaauwe verscheidenheid
bij het huis ter Heyde in September, Piag.
- 1000 *Latus*, F. N. n. 653. M. 666, 34. Redt. 309 — 2 ed. 507.
Bij Rotterdam, Gijsb. H. — Bij Leyden, Kopp. — In Junij
bij Voorst, v. V.
- 1001 *Bipustulatus*, F. N. n. 639. M. 666, 35. Redt. 299 — 2 ed. 494.
Bij Utrecht en in Februarij onder mos te Wassenaar, v. V. —
In November en December onder populierenschors te Rotterdam,
Sn. — Des winters onder het mos der boomen bij Amsterdam,
Kinker. — Op het Valkenburg te Breda, Heyl. — Te Brum-
men, v. Itt.
- 1002 *Cruciatus*, L. Bijvoegs. n^o. 654^a. M. 666, 37. Redt. 308 — 2 ed. 506.
In Nederland, waarschijnlijk Noord-Brabant, Wtt. — In Junij
1858 eenige voorwerpen te Voorst, v. V. — In Julij in een den-
nenbosch nabij Breda, Heyl.

Ludius LATR.

- *1003 *Ferrugineus*, L. N. n. 647. M. 669, 2. Redt. 306 — 2 ed. 504.
Twee voorwerpen bij Utrecht, V. — Een aldaar, Six. — Bij Brummen, v. Itt.

Agriotes ESCHS.

- 1004 *Flavicornis*, Panz. Bijvoegs. n^o. 657^a. M. 670, 6. Redt. 311 — 2 ed. 509.
Een voorwerp te Voorst, Wtt.
- *1005 *Sputator*, L. N. n. 657. M. 670, 7. Redt. ibid.
In Mei en Junij bij Rotterdam, Snell. -- In het gras, v. V. — In April onder aangespoelde ruigte aan den IJkant, Kink.
- 1006 *Lineatus*, L. N. n. 655 (*Segetis*, Gyll.). M. 670, 8. Redt. 310 — 2 ed. 508.
Zeer gemeen door het geheele land. — Somwijlen zeer schadelijk; zie de Landbouw-Courant en het Volksboek van Wttewaal.
- 1007 *Obscurus*, L. N. n. 656. M. 670, 9. Redt. ibid.
Onder steenen in het voorjaar niet zeldzaam, v. V. — Bij Rotterdam, vrij gemeen, Sn. — In April aan den oever van den Schenkel bij Amsterdam, Kink. -- Te Brummen, v. Itt. — Bij Groningen, de Gav.
- 1008 *Aterrimus*, L. N. n. 661. M. 670, 15. Redt. 313 — 2 ed. 512.
Alom zeer gemeen.

Sericosomus ESCHS.

- *1009 *Brunneus*, L. N. n. 658, 659 (*Brunneus* et *Fugax*). M. 671, 1. Redt. 312 — 2 ed. 510.
Bij 's Gravenhage, v. V. — Niet zeldzaam in de omstreken van Breda, Heyl.
- 1010 *Marginatus*, L. N. n. 660. M. 671, 3. Redt. 312 — 2 ed. 511.
Vrij gemeen in Holland in begroeide duinstreken, v. V. — Meermalen bij Utrecht, Six. — Bij Haarlem aan de duinstreek in Mei en bij Amst. aan den IJkant, Kink. — Bij Arnhem in Julij, de Gav.

Ctenonychus STEPH.

- *1011 *Filiformis*, F. N. n. 625. M. 673, 1. Redt. 293 (*Synaptus filif.*) — 2 ed. 487.
Niet zeldzaam bij Rotterdam, Snell.

Adrastus MEG.

- 1012 *Limbatus*, F. N. n. 662. M. 675, 1. Redt. 314 — 2 ed. 513.
Een der gemeenste soorten van kniptorren.
- 1013 *Pallens*, F. Bijvoegs. n^o. 662^a. M. 675, 3. Redt. ibid.
Te Rotterdam op brandnetels in Julij gemeen, Snell. — Bij Leyden in Julij, de Gav. — Bij Amersfoort in Junij en te Beek in Mei, Six. — Te Velp in Julij, Kink. — In Mei te Breda, Heyl. — Bij Brummen, v. Itt.

Campylus FISCH.

- 1014 *Linearis*, L. N. n. 635, 636. M. 676, 2. Redt. 298 — 2 ed. 494.
 Bij Leyden en Haarlem, doch zeldzaam, v. V. — Bij Leyden, Kopp. — Bij den Haag in Junij, v. d. W. — Bij Rotterdam, Sn. — In Junij te Utrecht, Six. — In Friesland, G. — Te Hoogeveen, Steenb.
 De varieteit *Mesomelas* op Walcheren, G. — Bij den Haag in Julij, Everts. *3 Junij Scheven. vroegjes dij*

MALACODERMATA.**Helodes** LATR.

- *1015 *Minutus*, L. N. n. 663 (*Melanurus* F.). M. 685, 1. Redt. 316 (*Pallidus* F.) — 2 ed. 517.
 In boschachtige streken, zeer zeldzaam, v. V.

Cyphon PAYK.

- 1016 *Testaceus*, L. N. n. 664 (*Lividus* F.). M. 686, 1. Redt. 315 — 2 ed. 517.
 Op elzen te Rotterdam, in Junij te Amersfoort en in Julij te Brummen, v. V. — Bij Rotterdam, Sn. — Bij Utrecht, Six. — Te Maarsbergen, Piag. — Te Ede in Mei, Kink.
- 1017 *Variabilis*, Thunb. N. n. 665. M. 687, 8. Redt. 315 — 2 ed. 518.
 Op eschdoorn-bladeren tamelijk gemeen op bepaalde plaatsen, v. V. — Bij Rotterdam, Snell. — In Maart en April onder het mos der boomen bij Amsterdam, Kink. — In December onder den schors der eiken in de omstreken van Breda, Heyl.
- *1018 *Padi*, L. N. n. 666. M. 687, 13. Redt. ibid.
 Bij Rotterdam, Gijsb. H. en Snell. — Met den vorigen bij Amsterdam, Kinker. — In Zeeland, H.
- 1019 *Deflexicollis*, Müll. N. n. 667. M. 689, 1. Redt. 316 — 2 ed. 519.
 Vier exemplaren op bloesems van wilgen aan den duinkant, v. V. — Bij Utrecht en te Driebergen in October, Six. — In Noord-Brabant, Roel.

Scirtes ILL.

- 1020 *Hemisphaericus*, L. N. n. 668. M. 690, 1. Redt. 316 — 2 ed. 520.
 Zeer gemeen in Junij op waterplanten bij Rotterdam en aan zekere sloot ten noorden van den Haag, v. V. — Bij Rotterdam, Snell. — Bij Kralingen, Piag. — In Julij en Augustus bij Abcoude en Amsterdam in het gras, Kinker.
- 1021 *Orbicularis*, Panz. N. n. 669. M. 690, 2. Redt. ibid.
 Bij Rotterdam, Sn. — Bij Kralingen, Piag. — Meermaals bij Leyden, v. V.

Dictyopterus LATR.

- *1022 *Sanguineus*, L. N. n. 670. M. 693, 1. Redt. 321 — 2 ed. 521.
In Noord-Brabant, v. Itt. — Te Zuidlaren, Cl. Muld.

Lampyris GEOFFR.

- 1023 *Noctiluca*, L. N. n. 671. M. 696, 18. Redt. 320 — 2 ed. 523.
De larve bij Leyden, de Gr. — Twee mannetjes, die geen licht gaven, in Junij op besmeerde boomen, v. V. — Aan den Bezuidenhoutschen weg bij 's Gravenhage, v. d. W. — Bij Scheveningen, Everts. — Bij Utrecht, W. — In Gelderland, v. V. — Bij Varseveld, ter Meer.
- 1024 *Splendidula*, L. N. n. 672. M. 696, 29. Redt. ibid.
Zeldzaam in Holland en gemeen te Beek bij Ubbergen in Aug., v. V.

Photophaenus CAST.

- *1025 *Hemipterus*, F. N. n. 673. M. 697, 1. Redt. 321 — 2 ed. 523.
De larve, die licht van zich geeft, meermalen in een tuin in de Wafellaan bij Rotterdam, van Santen Kolff. — De imago in de rigting naar Delftshaven bij Rotterdam, v. V.

Telephorus SCHAEFF.

- 1026 *Fuscus*, L. N. n. 674. M. 702, 9. Redt. 322 — 2 ed. 527.
Gemeen op planten in Junij en soms reeds in Mei, in Holland; het wijfje zeldzamer, v. V. — In de duinen, Piag. — In Junij te Abcoude, Kink. — Te Bommel in Mei, Sn. — Bij Groningen, de Gav.
- 1027 *Rusticus*, Fall. M. 702, 10. Gyll. *Ins. Suec.* 1, 330, 2. Oliv. *Ent.*, II, 26, 1. Pl. I, fig. 1, a — c. Redt. ibid.
Drie voorwerpen in de omstreken van Zutphen, v. Eyndh. — Aan het Ginneken bij Breda in Mei, Kink. — Te Groningen, de Gav.
- *1028 *Dispar*, F. N. n. 675. Redt. 323 — 2 ed. 527.
In Nederland, Gijsb. H. — Eenmaal bij Leyden, v. V. — Bij den Haag in Mei, zeldzaam, Snell.
- 1029 *Obscurus*, L. N. n. 678. M. 702, 19. Redt. 322 — 2 ed. 19.
Bij Rotterdam, Snell. — Bij Leyden, v. V. — Te Zeist en bij Ede, Kink. — Tamelijk gemeen te Brummen in Mei 1867, v. V. — Aldaar mede, v. W.
- *1030 *Albomarginatus*, Märk. M. 702, 26. Redt. 2 ed. 526.
In Mei op bloemen te Hillegom, Kink.
- 1031 *Nigricans*, F. N. n. 677. M. 702, 30. Redt. 323 — 2 ed. 527.
In het laatst van Mei en Junij op planten niet zeldzaam, v. V. — Bij Leyden, Kopp. — Bij Rotterdam, Snell. — Bij Utrecht, Six. — Te Voorst, v. Bemm.

- 1032 *Pellucidus*, F. N. n. 676. M. 702, 32. Redt. *ibid.*
 Bij Rotterdam zeldzaam, Snell. — In Mei bij den Haag, v. V. —
 Te Groningen, de Gav. — Bij Breda, Heyl. — Te Beek in Mei, Six.
 Eene varieteit met geheel roode pooten te Brummen, v. W.
- 1033 *Lividus*, L. N. n. 680. M. 702, 35. Redt. 324 — 2 ed. 528.
 In Mei en Junij overal gemeen.
- 1034 *Rufus*, L. N. n. 682 en 681 (*Liturgatus* Fall.) M. 702, 53. Redt. 2 ed. 529.
 Gemeen bij Rotterdam, Snell. — In Zuid-Holland, v. V. — In
 Junij bij Amsterdam, Grebn. — In Mei te Beek, Six. — Omstre-
 ken van Breda, Heyl.
- *1035 *Fulvicollis*, F. M. 702, 62. Redt. 2 ed. 527.
 In Julij aan den IJkant bij Amsterdam op bloemen, Kink.
- 1036 *Thoracicus*, Ol. N. n. 679. M. 702, 64. Redt. 323 — 2 ed. 527.
 Op brandnetels bij Rotterdam, Sn. — In de eerste dagen van
 Julij te Brummen; in Mei en Junij vrij gemeen bij den Haag, v.
 V. — Te Wassenaar, Piaget. — In de omstreken van Leyden,
 Kopp. — Te Noordwijk in Junij, Kink. — Bij Breda, Heyl. —
 In Julij te Groningen, de Gav.
- 1037 *Lateralis*, L. Bijvoegs. n^o. 676^a. M. 702, 69. Redt. 322 — 2 ed. 526.
 Eenmaal in de omstreken van Utrecht, v. Hass.
- 1038 *Clypeatus*, Ill. N. n. 683. M. 702, 80 (*Haemorrhoidalis* F.). Redt. 323 — 2 ed. 528.
 Niet ongemeen in berkenbosschen; in April op de Gliphoeve, in
 Mei bij den Haag, v. V. — Zeldzaam te Breda, Heyl.

Rhagonycha Eschsch.

- 1039 *Melanura*, L. N. n. 684. M. 704, 14. Redt. 324 — 2 ed. 530.
 Overal zeer gemeen.
- 1040 *Testacea*, L. N. n. 686. M. 704, 29. Redt. 325 — 2 ed. 530.
 Op berken in Junij, v. V. — Bij Rotterdam en bij den Haag
 in Mei, Sn. — Te Voorschoten, Drechsl. — Bij Breda, Heyl. —
 In Gelderland, v. W. — Bij Hoogeveen, Steenb.
- 1041 *Pallida*, F. N. n. 685. M. 704, 35. Redt. *ibid.*
 Op berken bij Voorschoten en den Haag, v. V. — In de omstre-
 ken van Utrecht, v. Hass. en Six. — Bij Hoogeveen, Steenb.
- 1042 *Atra*, L. Bijvoegs. n^o. 686^a. M. 704, 51. Redt. 325 — 2 ed. 531.
 In Junij te Voorst, v. V. — In Mei te Beek, Six. — Te Haren
 in Julij, de Gav. — In Julij te Breda, Heyl.

Silis Meg.

- *1043 *Nitidula*, F. Bijvoegs. 686^b. M. 706, 4. Redt. 326 — 2 ed. 531.
 Een wijfje in Augustus te Rotterdam op populier, Snell. — Een
 voorwerp aldaar in Junij 1865, Piag.

Malthinus LATR.

- 1044 *Flaveolus*, Herbst. N. n. 687. M. 708, 8. Redt. 327 — 2 ed. 532.
Op eiken in Junij op de duinen bij den Haag, in Julij te Amersfoort en aan de Vuursche, v. V. — Bij Driebergen en Utrecht, Six. — Op Wikkenburg bij Houten, Wtt. — In de duinen en bij Maarsbergen, Piag. — Te Overveen in Junij en bij Amsterdam in Julij, Kink. — Bij Breda Heyl.

Malthodes KIESW.

- *1045 *Sanguinolentus*, Fall. N. n. 688. M. 709, 1. (*Minimus* L.) Redt. 327 — 2 ed. 533.
Eenmaal te Oegstgeest, v. V. — Vrij gemeen bij Rotterdam, Sn.
- 1046 *Biguttatus*, L. N. n. 689. M. 709, 6? (*Marginatus* Latr.) Redt. ibid.
In Friesland, G. — Gemeen sp bloeiend pijpkruid, v. V. — Bij Utrecht, Six. — Bij Maarsbergen, Piag. — Te Hoogeveen, Steenb.
- *1047 *Dispar*, Germ. Bijvoegs. n^o. 689^a. M. 709, 25. Redt. 327 — 2 ed. 534.
Een klein voorwerp bij Utrecht, Six. — (Een aan de plassen bij Kralingen, Piaget.)
- *1048 *Maurus*, Ziegl. Bijvoegs. 689^b. M. 709, 32. Redt. 327 — 2 ed. 535.
Twee voorwerpen in het Overmaassche bij Rotterdam, Piag.

Malachus F.

- 1049 *Aeneus*, L. N. n. 690. M. 714, 1. Redt. 329 — 2 ed. 537.
Gemeen in het Overmaassche, Gijsb. H. — Te Rotterdam in April, Sn. — Bij Zeist, Mart. — In menigte in Mei op een korenveld onder Oosterbeek, v. W. — Zeer gemeen op rogge in Julij 1852 te Brummen, v. V. — Bij Veghel, Sn. — Bij Hoogeveen, Steenb. — Te Breda, Heyl.
- 1050 *Bipustulatus*, L. N. n. 691. M. 714, 12. Redt. ibid.
Alom gemeen in Junij.
- 1051 *Viridis*, F. N. n. 692. M. 714, 26. Redt. 329 — 2 ed. 538.
In Junij en Julij in de duinen bij den Haag, v. d. W. en v. V. — Bij Leyden, Steenhuyzen. — Bij Rotterdam in Junij zeldzaam, Sn. — In Mei op de dijken aan het IJ, Kink. — In de duinen bij Overveen, Rits. — Bij Utrecht, Six.
- 1052 *Marginellus*, Ol. N. n. 693. M. 714, 39. Redt. 329 — 2 ed. 537.
Op Walcheren, H. — Bij Rotterdam, Sn. — In de duinen bij Overveen, Rits. — Bij Utrecht, V. — Vrij gemeen bij Driebergen, Six. — Te Groningen, de Gav. — Te Hoogeveen, Steenb.
- 1053 *Elegans*, Ol. N. n. 694. M. 714, 41. Redt. 329 — 2 ed. 538.
Bij Katwijk niet zeldzaam en in Junij op de Glijphoeve, v. V. — Bij Rotterdam, Sn.

x *Myde* exempl van *Malthodes brevidens* op den 11. v. v. verkeerdelijk als *Malthodes* genomen. (zie de beschrijving van *Bipustulatus* Six.)

- 1054 *Pulicarius*, F. N. n. 695. M. 715, 2. Redt. 329 — 2 ed. 537.
Op planten in tuinen, v. V. — Bij Rotterdam, Sn. — Bij Brummen, v. W. — In Julij bij Amsterdam in het gras, Kink.
- *1055 *Marginalis*, Er. Bijvoegs. 695^a. M. 715, 3. Redt. *ibid*.
Bij Utrecht zeldzaam, Six.
- 1056 *Rubricollis*, Fall. M. 715, 5 (*Ruficollis* F). Redt. 328 — 2 ed. 537.
Een voorwerp te Doesburg, de Gav.

Anthocomus ERICHS.

- 1057 *Sanguinolentus*, F. N. n. 696. M. 716, 2. Redt. 330 — 2 ed. 539.
In Nederland, Overdijk. — Te Paterswolde in Aug., de Gav.
- 1058 *Equestris*, F. N. n. 697. M. 716, 2. Redt. 330 — 2 ed. 539.
In huizen op zolders en in Junij bij den Haag, v. V. — Op gras bij Rotterdam, Sn. — Bij Utrecht, v. Hass. en Six. — Gemeen in de omstreken van Zutphen, v. Eyndh.
- 1059 *Fasciatus*, L. N. n. 698. M. 716, 4. Redt. *ibid*.
In huizen gedurende de maand Julij, v. V. — Zeldzaam bij Rotterdam, Sn. — In de duinen bij den Haag, v. d. W. — In die van Aelbertsberg, Rits. — In Mei en Julij bij Amsterdam, Kink. — Bij Utrecht, v. Hass. en Six. — Bij Hoogeveen, Steenb. — In Noord-Brabant, Snell.
- *1060 *Analisis*, Panz. Bijvoegs. 696^a. M. 717, 23. Redt. *ibid*.
Eenmaal bij Rotterdam, Snell.

Hyphebaeus KIESW.

- 1061 *Flavipes*, F. M. 719, 5. Redt. 331 — 2 ed. 540.
Beide sexen in paring gevangen in de omstreken van Utrecht, Six.

Charopus ERICHS.

- *1062 *Pallipes*, Oliv. Bijvoegs. 698^a. M. 720, 2. Redt. 332 — 2 ed. 541.
Bij Utrecht in Junij, Six. en Groll.

Dasytes PAYK.

- 1063 *Coeruleus*, F. N. n. 699. M. 729, 21. Redt. 334 — 2 ed. 543.
Op bloemen vrij gemeen. — Leyden, Kopp. — 's Gravenhage, Sn. v. V. — Vogelenzang, Kink. — Breda, Heyl.
- 1064 *Flavipes*, F. N. n. 701. M. 729, 24. Redt. 336 — 2 ed. 545.
Bij Rotterdam gemeen, Sn. — Bij den Haag en Leyden, v. V. — Te Noordwijk, Kink. — Bij Utrecht, v. Hass., Wtt. en Six. — In Junij te Groningen, de Gav. — In Zeeland, H. — Bij Breda, Heyl.
- *1065 *Floralis*, Ol. N. n. 700. M. 732, 4. Redt. 334 — 2 ed. 543.
Bij Rotterdam, Gijsb. H. — Sedert niet meer teruggevonden.

- 1066 *Nigricornis*, F. M. 735, 16. Fabr. *S. EL.* II, 78, 10. Gyll. *Ins. Suec.* 1, 327, 4. Redt. 335 — 2 ed. 543.
In de (plantage te Rotterdam of te Zutphen?) v. Eynth. — In Febr. onder de schors der dennen te Strijbeek, Heyl.
- *1067 *Nobilis*, Illig. M. 730, Valentin Gutfleisch, *Käfer Deutschlands* 390.
In Augustus te Bergen bij Alkmaar, Kink. — In Mei bij Haarlem, Weyenbergh.

Dolichosoma STEPH.

- 1068 *Lineare*, F. N. n. 702. M. 730, 2. Redt. 336 — 2 ed. 547.
Bij Utrecht, zeldzaam, V. — Bij Driebergen, Six. — In Junij eenmaal vrij gemeen op de duinen bij den Haag, later bij Wassenaar, v. V. — Aan de Vogelenzang in Junij, Kink.

TEREDILIA.

Tillus OLIV.

- 1069 *Elongatus*, L. N. n. 703 et 704 (*Ambulans*, F. ♀) M. 743, 1. Redt. 337 — 2 ed. 549.
Bij Rotterdam, Sn. — Bij Hillegom in Junij, Kink. — Bij Utrecht, zeldzaam, V. — In het Soester bosch, v. d. W. — Bij Breda, Gijsb. H. — Bij Brummen, v. Itt. en v. W. — Binnen 's huis te Grave in Junij, Snell. — Te Hoogeveen, Steenb.

Opilus LATR.

- *1070 *Mollis*, F. N. n. 705. M. 744, 2. Redt. 337 — 2 ed. 550.
Zeer zeldzaam, G. — Bij Haarlem, Buse.
- 1071 *Domesticus*, Sturm. N. n. 706. M. 744, 3. Redt. *ibid.*
Bij Leyden in Julij niet zeldzaam en bij Bennebroek in Augustus, v. V. — Bij Rotterdam, Gijsb. Hod. en Snell. — In den Haag v. d. W. — Te Haarlem, Rits. — Te Hillegom in Junij, Kink. — Bij Utrecht, V. — Bij Brummen, v. Itt. — Te Hoogeveen, Steenb. — In Zeeland, H. — In Julij te Amsterdam, Kink. — Vrij gemeen te Groningen, de Gav.

Clerus GEOFFR.

- 1072 *Formicarius*, L. N. n. 708. M. 745, 3. Redt. 338 — 2 ed. 550.
Niet zeldzaam door het geheele land.
- *1073 *Quadrinaculatus*, F. N. n. 709. M. 745, 6. Redt. 338 — 2 ed. 550.
In Holland, W. *van Dijkveld Fe. 20 Mei*

Trichodes HERBST.

- *1074 *Alvearius*, F. N. n. 707. M. 747, 3. Redt. 338 — 2 ed. 551.
Bij Breda, Gijsb. H. — Bij Utrecht, V.

- *1075 *Apiarius*, L. | Bijvoegs. 707^a. M. 747, 4. Redt. *ibid.*
Eenmaal bij Zutphen in Julij, Sn. — In Aug. bij Cuyk, Everts.

Corynetes HERBST.

- 1076 *Ruficollis*, F. | N. n. 711. M. 750, 6. Redt. 339 — 2 ed. 552.
Op gedroogde huiden in verzamelingen van natuurlijke historie,
v. V. — Bij Utrecht, Six. — In Augustus te Leyden, Marsh. —
In Zeeland, G.
- *1077 *Rufipes*, F. | Fabr. *S. E.* I, 186, 2. M. 750, 7. Redt. *ibid.*
Bij den Haag in Julij, v. d. W.
- 1078 *Violaceus*, Latr. | N. n. 710. M. 750, 8. Redt. *ibid.*
Overal zeer gemeen, dikwijls in woningen.

Hylecoetes LATR.

- *1079 *Dermestoides*, L. | N. n. 730. M. 753, 1. Redt. 355 — 2 ed. 576.
De larve uit palen in het IJ, H.

Apate F.

- *1080 *Capucina*, L. | N. n. 729. M. 755, 2. Redt. 354 — 2 ed. 568.
Bij Rotterdam, v. W.

Rhizopertha STEPH.

- 1081 *Pusilla*, F. | M. 759, 1. Redt. 2 ed. 570.
Te Amsterdam in rijst aangetroffen, Groll. — Mede in rijst, Everts.

Lyctus F.

- 1082 *Canaliculatus*, F. | N. n. 501. M. 761, 1. Redt. 188 — 2 ed. 358.
In Junij en Julij in huizen te 's Gravenhage, v. d. W. en v. V. —
In huizen te Utrecht, v. V. — In menigte te Middelrode in Junij,
Sn. — In het algemeen schijnt de soort zeldzaam te zijn, doch zich
hier en daar in groot aantal te vertoonen.

Rhopalodontus MEL.

- 1083 *Fronticornis*, Pz. | N. n. 725. M. 764, 2. Redt. 350 — 2 ed. 575. *incautellus*
In Mei bij den Haag in zwammen.

Cis LATR.

- 1084 *Boleti*, F. | N. n. 723. M. 765, 1. Redt. 349 — 2 ed. 573.
In Maart en Aug. op de Glijphoeve in boleten en in April in het
Haagsche bosch, v. V. — Op beukenzwam in Junij, Snell. — In
de provincie Utrecht, V.
- *1085 *Hispidus*, Payk. | Bijvoegs. n^o. 724^a. M. 765, 6. Redt. *ibid.*
In Junij op beukenzwammen, Snell.
- *1086 *Micans*, Herbst. | N. n. 724. M. 765, 6. Redt. *ibid.*
In Julij des avonds vliegende gevangen op de Glijphoeve, v. V.

- 1087 *Nitidus*, Herbst. | N. n. 726. M. 765, 16. Redt. 2 ed. 573.
In Maart op de Glijphoeve in zwammen, v. V.
- Dryophilus** CHEVR.
- 1088 *Pusillus*, Gyll. | Bijvoegs. n^o. 722^a. M. 768, 1. Redt. 344 — 2 ed. 568.
Tweemaal bij Utrecht, Six.
- Priobium** MOTSCH.
- 1089 *Castaneum*, F. | N. n. 722. M. 769, 1. Redt. 2 ed. 564.
Op oude eiken in het Haagsche bosch in Junij, v. V. — In Maart in meidoornhout te Breda, Heyl.
- Anobium** F.
- 1090 *Striatum*, Ol. | N. n. 718. M. 770, 3. Redt. 345 — 2 ed. 565.
Alom zeer gemeen.
- 1091 *Paniceum*, L. | N. n. 720. M. 770, 15. Redt. 344 — 2 ed. 564.
In huizen en bakkerijen; bij duizenden met de parasiten uit scheepsbesluit gekweekt, v. V. — In 1846 bij millioenen in een huis te 's Gravenhage, dat daardoor onbewoonbaar werd, J. van der Hoeven.
- 1092 *Tesselatum*, F. | N. n. 717. M. 771, 1. Redt. 345 — 2 ed. 565.
Bij Rotterdam en den Haag, Sn. — Bij den Haag in April, v. d. W. — Op vermolmd hout, v. V. — Op oude eiken in het Haagsche bosch, Everts. — In September op gevelde boomen niet ver van Breda, Heyl.
- 1093 *Molle*, L. | N. n. 719. M. 772, 10. Redt. 346 — 2 ed. 566.
In October 1848 op de Glijphoeve, v. V.
- 1094 *Minutum*, F. | N. n. 721. Niet bij Marseul. Redt. 2 ed. 564.
Bij Rotterdam, Gijsb. H. — Bij Leyden en den Haag, v. V. — Bij Utrecht, Six. — In groote menigte met zijn parasiet uit *Radix Bardanae* (klissenwortels) van 's Rijks Herbarium te Leyden, v. Hall.
- Ptilinus** GEOFFR.
- *1095 *Costatus*, Gyll. | Bijvoegs. n^o. 728^a. M. 776, 1. Redt. 353 — 2 ed. 559.
Een wijfje te Brummen, v. Itt.
- 1096 *Pectinicornis*, L. | N. n. 728. M. 776, 2. Redt. ibid.
Een wijfje in Holland, v. W. — In Julij te Leyden; den 13den Julij 1850 zwermden honderden mannetjes om een tuinhuisje van elzenhout waarop eenige wijfjes zaten, op de Glijphoeve, v. V. — Te Brummen, v. Itt.
- Ochina** STEPH.
- 1097 *Heileriae*, Müll. | M. 778, 2. Redt. 347 — 2 ed. 562.
In Limburg aangetroffen door den heer Maurissen.

Xyletinus LATR.

- 1098 *Laticollis*, Dfts. | M. 782, 9. Gyll. *Ins. Succ.*, IV. app. p. 330, 4. Redt. 352 — 2 ed. 560.
In de duinen, Piag. *op eenig 1000 voet: Zogt het op de duinen. 1818*

Dorcatoma HERBST.

- *1099 *Bovistae*, Koch. | N. n. 727. M. 788, 1. Redt. 352 — 2 ed. 562.
Slechts eenmaal gevangen, bij Bennebroek in Aug. v. V.

Hedobia ZIEGL.

- 1100 *Imperialis*, L. | N. n. 712. M. 792, 2. Redt. 341 — 2 ed. 554.
Een paar malen te Leyden in Mei des avonds vliegende gevangen,
v. V. — In Junij bij den Haag, v. d. W. — Te Voorst, Wtt.

Ptinus L.

- *1101 *Sexpunctatus*, | N. n. 713. M. 793, 20. Redt. 342 — 2 ed. 555.
Panz. Bij Rotterdam, v. V.
*1102 *Dubius*, Sturm. | M. 793, 22. Redt. 2 ed. 556.
In October te Renkum, Groll.
*1103 *Rufipes*, F. | N. n. 715. M. 793, 24. Redt. 342 — 2 ed. 556.
Eenmaal het wijfje op elzen te Brummen, v. W. — Twee wijfjes
te Hoogeveen, Steenb.
*1104 *Fuscus*, Dej. | Bijvoegs. n^o. 714^a. M. 793, 25. Redt. 2 ed. 556.
Een wijfje te Utrecht, Six.
1105 *Fur*, L. | N. n. 714. M. 793, 33. Redt. 342 — 2 ed. 556.
Alom zeer gemeen.
1106 *Crenatus*, F. | N. n. 716. M. 794, 5. Redt. 343 — 2 ed. 557.
In grutterswaren, doch niet gemeen, v. V. — Te Rotterdam, Sn.
1007 *Hololeucus*, | M. 794, 1. Redt. 2 ed. 558.
Fald. Een ex. in een stuk laken, een ander tusschen oude zijden linten
te Amst, Kink. — Eenige exx. in rollen foelietin voor spiegels, Sala.

HETEROMERA.**Blaps** F.

- *1108 *Obtusa*, F. | N. n. 1142, M. 856, 5 (*Mucronata* Latr.). Redt. 598 — 2 ed. 591. *1818 10 10*
Eenmaal in een tuin bij den Haag, v. V. — Te Rotterdam in
kelders, zeldzaam, Sn. — Een voorwerp in een paardenstal bij den Haag,
Everts. — In Junij en Aug. in een wijnkelder naast mijn huis te
Amsterdam, Kink.
1109 *Fatidica*, Creutz. | N. n. 1141. M. 856, 38 (*Similis* Latr.). Redt. *ibid.*
In het Westland, v. d. W.

Crypticus LATR.

- 1110 *Glaber*, F. | N. n. 1143. M. 875, 5. Redt. 600 — 2 ed. 598.
 In de omstreken van Leyden, zeldzaam; bij Haarlem en Amersfoort
 vrij gemeen, v. V. — Bij Velzen in Junij en te Naarden in Aug.,
 Kink. — Bij Driebergen in Junij, Six. — Bij Zeist, Mart. — In
 Gelderland, v. d. W. — Op Walcheren, G.

Heliopathes DEJ.

- 1111 *Gibbus*, F. | N. n. 1140. M. 890, 3. Redt. 598 — 2 ed. 594.
 Zeer gemeen op de laatste rijen der duinen; ook in April en Junij op de
 Glyphoeve aangetroffen, v. V. — Bij Utrecht, Six. — Op Walcheren, H.

Opatrum F.

- 1112 *Sabulosum*, L. | N. n. 1139. M. 898, 7. Redt. 597 — 2 ed. 596.
 Op de duinen bij Katwijk, v. V. — Gemeen in April aan den
 duinkant naar de rigting van Waalsdorp, v. V. — Omstreken van
 den Haag, Sn. — Gemeen in de Haagsche duinen, Everts.

Microzoum DEJ.

- 1113 *Tibiale*, F. | N. n. 1138. M. 907, 1. Redt. 597 — 2 ed. 597.
 Op de Hollandsche duinen en in April op de Glyphoeve, v. V. —
 Bij den Haag in April, Sn. — Te Katwijk, Drechsl. — Op de heide
 achter de Bildt, Six.

Phaleria LATR.

- 1114 *Cadaverina*, F. | N. n. 1137. M. 914, 2. Redt. 2 ed. 600.
 Op Walcheren twee exemplaren, G. — Te Katwijk, Kopp. — Te
 Zandvoort in Aug., Kink. — Vrij gemeen in Aug. en Sept. onder
 doode visschen aan het strand te Scheveningen, v. Br. en v. V.

Gnathocerus THUNB.

- *1115 *Cornutus*, F. | M. 923, 1. Redt. 2 ed. 609. Spry et Shuck. *Brit. Col. Pl. LVIII*, fig. 2.
 In een flesch met arrowroot aangetroffen, v. d. W.

Tribolium Mac. L.

- 1116 *Ferrugineum*, F. | N. n. 1134. M. 924, 1. Redt. 593 — 2 ed. 608.
 Eenmaal op eene provisiekamer, v. V. — Was in de Collectie
 van Eyndhoven aanwezig met een etiquette, waaruit bleek dat het
 voorwerp inlandsch was.

Alphitobius STEPH.

- *1117 *Diaperinus*, | N. n. 1135. M. 928, 1. Redt. 594 — 2 ed. 606.
 Panz. | Eenmaal bij Rotterdam, Snell.

Platydema

violacea F.

Bes. bek. (hous. f.) 4's May. 1874. 7 roojen opgesteld naar Leeb

Hypophloeus F.

- 1118 *Depressus*, F. | N. n. 1132. M. 932, 1. Redt. 592 — 2 ed. 610.
Binnen Leyden, v. V.
- *1119 *Castaneus*, F. | N. n. 1133. M. 932, 3. Redt. 592 — 2 ed. 609.
Door den heer Maitland gevangen.
- *1120 *Bicolor*, F. | M. 932, 10. Redt. 593 — 2 ed. 610.
In de omstreken van Haarlem, Groll.

Tenebrio L.

- 1121 *Molitor*, L. | N. n. 1136. M. 945, 1. Redt. 595 — 2 ed. 612.
Zeer gemeen en bekend onder den naam van meelworm.

Helops F.

- *1122 *Pallidus*, Curt. | Bijvoegs. n°. 1144^a. M. 949, 69. Curtis, VII, 298.
Door den heer Perrin op de duinen van Katwijk gevangen.
- 1123 *Carabooides*,
Panz. | N. n. 1144. M. 949, 78 (*Striatus*, Fourc.). Redt. 601 — 2 ed. 619.
In de omstreken van Leyden, v. V. — Bij den Haag, v. d. W. —
Aan de Bildt bij Utrecht, Piag. S. en V. — te Driebergen, Six
en de Gav. — Te Hoogeveen, Steenb. — In Aug. te Wolfheze,
Kink. — In Aug. te Beek, v. V.

Allecula F.

- 1124 *Morio*, F. | N. n. 1145. M. 959, 1. Redt. 601 — 2 ed. 622.
In Zuid-Holland, v. d. W.

Prionychus SOL.

- 1125 *Ater*, F. | N. n. 1146. M. 960, 2. Redt. 602 — 2 ed. 624.
Eenige voorwerpen bij Rotterdam, een enkel te Wort-Rhede in
Aug. v. V. — Bij Rotterdam zeldzaam, Sn. — Uit de larve ge-
kweekt te Zwolle, C. B. Voet.

Cistela GEOFFR.

- *1126 *Morio*, Dahl. | N. n. 1147. M. 961, 10 (*Maurina*? Muls?). Redt. 602 — 2 ed. 621.
Den 7^{en} Julij 1853 tusschen gras en braamstruiken op het duin
ter zijde van het Scheveningsche badhuis, v. V.
- 1127 *Murina*, L. | N. n. 1148. M. 960, 20. Redt. 603 — 2 ed. 623.
Bij Leyden, W. — In Junij op de Glijphoeve, v. V. — Vrij
gemeen in Julij op de Scheveningsche duinen, v. d. W. en v. V.

Mycetocharis LATR.

- 1128 *Linearis*, Ill. | N. n. 1151. M. 961, 1 (*Barbata* Latr.). Redt. 605 — 2 ed. 621.
Eenmaal bij Rott. en in Junij op de Glijphoeve, v. V. — Meer-
malen op stammen van oude boomen in het Haagsche bosch aange-
troffen, Everts. — Op Walcheren, G. — Bij Brummen, v. W. —
Het ♂ in Noord-Brabant, Roel.

Cteniopus SOL.

- 1129 *Sulphureus*, L. | N. n. 1150 et 1149 (*Bicolor* F.). M. 963, 4. Redt. 603 — 2 ed. 625.
 In Julij en Aug. gemeen in de Zuid-hollandsche duinen, W., v. d. W., Sn. en v. V. — Te Overveen in Julij gemeen op schermdragende planten, Kink. — De var. *Bicolor*, vroeger als zelfstandige soort beschouwd, werd eenmaal door Dr. Piaget, en eenmaal door mij in de duinen aangetroffen.

Salpingus ILL.

- 1130 *Castaneus*, Panz. | M. 966, 5. Redt. 630 (*Piceae*) — 2 ed. 668.
 Te Driebergen, Six. — Op Beekhuizen bij Velp in Julij in het gras, Kink.

Rhinosimus LATR.

- 1131 *Planirostris*, F. | N. n. 1179. M. 968, 2. Redt. 631 — 2 ed. 669.
 Door de heeren Gerdes en v. Bemmelen te Wassenaar gevangen. — In Sept. bij den Haag, v. V. — Bij Utrecht, Six. — In Januarij in vermolmd hout te Frankendaal bij Amsterdam, Kink.

Orchesia LATR.

- 1132 *Micans*, Panz. | M. 972, 1. Redt. 611 — 2 ed. 627.
 De imago te Utrecht in Mei; de larve in Oct. in een hollen eik op de Duno bij Oosterbeek (het volkomen insect verscheen daaruit in de maand Mei van het volgende jaar), Groll.

Hallomenus PANZ.

- 1133 *Humeralis*, Panz. | M. 973, 1. Redt. 610 — 2 ed. 628. Panz. *Faun.* 16, 17.
 Een enkel voorwerp den 15^{en} Mei bij Utrecht, Six.

Melandrya F.

- 1134 *Caraboides*, L. | N. n. 1152. M. 983, 1. Redt. 606 — 2 ed. 632.
 Bij den Haag, v. d. W. — In Mei te Hillegom, Kink. — Tweemaal te Heemstede en zes exemplaren in Junij 1858 te Voorst op een ouden eikenboom, v. V. — In Friesland, G.

Conopalpus GYLl.

- *1135 *Testaceus*, Oliv. | M. 985, 1. Redt. 2 ed. 631.
 In Julij in het Haagsche bosch, tegen een boomstam, Everts.

Lagria F.

- 1136 *Hirta*, L. | N. n. 1176. M. 990, 5. Redt. 629 — 2 ed. 634.
 Zeer gemeen bij Wassenaar en Katwijk in Julij, v. V. — Te Rotterdam vrij gemeen, Sn. — Op Walcheren, H. — De 1^{en} Mei te Beek gevangen, Six.

Pyrochroa GEOFFR.

- *1137 *Coccinea*, L. | N. n. 1177. M. 991, 1. Redt. 629 — 2 ed. 634.
In Noord-Brabant, v. Itt.
- 1138 *Rubens*, F. | N. n. 1178. M. 991, 2 (*Satrapa* Schr.) Redt. 629 — 2 ed. 635.
Niet zeldzaam in Mei in Holland, v. V. — Bij Leiden, Kopp.
v. Bemm. en Wtt. — In Junij bij Amsterdam en Abcoude, Kink. —
Bij Utrecht, Six.

Xylophilus LATR.

- 1139 *Populneus*, F. | N. n. 1185. M. 996, 7. Redt. 635 — 2 ed. 641.
Bij Leyden en in Mei bij Heemstede, v. V. — In Mei bij Utrecht, Six.

Notoxus GEOFFR.

- 1140 *Monoceros*, L. | N. n. 1181. M. 999, 5. Redt. 632 — 2 ed. 636.
Bij Leiden zeldzaam, G. en v. V. — In 1852 gemeen bij den
Haag, v. d. W. — In groote menigte op de bloem van reinevaren
aan het strand der Zuiderzee bij Naarden in Aug., Kink. — Bij
Utrecht, v. Hass. — Bij Arnhem in Aug., Snell. — Bij Brummen,
v. W. — In Junij bij Voorst, v. V. — Eene zeer fraaije verscheiden-
heid in de Zuid-hollandsche duinen gevangen door den heer Piaget.
- *1141 *Cornutus*, F. | N. n. 1180. M. 999, 11. Redt. *ibid.*
Eenmaal, G.

Anthicus PAYK.

- *1142 *Pedestris*, Ross. | N. n. 1184. M. 1002, 5. Redt. 633 — 2 ed. 637.
In Sept. bij Scheveningen, v. Br.
- 1143 *Bimaculatus*, Ill. | M. 1005, 8. Redt. 2 ed. 640.
In Mei op de duinen bij den Haag, Everts.
- 1144 *Floralis*, L. | N. n. 1183. M. 1005, 9. Redt. 633 — 2 ed. 639.
In Sept. bij Rotterdam, Snell. — Tweemaal bij Leyden, in Sept.
op de duinen bij den Haag en in Aug. op Sterkenburg bij Drie-
bergen, v. V. — In de omstreken van Utrecht, Six. — Bij Brum-
men, v. Itt. — In Friesland, G.
- 1145 *Antherinus*, L. | N. n. 1182. M. 1005, 37. Redt. 634 — 2 ed. 640.
Bij Rotterdam, Snell. — In het voorjaar en weder in Sept. niet
zeldzaam bij Amsterdam onder dood riet, Kink. — Bij Utrecht,
v. V. en Six. — Bij Amersfoort in Sept., Six. — Bij Brummen,
v. W. — In Friesland, G.
- 1146 *Flavipes*, Panz. | M. 1005, 55. Panz. 38, 22. Redt. 634 — 2 ed. 640.
In Mei op de duinen bij den Haag, Everts.

Mordella L.

- 1147 *Fasciata*, F. N. n. 1153. M. 1008, 6. Redt. 614 — 2 ed. 643.
Zeldzaam te 's Gravenhage, v. V. — Gemeen te Brummen, v. W en v. V. *Prof. Lij*
- 1148 *Aculeata*, L. N. n. 1154. M. 1008, 12. Redt. *ibid.*
Niet ongemeen op bloemen in het voorjaar, v. V.
- *1149 *Abdominalis*, L. N. n. 1156. M. 1009, 1. Redt. 615 — 2 ed. 644.
Bij Brummen, v. W.
- *1150 *Brunnea*, F. N. n. 1158. M. 1009, 3. Redt. *ibid.*
Bij Brummen, v. W.
- 1151 *Variegata*, F. N. n. 1157. M. 1009, 4. Redt. *ibid.*
Bij Utrecht, Six. — Zeldzaam bij Brummen, v. W.
- 1152 *Pumila*, Gyll. N. n. 1155. M. 1009, 14. Redt. 614 — 2 ed. 643.
Eenige voorwerpen den 25^{en} Junij 1851 op *Hieracium pilosella*
in de duinen bij Scheveningen, v. V. — Te Velzen in Junij, Kink. —
In Junij te Voorst, v. V.
- Anaspis** GEOFFR.
- *1153 *Rufilabris*, Bijvoegs. n^o. 1160^a. M. 1011, 2. Redt. 616 — 2 ed. 645.
Sturm. Bij den Haag, v. d. W. — In Junij te Velzen en bij Amst., Kink.
- 1154 *Frontalis*, L. N. n. 1159. M. 1011, 3. Redt. *ibid.*
Vrij gemeen in Mei op bloemen, vooral van *Cornus sanguinea* en
pijpkruid (*Chaerophyllum sylvestre*).
- 1155 *Assimilis*, v. V. N. n. 1160. M. 1011, 18.
Tweemaal in Mei op de Glijphoeve, v. V. — Bij den Haag, v. d. W.
- 1156 *Humeralis*, Ol. N. n. 1161. M. 1011, 9 (*Geoffroyi*, Mull.). Redt. 615 — 2 ed. 645.
Bij Leyden in Junij, H. — Bij den Haag in Mei, Snell, v. d. W.
en v. V. — Bij Heemstede, v. V. — Bij Haarlem, Buse. — Bij Hille-
gom in Mei, Kink. — Op Wikkenburg in Sept. Wtt. — Bij Utrecht, Six.
- 1157 *Quadripustu-* Germ., *Mag.* IV. p. 212, 14. Redt. 2 ed. 646.
lata, Müll. Bij Haarlem, Buse.
- *1158 *Ruficollis*, F. Bijvoegs. n^o. 1162^a. M. 1011, 10. Redt. 616 — 2 ed. 645.
In de omstreken van den Haag, v. d. W. — Bij Breda, Heyl.
- *1159 *Thoracica*, L. N. n. 1162. M. 1011, 12. Redt. *ibid.*
Op Walcheren, G. — In Junij in het Haagsche bosch, Piag. —
Bij Amsterdam in Mei, Kink.
- 1160 *Flava*, L. Bijvoegs. n^o. 1165^a. M. 1011, 13. Redt. *ibid.*
Bij den Haag, v. d. W. — In Junij te Utrecht, Wtt. *1165^a M. Lij (B.)*
- 1161 *Nigricollis*, N. n. 1163.
Latr. In Mei en Junij op de Glijphoeve, v. V. — Bij Brummen, v. W.
- 1162 *Obscura*, Gyll. N. n. 1164. Redt. 616 — 2 ed. 645. M. 1011, 17 (*Maculata*, Geoffr.)
Gemeen bij Rotterdam, Snell. — In mei op de bloemen van *Sorbus*
aucuparia bij den Haag en Leyden, v. V. — In de duinen, Piag. —
In Junij bij Amsterdam, Kink. — Bij Utrecht, v. Hass.

- 1163 *Testacea*, v. V. N. n. 1165. M. 1011, 19.
In Friesland, G — Bij den Haag en op de Glijphoeve in Junij, v. V. — Bij Utrecht, Six.
- Meloe** F.
- 1164 *Proscarabaeus*, L. N. n. 1166. M. 1020, 1. Redt. 618 — 2 ed. 650.
Bij Voorschoten, W. — Op Walcheren, G. — Te Velp, v. W. — In Mei 1867 te Brummen, v. V. — Onderscheidene ex. bij Nijmegen, v. d. W. — In Maart bij Leyden, ter Meer. — Aldaar in Junij, v. V. — In Drenthe, Cl. Muld.
- 1165 *Violaceus*, Marsh. N. n. 1167. M. 1020, 3. Redt. *ibid.*
In Junij bij Leyden in een moestuin, v. V. — Bij Woerden, d. Gr. — Te Brummen, v. W. — In Mei op Sterkenburg bij Driebergen door den heer Kneppelhout gevangen. — Een gepaard paar bij Zutphen den 13^{en} April, v. Eyndh.
- 1166 *Majalis*, L. N. n. 1168. M. 1020, 6. Redt. 618 (*Variiegatus*, Don.). — 2 ed. 651.
Bij Utrecht, Maitl. — Meer dan eens bij Brummen, v. W. — Bij Arnhem, v. d. W. — Bij Katwijk in Mei, de reiziger van Dam.
- *1167 *Brevicollis*, Panz. N. n. 1169. M. 1020, 29. Redt. 619 — 2 ed. 651.
Bij Amersfoort, v. W. — In Drenthe, Cl. Muld.
- Cantharis** GEOFFR.
- *1168 *Vesicatoria*, L. N. n. 1170. M. 1029, 7. Redt. 620 — 2 ed. 654.
In Gelderland, v. V. — Bij Zevenaar op esschen, v. Itt. — Te Doetinchem volgens mededeeling op de vergad. der N. E. V. in 1860.
- Nacertes** SCHÖNH.
- 1169 *Melanura*, L. N. n. 1172. M. 1043, 1 (*Lepturoides*, Thb.). Redt. 623 — 2 ed. 660.
Bij den Haag, v. d. W. — Te Leyden, en de larven uit het paalwerk van het IJ, Herkl. — Twee voorwerpen op paalwerk aan het strand van Loosduinen, Everts. — Bij den Haag in Junij, Snell. — In Julij binnen 's huis te Amsterdam, Kink. — In Zeeland gemeen, G. — Bij Wassenaar, v. V.
- Asclera** DEJ.
- *1170 *Sanguinicollis*, F. N. n. 1171. M. 1045, 1. Redt. 622 — 2 ed. 661.
In Noord-Brabant, v. Itt.
- Oedemera** OLIV.
- 1171 *Coerulea*, L. N. n. 1173. M. 1049, 21. Redt. 626 — 2 ed. 662.
Een mannetje in Noord-Brabant, v. Itt. — Verscheidene mannetjes en een wijfje in de omstreken van Breda, Heyl.
- 1172 *Virescens*, L. N. n. 1174. M. 1049, 24. Redt. 626 — 2 ed. 663.
In September bij Scheveningen, v. Br. — Te Noordwijk in Julij en op andere plaatsen in Holland, v. V. — Te Velzen in Junij, Kink.

- 1173 *Lurida*, Marsh. | N. n. 1175. M. 1049, 26. Redt. *ibid.*
 Niet zeldzaam op planten in Zuid-Holland, voornamelijk in Junij op *Leontodon hispidum*, v. V. — Bij Utrecht, Six. — Bij Abcoude en Velzen in Junij, Kink. — Te Groningen, v. Bemm. en de Gav.
- Chrysanthia** SCHM.
- 1174 *Viridis*, Schm. | Bijvoegs. n°. 1172^a. M. 1052, 3. Redt. 625 — 2 ed. 665.
 Tweemaal bij Driebergen gevangen, Six.

CURCULIONIDEA.

Cneorhinus SCHÖNH.

- 1175 *Geminatus*, F. | N. n. 896. M. 1056, 7. Redt. 456 — 2 ed. 698.
 Zeer gemeen op de duinen bij Katwijk en Scheveningen, v. V. — Bij Wassenaar, v. Bemm. en Six. — Bij Hoogeveen, Steenb. — In Noord-Brabant, Roel. *Op de gr...*

Liophloeus GERM.

- 1176 *Nubilus*, F. | N. n. 866. M. 1057, 1. Redt. 443 — 2 ed. 717.
 Bij Rotterdam en Brummen, v. W. — Op Walcheren, G. — Bij Leyden, Kopp. — In den Bommelerwaard op zuring in Junij, Snell. — Te Paterswolde in Junij, de Gav.

Barynotus GERM.

- 1177 *Obscurus*, F. | M. 1058, 3. Redt. 443 — 2 ed. 718.
 Omstreken van Utrecht in Junij, Groll. — In Mei bij Groningen, de Gav.

Strophosomus BILB.

- 1178 *Coryli*, F. | N. n. 892. M. 1060, 1. Redt. 456 — 2 ed. 699.
 Op berken in het voorjaar, op hazelaren te Brummen (gemeen) en bij den Haag in Oct., v. V. — Te Overveen in Oct., en in Febr. onder het mos der boomstammen te Hillegom, Kink. — Bij Hoogeveen, Steenb. — Te Groningen, de Gav. — In Noord-Brabant, Roel.
- 1179 *Limbatu*s, F. | N. n. 894. M. 1060, 13. Redt. 2 ed. 698.
 Bij Utrecht, S. en Six. — Te Breda, Heyl.
- 1180 *Faber*, Herbst. | N. n. 893. M. 1060, 18. Redt. *ibid.*
 Eenmaal in Julij op Rhienderstein bij Brummen v. V. — Te Hillegom in Maart onder afgevalen bladeren, Kink. — Vier voorwerpen in Julij onder steenen in het duin bij den Haag, Everts.
- 1181 *Squamulatus*, F. | N. n. 895. M. 1061, 4. Redt. 456 — 2 ed. 699.
 Bij Leyden en in Oct. bij den Haag, v. V. — In Sept. bij Rotterdam, Snell. — Bij Arnhem in Aug. de Gav. — Te Wolfheze in Junij, Kink. — Gemeen in Noord-Brabant, Roel. en Wtt.

Sciaphilus SCHÖNH.

- 1182 *Muricatus*, F. | N. n. 891. M. 1063, 1. Redt. 454 — 2 ed. 700.
Bij den Haag op gras tamelijk gemeen, Snell. en v. V.

Brachyderes SCHÖNH.

- 1183 *Incanus*, L. | N. n. 889. M. 1068, 11. Redt. 454 — 2 ed. 701.
Bij Rotterdam op distels, Snell. — Bij Utrecht, S. — Eenmaal bij Heemstede, v. V.
- 1184 *Lepidopterus*,
Chevr. | N. n. 890. M. 1068, 14. Redt. ibid.
Tweemaal in Zuid-Holland, v. d. W. — In October aan de Glip, v. V. — Gemeen te Velp, Rhede en Renkum op jonge beuken, Wtt. en v. V.

Sitones GERM.

- 1185 *Griseus*, F. | N. n. 882. M. 1071, 4. Redt. 2 ed. 705.
Op de duinen in April, v. V. — Aan de Vogelenzang in Mei en te Soest in Aug., Kink. — Te Voorst, Wtt. — Bij Groenlo op brem in Mei en in Noord-Brabant, Snell. — Mede in Noord-Brabant, Roel. — Eene verscheidenheid in de eerste dagen van Mei te Beek, Six.
- 1186 *Flavescens*, Marsh. | N. n. 885 (*Caninus*, Gyll.). M. 1071, 10. Redt. 452 — 2 ed. 703.
Alom vrij gemeen.
- *1187 *Sulcifrons*, Thb. | N. n. 885. M. 1071, 14. Redt. 452 (*Medicaginis*, Redt.) — 2 ed. 740.
Tweemaal in Aug. aan de Glip, v. V.
- 1188 *Lineellus*, Bond. | Bijvoegs. n^o. 887^a. M. 1071, 19. Redt. 453 — 2 ed. 705.
Bij Utrecht, Six.
- *1189 *Waterhousei*,
Walton. | M. 1071, 21. Redt. 453 (*Setosus*) — 2 ed. 705.
Bij Amsterdam in Maart en April onder aangespoeld riet, Kink.
- 1190 *Cambricus*, Steph. | M. 1071, 29. Schönh. *Cure*. VI, I, 257, 8 (*Sit. constrictus*). Redt. 2 ed. 703.
Te Voorst in April, v. V.
- 1191 *Lineatus*, L. | N. n. 886. M. 1071, 34. Redt. 451 — 2 ed. 703.
Overal zeer gemeen.
- 1192 *Hispidulus*, F. | N. n. 887. M. 1071, 48. Redt. 452 — 2 ed. 704.
Bij den Haag, v. d. W. — Bij Leyden in October, v. V. — In April bij Utrecht, Six.
- 1193 *Tibiellus*, Schh. | Bijvoegs. n^o. 886^a. M. 1071, 49. Redt. 452 — 2 ed. 704.
Bij Brummen, v. Itt. — In Sept. te Rotterdam, Snell.

Metallites GERM.

- *1194 *Atomarius*, Oliv. | N. n. 873. M. 1072, 6. Redt. 448 — 2 ed. 710.
In Mei en Junij bij den Haag en in Junij te Goes, v. V.

- *1195 *Iris*, Oliv. | N. n. 872 (*Ambiguus*, Schönh.). M. 1072, 11. Redt. 447 — 2 ed. 709.
In Mei bij den Haag, v. V.

Polydrosus GERM.

- 1196 *Unilatus*, F. | Bijvoegs. n^o. 875^a. M. 1074, 1. Redt. 449 — 2 ed. 708.
Bij Utrecht, Six. — Op elzen bij Zutphen in Mei vier voorwerpen, v. Eyndh.
- 1197 *Flavipes*, de Gr. | N. n. 874. M. 1074, 21. Redt. *ibid*.
Alom vrij gemeen.
- 1198 *Pterygomalis*, Schh. | N. n. 875. M. 1074, 22. Redt. 449 — 2 ed. 707.
Volgens Schönherr in Holland. — Meer dan eens bij den Haag in Mei, v. V. — Bij Utrecht, v. Hass. en Six. — Te Wassenaar, Piag.
- *1199 *Corruscus*, Müll. | N. n. 879. M. 1074, 23. Redt. 449 — 2 ed. 708.
Op berken bij den Haag, Sn en v. V.
- 1200 *Cervinus*, L. | N. n. 876. M. 1074, 27. Redt. 448 — 2 ed. 707.
In Holland zeer gemeen in Mei, v. V. — Bij Hoogeveen, Steenb. — In Mei te Oldhorst in Gelderland, Wtt. — Te Groningen, de Gav.
- *1201 *Chrysomela*, Schh. | N. n. 877. Redt. 448 — 2 ed. 707.
Eenmaal bij Leyden, v. V.
- 1202 *Sericeus*, Schall. | N. n. 878. M. 1074, 35. Redt. 449 — 2 ed. 708.
Bij den Haag op elzen, Snell. — Bij Leyden, in Junij op de Glijphoeve en in Mei te Noordwijk, v. V. — Bij Groningen, de Gav. — In Noord-Brabant, Wtt.
- 1203 *Micans*, F. | M. 1074, 41. Redt. 449 — 2 ed. 708.
In Limburg, Maur. — Vrij gemeen in de omstreken van Breda, Heyl.

Tanymecus GERM.

- 1204 *Palliatius*, F. | M. 1078, 1. Redt. 453 — 2 ed. 702.
In Julij bij Rotterdam op brandnetelen, v. V.

Chlorophanus DALM.

- 1205 *Viridis*, L. | N. n. 880. M. 1079, 1. Redt. 450 — 2 ed. 706.
Bij Utrecht, V. — Aldaar in Junij, Six. — Bij Groningen, de Gav. — Bij Driebergen, v. Bemm. en Six. — Bij Amersfoort in Junij, v. V. — Bij Hoogeveen, Steenb.
- *1206 *Pollinosus*, F. | N. n. 881. M. 1079, 3. Redt. *ibid*.
Eenmaal te Brummen, v. W.
- 1207 *Salicicola*, Germ. | M. 1079, 4. Redt. 450 — 2 ed. 706.
Een enkel inlandsch voorwerp is mij bekend geworden, gevangen door den heer Koppeschaar, waarschijnlijk in de omstreken van Leyden.

Otiorhynchus GERM.

- 1208 *Atroapterus*, Gyll. | N. n. 837. M. 1082, 74. Redt. 2 ed. 749.
Zeer gemeen op de laatste rij duinen langs het strand. *S.*

- 1209 *Raucus*, F. N. n. 840. M. 1082, 96. Redt. 425 — 2 ed. 747.
Bij Rotterdam, v. W. — Bij Utrecht in Sept., v. V. *J II 7 164/2*
- 1210 *Porcatus*, Herbst. M. 1082, 144. Redt. *ibid.*
In Zuid-Holland, Kink. — In Holland, de Haan. — Bij Utrecht, v. V.
- 1211 *Septentrionis*,
Herbst. N. n. 839. M. 1082, 145. Redt. *ibid.*
Op de Glijphoeve in Febr. en te Rotterdam in Mei, v. V. — Ter
laatstgen. plaats zeldzaam, Snell.
- 1212 *Picipes*, F. N. n. 838. M. 1082, 194 Redt. *ibid.*
In de omstreken van Utrecht niet ongemeen S. en V. — Aldaar
in Mei, Six. — Op de Glijphoeve in Mei, te Brummen in Julij,
v. V. — In April bij Amsterdam onder steenen, Kink. — Bij
Hoogeveen, Steenb. — In Junij bij Groningen, de Gav. — In
Noord-Brabant, Wtt. en Heyl.
- 1213 *Sulcatus*, F. N. n. 841. M. 1082, 239. Redt. 426 — 2 ed. 748
Bij Schiedam, v. W. — Bij Rotterdam in Junij in tuinen, Snell. —
Bij den Haag en in Junij bij Leyden, v. V. — Te Leyden, Kopp. —
Te Noordwijk in Oct., Kink. — Bij Groningen in Aug., de Gav.
- 1214 *Ovatus*, L. N. n. 842. M. 1082, 316. Redt. *ibid.*
Door het geheele land, hier en daar vrij gemeen.

Omius GERM.

- 1215 *Hirsutulus*, F. Bijvoegs. n^o. 842^a. M. 1090, 21. Redt 428 — 2 ed. 737.
Bij de Bildt in Julij op gras, Six.
- *1216 *Brunnipes*, Ol. Bijvoegs. n^o. 842^b. M. 1090, 25. Redt. 429 — 2 ed. 738.
Bij Brummen, v. Itt. — Bij Rhederoord in Julij, Kink.
- *1217 *Concinnus*, Sch. Bijvoegs. n^o. 842^c. M. 1090, 39. Redt. *ibid.*
Bij Utrecht, Six.

Trachyphloeus GERM.

- 1218 *Scabriculus*, L. M. 1092, 6. Redt. 430 (*♂ erinaceus* et *♀ scabriculus*) — 2 ed. 734.
Te Utrecht in Mei, Groll. en Six. — Den 28^{en} Mei bij Zutphen,
v. Eynth. — Ook door de Gav. gevangen, waarschijnlijk bij Groningen.

Phyllobius GERM.

- 1219 *Calcaratus*, F. N. n. 843. M. 1100, 1. Redt. 431 — 2 ed. 710.
Op elzen in Junij en Julij bij den Haag en Rhijnsburg, v. V. —
In Maart bij Rotterdam, Snell. — Bij Utrecht, Six en Wtt.
- 1220 *Alneti*, F. N. n. 844 (*Pyri*, L.). M. 1100, 3. Redt. *ibid.*
Vrij gemeen in Mei bij Leyden en den Haag, v. V. — Bij Amsterdam
in April en Mei, Kink. — Bij Utrecht, Wtt. en Six. — Bij Hooge-
veen, Steenb.
- 1221 *Argentatus*, L. N. n. 845. M. 1100, 18. Redt. 431 — 2 ed. 711.
Overal zeer gemeen.

- 1222 *Oblongus*, L. N. n. 850. M. 1100, 28. Redt. 431 — 2 ed. 710.
Zeer gemeen en schadelijk. *... op de ...*
- 1223 *Vespertinus*, F. N. n. 846. M. 1100, 34 (*Pyri*, L.). Redt. 432 — 2 ed. 711.
Niet zeldzaam in Zuid-Holland, v. V. — In Maart bij Rotterdam, Sn. — In den Bommelerwaard, v. d. W.
- *1224 *Mutus*, Schh. N. n. 848. M. 1100, 35. Redt. 2 ed. 713.
Eene varieteit in Holland volgens Schönherr.
- *1225 *Ruficornis*, Dej. N. n. 847. M. 1100, 40 (*Incanus*, Gyll. var.) Redt. 432 — 2 ed. 711.
Eenmaal te Brummen, v. W.
- 1226 *Uniformis*, Marsh. N. n. 849. M. 1100, 54. Redt. 433 — 2 ed. 712.
Bij Rotterdam, Sn. — Bij Leyden, Kopp. en v. V. — Te Hillegom in Mei, Kink. — Te Brummen, v. Itt. — Bij Groningen, v. Bemm.
- Gronops** SCHÖNH.
- 1227 *Lunatus*, F. Bijvoegs. n^o. 867^a. M. 1112, 2. Redt. 444 — 2 ed. 716.
Bij Utrecht op zandgrond, Six. — Een voorwerp in Zuid-Holland, Kink.
- Molytes** SCHÖNH.
- 1228 *Germanus*, L. M. 1120, 2. Redt. 440 — 2 ed. 722.
In Limburg, Maur.
- Plinthus** GERM.
- *1229 *Caliginosus*, F. N. n. 861. M. 1123, 8. Redt. 438 — 2 ed. 725.
Eenmaal bij Brummen, v. Itt. — Mede aldaar, v. V.
- Alophus** SCHÖNH.
- 1230 *Triguttatus*, F. N. n. 867. M. 1130, 3. Redt. 444 — 2 ed. 717.
Eenmaal bij den Haag en in Augustus bij Brummen, v. V. — Eenmaal bij Utrecht, V. — Bij de Rhedersteeg, W. — In Junij bij Doesburg, Snell. — Op Walcheren, G. — Bij Groningen, de Gav. — In Noord-Brabant, Wtt.
- Phytonomus** SCHÖNH.
- 1231 *Punctatus*, F. N. n. 851. M. 1131, 2. Redt. 434 — 2 ed. 727.
In Zeeland, H. — Bij Rotterdam in Sept. op eiken en eschdoorn, Sn. — Bij den Haag, v. d. W. — Bij Leyden in Sept. en Nov. en in Aug. te Heemstede, v. V. — Bij Utrecht zeldzaam, V. en Six. — Bij Doorn, Piag. — In Aug. in den Haarlemmerhout, Rits.
- 1232 *Rumicis*, L. N. n. 852. M. 1131, 45. Redt. 436 — 2 ed. 729.
Bij den Haag, v. d. W. — Aldaar tamelijk gemeen in Mei, Sn. — Te Wassenaar, Piag. — Bij Brummen, v. W. — Te Voorst, Wtt.
- 1233 *Plantaginis*, F. N. n. 853. M. 1131, 61. Redt. 435 — 2 ed. 728.
In April en Aug. op gras bij Heemstede en Wassenaar, v. V. — Te Utrecht, Six.

- *1234 *Pedestris*, Payk. N. n. 854. M. 1131, 49.?
Eenmaal bij Brummen in Julij op gras, v. V.
- 1235 *Murinus*, F. N. n. 855. M. 1131, 64. Redt. 2 ed. 724.
Bij Leyden en in April en Aug. op de Glijphoeve. In Julij bij mij uitgekomen uit een rond, glanzig groen coconnetje aan een grashalm gevonden, v. V.
- 1236 *Variabilis*,
Herbst. N. n. 856. M. 1131, 66. Redt. 435 — 2 ed. 729.
Op de duinen bij Wassenaar, v. V. — In Aug. in de omstreken van Rotterdam, Sn. — Te Helpman bij Groningen in April, de Gav.
- 1237 *Polygoni*, F. N. n. 857. M. 1131, 68. Redt. 435 — 2 ed. 728.
In Zuid-Holland niet gemeen, v. V. — In Maart bij Amsterdam, Kink. — Gemeen te Voorst in Sept. Wtt. — Bij Groenlo op brem in Mei, Sn. — In Friesland op roggeären, Wtt.
- *1238 *Meles*, F. N. n. 858. M. 1131, 73. Redt. 436 — 2 ed. 730.
Eenmaal in Sept. op de Glijphoeve, v. V.
- 1239 *Plagiatus*, Redt. N. n. 859. M. 1131, 77. Redt. 437 — 2 ed. 730.
In Sept. bij Scheveningen, v. Br. — Te Beek in de eerste dagen van Mei, Six.
- 1240 *Nigrirostris*, F. N. n. 860. M. 1131, 79. Redt. *ibid.*
Op wilgen bij Rotterdam, Sn. — In April op de duinen bij den Haag en Wassenaar, in Maart en Sept. bij Heemstede; niet gemeen bij Brummen, doch aldaar tweemaal een rosse var. gevangen, v. V. — Vrij gemeen in Mei in de omstreken van Utrecht, Six. In Friesland, G.

Cleonus SCHÖNH.

- 1241 *Sulcirostris*, L. N. n. 869. M. 1138, 31. Redt. 445 — 2 ed. 714.
In de Hollandsche duinen, Piag, Kopp., Snell., Everts, v. V. — Bij Groningen in Junij, de Gav. *zeldzaam 3 Aug.*
- 1242 *Nebulosus*, L. N. n. 870. M. 1139, 1. Redt. 2 ed. 716.
In Zuid-Holland, v. d. W. — Bij Utrecht, Six. — Bij Wort-Rhede in Aug. v. V. — Te Hoogeveen Steenb. en de Gav.
- 1243 *Glaucus*, F. N. n. 868. M. 1143, 49. Redt. 2 ed. 715.
Op de duinen van Holland zeer zeldzaam, v. V.
- 1244 *Albidus*, F. N. n. 871. M. 1143, 52. Redt. 447 — 2 ed. 715.
Bij den Haag aan den duinkant, v. d. W.

Larinus SCHÜPP.

- 1245 *Carlinae*, Ol. N. n. 831. M. 1147. 54. Redt. 2 ed. 754 — 55.
Twee voorwerpen bij Rott. op een distel, Snell. — Gemeen bij Groningen, v. Bemm. — Gemeen aldaar in Junij, de Gav.

Lixus F.

- 1246 *Paraplecticus*, L. N. n. 832. M. 1148, 1. Redt. 420 — 2 ed. 752.
In de stengels van *Sparganium ramosum* bij Utrecht, S. — Te Rotterdam in Sept., Sn. — Bij Zutphen, v. Eyndh.
- 1247 *Turbatus*, Gyll. N. n. 883. M. 1148, 3. Redt. *ibid.*
Aan den duinkant bij Katwijk zeldzaam, v. V. — Uit riet in Augustus bij Rotterdam, Sn. — Bij Utrecht zeldzaam, V. — Omstreken van Amsterdam, de Haan.
- 1248 *Angustatus*, F. N. n. 834. M. 1148, 52. Redt. 420 — 2 ed. 753.
Bij Wassenaar, v. d. W.
- 1249 *Bicolor*, Oliv. N. n. 835. M. 1148, 66. Redt. *ibid.*
Eenmaal bij Katwijk en eenmaal in Mei bij Noordwijk op de duinen, v. V. — Te Overveen, half Junij, Rits.
- *1250 *Filiformis*, F. N. n. 836. M. 1148, 83. Redt. 420 — 2 ed. 752.
Eenmaal bij Katwijk-Binnen, v. V.

Lepyrus GERM.

- 1251 *Colon*, L. N. n. 864. M. 1150, 1. Redt. 442 — 2 ed. 720.
Aan den duinkant, v. V. — Te Wassenaar in Nov, de Gr. — Te Voorst in Junij, v. V. — Op Walcheren, H. — In Drenthe, Gock.
- *1252 *Binotatus*, F. N. n. 865. M. 1150, 3. Redt. *ibid.*
Eenmaal in Holland, v. W.

Hylobius GERM.

- 1253 *Abietis*, L. N. n. 862. M. 1151, 3. Redt. 441 — 2 ed. 721.
Vrij gemeen in dennenbosschen.

Pissodes GERM.

- 1254 *Pini*, L. N. n. 829. M. 1152, 2. Redt. 417 — 2 ed. 756.
Bij Zeist, v. V.
- 1255 *Notatus*, F. N. n. 830. M. 1152, 3. Redt. 417 — 2 ed. 756.
In Aug. bij Zeist, V. — Te Leyden in Mei, v. V. — Te Renkum en aan de Smilde in Mei, Wtt. — Bij Brummen, v. W. — Bij Roermond, Sn. — Ontvangen uit de Weymouthspijnen van den heer Baron d'Ablaing van Moersbergen, v. V.

Grypidius SCHÖNH.

- 1256 *Equiseti*, F. N. n. 813. M. 1156, 1. Redt. 410 — 2 ed. 765.
Op *Equisetum* bij den Haag in Junij, v. Iterson. — Op de Gliphoeve, in Junij en bij Leyden in Oct., v. V. — Bij Brummen, v. W. — In Friesland, G. — In Junij bij Utrecht, Six. — In Junij te Nieuwersluis, Kink.

Eriohinus SCHÖNH.

- 1257 *Bimaculatus*, F. N. n. 814. M. 1157, 1. Redt. 413 — 2 ed. 760.
In Mei bij Leyden, v. V. — Bij Warmond, Drechsler. — Op waterplanten en onder steenen aan den oever van het Haarlemmermeer, v. Bemm. en v. V. — Bij Brummen, v. Itt.
- 1258 *Scirpi*, F. N. n. 815. M. 1157, 3. Redt. *ibid.*
Zeldzaam in Holland, v. V. — Aan den oever van het Haarlemmermeer, v. Bemm. — Bij Utrecht, Six.
- 1259 *Acridulus*, L. N. n. 816. M. 1157, 4. Redt. *ibid.*
Zeer gemeen bij den Haag, v. d. W. — Bij Rotterdam in Junij en Julij op riet, Snell. — Bij Leyden, Kopp. en v. V. — In Junij in de omstreken van Utrecht, Wtt. — Bij Brummen, v. W. — In Noord-Brabant, v. Itt.
- *1260 *Aethiops*, F. N. n. 822. M. 1157, 8. Redt. 2 ed. 760.
Eenmaal in Mei aan den kant van den vijver op de Glijphoeve, v. V.
- 1261 *Festucæ*, Herbst. M. 1157, 15. Redt. 510 — 2 ed. 764.
Bij Rotterdam, Snell.

Dorytomus GERM.

- 1262 *Vorax*, F. N. n. 817. M. 1157, 19. Redt. 411 — 2 ed. 761.
Zeer gemeen in het voorjaar onder het mos der boomen, v. V. — Bij Rotterdam, Sn. — Bij Leyden, de Gr. — Bij Brummen, v. Itt. — In Noord-Brabant, Wtt. — De var. γ van Schönherr in aantal in Friesland, G. — Eene var. te Groningen, de Gav. en te Utrecht v. Hass.
- 1263 *Tremulae*, Payk. N. n. 818. M. 1157, 80. Redt. 412 — 2 ed. 762.
Bij Rotterdam zeldzaam, Sn. — In Mei bij den Haag, v. V. — Bij Leyden, Prof. J. v. d. Hoeven.
- *1264 *Costirostris*,
Gyll. M. 1157, 22. Redt. 412 (*bituberculatus*, Zett.) — 2 ed. 761.
In April onder den schors der populieren, Wtt.
- 1265 *Affinis*, Payk. N. n. 819. M. 1157, 24. Redt. 2 ed. 762.
Bij Rotterdam, v. W. — Aldaar in Junij, Sn. — Bij Leyden en in April op de Glijphoeve, v. V.
- *1266 *Taeniatus*, F. M. 1157, 26. Redt. 2 ed. 762.
In Mei te Hillegom onder dorre bladeren, Kink.
- 1267 *Majalis*, Payk. N. n. 820. M. 1157, 33. Redt. 413 — 2 ed. 762.
Bij Leyden in April, v. V. — Bij Rotterdam, Snell. — Bij Utrecht, v. Hass. — Te Voorst, Wtt. — Op den Omlanderdijk in Mei, de Gav.
- 1268 *Pectoralis*,
Panz. N. n. 821. M. 1157, 34. Redt. 412 — 2 ed. 761.
In October op de Glijphoeve, v. V.

- *1269 *Villosulus*, Meg. | N. n. 823. M. 1157, 38. Redt. 412 -- 2 ed. 763.
In Junij bij Heemstede, v. V.
- 1270 *Tortrix*, L. | N. n. 824. M. 1157, 40. Redt. 412 — 2 ed. 762.
Op populieren v. V. — Bij Haarlem, Buse. — In Noord-Brabant,
v. Itt. — Omstreken van Breda, Heyl. — Bij Utrecht, Six.

Mecinus GERM.

- 1271 *Pyrauster*, Herbst. | N. n. 749. M. 1158, 1. Redt. 371 — 2 ed. 818.
In Maart, Aug. en Oct. op de Gliphoeve, in April op de duinen
bij den Haag en in Julij bij Leyden, v. V. — Bij Utrecht, Six. —
In Aug. bij Groningen, de Gav. *de L.?*
- *1272 *Collaris*, Germ. | M. 1158, 5. Redt. ibid.
In Maart bij Amsterdam aan den IJkant onder aangespoeld riet, Kink.
- *1273 *Circulatus*,
Marsh. | M. 1158, 7. Redt. ibid.
Te Utrecht in Mei, Six.

Hydronomus SCHÖNH.

- 1274 *Alismatis*,
Marsh. | M. 1160, 1. Redt. 409 — 2 ed. 765.
Bij Rotterdam in Mei op waterplanten, Snell.

Bagous GERM.

- *1275 *Elegans*, F. | N. n. 782. M. 1161, 1. Redt. 2 ed. 795.
Twee exemplaren in riet bij Rotterdam, Snell.
- *1276 *Binodulus*,
Herbst. | Bijvoegs. n^o. 782^a. M. 1161, 2. Redt. 2 ed. 793.
Bij Utrecht, Six.
- 1277 *Lutulentus*, Gyll. | N. n. 783. M. 1161, 64. Redt. 393 — 2 ed. 597.
In Friesland, G. — In Mei op waterplanten bij Heemstede niet
zeldzaam. v. V. — In Maart te Hillegom en aan den oever van de
ringvaart om de Haarlemmermeer, Kink. — Bij Utrecht, Six.

Tanysphyrus GERM.

- 1278 *Lemnae*, F. | N. n. 863. M. 1165, 1. Redt. 442 — 2 ed. 721.
Gemeen bij den vijver op de Gliphoeve in Junij, v. V. — Bij
den Haag, v. d. W. — In Febr. en weder in Oct. bij Amsterdam;
in Maart te Hillegom aan het water onder aanspoelsel, Kink. —
Bij Utrecht, Six.

Anoplus SCHÖNH.

- 1279 *Plantaris*, Naez. | M. 1168, 1. Redt. 398 — 2 ed. 779. Gyll. *Ins. Suec.* III, 252,
n^o. 252. Spry and Shuck., pag. 58. Tab. LXVII, fig. 2.
Bij den Haag, v. d. W. — Bij Amersfoort in Aug. v. V. — In
April en Mei aan de Bildt, te Noordwijk en te Amsterdam, Kink.

Brachonyx SCHÖNH.

- 1280 *Indigena*, Herbst. N. n. 810. M. 1169, 1. Redt. 408 — 2 ed. 767.
Bij den Haag, v. d. W. *onder de mos bij de Haagse dijk*

Apion HERBST.

- 1281 *Pomonae*, F. N. n. 898. M. 1170, 1. Redt. 459 — 2 ed. 683.
Alom vrij gemeen. *op de dijk bij de Haagse dijk*
- 1282 *Craccae*, L. N. n. 899. M. 1170, 5. Redt. *ibid.*
Zeer gemeen in en om Leyden, v. V. — In Aug. te Brummen gemeen, v. W. en v. V. Het ♂ zeldzaam. — In Julij te Utrecht, met het mannetje, Six. — In April aan de Bildt op berken, Kink.
- 1283 *Onopordi*, Kirb. N. n. 901. M. 1170, 19. Redt. 461 — 2 ed. 685.
In Maart en in Mei op de Glijphoeve, in Julij op Schothorst te Hoogland, v. V. — In Mei te Zeist, Kink.
- *1284 *Pubescens*, Kirb. N. n. 921. M. 1170, 41. Redt. 2 ed. 687.
In September bij Scheveningen, v. V.
- 1285 *Atomarium*, Kirb. N. n. 920. M. 1170, 44. Redt. 460 — 2 ed. 684.
In Augustus bij Brummen, v. V.
- *1286 *Vernale*, F. M. 1170, 57. Redt. 462 — 2 ed. 687.
In het voorjaar en weder in Oct. op brandnetelen in de omstreken van Amsterdam, Kink. *op de dijk bij de Haagse dijk*
- 1287 *Radiolus*, Kirb. N. n. 922. M. 1170, 68. Redt. 460 — 2 ed. 685.
Eenmaal in Augustus op de Glijphoeve in stokrozen gemeen, v. V.
- 1288 *Aeneum*, F. N. n. 900. M. 1170, 70. Redt. *ibid.*
Bij Rotterdam gemeen, Sn. — Op Malva in Junij te Scheveningen, bij de Haagsche Schouw en te Leyden gemeen, v. V. — In Zeeland, Wtt.
- 1289 *Rufrostre*, F. M. 1170, 80. Redt. 462 — 2 ed. 687.
In Mei aan den IJkant bij Amsterdam onder aangespoelde ruigte, Kink. — Het mannetje bij Utrecht, Six.
- 1290 *Miniatum*, Germ. N. n. 906. M. 1170, 88. Redt. 462 — 2 ed. 688.
Te Leyden, H. — Op eene soort van zuring bij Rotterdam niet ongemeen, Sn. — In April, Mei en October op brandnetelen bij Amst. Kink. — Bij Utrecht, Six. — In Sept. te Scheveningen, v. Br.
- 1291 *Fruментарium*, L. N. n. 907. M. 1170, 90. Redt. *ibid.*
In Mei en Aug. op de Glijphoeve, v. V. — Te Driebergen in Julij, Six en v. V. — Op Sterkenburg en te Brummen in Aug., v. V. — Bij Dalfsen, V. *op de dijk bij de Haagse dijk*
- 1292 *Flavipes*, F. N. n. 904. M. 1170, 93. Redt. 463 — 2 ed. 688.
Zeer gemeen op peulvruchten, op de Glijphoeve in Mei, te Brummen in Oct., v. V. — In de duinen, Piag. — Gemeen onder mos en dorre bladeren in het voorjaar, Kink. — Te Groningen in Aug., de Gav.

- 1293 *Nigritarse*, Kirby. Bijvoegs. n^o. 904^a. M. 1170, 95. Redt. *ibid*.
Bij Utrecht, Six. — Bij den Haag, v. d. W. — Beide sexen te Rotterdam in Aug., Sn. — Een ♂ te Leyden in Sept., v. V.
- 1294 *Ononidis*, Gyll. N. n. 903. M. 1170, 98. Niet bij Redtenbacher.
In September bij Scheveningen, v. Br.
- 1295 *Varipes*, Germ. Bijvoegs. n^o. 901^a. M. 1170, 99. Redt. 463 — 2 ed. 688.
In Mei bij den Haag, v. d. W. — In Oct. in het Drieberger bosch, Six.
- 1296 *Apricans*, Herbst. N. n. 902. M. 1170, 101 (*Fagi*, L.). Redt. 463 — 2 ed. 689.
In Mei op de Glijphoeve gemeen, v. V.
- *1297 *Assimile*, Kirby. M. 1170, 104. Redt. *ibid*.
In Zuid-Holland, de Gr.
- 1298 *Aestivum*, Germ. N. n. 905. M. 1170, 106 (*Trifolii*, L.). Redt. *ibid*.
Op de Glijphoeve in Aug. en bij Leyden, v. V. — Bij den Haag, v. d. W. — Te Utrecht, Six en v. Hass. — Bij Rott. in April, Sn.
- 1299 *Ruficrus*, Germ. M. 1170, 107. Redt. 463 — 2 ed. 688.
Op Schothorst bij Amersfoort in Julij, v. V.
- *1300 *Striatum*, Kirb. N. n. 919. M. 1170, 117. Redt. 2 ed. 689. *op de Glijphoeve*
In September bij Scheveningen, v. Br.
- *1301 *Seniculus*, Kirb. N. n. 908. M. 1170, 135. Redt. 464 — 2 ed. 690.
Eenmaal in Julij te Brummen, v. V. — In April bij Amsterdam en Overveen, in Julij te Abcoude, Kink.
- 1302 *Vorax*, Herbst. N. n. 912. M. 1170, 148. Redt. 465 — 2 ed. 691.
Bij Utrecht, Six. — In April bij Amsterdam, Kink. — In Mei bij Heemstede en in October te Brummen, v. V.
- 1303 *Ononis*, Kirb. N. n. 910. M. 1170, 157. Redt. 2 ed. 690.
In September bij Scheveningen, v. Br. — Te Hillegom in Mei, Kink. — Op Sterkenburg bij Driebergen in Aug., v. V.
- *1304 *Sorbi*, Herbst. N. n. 914. M. 1170, 160. Redt. 466 — 2 ed. 694.
In Zuid-Holland, v. V.
- 1305 *Pisi*, F. N. n. 913. M. 1170, 165. Redt. 466 (*Punctifrons*, Germ.) — 2 ed. 693.
In September bij Scheveningen, v. Br. — In December in mijn tuin te Leyden, v. V. — In Mei bij Amsterdam, Kink.
- *1306 *Virens*, Herbst. N. n. 911. M. 1170, 174. Redt. 465 — 2 ed. 692.
In Sept. op de Glijphoeve, v. V. — In Oct. bij Amsterdam, Kink.
- *1307 *Ebeninum*, Kirb. Bijvoegs. n^o. 909^a. M. 1170, 177. Redt. 464 — 2 ed. 690.
Bij Utrecht, Six.
- *1308 *Minimum*, Herbst. N. n. 916. M. 1170, 178. Redt. 464 — 2 ed. 693.
In September bij Scheveningen, v. Br. — In April bij Utrecht, Six. — In Junij te Bloemendaal op *Salix repens*, Kink.
- *1309 *Filirostre*, Kirb. N. n. 909 (*Morio*, Germ.). M. 1170, 179. Redt. 464 — 2 ed. 694.
Eenmaal in April op de Glijphoeve, v. V.

- *1310 *Humile*, Germ. N. n. 915. M. 1170, 184. Redt. 2 ed. 693.
In Sept. bij Scheveningen, v. Br. — In Julij te Soest, Kink.
- 1311 *Violaceum*, Kirby. N. n. 917. M. 1170, 188. Redt. 466 — 2 ed. 693.
Bij Utrecht, V. — Bij Leyden zeldzaam, v. V. — In het voorjaar bij Amsterdam, Kink. — In Mei op den Omlanderdijk bij Groningen, de Gav.
- 1312 *Marchicum*, Herbst. N. n. 918. M. 1170, 194. Redt. *ibid.*
In Mei op klaver en in April gemeen op tuinzuring te Heemstede, v. V. — In Mei te Hillegom, Kink.

Apoderus OLIV.

- 1313 *Coryli*, L. N. n. 933. M. 1171, 1. Redt. 471 — 2 ed. 679.
Alleen de varieteit *Avellanae* komt in ons land voor. — Bij Utrecht, Six. — Bij Brummen in Julij en op Schothorst bij Amersfoort mede in Julij, v. V. — Te Hoogeveen, Steenb.

Attelabus L.

- 1314 *Curculionoides*, L. 1^e N. p. 37 (*overgeslagen in* N. n.). M. 1172, 1. Redt. 471 — 2 ed. 679.
Niet zeldzaam in Zuid-Holland op berken, v. V. — Bij Utrecht, Six. — Te Zuid-Laren, Cl. Mulder. — Te Groningen, v. Bemm. — In Junij te Wolfheze en in Julij te Amersfoort, Kink. — Een voorwerp met schier geheel zwarte sprieten in Augustus te WortRhede, v. V.

Rhynchites HERBST.

- 1315 *Auratus*, Scop. N. n. 923. M. 1173, 6. Redt. 468 — 2 ed. 680.
Eenmaal te Rhederoord in den herfst op een kweepeer een ♂, v. V. — Er is nog een tweede exempl. in de collectie der N. E. V., doch zonder aanwijzing van vindplaats.
- 1316 *Aequatus*, L. N. n. 924. M. 1173, 12. Redt. *ibid.*
Eenmaal bij Rotterdam op een populier, v. V. — Aldaar, v. W. — Bij Voorst, Wtt. — Bij Zutphen, v. Eyndh.
- 1317 *Cupreus*, L. N. n. 925. M. 1173, 14. Redt. 469 — 2 ed. 681.
Aan den duinkant en in Aug. op de Glijphoeve, v. V. — In Mei te Hillegom op lijsterbes, Kink. — Te Driebergen, v. Bemm. — In Augustus bij Amersfoort, v. V.
- 1318 *Germanicus*, Herbst. N. n. 926 (*Minutus*, Gyll.). M. 1173, 23. Redt. 470 — 2 ed. 681.
Niet zeldzaam op bloesem van vogelkers in Junij te Heemstede, v. V. — Bij Leyden, Kopp. — In April in een tuin te Utrecht, Six. — Bij Zutphen, v. Eyndh.
- 1319 *Nanus*, Payk. N. n. 927. M. 1173, 24. Redt. 469 — 2 ed. 681.
Bij Heemstede in Julij en bij den Haag in Junij, v. V. — In de Wassenaarsche duinen, Piag. — Bij Brummen, v. W.

- 1320 *Populi*, L. N. n. 929. M. 1173, 25. Redt. *ibid.*
Bij den Haag en in Aug. te Brummen, v. V. — Ook aldaar de
var. *c.* van Gyllenhall, v. W. — In Drenthe, Gockinga.
- 1321 *Betuleti*, F. N. n. 930. M. 1173, 26. Redt. *ibid.*
De type te Groningen, de Gav. — De blaauwe var. in menigte
in Zuid-Holland op berken aan den duinkant, v. V. — Dezelfde bij
Utrecht, Six. — Bij Breda, Heyl. — Te Hoogeveen, Steenb.
- 1322 *Scriceus*, Herbst. N. n. 931. M. 1173, 27. Redt. 470 — 2 ed. 682.
Eenmaal bij den Haag en in Julij bij Leyden, v. V.
- *1323 *Ophthalmicus*,
Steph. N. n. 928 (♀ *Cyanicolor*, Schh.). M. 1173, 31. Redt. 2 ed. 682.
Twee voorwerpen te Brummen, v. W. — In Junij aan de
Vogelenzang, Kink
- 1324 *Betulae*, L. N. n. 932. M. 1173, 39. Redt. 468 — 2 ed. 680.
Zeer gemeen op berken en elzen in het voorjaar.

Rhinomacer GEOFFR.

- 1325 *Attelaboides*, F. M. 1176, 1. Redt. 467 — 2 ed. 678. Gyll., *Ins. Suec.*, III. 30, n^o. 10.
In Mei bij Utrecht, Six.

Magdalinus GERM.

- 1326 *Cerasi*, L. N. n. 825. M. 1178, 10. Redt. 415 — 2 ed. 788.
In Junij in de omstreken van den Haag, v. d. W. — In Maart
te Hillegom en in Junij aan de Vogelenzang, Kink. — In de duinen,
Piag. — Bij Brummen, v. W.
- *1327 *Rhina*, Gyll. N. n. 827. Schönh. *Cure.*, III, p. 276.
In Zuid-Holland, v. V.
- *1328 *Aterrimus*, F. M. 1178, 13. Redt. 415 (*Stygia*, Gyll.) — 2 ed. 759.
In Junij op ijpen te Amsterdam, Kink.
- 1329 *Carbonarius*, L. N. n. 826 (*Atramentarius*, Germ.). M. 1178, 14. Redt. 415 — 2 ed. 758.
Bij Utrecht, V.
- 1330 *Pruni*, L. N. n. 828. M. 1178, 19. Redt. 416 — 2 ed. 759.
In Junij bij den Haag, v. V. — In Junij te Utrecht, Six.

Balaninus GERM.

- 1331 *Venosus*, Germ. N. n. 798. M. 1179, 4. Redt. 404 — 2 ed. 771.
Op Sterkenburg bij Driebergen, Knepelhout v. St. — In Julij
op Schothorst bij Amersfoort en te Brummen, v. V. — Bij Breda, Heyl.
- 1332 *Nucum*, L. N. n. 799. M. 1179, 5. Redt. *ibid.*
In Zuid-Holland, v. V. — In April bij Leyden, Rits. — Gemeen
in de omstreken van Breda, Heyl. — Bij Utrecht, Six. — Te
Zutphen, v. Eyndh.
- 1333 *Turbatus*, L. M. 1179, 6. Redt. *ibid.*
Te Brummen in Junij, v. V. — Bij Breda, Heyl.

- 1334 *Cerasorum*,
Herbst. N. n. 800. M. 1179, 7. Redt. 405 — 2 ed. 772.
Te Leyden, Kopp. — Bij Wassenaar, v. Bemm. — In Julij bij
Heemstede, v. V. — Bij Utrecht, Six. — In Aug. op Walcheren,
H. — Te Oldekerke in Julij, de Gav.
- 1335 *Villosus*, F. M. 1179, 8. Redt. *ibid.*
In Mei bij den Haag, v. d. W. — In Mei bij Breda, Heyl.
- 1336 *Rubidus*, Schh. M. 1179, 9. Schönh. *Curc.* 304, 12. Redt. 2 ed. 771.
Een ex. in Aug. 1866 te Wort-Rhede, v. V.
- 1337 *Cruæ*, F. N. n. 801. M. 1179, 10. Redt. 405 — 2 ed. 772.
In April, Mei en Junij bij Leyden, v. V. — In dezelfde maan-
den bij Amst., Kink. — Bij Naarden, de Haan. — Bij Zutphen, v. Eynth.
- 1338 *Brassicae*, F. N. n. 802. M. 1179, 14. Redt. *ibid.*
Vrij gemeen om Leyden in April en op Sterkenburg in Julij, v. V. —
In Maart, Mei en Junij bij Amst., Kink. — In Mei en Aug. bij
Heemstede op lage planten, v. V. — Bij 's Gravenhage, v. d. W.
- 1339 *Pyrrhoceras*,
Marsh. N. n. 803. M. 1179, 15. Redt. *ibid.*
Niet zeer ongemeen bij den Haag, v. V. — Bij de Bildt in Mei,
Six. — Te Hillegom in Mei op bloesem van lijsterbes, Kink.

Anthonomus GERM.

- 1340 *Ulmii*, de Geer. N. n. 804. M. 1180, 1. Redt. 406 — 2 ed. 768.
In Zuid-Holland, v. V. — Te Wassenaar, v. Bemm. — Te Hille-
gom in Maart en aan de Bildt in April, Kink.
- 1341 *Pedicularius*, L. M. 1180, 2. Germ. *Mag.* 4. p. 322, 1.
In Junij 1865 in groote menigte uit knoppen van rooden Meidoorn
in den tuin van den heer van Olden te Leyden, v. V. — In Junij te
Utrecht, Wtt.
- *1342 *Pyri*, Chevr. Bijvoegs. n^o. 804^a (*Cinctus*). Redt. 406 — 2 ed. 768.
Te Voorst, Wtt.
- 1343 *Pomorum*, L. N. n. 805. M. 1180, 7. Redt. 406 — 2 ed. 769.
Overal verspreid en nadeelig aan den bloesem van vruchtboomen.
- *1344 *Incurvus*, Panz. N. n. 806. M. 1180, 11. Redt. *ibid.*
Eenmaal in Mei bij Heemstede, v. V. — Te Brummen, v. W.
- *1345 *Varians*, Payk. N. n. 807 (*Melanocephalus*, F.). M. 1180, 13. Redt. 407 — 2 ed. 769.
Bij Rotterdam, v. W.
- 1346 *Rubi*, Herbst. N. n. 808. M. 1180, 18. Redt. *ibid.*
In Junij op bloeiende frambozen in Holland; in Aug. en Sept. op
de vrucht, v. V.
- 1347 *Druparum*, L. N. n. 801. M. 1180, 20. Redt. 406 — 2 ed. 768.
Eenmaal bij Rotterdam, v. W. — Bij den Haag in April, v. d. W.

Orchestes ILL.

- 1348 *Quercus*, L. N. n. 784. M. 1183, 1. Redt. 396 — 2 ed. 780.
In eikenbosschen alom vrij gemeen.
- 1349 *Scutellaris*, F. N. n. 785. M. 1183, 2. Redt. ibid.
In April bij den Haag, v. V. — Te Hillegom in Febr. onder mos, Kink. — Te Noordwijk in Mei, v. V. — Bij Utrecht, Six. — In Noord-Brabant, Roel.
- 1350 *Rufus*, Oliv. N. n. 786 (*Haematitius*, Germ.). M. 1183, 5 Redt. 2 ed. 780.
Twee voorwerpen in Junij bij Rotterdam, Sn. *Hillegom 2-17-74*
- 1351 *Alni*, L. N. n. 787. M. 1183, 10. Redt. 395 — 2 ed. 780.
Vrij gemeen op ijpen en soms op elzen bij Rott. en Leyden, v. V. — In April en Mei bij Heemstede en den Haag, v. V. — Bij Leyden, Prof. J. v. d. Hoeven. — Te Groningen in Julij, de Gav. — In Friesland, G.
- 1352 *Ilicis*, F. N. n. 788. M. 1183, 13. Redt. 397 — 2 ed. 780.
In Mei bij Leyden en den Haag, en in Julij bij Heemstede en Noordwijk, v. V. — Te Hillegom in Febr. onder mos, Kink. — Bij Utrecht, Six.
- 1353 *Fagi*, L. N. n. 789. M. 1183, 16. Redt. 396 — 2 ed. 781.
Zeer gemeen in Oct. en Nov. in het Haagsche bosch, v. d. W. en v. V. — In Maart te Hillegom, Kink. — Aan de Bildt in April en te Beck in Junij, Six. *2-17-74*
- 1354 *Iota*, F. M. 1183, 19. Redt. 2 ed. 780.
In Oct. te Driebergen, Six. — In Sept. bij het huis ter Heyde, Piag. — Te Breda, Heyl.
- 1355 *Populi*, F. N. n. 793. M. 1183, 25. Redt. 396 — 2 ed. 781.
Zeer gemeen op wilgen en populieren in Zuid-Holland en Gelderland, v. V. — In Junij te Rotterdam, Sn. — In Junij op wilgen bij Amsterdam, Kink. — In Mei te Utrecht, Six.
- *1356 *Signifer*, Cr. N. n. 790. M. 1183, 26. Redt. 397 — 2 ed. 781.
Zeer zeldzaam in Holland, v. V.
- *1357 *Erythropus*,
Germ. M. 1183, 28. Redt. 2 ed. 782.
Bij Noordwijk in Maart, Kink. *2-17-74*
- 1358 *Salicis*, L. N. n. 791. M. 1183, 32. Redt. 397 — 2 ed. 782.
Gemeen aan het jaagpad van de Delftsche vaart bij Leyden op elzen en bij Katwijk op wilgen, v. V. — Te Rotterdam in Aug., Snell. — Bij Utrecht, v. Hass. — In Mei op wilgen bij Sloten, Kink.
- 1359 *Stigma*, Germ. N. n. 792. M. 1183, 35. Redt. 397 — 2 ed. 781.
Hier en daar op wilgen in Zuid-Holland en in Aug. te Wort-Rhede, v. V.

- 1360 *Saliceti*, F. M. 1183, 36. Redt. 2 ed. 781.
Op wilgen bij Sloten in Mei, Kink.
- Ellescus** MEG.
- 1361 *Bipunctatus*, L. N. n. 811. M. 1188, 2. Redt. 409 — 2 ed. 766.
Eenmaal bij Brummen, v. W. — In April aan de Bildt op wilgen,
Kink. — In de omstreken van Utrecht eene ongevlekte variëteit, Six.
- Tychius** GERM.
- 1362 *Quinquepunctatus*, L. N. n. 795. M. 1189, 1. Redt. 402 — 2 ed. 773.
In de bloemen van *Leontodon taraxacum*, v. V. — In menigte
op de duinen bij den Haag in Julij, Piag. en Everts.
- 1363 *Venustus*, F. Bijvoegs. n^o. 795^a. M. 1189, 4. Redt. ibid.
Bij de Bildt in Aug. op zandgrond, Six.
- 1364 *Tomentosus*, N. n. 796. M. 1189, 35. Redt. 402 — 2 ed. 774.
Herbst. In April bij Rotterdam, Snell. — In Junij bij Amersfoort, v. V.
- 1365 *Junceus*, Reichb. N. n. 797. M. 1189, 40. Redt. ibid.
In Julij op Rhienderstein bij Brummen en in Junij bij den
Haag, v. V.
- 1366 *Picrostris*, F. M. 1189, 85. Redt. 401 (*Miccotrogus*) — 2 ed. 775.
Te Beek in de eerste dagen van Junij, Six.
- Sibynes** SCHÖNH.
- 1367 *Potentillae*, M. 1189, 98. Redt. 400 — 2 ed. 776. Schönh. *Curc.* III. 438 et
Germ. VII, 2. pag. 321.
In de bloemen van *Spartium scoparium* in Oct. te Noordwijk,
v. V. — In Maart te Hillegom onder dorre bladeren, Kink.
- *1368 *Phaleratus*, N. n. 794. M. 1189, 103. Redt. ibid.
Stev. Op de Scheveningsche duinen in Sept., v. Br. — Aldaar in
Augustus, v. d. W.
- Cionus** CLAIRV.
- 1369 *Scrophulariae*, L. N. n. 753. M. 1190, 1. Redt. 375 — 2 ed. 812.
Gemeen op *Scrophularia nodosa* in Julij te Brummen, v. V. —
In Aug. te Wort-Rhede, v. V. — Te Hoogeveen, Steenb.
- 1370 *Verbasci*, F. N. n. 754. M. 1190, 2. Redt. ibid.
Bij Utrecht, V. en Six. — Gemeen op de Gliphoeve in Junij; te
Brummen in Mei en Julij, steeds op *Scrophularia*, v. V.
- 1371 *Thapsus*, F. N. n. 755. M. 1190, 5. Redt. 375 — 2 ed. 813.
Bij Leyden, zeldzaam, op de Gliphoeve in Junij en te Brummen
niet gemeen, steeds op *Scrophularia*, v. V.
- 1372 *Blattariae*, F. N. n. 756. M. 1190, 13. Redt. 375 — 2 ed. 812.
Op de Gliphoeve in Junij zeer gemeen op *Scrophularia*; in Mei
te Brummen, v. V. — In Drenthe, Gock.

- 1373 *Pulchellus*,
Herbst. N. n. 758. M. 1190, 16. Redt. 376 — 2 ed. 813.
Zeldzaam in Junij op *Scrophularia* op de Glijphoeve, v. V. — Bij
Utrecht, Six. *by v. Haye bij de ...*
- 1374 *Fraxini*, de Geer. N. n. 757. M. 1190, 20. Redt. 2 ed. 812.
Op essen in Julij bij den Haag; gemeen op essen aan het plant-
soen te Leyden, v. V. — In Mei te Hillegom, Kink. — Te Voorst
en in Julij in Zeeland, Wtt. — Te Beek in Augustus, v. V.

Nanophyes SCHÖNH.

- 1375 *Lythri*, F. N. n. 748. M. 1191, 7. Redt. 371 — 2 ed. 819.
Zeer gemeen van Junij tot Augustus op *Lythrum salicaria*.

Gymnetron SCHÖNH.

- *1376 *Pascuorum*,
Gyll. Bijvoegs. n^o. 752^a. M. 1192, 1. Redt. 374 — 2 ed. 816.
Bij Utrecht, zeldzaam, Six.
- 1377 *Villosulus*, Sch. M. 1192, 5. Redt. 2 ed. 817.
In Maart op Frankendaal bij Amsterdam onder mos en te Hille-
gom, Kink.
- 1378 *Veronicae*, Germ. N. n. 750. Redt. 374 — 2 ed. 816.
Zeldzaam bij Leyden, v. V. — In Friesland, G.
- 1379 *Beccabungae*, L. M. 1192, 6. Redt. *ibid*.
Te Haarlem, Buse. — In Mei bij Utrecht, Six.
- *1380 *Teter*, F. N. n. 751. M. 1192, 29. Redt. 373 — 2 ed. 815.
In Zuid-Holland, v. d. W.
- 1381 *Linariae*, Panz. M. 1192, 28. Redt. *ibid*.
Op Sterkenburg in Augustus, v. V.
- 1382 *Noctis*, Herbst. N. n. 752. M. 1192, 33. Redt. 373 — 2 ed. 815.
In Julij in de bloemen van *Antirrhinum linaria* in Holland, v. V.

Orobitis GERM.

- 1383 *Cyaneus*, L. Bijvoegs. n^o. 758^a. M. 1197, 1. Redt. 376 — 2 ed. 796.
Bij de Bildt in Aug. op zandgrond, Six.

Cryptorhynchus ILL.

- 1384 *Lapathi*, L. N. n. 778. M. 1202, 1. Redt. 390 — 2 ed. 786.
In sommige streken zeer gemeen, vooral in het wilgenhout aan
de oevers der rivieren.

Rhamphus CLAIRV.

- *1385 *Flavicornis*, Cl. N. n. 897. M. 1203, 1. Redt. 458 — 2 ed. 695.
Op abeelen in Zuid-Holland, v. V. — Bij Utrecht, Six. — Bij
Brummen, v. W.

None ...
...

...

- *1400 *Litura*, F. M. 1208, 43. Redt. 384 — 2 ed. 803.
In September te Utrecht, Groll.
- 1401 *Trimaculatus*, F. M. 1208, 44. Redt. *ibid.*
Een pas uitgekomen exemplaar den 17^{en} Mei bij den Haag, Snell.
- *1402 *Echii*, F. N. n. 768. M. 1208, 52. Redt. 383 — 2 ed. 802.
Bij Brummen, v. W. — Schijnt zeer zeldzaam. Ik heb duizenden planten *Echium* naauwkeurig onderzocht en den kever nooit gevonden, v. V.
- 1403 *Asperifoliarum*, Kirb. N. n. 770. M. 1208, 76. Redt. 384 — 2 ed. 804.
In Zuid-Holland, v. V. — Schijnt even zeldzaam.
- *1404 *Chrysanthemi*, Germ. Bijvoegs. n^o. 770^b. M. 1208, 78 v. Redt. 384 — 2 ed. 804.
Bij 's Gravenhage, v. d. W.
- *1405 *Lycopi*, Schh. Schönh. *Curc.* IV. 533, 85. Redt. 385 — 2 ed. 804.
In Aug. op kruisemunt bij Rotterdam, Snell.
- 1406 *Pollinarius*, Forst. M. 1208, 87. Redt. 385 — 2 ed. 805.
In April aan den IJkant bij Amsterdam in het gras, Kink. — In April bij Rotterdam op brandnetelen, Snell. — In Mei bij den Haag, v. d. W. — Gemeen in de duinen aldaar in April, Everts.
- 1407 *Arator*, Schh. M. 1208, 95. Schh. *Curc.* IV. 479, 6. Redt. 382 — 2 ed. 800.
In April bij Leyden, v. V.
- 1408 *Syriles*, Germ. Bijvoegs. n^o. 763^a. M. 1208, 96. Redt. *ibid.*
Bij Utrecht beide sexen, Six.
- *1409 *Macula alba*, Herbst. N. n. 763. M. 1208, 108. Redt. 381 — 2 ed. 799.
Eenmaal bij Leyden, v. V.
- *1410 *Marginatus*, Payk. N. n. 771. M. 1208, 109. Redt. 383 — 2 ed. 802.
Op eene weide in het gras, v. V.
- *1411 *Punctiger*, Gyll. N. n. 772. M. 1208, 111. Redt. *ibid.*
In Sept. bij Scheveningen, v. Br. — In Maart onder aangespoelde ruigte aan den oever van den Schenkel bij Amst., Kink.
- *1412 *Quercicola*, F. M. 1208, 112. Redt. 2 ed. 802. Gyll. III, 230.
In Maart 1868 bij Noordwijk gevangen, Kink.
- 1413 *Sulcicollis*, Payk. Bijvoegs. n^o. 774^b. M. 1208, 122. Redt. 386 — 2 ed. 805.
Bij Voorst en in den Haarlemmermeerpolder in koolzaadstengels, Wtt. — In April bij Utrecht, Six.
- 1414 *Tarsalis*, Märk. Schönh. *Curc.* VIII, 167, n^o. 142. Redt. 2 ed. 807.
Bij Amersfoort in Augustus, v. V.
- *1415 *Quadrilens*, Panz. Bijvoegs. n^o. 770^a. M. 1208, 131. Redt. 2 ed. 803.
Bij Utrecht, Six.
- 1416 *Ericae*, Gyll. Bijvoegs. n^o. 774^a. M. 1208, 135. Redt. 2 ed. 806.
In Aug. bij den Haag, v. d. W. — Gemeen op heide te Renkum, Wort-Rhede en Hoogland in Aug., v. V. — In Julij op Beekhuizen bij Velp, Kink. — Te Beek den 1^{en} Junij en bij de Bildt, Six.

- *1417 *Cyanipennis*, Germ. N. n. 773. M. 1208, 144. Redt. 379 — 2 ed. 799.
In Mei bij Heemstede, v. V. — Te Brummen, v. Itt.
- Poophagus** SCHÖNH.
- 1418 *Sisymbrii*, F. N. n. 759. M. 1209, 1. Redt. 378 — 2 ed. 810.
Op het eind van Augustus te Rotterdam, Sn. — Te Hillegom in Maart aan de trekvaart onder aangespoelde ruigte, Kink. — In Junij 1858 te Voorst, v. V. — In Friesland, G.
- Rhinoncus** SCHÖNH.
- *1419 *Bruchoides*, Herbst. N. n. 760. M. 1213, 2. Redt. 2 ed. 809.
Een paar in Augustus 1848 op de Glyphoeve, v. V.
- 1420 *Inconspicua*, Herbst. N. n. 761. M. 1213, 4. Redt. 379 — 2 ed. 809.
In menigte op eene soort van *Polygonum* aan den vijver der Glyphoeve in Aug. en op dezelfde soort van plant bij Leyden in Oct. v. V. — Bij Rotterdam, Snell.
- 1421 *Pericarpii*, F. N. n. 762. M. 1213, 5. Redt. 378 — 2 ed. 809.
Op *Rumex* in April en Mei, v. V. — Bij Rotterdam in April, Snell. — Bij Utrecht, Six. — In Mei bij Amsterdam, Kink. — Op Sterkenburg bij Driebergen in Aug., v. V.
- *1422 *Guttalis*, Grav. M. 1213, 6. Redt. 2 ed. 809.
In Maart aan den kant van de trekvaart bij Hillegom, Kink.
- Amalus** SCHÖNH.
- *1423 *Scortillum*, Herbst. M. 1214, 1. Redt. 403 — 2 ed. 772. Panz. *Fauna*, 99, 12.
In het gras op den hoogen Zeedijk in de maand October, Kink.
- Baridius** SCHÖNH.
- *1424 *Artemisiae*, F. N. n. 779. M. 1215, 10. Redt. 391 — 2 ed. 784.
Eenmaal in Junij aan den Scheveningschen weg, v. V.
- *1425 *Picinus*, Germ. M. 1215, 22. (*Laticollis*, Marsh.). Redt. *ibid.*
In Mei op de duinen bij den Haag, Everts.
- *1426 *Lepidii*, Müll. N. n. 780. M. 1215, 41. Redt. 392 — 2 ed. 785.
Bij Brummen, v. W.
- *1427 *Abrotani*, Germ. N. n. 781 (*Punctatus*, Schh.). M. 1215, 42. Redt. *ibid.*
Bij Brummen, v. W.
- *1428 *T album*, L. Bijvoegs. n^o. 778^a. M. 1215, 52. Redt. 391 — 2 ed. 784.
Bij Utrecht eenmaal, Six. — In April onder aangespoeld riet aan den Ooster Dokdijk bij Amsterdam, Kink.
- Calandra** CLAIRV.
- 1429 *Granaria*, L. N. n. 746. M. 1218, 1. Redt. 369 — 2 ed. 820.
Zeer gemeen op korenzolders en bij bakkers.
- 1430 *Oryzae*, L. N. n. 747. M. 1218, 2. Redt. *ibid.*
Iets minder gemeen. Leeft voornamelijk in rijst en scheepsbesluit.

Cossonus CLAIRV.

- 1431 *Linearis*, F. N. n. 745. M. 1225, 1. Redt. 367 — 2 ed. 821.
De type en eene varieteit in Mei in de omstreken van Utrecht, Six. — De type in Zeeland, de Bruyne. — De roode verscheidenheid op Walcheren, G.

Rhyncolus CREUTZ.

- 1432 *Elongatus*, Gyll. N. n. 744. M. 1228, 4. Redt. 367 — 2 ed. 823.
In Friesland, G.
- *1433 *Truncorum*, Gyll. M. 1228, 10. Redt. *ibid.*
In Mei op haagbeuken te Voorst, Wtt.

Hylastes ERICHS.

- 1434 *Ater*, Payk. N. n. 741. M. 1229, 1. Redt. 365 — 2 ed. 826.
In Sept. te Zeist, V. — In Mei bij Driebergen, Six. — In April te Velp, de Roo. — Bij Brummen, v. Itt. — In Mei, Sept. en Oct. te Bennebroek, v. V.
- 1435 *Cunicularius*, Er. N. n. 742. M. 1229, 4. Redt. *ibid.*
In Sept. en Oct. op de Gliphoeve, v. V. — In de omstreken van Naarden, de Haan.
- 1436 *Angustatus*,
Herbst. N. n. 743. M. 1229, 9. Redt. 365 — 2 ed. 825.
In Sept. bij Zeist, V. — Bij Brummen, v. W.
- *1437 *Palliatus*, Gyll. N. n. 740. M. 1229, 12. Redt. 364 — 2 ed. 825.
Eenmaal bij Leyden, v. V. — Bij Utrecht, S. — Bij Brummen, v. W.

Hylurgus LAFR.

- 1438 *Piniperda*, L. N. n. 739. M. 1231, 1. Redt. 364 — 2 ed. 827.
In zeer groote menigte bij Zeist en Driebergen in 1846; ook gevonden bij Dalfts, V. — Bij den Haag in April en bij Renkum in Aug., v. V. — Bij Utrecht, Six. — Bij Voorst, Wtt. — Bij Brummen, v. Itt. — In de omstreken van Breda, Heyl.

Hylesinus F.

- *1439 *Crenatus*, F. N. n. 737. M. 1235, 1. Redt. 362 — 2 ed. 828.
Bij den Haag, v. d. W.
- 1440 *Frauxini*, F. N. n. 738. M. 1235, 5. Redt. *ibid.*
Zeer gemeen in verschillende plaatsen; leeft in ijpen.

Eccoptogaster HERBST.

- 1441 *Destructor*, Oliv. N. n. 735. M. 1238, 1 (*Scolytus Ratzeburgi*, Jans.). Redt. 361 — 2 ed. 837.
De vernielers van vele ijpenboomen bij Rotterdam, Sn. — Te Voorst, Wtt.

- 1442 *Scolytus*, F. N. n. 736. M. 1238, 2 (*Destructor*, Oliv.). Redt. ?
Meermalen bij den Haag, v. V. — Op Walcheren, G. — Bij
Brummen, v. Itt. — Te Voorst, Wtt. — In Junij bij Groningen, de Gav.
- 1443 *Multistriatus*, Marsh. Bijvoegs. n^o. 736^a. M. 1238, 5. Redt. 361 — 2 ed. 838.
Te Voorst in Maart, Wtt.
- 1444 *Pruni*, Ratz. Bijvoegs. n^o. 736^b. M. 1238, 7. Redt. *ibid*.
Te Voorst of te Houten, Wtt.

Xyloterus ERICHS.

- 1445 *Domesticus*, L. N. n. 734. M. 1239, 1. Redt. 360 — 2 ed. 830.
In het Haagsche bosch in beuken; zwermt in het laatst van April
en in Mei, v. V.

Cryphalus ERICHS.

- *1446 *Abietis*, Ratz. Ratz. *Forstins.*, I, 163. Tab. XIII, fig. 14. M. 1242, 6. Redt. 2 ed. 832.
In Junij bij Utrecht, Six.

Bostrichus F.

- *1447 *Curvidens*, Germ. N. n. 732. M. 1244, 5. Redt. 357 — 2 ed. 834.
Bij Brummen, v. W.
- 1448 *Laricis*, F. N. n. 731. M. 1244, 6. Redt. *ibid*.
Niet zeldzaam op lorken. — Bij Zeist en Driebergen in groot
aantal, V. — Te Apeldoorn in Junij, Snell. — Een enkele maal bij
den Haag, v. d. W. — Bij Naarden, de Haan.
- 1449 *Bidens*, F. M. 1244, 13. Redt. 358 — 2 ed. 835. Panz. *Fn.* 39, fig. 21.
In October te Driebergen, Six.
- 1450 *Micrographus*, Gyll. N. n. 733 (*Pityographus*, Ratz.). M. 1245, 1. Redt. 359 — 2 ed. 830.
Eenmaal in Sept. bij de Bildt, v. V. — In Oct. bij Driebergen, Six.
- *1451 *Villosus*, F. M. 1246, 4. Redt. 358 — 2 ed. 835.
Een paar ex. in vochtig hout in het Haagsche bosch in Junij, Everts.
- 1452 *Bicolor*, Herbst. M. 1246, 6. Redt. 359 (*Fuscus*, Marsh.) — 2 ed. 836.
In Junij op dennenstammen te Driebergen, Six.
- *1453 *Dryographus*, Erichs. M. 1247, 3. Redt. 358 — 2 ed. 835.
Een voorwerp in April op de duinen in het zand bij eikenhout, Everts.

Anthribus GEOFFR.

- *1454 *Albinus*, L. N. n. 934. M. 1255, 1. Redt. 472 — 2 ed. 677.
Eenmaal bij Utrecht, V. — In Julij op eiken bij Breda, Heyl. —
Te Hoogeveen, Steenb.

Brachytarsus SCHÖNH.

- 1455 *Scabrosus*, F. N. n. 935. M. 1257, 1. Redt. 474 — 2 ed. 673.
Bij Bommel onder den schors van populieren, Sn. — De Heer
Piaget ving, waar is mij onbekend, een insect dat men voor een
bastaard van *Scabrosus* en *Varius* zou kunnen aanzien, omdat het
tusschen beide soorten het midden houdt.

Aræocerus SCHÖNH.

- 1456 *Coffeae* ¹⁾, F. M. 1258, 1. Schönh. *Curcul.* V, pag. 275.
Te Rotterdam, Snell. — Te Delft in koffij, H. Heys van de Lier.

Urodon SCHÖNH.

- 1457 *Rufipes*, F. M. 1260, 1. Redt. 475 — 2 ed 673.
Te Haarlem in Julij, Groll.

Spermophagus STEV.

- *1458 *Cardui*, Stev. N. n. 936. M. 1262, 2. Redt. 475 — 2 ed. 672.
Slechts eenmaal gevangen, te Rotterdam, v. V.

Bruchus L.

- *1459 *Cisti*, F. N. n. 941. M. 1263, 41. Redt. 477 — 2 ed. 671.
Te Brummen, v. W. — In Mei bij den Haag, v. V. — Te Driebergen in Mei in bloemen van brem, Kink. *in Apr op brens by Driebergen*
- *1460 *Pisi*, L. N. n. 937. M. 1263, 71 Redt. 476 — 2 ed. 671.
Bij Leyden, G. en v. V.
- 1461 *Rufimanus*, Schh. N. n. 938. M. 1263, 72.
Op Walcheren, G. — Bij Brummen, v. W. — In den Haag en in Sept. op Gliphoeve, v. V. — In het Overmaasche, Piag. — In boonen uit verschillende provincien ontvangen en te Voorst, Wtt. — Te Leyden, Kopp. — Te Utrecht, Six.
- *1462 *Loti*, Gyll. N. n. 940. M. 1263, 93. Redt. 2 ed. 671.
Eenmaal, vindplaats niet opgeteekend, v. V.
- *1463 *Pubescens*, Ziegl. Bijvoegs. n^o. 941^a. M. 1263, 112. Redt. 117 — 2 ed. 672.
Bij Utrecht, Six. — Te Wassenaar in Aug., v. d. W. — Aan het huis ter Heyde, Piag.
- 1464 *Seminaris*, L. N. n. 939 (*Granarius*, L.). M. 1263, 117. Redt. 467 — 2 ed. 672.
Bij Leyden, W. — Bij den Haag, v. d. W. — Bij Utrecht, Six. — Bij Brummen, v. Itt. en v. W.

LONGICORNIA.**Spondylis** F.

- 1465 *Buprestoides*, L. N. n. 942. M. 1265, 1. Redt. 477 — 2 ed. 839.
In Limburg, Sn. — Op Walcheren, W. — Bij Groningen, Prof. Cl. Mulder. — Te Hoogeveen, Steenb. — Bij Maarsbergen en Doorn; op den Amerongschen berg niet ongemeen, v. V. — Aan het huis ter Heyde, Piag.

¹⁾ Deze cosmopolitische soort heeft evenveel recht op den titel van inlandsch als *Calandra Oryzae*.

Prionus GEOFFR.

- 1466 *Coriarius*, L. | N. n. 943. M. 1266, 1. Redt. 479 — 2 ed. 841.
Een voorwerp te Ede, Maitl. — Te Beekhuizen bij Velp, Kink. —
Een mannetje te Beek, Lewe v. Middelstum.

Cerambyx L.

- *1467 *Heros*, Scop. | M. 1274, 5 (*Cerdo*, L.). Redt. 479 — 2 ed. 842.
Een klein mannetje in Nederland gevangen, Dozy.
- 1468 *Cerdo*, F. | M. 1274, 16 (*Scopolii*, Laich.). Redt. 479 — 2 ed. 842. — Gyll.,
Ins. Succ. IV, pag. 50.
Een fraai vrouwelijk voorwerp in April te Amsterdam, V.

Aromia SERV.

- 1469 *Moschata*, L. | N. n. 944. M. 1279, 1. Redt. 480 — 2 ed. 843.
Vrij gemeen op wilgen bij Rotterdam, Sn. — Bij Delft, G. —
Bij den Haag zeldzaam, v. d. W. en v. V. — Bij honderden op
wilgen aan den binnenzoom der duinen bij den Haag, Everts. — Te
Leyderdorp in Julij, v. V. — Te Amsterdam in Sept., Grebn. — Bij
Utrecht, V. — Bij Wageningen gemeen, W.

Callidium F.

- 1470 *Clavipes*, F. | N. n. 949. M. 1282, 3. Redt. 484 — 2 ed. 848.
In Zuid-Holland en den Bommelerwaard, v. d. W. — In de
Betuwe, v. W. — Bij Nijmegen, Sn.
- 1471 *Violaceum*, L. | N. n. 946. M. 1282, 6. Redt. 482 — 2 ed. 848.
Bij Rotterdam in Mei, Sn. — Te Hillegom in Mei, Kink. — In
het Ulvenhoutsche bosch bij Breda op elzen, Heyl. — In Friesland,
G. — Te Hoogeveen, Steenb.
- 1472 *Sanguineum*, L. | N. n. 947. M. 1282, 9. Redt. 483 — 2 ed. 848.
In Friesland, G. — Te Hoogeveen, Steenb.
- 1473 *Alni*, L. | N. n. 948. M. 1282, 11. Redt. 483 — 2 ed. 849.
Bij Rotterdam, zeer zeldzaam, v. V. — Bij Hillegom in Mei,
Kink. — In Mei bij Haarlem, Rits. — Bij Utrecht, Six. — In
Gelderland, v. Itt. — Bij Hoogeveen, Steenb. — In Junij in het
Valkenburg te Breda, Heyl.
- 1474 *Variabile*, L. | N. n. 945. M. 1282, 14. Redt. 481 — 2 ed. 849.
In Zuid-Holland zeldzaam; in Junij in mijn tuin te Leyden, v.
V. — In den Bommelerwaard, v. d. W. — Te Hoogeveen, Steenb. —
In Junij en Julij te Groningen, de Gav. — In Julij op den stam
van een populier bij Breda, Heyl.

Hylotrupes SERV.

- 1475 *Bajulus*, L. | N. n. 951. M. 1284, 1. Redt. 486 — 2 ed. 847.
 Zeer gemeen in sommige huizen in Holland en Gelderland, v. V. —
 In Zeeland, H. — Te Wassenaar in Julij, Sn. — Te Hillegom in Julij,
 Kink. — Te Leyden, Kopp. — Te Nieuwer-Amstel, Grebn. — Te
 Utrecht, V. — Te Beek, Dr. Rombouts. — Te Hoogeveen, Steenb. —
 Gemeen te Voorst, Wtt.

Asemum ESSCH.

- 1476 *Striatum*, L. | Bijvoegs. n^o. 950^a. M. 1290, 1. Redt. 485 — 2 ed. 845.
 In de duinen bij Overveen in Junij, Rits. — Te Breda, Heyl. —
 Bij Hoogeveen, Steenb. — De larve te Voorst in Febr. en te Arn-
 hem in April, Wtt.

Criocephalus MULS.

- 1477 *Rusticus*, L. | N. n. 950. M. 1292, 1. Redt. 484 — 2 ed. 845.
 Op Schothorst bij Amersfoort in Aug., v. V. — Te Ede, Maitl. —
 In Gelderland, Wtt. — Te Hoogeveen, Steenb.

Clytus F.

- 1478 *Arcuatus*, L. | N. n. 952. M. 1297, 3. Redt. 487 — 2 ed. 851.
 Bij Nijmegen, Maitl. — Bij Goor, v. Itt. — In Drenthe, Gock. —
 Bij Hoogeveen, Steenb. — Bij Dieren op geveld hout, v. V. —
 Aan de Rhedersteeg, W.
- 1479 *Arietis*, L. | N. n. 953. M. 1297, 16. Redt. 488 — 2 ed. 852.
 Bij den Haag en Utrecht, v. d. W. — Bij Leyden en Heemstede,
 v. V. — Bij Utrecht in Junij, Wtt. — In tamelijk aantal bij
 Leyden, Kopp. — Te Hoogeveen, Steenb.
- *1480 *Mysticus*, L. | M. 1297, 50. Redt. 487 — 2 ed. 851. Panz. *Fn.* 82, 9.
 Bij Cuyk, Everts.

Gracilia SERV.

- 1481 *Pygmaea*, F. | N. n. 954. M. 1302, 1. Redt. 489 — 2 ed. 854.
 Vrij gemeen in huizen te Leyden en den Haag, levende in teenen
 manden, v. V. — Te Rotterdam, Snell. — Te 's Gravenhage, v. d.
 W. — In Utrecht, V., Mart. en v. Hass. — In Junij binnen 's huis
 te Amsterdam, Kink. — In Zeeland, H. — In Augustus te Gro-
 ningen, de Gav.

Necydalis L.

- 1482 *Major*, L. | N. n. 956. M. 1304, 2. Redt. 492 — 2 ed. 856.
 Eenmaal aan den Maasoever bij Schiedam beide sexen in copulatie
 gevangen, v. W.

- 1483 *Minor*, F. M. 1304, 3. Redt. *ibid.* Panz. *Fauna*, 41, f. 21.
 Vijf voorwerpen in Mei 1863 binnen Amsterdam gevangen, J. M. Smit.
- *1484 *Umbellatarum*, L. N. n. 957. M. 1304, 4. Redt. *ibid.*
 Eenmaal te Brummen, v. W.

Stenopterus ILL.

- 1485 *Rufus*, L. N. n. 955. M. 1307, 2. Redt. 491 — 2 ed. 856.
 In Nederland, v. Itt. — Eenmaal bij Driebergen, Six. — Bij Amersfoort op schermbloemen in Julij, Kink.

Lamia F.

- 1486 *Textor*, L. N. n. 962. M. 1314, 1. Redt. 495 — 2 ed. 861. Panz. *Fn.* 19, f. 1.
 Bij Nijmegen, Maitl. — In den Bommelerwaard, v. d. W. — In Gelderland, v. V. — Bij Hoogeveen, Steenb. — Te Breda, Heyl.

Monochamus MEG.

- *1487 *Sutor*, L. N. n. 961. M. 1315, 2. Redt. 495 — 2 ed. 860.
 Het wijfje aan de Rhedersteeg eenmaal, W.

Astynomus DEJ.

- 1488 *Aedilis*, L. N. n. 959. M. 1316, 1. Redt. 493 — 2 ed. 857.
 Bij Utrecht, v. Hass. — In de Provincie Utrecht gemeen, V. — Bij het huis ter Heyde, Piag. — Bij Arnhem en Ede, v. d. W. — In de omstreken van Arnhem in Oct., v. V. — Te Velp, de Roo. — Bij Hoogeveen, Steenb. — Te Groningen, de Gav.

Liopus SERV.

- 1489 *Nebulosus*, L. N. n. 958. M. 1317, 1. Redt. 493 — 2 ed. 858.
 Bij den Haag, v. d. W. — Vrij gemeen in het Haagsche bosch in Junij en Julij, Everts. — In de duinen, Piag. — In Julij bij Noordwijk, Utrecht, Amersfoort en op de Glijphoeve, v. V. — In Junij te Amsterdam, Kink. — Te Utrecht, S. en Six. — In Sept. op Wikkenburg bij Houten, Wtt. — Bij Hoogeveen, Steenb.

Pogonocherus MEG.

- 1490 *Pilosus*, F. N. n. 960. M. 1321, 7 (*Dentatus*, Fourcr.). Redt. 494 — 2 ed. 859.
 In Julij te Leyden; bij Heenstede in Julij en October niet zeldzaam, v. V. — Uit klimoprانken gekweekt, met zijn' parasiet, Wtt. — Bij Brummen, v. Itt. — Te Hoogeveen, Steenb. — In Oct. op meidoorn in het Valkenburg bij Breda, Heyl.

Mesosa MEG.

- 1491 *Nubila*, Oliv. N. n. 963. M. 1323, 3. Redt. 496 — 2 ed. 862.
 Bij Utrecht, S. — Te Empe, v. Eyndh.

Agapanthia SERV.

- 1492 *Cardui*, L. N. n. 969. M. 1327, 12. Redt. 502 — 2 ed. 869.
Vrij gemeen aan den binnenrand der duinen.

Saperda F.

- 1493 *Carcharias*, L. N. n. 964. M. 1329, 1. Redt. 497 — 2 ed. 864.
Bij Rotterdam, v. d. Hoeven. — Aldaar gemeen, Snell. — Te Bleiswijk en bij Leyden, v. V. — Bij den Haag zeldzaam, v. d. W. — Te Amsterdam, Grebn. — Te Groningen, v. Bemm. — Te Hoogeveen, Steenb. — De larve leeft in populieren.

- 1494 *Scalaris*, L. N. n. 966. M. 1329, 7. Redt. *ibid.* *de larve v. d. Hoeven v. d. W. bij den Haag zeldzaam, v. d. W. — Te Amsterdam, Grebn. — Te Groningen, v. Bemm. — Te Hoogeveen, Steenb. — De larve leeft in populieren.*
Bij den Haag zeldzaam, v. V. — Te Hoogeveen, Steenb. — In Drenthe, Gock. — Bij Utrecht, V. — Te Groningen, de Gav. — Te Beek in Gelderland, Lewe. — Op Walcheren, W.

- 1495 *Populnea*, L. N. n. 965. M. 1329, 11. Redt. *ibid.*
In Junij gemeen op lage populieren aan den duinkant, v. V. — Aan de Vogelenzang in Junij, Kink. — Te Groningen, de Gav. — Den 1^{en} Mei te Beek bij Nijmegen, Six. — Te Hoogeveen, Steenb.

Tetrops KIRB.

- 1496 *Praeusta*, L. N. n. 967. M. 1330, 2. Redt. 499 — 2 ed. 865.
Bij Rotterdam en te Leyden in Mei, v. V. — Te Hillegom in Mei, Kink. — Bij den Haag, v. d. W. — Bij Utrecht, Six. — Bij Brummen, v. Itt. — Te Hoogeveen, Steenb. — In Junij vrij gemeen op bloemen van *Achillaea millefolium* op de wallen te Breda, Heyl.

Oberea MEG.

- 1497 *Oculata*, L. N. n. 968. M. 1333, 1. Redt. 499 — 2 ed. 866.
zeldz. In de duinen bij Wassenaar, W. en Kopp. — Aldaar 5 Aug. 1860, v. V. — Bij den Haag zeldzaam, v. d. W. — Bij Scheveningen in Sept. v. Br. — Te Brummen, v. Itt. *Sept. 1860 v. Br.*
*1498 *Linearis*, L. M. 1333, 8. Redt. *ibid.*
Te Doesburg, Tengbergen.

Rhagium F.

- *1499 *Mordax*, F. Bijvoegs. n^o. 969^a. M. 1340, 1. Redt. 503 — 2 ed. 870. Panz. *Fz.* 82, 3.
Bij Gieten en Rolde in Drenthe, Gock.
1500 *Inquisitor*, L. N. n. 970. M. 1340, 2. Redt. *ibid.*
Bij Utrecht, V. en S.
1501 *Bifasciatum*, F. Bijvoegs. n^o. 970^a. M. 1340, 5. Redt. 503 — 2 ed. 870.
Twee voorwerpen bij Hoogeveen, Steenb. — Bij Driebergen, Six. — In Drenthe, Gock. — Bij Brummen, v. Itt. — Twee voorwerpen te Beek, Lewe. — Eenige voorwerpen, waaronder eene fraaije var. te Breda, Heyl.

Toxotus MEG.

- 1502 *Meridianus*, L. N. n. 971. M. 1342, 4. Redt. 504 — 2 ed. 871.
Te Brummen eenmaal niet zeldzaam; de var. *Chrysogaster*, Oliv. komt minder voor, v. W.

Pachyta MEG.

- 1503 *Sexmaculata*, L. N. n. 972. M. 1344, 13. Redt. 505 — 2 ed. 873.
Eenmaal bij Brummen, v. W. — Ook aldaar in Mei, v. V.

Strangalia SERV.

- 1504 *Quadrifasciata*, L. N. n. 974. M. 1346, 2. Redt. 507 — 2 ed. 874.
Bij Utrecht, S. — In Julij op bloeiend pijpkruid bij Rotterdam, Snell. — Te Wassenaar den 2^{en} Aug., Grebn. — Te Noordwijk in Junij, Kink en v. V. — Te Haren, de Gav.
- 1505 *Armata*, Herbst. N. n. 973. M. 1346, 3 (*Maculata*, Poda). Redt. 507 — 2 ed. 875.
Bij Rotterdam en in Junij te Brummen, v. V. — Bij Putten, v. Benn. — Te Hoogeveen, Steenb.
- 1506 *Atra*, F. N. n. 975. M. 1346, 11. Redt. 506 — 2 ed. 874.
Bij Brummen niet gemeen, v. W. — Aldaar in Mei, v. V. — Bij Utrecht meer dan eens, Six. — Bij Amersfoort in Junij, v. V. — Te Hoogeveen, Steenb.
- *1507 *Bifasciata*, Schr. N. n. 977. M. 1346, 16. Redt. 507 — 2 ed. 875.
Te Utrecht, Six. — Te Brummen, v. Itt.
- 1508 *Melanura*, L. N. n. 976. M. 1346, 19. Redt. *ibid.*
Bij Rotterdam, en in Gelderland op verscheidene plaatsen, o. a. te Beek in Aug., v. V. — Te Amersfoort in Julij, Kink. — Omstreken van Utrecht, v. Hass. — Te Brummen, v. Itt. — Te Hoogeveen, Steenb. — In Julij bij Breda, Heyl.

Leptura L.

- 1509 *Testacea*, L. N. n. 978 (*Rubrotestacea*, Ill.). M. 1347, 2. Redt. 508 — 2 ed. 876.
Vrij gemeen te Rotterdam, v. V. — In Julij te Leyden, Kopp. en v. V. — Te Brummen, v. Itt.
- 1510 *Tomentosa*, F. N. n. 979. M. 1347, 13 (*Fulva*, de Geer). Redt. *ibid.*
Vrij gemeen in de omstreken van Leyden, de Gr., Kopp. en v. V. — Bij Utrecht, Six. — Zeer gemeen op Walcheren, H. — Op rozen in een tuin te Breda, Heyl.
- 1511 *Livida*, F. N. n. 980. M. 1347, 23. Redt. 509 — 2 ed. 877.
In Zuid-Holland, v. d. W. — In de omstreken van Utrecht, v. Hass. — Te Beek den 1^{en} Mei, Six.

Grammoptera SERV.

- 1512 *Laevis*, F. N. n. 981. M. 1351, 1. Redt. 2 ed. 878.
In Zuid-Holland, v. d. W. — Bij den Haag op bloemen in Mei, Snell. — Bij Utrecht, Wtt. — Bij Brummen, v. W.
- 1513 *Ruficornis*, F. Bijvoegs. n°. 981^a. M. 1351, 6. Redt. 510 — 2 ed. 878.
Meer dan eens bij Utrecht, Six. — Te Voorst de larve in klimop-ranken gevonden en het volkomen insect uitgekregen den 15^{en} Mei 1859, Wtt.

PHYTOPHAGA.

Donacia F.

- 1514 *Crassipes*, F. N. n. 982. M. 1353, 1. Redt. 511 — 2 ed. 879.
In Zuid-Holland, v. d. W. — Bij Utrecht, Wtt. — Bij Brummen, v. Itt.
- 1515 *Bidens*, Oliv. N. n. 983 (*Cincta*, Germ.). M. 1353, 2. Redt. 511 — 2 ed. 880.
Bij Rotterdam in Aug. en bij den Haag in Oct., v. V. — Bij Haarlem in Julij, Rits. — Op Wikkenburg in Sept., Wtt. — In Aug. te Vorden, de Gav.
- 1516 *Dentata*, Hoppe. N. n. 993. M. 1353, 3. Redt. *ibid*.
In Julij op riet bij Rotterdam, zeldzaam, Snell. — Bij Leyden, Kopp.
- 1517 *Dentipes*, F. N. n. 984. M. 1353, 8. Redt. *ibid*.
Bij Rotterdam, v. W. — Ik ontving een ex. bij Gouda gevangen, v. V. — In Maart bij Breda, Heyl.
- 1518 *Lemnae*, F. N. n. 985. M. 1353, 9. Redt. 512 — 2 ed. 880.
Vrij gemeen in Zuid-Holland, v. V. — Zeldzaam bij Rott., Snell. — In April bij den Haag, v. d. W. — Bij Leyden, Kopp. — Zeer gemeen te Brummen, v. V. — In Friesland, G. — In Drenthe, Gock. — In Dec. onder boomschors op de wallen van Breda, Heyl.
- 1519 *Sagittariae*, F. N. n. 986. M. 1353, 11. Redt. *ibid*.
Zeldzaam in Zuid-Holland, v. V. — Bij den Haag, v. d. W. — Den 26^{en} Oct. *op eene Dahlia-bloem* in mijn tuin te Leyden. — Te Brummen, v. W.
- *1520 *Brevicornis*, Ahr. M. 1353, 14. Redt. *ibid*.
In December onder den bast der boomen op de wallen van Breda. Heyl.
- 1521 *Menyanthidis*, F. N. n. 987. M. 1353, 17. Redt. 513 — 2 ed. 882.
Bij Rotterdam, Snell. — In tamelijk aantal in de omstreken van Leyden, Kopp. — Te Abcoude in Junij, Kink. — In Junij op de Glijphoeve en aan de Winkelsteeg bij Hatert, v. V.

- 1522 *Linearis*, Hoppe. N. n. 988. M. 1353, 21. Redt. 513 — 2 ed. 881.
Bij Leyden, Kopp. — Bij Brummen, v. V.
- 1523 *Simplex*, F. N. n. 989. M. 1353, 23. Redt. 513 (*Semicuprea*, Panz.) — 2 ed. 882.
Alom vrij gemeen op waterplanten; de gemeenste der *Donacien*.
- 1524 *Hydrocharidis*, F. N. n. 990. M. 1353, 25. Redt. *ibid*.
Bij Schiedam, zeldzaam, v. W. — In Julij bij Utrecht, Six. —
Aan de Rijnwetering, de Gr.
- 1525 *Nigra*, F. N. n. 991. M. 1353, 27. Redt. 512 — 2 ed. 881.
Gemeen bij den Haag, v. d. W en v. V. — In Mei bij Rotterdam,
Snell. — Bij Leyden, Kopp. — Gemeen op riet in eene sloot aan
den Maredijk bij Leyden, W. en v. V.
- 1526 *Sericea*, L. N. n. 992. M. 1353, 30. Redt. *ibid*.
Bij Leyden, v. V. en Kopp. — Bij Utrecht, Six. — In zeer groot
aantal te Groningen, v. Bemm. — Met de var. *Festucæ* in Mei bij
den Haag, v. d. W. — Eene prachtige vuurroode var. bij den Haag
Everts. — Eene indigo-blaauwe in Mei bij Utrecht, Six.
- Haemonia** MEG.
- 1527 *Equiseti*, F. M. 1354, 1. Redt. 514 — 2 ed. 803. Panz. *Fauna*, 24, f. 17.
Op het eiland Walcheren, de Man.
- Zeugophora** KUNZE.
- 1528 *Subspinosa*, F. N. n. 994. M. 1356, 2. Redt. 515 — 2 ed. 885.
Zeldzaam bij Rotterdam, Snell. — Bij den Haag, v. d. W. — In
Julij te Scheveningen en bij de Glip, op abeelen; ook in Julij op
Schothorst op populieren, v. V. — Aan het huis ter Heyde, Piag. —
In Mei bij Utrecht, Six. — Aldaar op populieren, V.
- 1529 *Flavicollis*,
Marsh. N. n. 995. M. 1356, 3. Redt. 516 — 2 ed. 886.
Bij Bennebroek en aan de Vogelenzang op populieren, v. V.
- Lema** F.
- *1530 *Puncticollis*,
Curt. M. 1357, 1. Redt. 517 — 2 ed. 886.
Te Hengelo in Julij, Groll.
- 1531 *Cyanella*, L. N. n. 1000. M. 1357, 2. Redt. 518 — 2 ed. 886.
Alom zeer gemeen, vooral op wilgen.
- 1532 *Melanopa*, L. N. n. 999. M. 1357, 5. Redt. *ibid*.
In April op lelien, Snell. — Bij Voorschoten en Leyden, en in
Aug. bij Heemstede, v. V. — Bij Hillegom in Maart onder dorre
bladeren, Kink. — Bij Utrecht, Six. — Te Hoozeveen, Steenb.
- Crioceris** GEOFFR.
- 1533 *Merdigera*, L. N. n. 996. M. 1358, 2. Redt. 516 — 2 ed. 887.
Op witte lelien te Zwammerdam en te Leyden, v. V. — Te Rotter-
dam, in Mei, Snell. — Bij Wageningen, W. — Te Hoozeveen,
Steenb. — In Zeeland, H.

- *1534 *Brunnea*, F. Bijvoegs. n^o. 996^a. M. 1358, 3. Redt. *ibid*.
Bij Gieten en Rolde in Drenthe, Gock.
- 1535 *12-punctata*, L. N. n. 997. M. 1358, 5. Redt. 517 — 2 ed. 887.
Bij Wageningen gemeen, W. — In de omstreken van Utrecht,
v. Hass. en Six. — Bij Leyden, Kopp. — Op *Asparagus* in Julij op de
duinen, v. V. — Bij Brummen, v. W.
- 1536 *Asparagi*, L. N. n. 998. M. 1358, 14. Redt. 517 — 2 ed. 888.
Zeer gemeen op spergiebedden, door het geheele land.

Clythra LAICH.

- *1537 *Tridentata*, L. N. n. 1091. M. 1360, 21. Redt. 560 — 2 ed. 889.
Den Sen Junij 1848 een enkel exemplaar op den Keijenberg bij
Renkum, v. V. — In Noord-Brabant, v. W.
- 1538 *Quadrifun-*
ctata, L. N. n. 1090. M. 1360, 72. Redt. 559 — 2 ed. 891.
Bij Wageningen gemeen, G. — Bij Driebergen, V. — Bij Zeist, Mart.
- 1539 *Cyanea*, F. Bijvoegs. n^o. 1090^a. M. 1360, 93. Redt. 562 — 2 ed. 891.
Aan de Bildt in April, te Soest in Julij en te Amsterdam in Aug.,
Kink. — In de omstreken van Maastricht, Maur.
- 1540 *Bucephala*, F. M. 1360, 104. Redt. 562 — 2 ed. 892.
Een voorwerp in de omstreken van Utrecht, Six.

Lamprosoma KIRB.

- *1541 *Concolor*, Sturm. N. n. 1085. M. 1361, 1. Redt. 556 (*Oomorplus conc.*) — 2 ed. 893.
Op de heide bij Zeist, v. V.

Colaphus MEG.

- 1542 *Sophiae*, Schall. N. n. 1084. M. 1362, 5. Redt. 556 — 2 ed. 925.
Eenmaal te Brummen, v. W. — In 1860 schadelijk te Haren op
knollenloof, Cl. Muld.

Bromius CHEVR.

- 1543 *Obscurus*, L. N. n. 1088. M. 1365, 1. Redt. 558 — 2 ed. 893.
Eenige voorwerpen bij Zeist, v. V. — Bij Breda, Heyl. — Bij
Brummen, v. Itt.
- *1544 *Vitis*, F. N. n. 1089. M. 1365, 2. Redt. *ibid*.
Tweemaal te Brummen, v. Itt.

Cryptocephalus GEOFFR.

- *1545 *Serpunctatus*, L. N. n. 1092. M. 1370, 34. Redt. 566 — 2 ed. 897.
Eenmaal te Amersfoort op berken, v. W. — Te Hoogeveen, Steenb.
- 1546 *Sericens*, L. N. n. 1094. M. 1370, 61. Redt. 567 — 2 ed. 898.
Op de duinen van Holland somwijlen gemeen in de bloemen van
Leontodon en *Hieracium*, v. V. — Eenmaal op den Keijenberg bij
Renkum in Junij, v. V. — Te Hoogeveen, Steenb. — In Noord-
Brabant, Roel.

- *1547 *Pini*, L. M. 1370, 72. Redt. 572 — 2 ed. 904.
Bij Haarlem, Groll.
- 1548 *Abietis*, Knoch. Redt. ibid. Suffr. *Linn ent.* II, 160.
Eenmaal bij Driebergen, Six.
- 1549 *Nitens*, L. N. n. 1095. M. 1370, 78. Redt. 568 — 2 ed. 899.
Op berken bij Amersfoort in het najaar, v. W. — Te Hoogeveen, Steenb. — In de omstreken van Breda, Heyl. — Te Driebergen, Six.
- 1550 *Moraei*, L. N. n. 1096. M. 1370, 90. Redt. 569 — 2 ed. 901.
Bij Brummen, v. V. — Aan de Bildt, Six. — Bij Maartensdijk, Mart. — In Junij op Frankendaal bij Amsterdam, Kink. — In de duinen bij den Haag, v. d. W. en Snell.
- *1551 *10-punctatus*, L. Bijvoegs. n^o. 1096^a. M. 1370, 95.
Bij Hoogeveen, Steenb. — In Junij op bloeiende Spiraeën te Breda, Heyl.
- 1552 *Flavilabris*, F. N. n. 1097. M. 1370, 102. Redt. 568 — 2 ed. 900.
In het najaar op berken te Amersfoort, v. W. — Bij Maarsbergen, Piag. — In Noord-Brabant, Roel.
- 1553 *Bipunctatus*, L. N. n. 1093. M. 1730, 110. Redt. 570 — 2 ed. 901.
Bij Utrecht, Six en v. V. — Te Brummen, v. ltt. — Bij Breda, Heyl.
- 1554 *Vittatus*, F. Bijvoegs. n^o. 1093^a. M. 1370, 116. Redt. 570 — 2 ed. 902.
Een gepaard paar bij Utrecht, Six. — In Julij bij Harendermolen, de Gav.
- 1555 *Pygmaeus*, F. M. 1370, 123. Redt. 571 — 2 ed. 903.
In de Scheveningsche duinen, Piag. en Everts — Een voorwerp den 5^{en} Aug. te Wort-Rhede, v. V.
- 1556 *Minutus*, F. N. n. 1100. M. 1370, 129. Redt. ibid.
Op het eiland Walcheren, G. — In de duinen, Piag. — In Julij en Sept. op de Glijphoeve, in Julij zeer gemeen op zekere duinweide bij den Haag; voorts te Noordwijk, Wassenaar en Driebergen, v. V. — In Junij bij de Bildt, Six. — Aan de Vogelenzang in Junij, en op de heide te Velp in Julij, Kink.
- *1557 *Pusillus*, F. M. 1370, 132. Fabr. *S. E.* II, 57, 85. Suffr. *Linn. ent.* III, pag. 78. N^o. 98. Redt. 2 ed. 903.
Den 31^{en} Aug. 1854 een ex. op een elzenboom bij den Haag, Snell.
- 1558 *Gracilis*, F. N. n. 1101. M. 1370, 133. Redt. 2 ed. 900.
Bij den Haag in Julij en Aug., v. d. W. — In Aug. bij Wassenaar en in Sept. te Heemstede, v. V.
- 1559 *Labiatus*, L. N. n. 1099. M. 1370, 135. Redt. 570 — 2 ed. 901.
Op berken bij Wassenaar, den Haag en Brummen in Julij, v. V. — Bij Maarsbergen, Piag. — Te Driebergen in Oct., Six. — Aan de Vuursche in Julij, v. V. — In Noord-Brabant, Roel.

- 1560 *Geminus*, Meg. N. n. 1098. M. 1370, 138. Redt. *ibid.*
 Bij Rotterdam op wilgen en bij den Haag, Snell. — Op berken bij Wassenaar en op vruchtboomen bij Heemstede in de lente; bij Brummen in Julij, v. V. — Te Haarlem, Buse. — Te Noordwijk in Junij, Kink. — Bij Driebergen, Six. — Bij Maarsbergen, Piag.

Pachybrachys SUFFR.

- 1561 *Hieroglyphicus*, F. M. 1371, 9. Redt. 563 — 2 ed. 905. Panz. *Fauna*, 68. fig. 13.
 Op het laatst van Julij zes voorwerpen in de Wassenaarsche duinen, Piag. — Ter zelfder plaatse in Junij, v. V.

Timarcha MEG.

- 1562 *Tenebricosa*, F. N. n. 1054. M. 1374, 7. Redt. 543 — 2 ed. 907.
 Aan de Rhedersteeg, W. — Larve en kever (de laatste in Aug.) op het buitengoed Rhienderstein bij Brummen, v. V. — Bij Zutphen, v. Eyndh. en v. Bemm.
- 1563 *Coriaria*, F. N. n. 1055. M. 1374, 36. Redt. *ibid.*
 Bij Leyden, v. V. — In Gelderland, W. — Te Zutphen, v. Eyndh. — Te Voorst in Mei, Wtt. en v. V.

Chrysomela L.

- 1564 *Staphylaea*, L. N. n. 1063. M. 1375, 18. Redt. 545 — 2 ed. 909.
 In Zuid-Holland, v. d. W. — Bij Leyden, v. V. — Te Hillegom in Maart onder mos, Kink. — In Januarij bij IJsselstein, Snell. — Te Groningen, de Gav. — Te Hoogeveen, Steenb.
- 1565 *Varians*, F. N. n. 1067. M. 1375, 27. Redt. 546 — 2 ed. 911.
 Bij Leyden en in Gelderland, v. V. — Bij Utrecht, Wtt. — Bij Brummen, v. W.
- 1566 *Goettingensis*, L. N. n. 1056. M. 1375, 28. Redt. 547 — 2 ed. 911.
 Bij Leyden, Kopp. en v. V. — Bij den Haag en bij Arnhem, v. d. W. — In Mei en weder in Sept. op de dijken bij Amsterdam, Kink. — Te Groningen, de Gav. — Bij Brummen, v. V.
- 1567 *Haemoptera*, L. N. n. 1057. M. 1375, 51. Redt. *ibid.*
 Bij Katwijk en Scheveningen, en in Julij te Oestgeest in het gras, v. V. — In de omstreken van Leyden, Kopp. en Wtt. — Bij den Haag in Sept., Snell. — Te Groningen, de Gav.
- 1568 *Sanguinolenta*, L. N. n. 1058. M. 1375, 66. Redt. 545 — 2 ed. 909.
 Tweemaal bij Rotterdam, Snell. — Bij Wassenaar, W. — In tamelijken overvloed in Noord-Brabant, Wtt.
- 1569 *Limbata*, F. N. n. 1059. M. 1375, 70. Redt. 544 — 2 ed. 908.
 Te Overveen in Julij op *Salix repens*, Kink. — In Sept. bij Rotterdam, Snell.

- 1570 *Violacea*, Panz. N. n. 1068. M. 1375, 89. Redt. 546 — 2 ed. 911.
Bij Brummen in Aug., v. Itt., v. W. en v. V. — In Aug. bij Haren, de Gav. — Een groot getal voorwerpen van kleine gestalte op Schothorst bij Amersfoort in Julij en Aug., v. V.
- 1571 *Menthastris*, M. 1375, 90. Redt. 2 ed. 911. Duftschm., *Fauna*, III. 192, 50.
Suffr. De varieteit *Herbacea*, Duftschm. den 18^{en} Mei te Brummen, v. V.
- 1572 *Graminis*, L. N. n. 1065. M. 1375, 93. Redt. 546 — 2 ed. 910.
Bij Rotterdam in Julij, Snell. — Bij Utrecht, S. en Six. — Ik zag eens een doos vol dezer dieren uit de omstreken van Leyden, doch vond er zelf nimmer een, v. V.
- 1573 *Fastuosa*, L. N. n. 1066. M. 1375, 95. Redt. 545 — 2 ed. 909.
Zeer gemeen op doove netelen (*Lamium album*). — Eene zwarte verscheidenheid is bij Leyden in April en in Julij niet zeer zeldzaam, Kopp. en v. V.
- *1574 *Cerealis*, L. N. n. 1069. M. 1375, 102. Redt. 547 — 2 ed. 912.
Bij Brummen, v. Itt.
- 1575 *Polita*, L. N. n. 1064. M. 1375, 105. Redt. 545 — 2 ed. 909.
Nog gemeener dan *Fastuosa*, en op velerlei planten aan te treffen.
- 1576 *Lamina*, F. N. n. 1060. M. 1375, 108. Redt. 548 — 2 ed. 913.
Op brandnetelen bij Rott., Snell. — Aan de Oude Plas aldaar, Piag. — Bij Leyden in Sept., v. V.
- 1577 *Fucata*, F. N. n. 1062. M. 1375, 113. Redt. 549 — 2 ed. 913.
Eenmaal in Holland, v. d. W. — Op brandnetelen bij Rotterdam, zeldzaam, Snell. — Te Beek in Mei, Six. — In zeer groot aantal op enkele planten van hertshooi (*Hypericum perforatum*) in Julij op Heidestein bij Renkum, v. V.
- *1578 *Geminata*, Panz. N. n. 1061. M. 1375, 117. Redt. 548 — 2 ed. 913.
In Zuid-Holland, v. d. W.
- Lina** MEG.
- 1579 *Aenea*, L. N. n. 1072. M. 1376, 1. Redt. 551 — 2 ed. 918.
In Aug. op Schothorst bij Amersfoort, v. V. — Te Warnsveld bij Zutphen in Aug., Grebner. — In Gelderland, Snell. — De blaauwe var. bij Brummen, zeldzaam, v. W.
- 1880 *Collaris*, L. N. n. 1073. M. 1376, 2. Redt. 551 — 2 ed. 917.
Zeer gemeen in de duinen in April en Mei, op duinwilgen en in de wagenspooren, v. d. W., de Gr. en v. V. — Te Groningen, de Gav. — Bij Brummen, v. W.
- 1581 *Populi*, L. N. n. 1070. M. 1376, 8. Redt. ibid.
Op populieren bij Rotterdam en achter Rhederoord in Aug., v. V. — Op de duinen bij den Haag in Junij, v. V. — In Drenthe, Gock. — Te Hoogeveen, Steenb.

- 1582 *Tremulae*, F. N. n. 1701. M. 1376, 9. Redt. 551 — 2 ed. 918. *Redt. 1843*.
Op populieren, zeer zeldzaam, v. V. — In September in de omstreken van Groningen, de Gav.

Gonioctena CHEVR.

- 1583 *Decempunctata*, L. N. n. 1087. M. 1378, 1 (*rufipes*, de Geer). Redt. 558 — 2 ed. 919.
De type met eene schier ongevlekte verscheidenheid te Brummen, v. W.
- 1584 *Litura*, F. N. n. 1086. M. 1378, 8. Redt. 557 — 2 ed. 919.
Bij Utrecht, V. — Bij Driebergen in Junij en aan de Bildt in Aug.; te Beek in de eerste dagen van Mei, Six. — In September op brem aan het huis ter Heyde, Kink. — Aldaar en bij Maarsbergen, Piag. — Bij Zeist, Snell. — Te Brummen, v. Itt. — Te Noordwijk en in Gelderland op brem, v. V.
- 1585 *Pallida*, L. M. 1378, 12. Redt. 557 (*Dispar*, Payk.) — 2 ed. 920.
Bij Paterswolde in Mei, de Gav.

Gastrophysa CHEVR.

- 1586 *Polygoni*, L. N. n. 1075. M. 1379, 1. Redt. 553 — 2 ed. 921.
Gemeen in Friesland, G. — Bij Hoogeveen, Steenb. — In Mei aan de Bildt, Six. — Bij Brummen v. Itt. — In Julij te Arnhem, de Gav. — Op waterpeper bij Rotterdam, niet gemeen, Snell. — In Junij en Aug. op de dijken aan het IJ bij Amsterdam, Kink. — Omstreken van Leyden, Kopp.
- 1587 *Raphani*, F. N. n. 1076. M. 1379, 2. Redt. *ibid.*
Vrij gemeen op zuring door het geheele land.

Plagiodera CHEVR.

- 1588 *Armoraciae*, L. N. n. 1074. M. 1380, 1. Redt. *ibid.*
Op wilgen bij den Haag, Leyden, Brummen, Bloemendaal, enz. v. V. — Bij Kralingen en Katendrecht, Piag. — In Junij op wilgen bij Amsterdam, Kink. — In Mei bij Utrecht, Six. — Te Voorst en op Wikkenburg in September, Wtt. — Bij Groningen, de Gav.
- 1589 *Pyritosa*, Oliv. Bijvoegs. n°. 1078^a (*Graminicola*, Dfts.). M. 1381, 4. Redt. 554 — 2 ed. 922.
Bij Utrecht, Six. — Eenige voorwerpen bij Vianen, Everts.

Phaedon MEG.

- 1590 *Cochleariae*, F. N. n. 1078. M. 1381, 8. Redt. 554 — 2 ed. 922.
Soms tijds bij honderden op mierikswortel, v. V. — Te Leyden, Kopp. — In April op riet bij Rotterdam, Snell.
- 1591 *Concinuus*, Steph. M. 1381, 12. Redt. 2 ed. 922.
In April onder aangespoeld riet aan den IJkant bij Amsterdam, Kinker.

Phratora CHEVR.

- 1592 *Vulgatissima*, L. M. 1382, 1. Redt. 2 ed. 923.
 Bij Amsterdam in Mei, Grebner. — Aldaar in Febr. en Maart, Kink. — Bij Kralingen en in het Overmaassche, Piag. — Te Doesburg en in Mei in Julij te Groningen, de Gav. — Te Voorst, Wtt.
- 1593 *Vitellinae*, L. N. n. 1077. M. 1382, 3. Redt. 554 — 2 ed. 923.
 Veel gemeener dan de vorige. — Op popels en wilgen bij Leyden, Kopp. en v. V. — Bij Rotterdam, Scheveningen, de Vogelenzang en Brummen in Mei, v. V. — Te Amsterdam in Mei, Grebn. — Te Utrecht in Mei, Six. — Te Voorst, Wtt. — Te Groningen in Augustus, de Gav.

Prasocuris LATR.

- 1594 *Aucta*, F. N. n. 1083. M. 1383, 1. Redt. 556 — 2 ed. 924.
 Bij Leyden en in Mei bij Heemstede, v. V. — Bij Utrecht, Six. — In Junij te Abcoude, in Mei bij Ede, Kink.
- 1595 *Marginella*, L. N. n. 1079. M. 1383, 5. Redt. 555 — 2 ed. 924.
 Bij Rotterdam op wilde kervel in Julij, Snell. — In Julij op de Glijphoeve, v. V. — Te Haarlem, Buse. — In Maart bij Amsterdam en in Mei aan de Bildt, Kink. — Vrij gemeen in Mei in de omstreken van Utrecht, Six.
- *1596 *Hanoveriana*, F. N. n. 1080. M. 1383, 8. Redt. 2 ed. 924.
 Bij Leyden, zeer zeldzaam, v. V.
- 1597 *Phellandrii*, L. N. n. 1081. M. 1383, 9. Redt. 555 — 2 ed. 924.
 Menigvuldig op bloeiende waterplanten bij Leyden, v. V. — Als larve, pop en kever in den wortel van *Sium latifolium*. S. — Aan de Oude Plas bij Rotterdam, Piag. — In April aan de Bildt, Kink. — In Mei bij Utrecht, Six. — Te Breda, Heyl.
- *1598 *Beccabungae*, Ill. N. n. 1082. M. 1383, 13. Redt. ibid. (*Violacea*).
 In Zuid-Holland, v. d. W. — Op elzen en populieren bij Rotterdam, doch niet gemeen, Snell.

Adimonia LAICH.

- 1599 *Tanaceti*, L. N. n. 1012. M. 1384, 12. Redt. 523 — 2 ed. 926.
 Op de duinen bij Wassenaar en Katwijk, en in October te Noordwijk, v. V. — Op de duinen van Overveen, Kink. — Te Wassenaar, Wtt. en Snell.
- 1600 *Rustica*, F. N. n. 1013. M. 1384, 15. Redt. ibid.
 Op de duinen, zeldzaam, v. V. — Bij den Haag, Snell. — Bij Utrecht, Six. — Te Hoogeveen, Steenb. — In Julij te Brummen, v. V.

- 1601 *Sanguinea*, F. N n. 1014. M. 1384, 55. Redt. 523 — 2 ed. 927.
Zeldzaam. Eenmaal bij Leyden en eenmaal in April op de Gliphoeve, v. V. — In April op Rozenburg bij Amsterdam, Kink.
- 1602 *Capraeae*, L. N. n. 1015. M. 1384, 57. Redt. *ibid.*
Op wilgen in Mei te Noordwijk, v. V. — In Mei bij Amsterdam, Kink. — Omstreken van Utrecht, van Hass. — Aan de Bildt in April, Six. — Bij Harkstede in April, de Gav.
- Galeruca** GEOFFR.
- 1603 *Viburni*, Payk. N. n. 1017. M. 1385, 1. Redt. 524 — 2 ed. 927.
Bij Rotterdam gemeen, Snell. — In April op wilgen te Hillegom, Kink. — Bij Utrecht op wilgen, V. en v. V. — Bij Leeuwarden, G. — Bij Breda, Heyl.
- 1604 *Calvariensis*, F. N. n. 1016. M. 1385, 3 (*Xanthomelaena*, Schr.). Redt. 524 — 2 ed. 928.
In Holland, v. W. — Bij Rotterdam, Piag. — In Sept. op *Lythrum salicaria* aan den oever van de Haarlemmermeer, v. V. — Aan de Bildt in April, Six.
- 1605 *Nymphaeae*, L. N. n. 1018. M. 1383, 4. Redt. *ibid.*
In Maart bij Amsterdam, in April bij Hillegom, Kink. — Op *Rumex hydrolapathum*, v. V. — In Aug. bij Utrecht, Six. — Al-
daar op *Nymphaea lutea*, S.
De var. *Sagittariae* niet zeldzaam op allerlei waterplanten.
- 1606 *Lineola*, F. N. n. 1019. M. 1383, 6. Redt. *ibid.*
Gemeen bij Rotterdam, Snell. — In de omstreken van Kralingen, Piag. — Op waterwilgen bij Leyden in September en te Noordwijk, v. V. — Bij Utrecht, Six. — Bij Hoogeveen, Steenb.
- Agelastica** CHEVR.
- 1607 *Alni*, L. N. n. 1021. M. 1388, 1. Redt. 525 — 2 ed. 930.
Zeer gemeen door het geheele land, meest op elzen.
- 1608 *Halensis*, L. N. n. 1020 (*Nigricornis*, F.). M. 1383, 2. Redt. *ibid.*
In Sept. bij Scheveningen, v. Br. — In Aug. bij den Haag, Snell. — Omstreken van Leyden, Kopp. — In Oct. op het duin bij Overveen, Kink. — Te Zandpoort, Piag. — Te Brummen, v. Itt.
- Phyllobrotica** CHEVR.
- 1609 *Quadrinaculata*, L. N. n. 1022. M. 1389, 1. Redt. 525 — 2 ed. 931.
In Julij bij Rotterdam, Sn. — Bij Leyden, Kopp. en v. V. — Bij Utrecht, Six. — Te Hoogeveen, Steenb.
- Luperus** GEOFFR.
- 1610 *Rufipes*, F. N. n. 1023. M. 1390, 27. Redt. 526 — 2 ed. 932.
Op berken bij den Haag en in Junij in Gelderland, v. V. — Bij Maarsbergen, Piag. — Te Driebergen en te Beek in Mei, Six. — Te Brummen, v. W. — Te Groningen, de Gav.

- 1611 *Flavipes*, L. | N. n. 1024. M. 1390, 30. Redt. 527 — 2 ed. 932.
Op berken bij Wassenaar en in de omstreken van Arnhem in
Junij, v. V. — Bij Brummen, v. Itt.

Crepidodera CHEVR.

- *1612 *Salicariae*, Payk. | M. 1394, 5. Redt. 529 — 2 ed. 936.
Te Vorden in Junij, Groll.
- 1613 *Impressa*, F. | N. n. 1026. M. 1394, 7. Redt. 528 — 2 ed. 934.
Een paar aan den oever van de Haarlemmermeer, half Julij, v. V. —
Bij Kralingen, Piag. — Bij Utrecht en in September bij Amersfoort,
Six. — Te Helpman en te Groningen in Aug., de Gav.
- 1614 *Ferruginea*,
Schr. | N. n. 1027 (*Exoleta*, E. H.). M. 1394, 9. Redt. *ibid.*
Bij Leyden, Wassenaar, Noordwijk en Heemstede, v. V. — Bij
Amsterdam in Aug., Kink. — Bij Groningen in Julij, de Gav.
- 1615 *Helxines*, L. | N. n. 1029. M. 1394, 24. Redt. 528 — 2 ed. 935.
Zeer gemeen op wilgen.
- *1616 *Modeeri*, L. | N. n. 1028. M. 1394, 29. Redt. *ibid.*
Bij Leyden, H. — In Sept. op de Gliphoeve eenmaal, v. V.

Graptodera CHEVR.

- 1617 *Erucae*, Oliv. | M. 1395, 1. Redt. 527 — 2 ed. 934.
Te Noordwijk in Mei en te Brummen in Junij, v. V. — Aan
het huis ter Heide, Piag. — Te Voorst, Wtt.
- 1618 *Olerucea*, L. | N. n. 1025. M. 1395, 11. Redt. 528 — 2 ed. 934.
In het Overnaassche, Piag. — In Maart bij Hillegom en in Julij
te Velp, Kink. — Bij Utrecht, Six. — In den Haarlemmermeer-
polder, v. Bemm. — Te Rhederoord in Julij zeer gemeen op *Epi-*
lobium angustifolium, v. V.

Aphthona CHEVR.

- 1619 *Coerulea*, Payk. | N. n. 1038. M. 1397, 14. Redt. 531 — 2 ed. 938.
In het vroege voorjaar op *Iris pseudacorus* bij Leyden, v. V. —
Bij Haarlem, Buse.
- 1620 *Euphorbiae*, F. | N. n. 1037. M. 1397, 26. Redt. 531 — 2 ed. 937.
Overal zeer gemeen.
- *1621 *Atrocoerulea*,
Steph. | M. 1397, 28. Redt. 531 (*Cyanella*) — 2 ed. 938.
In September op de Katwijksche duinen, v. d. W.

Argopus FISCH.

- *1622 *Hemisphaericus*,
Dftschm. | M. 1398, 3. Redt. 541 — 2 ed. 949.
In Junij bij Utrecht, Groll.

- 1623 *Cardui*, Kirb. M. 1399, 1. Redt. 542 — 2 ed. 950. Gyll. *Ins. Suec.* IV, 658, n^o. 23 — 24.
Bij den Haag in Julij, v. d. W. — Mede in Julij op Sterkenburg en te Brummen, v. V. — Te Groningen, de Gav.
- 1624 *Testaceus*, F. N. n. 1053. M. 1399, 2. Redt. 542 — 2 ed. 949.
Op de duinen bij den Haag, Sn. — Bij Leyden en op de Gliphoeve in Aug., v. V. — Bij Utrecht, Six. en V.
- Phyllotreta** FOND.
- 1625 *Antennata*, E. H. M. 1400, 1. Redt. 530 — 2 ed. 937.
In Holland, de Haan.
- 1626 *Atra*, Payk. N. n. 1033. M. 1400, 4. Redt. *ibid.*
Twee voorwerpen te Rocagne, Piag. — In Mei bij Amsterdam, Kink. — Bij Utrecht, S. — Bij Brummen in Julij, v. V. — Gemeen te Renkum, Wtt.
- 1627 *Lepidii*, E. H. N. n. 1032. M. 1400, 10. Redt. *ibid.*
Eens in Julij gemeen te Brummen op bloeiende peen, v. V.
- 1628 *Nemorum*, L. N. n. 1039. M. 1400, 19. Redt. 532 — 2 ed. 938.
In Mei bij den Haag; gemeen op hop en kool in Gelderland in Junij, v. V. — Bij Utrecht, v. Hass. — In Maart en Mei bij Amsterdam en in Julij te Soest, Piaget. — In April te Haren, de Gav.
- 1629 *Flexuosa*, E. H. N. n. 1031. M. 1400, 22. Redt. 532 — 2 ed. 939.
Aan slootkanten bij Leyden, v. V. — In het Overmaassche, Piag.
- 1630 *Brassicae*, F. N. n. 1030. M. 1400, 24. Redt. *ibid.*
Bij Leyden, zeldzaam, v. V. — In het Overmaassche land, Piag. — In Febr. en Maart onder aanspoelsel bij Amsterdam; in April aan de Bildt, Kink. — Gemeen op knollenloof te Voorst, Wtt.
- Podagrica** CHEVR.
- 1631 *Fuscicornis*, L. N. n. 1036. M. 1401, 8. Redt. 530 — 2 ed. 936.
Op dessertbladeren te Voorst, Wtt. — In Julij op Sterkenburg bij Driebergen, v. V.
- Plectroscelis** CHEVR.
- 1632 *Dentipes*, E. H. Bijvoegs. n^o. 1051^a. M. 1403, 6. Redt. 540 — 2 ed. 947.
In Junij bij Leyden, v. V. — In Maart onder boommos bij Amsterdam, Kink. — In Maart te Utrecht. Six. — In September bij het huis ter Heide, Piag. — Op kool in Junij te Voorst gemeen, Wtt.
- *1633 *Sahlbergii*, Gyll. M. 1403, 21. Redt. *ibid.*
In April onder aangespoelde ruigte aan den oever van den Schinkel bij Amsterdam, Kink.

- *1634 *Aridella*, Payk. N. n. 1051. M. 1403, 22. Redt. *ibid.*
Bij Scheveningen in October, v. Br. — In Maart onder aange-
spoelde ruigte aan den Schinkel, Kink. *Leider de ruigte*

Balanomorpha CHEVR.

- 1635 *Rustica*, L. N. n. 1034. M. 1405, 1. Redt. 529 — 2 ed. 936.
In April en Mei bij den Haag, v. V. — In Oct. te Driebergen, Six.
- *1636 *Chrysanthemii*,
E. H. N. n. 1035. M. 1405, 2. Redt. 2 ed. 939.
In September bij Scheveningen, v. Br.

Haltica ILL.

(*Thyamis*, Steph. Mars.)

- 1637 *Verbasci*, Panz. M. 1409, 1. Redt. 583 — 2 ed. 940. Panz. *Fauna*, 21, fig. 17.
In Julij in zeer groot aantal bij Brummen, v. V.
- *1638 *Analisi*, Creutz. Bijvoegs. n^o. 1044^a. M. 1409, 3 (*Apicalis*, Beck). Ratz. 535 — 2 ed. 942.
Te Utrecht, Six.
- 1639 *Atricapillus*,
Dftschr. M. 1409, 5 (*Melanocephala*, Gyll.). Redt. 534 — 2 ed. 941.
Op den zeedijk der Zuiderzee, niet ver van Kampen, v. V.
- 1640 *Holsatica*, L. N. n. 1044. M. 1409, 11. Redt. 535 — 2 ed. 942.
Eenmaal bij Leyden, v. V. — In Oct. bij Driebergen, Six.
- 1641 *Atricilla*, L. N. n. 1041. M. 1409, 21. Redt. 534 — 2 ed. 942.
Gemeen bij Rotterdam, Snell. — In April en Mei op dijken
in den ontrek van Amsterdam, Kink. — In Maart bij Utrecht,
Six. — In September bij het huis ter Heide, Piag. — In Augustus
te Wort-Rhede, v. V.
- *1642 *Pusilla*, Gyll. M. 1409, 59. Redt. 534 — 2 ed. 941.
In Julij op Beekhuizen bij Velp op heide, Kink.
- *1643 *Anchusae*, Payk. M. 1409, 64. Redt. 536 — 2 ed. 943.
In Januarij en Maart te Amsterdam en Hillegom onder dorre
bladeren, Kink.
- *1644 *Lurida*, Scop. N. n. 1040. M. 1409, 70. Redt. 534 — 2 ed. 941.
In September bij Scheveningen, v. Br.
- 1645 *Nasturtii*, F. N. n. 1042. M. 1409, 80. Redt. 534 — 2 ed. 942.
Gemeen op bloeiende radijs, v. V. — In Maart gemeen in de
omstreken van Utrecht, Six.
- 1646 *Tabida*, F. N. n. 1043. M. 1409, 92. Redt. 533 — 2 ed. 940.
Bij den Haag, v. d. W. en v. V. — In Julij en Aug. gemeen
op sommige planten van *Senecio Jacobaea*, in Zuid-Holland en Gel-
derland, v. V. — Te Hillegom in Sept., Kink.
- *1647 *Ochroleuca*,
Marsh. N. n. 1046. M. 1409, 95. Redt. 2 ed. 941.
Bij Rotterdam, Gijsb. H.

- 1648 *Parvula*, Payk. | N. n. 1045. M. 1409, 103. Redt. 535 — 2 ed. 943.
Bij Leyden en in Augustus te Heemstede, v. V. — Op vlas, Wtt. —
In de omstreken van Utrecht, Six. — Te Zutphen, v. Eyndh.

Dibolia LATR.

- 1649 *Cynoglossi*, E.H. | N. n. 1052. M. 1410, 10. Redt. 541 — 2 ed. 949.
In April 1851 in menigte op de duinen bij den Haag achter de
Beeklaan, v. V. — Te Amersfoort in Julij, v. d. W.

Psylliodes LATR.

- 1650 *Chrysocephala*, L. | N. n. 1048. M. 1411, 2. Redt. 537 — 2 ed. 945.
Bij den Haag in April en te Brummen, v. V. — Bij Leyden,
de Gr. — In Oct. aldaar, v. V. — In den Haarlemmermeer-polder
schadelijk, Wtt. — Bij Utrecht, v. Hass.
- *1651 *Napi*, E. H. | M. 1411, 7. Redt. 539 (*Rapae*, Ill.) — 2 ed. 946.
In April op Frankendaal bij Amsterdam op *Glechoma hederacea*,
Kinker.
- 1652 *Affinis*, Payk. | N. n. 1050. M. 1411, 25. Redt. 536 — 2 ed. 944.
In Zeeland, de Bruyne. — Eene geheel geele var. bij Leyden,
Kopp. — De type aldaar, v. V. — In Friesland, G.
- 1653 *Rufilabris*, E. H. | M. 1411, 28. Redt. 539 — 2 ed. 945.
In groote menigte in een elzenlaantje bij den Blaauwen steen
in Junij, v. V.
- *1654 *Dulcamaræ*,
E. H. | N. n. 1047. M. 1411, 34. Redt. 537 — 2 ed. 944.
Eenmaal in Oct. op elfrank bij Bennebroek, v. V. — In April
op een der dijken bij Amsterdam, Kinker.
- 1655 *Cucullata*, Ill. | N. n. 1049. M. 1411, 44. Redt. 538 — 2 ed. 946.
Bij Rotterdam, Gijsb. H. — Te Noordwijk in Julij, v. V.

Hispa L.

- 1656 *Atra*, L. | N. n. 1001. M. 1412, 1. Redt. 518 — 2 ed. 951.
Drie exemplaren op den Amersfoortschen berg in Junij, v. V. —
Bij de Bildt in Aug. niet zeldzaam, Six. — ~~Bij Scheveningen, Everts.~~

Cassida L.

- 1657 *Murraea*, L. | N. n. 1003. M. 1414, 4. Redt. 520 — 2 ed. 953.
Zeer gemeen bij Rijnsburg op eene soort van *Inula*, W. en v. V. —
Bij Utrecht, V. — Bij Utrecht en Driebergen, Six.
- 1658 *Sanguinosa*,
Creutz. | M. 1414, 6. Redt. *ibid.*
Twee voorwerpen aan het huis ter Heide, Piag. — Een voorwerp
op de duinen bij den Haag in de vlugt gevangen, in Julij, Everts.

- 1659 *Rubiginosa*, Ill. N. n. 1004. M. 1414, 10. Redt. *ibid.*
Bij Rotterdam gemeen, Snell. — Op distelen bij Leyden gemeen, Kopp. en v. V. — In April en Mei bij Amsterdam, Kink. — Bij Oosterbeek, v. Bemm. — In Gelderland, waarschijnlijk te Voorst, Wtt.
- 1660 *Vibex*, L. N. n. 1005. M. 1414, 14. Redt. 520 — 2 ed. 953.
Bij Brummen, v. W. — Bij Utrecht, Six.
- *1661 *Stigmatica*, Ill. M. 1414, 26. Redt. 521, — 2 ed. 954.
In Junij op de Hollandsche duinen, Piag.
- 1662 *Nobilis*, L. N. n. 1007. M. 1414, 36. Redt. 521 — 2 ed. 954.
Bij Leyden en in Aug. te Brummen, v. V. — In de Hollandsche duinen, Piag. — In Mei aan de Vogelenzang, Kink. — Bij Rotterdam in Aug., Snell. — Te Keppel, Burgersd.
De var. *Pulchella*, Panz. uit het Westland ontvangen van den heer van der Wulp en tweemaal bij Heemstede gevangen, v. V. — De var. *Viridula*, Payk. in April bij Utrecht, Six en V. — Op Walcheren, H.
- 1663 *Margaritacea*, F. N. n. 1006. M. 1414, 41. Redt. *ibid.*
Op zuring bij Rotterdam, Snell. — In Sept. bij den Haag en in Aug te Wassenaar en te Brummen, v. V. — Ter laatstgenoemde plaats mede, v. W.
- 1664 *Nebulosa*, L. N. n. 1011. M. 1414, 50. Redt. 522 — 2 ed. 955.
De gemeenste der schildpad-torretjes, schier door het geheele land aangetroffen.
- *1665 *Ferruginea*, F. N. n. 1010. M. 1414, 51. Redt. *ibid.*
Eenmaal in Holland, v. V.
- *1666 *Obsoleta*, Ill. N. n. 1009. M. 1414, 53. Redt. 521 — 2 ed. 954.
Bij Rotterdam, Gijsb. H. en Snell. — In April bij Bennebroek, v. V.
- 1667 *Equestris*, F. N. n. 1002. M. 1414, 56. Redt. 519 — 2 ed. 952.
In het voorjaar aan de Morsch bij Leyden, v. V. — Bij Leyden, Kopp. — Vrij gemeen in Julij bij Rotterdam, Snell. en Piag. — Bij Utrecht, Six. — In de omstreken van Groningen, de Gav. — Bij Hoogeveen, Steenb.
- 1168 *Hemisphaerica*,
Herbst. M. 1414, 58. Redt. 519 — 2 ed. 952.
In Junij in de duinen, Piag. — In Augustus bij Driebergen, Six.

EROTYLIDEA.

Triplax PAYK.

- 1669 *Russica*, L. N. n. 519. M. 1415, 1. Redt. 201 — 2 ed. 375.
Eenmaal bij Leyden, v. V.

Engis PAYK.

- 1670 *Humeralis*, F. N. n. 518. M. 1420, 2. Redt. 200 — 2 ed. 374.
 In Mei 1849 in menigte onder de schors van een' dooden ijpenboom aan de Vogelenzang en in Junij 1850 in menigte in boleten aan een' zeer ouden ijpenboom op het Manpad, v. V. — Bij Utrecht, Groll. — Bij Harendermolen in April, de Gav.
- 1671 *Rufifrons*, F. M. 1420, 3. Redt. *ibid.*
 In zeer groot aantal in Junij op een boleet tegen een' eschdoornstam bij Wassenaar aan den binnenzoom van het duin, v. V.

COCCINELLINA.

Hippodamia CHEVR.

- 1672 *13-punctata*, L. N. n. 1113. M. 1428, 1. Redt. 581 — 2 ed. 961.
 Niet zeldzaam in Holland, vooral aan te treffen op bloeiende *Spiraea*, v. V. — Op distels, Snell. — Bij Wassenaar in October; gemeen bij het huis ter Heide in Augustus, Piag. — Gemeen bij Utrecht, Six. — In den Haarlemmerhout, Rits. — In Augustus bij Amsterdam, Kink. — Bij Zwol en Dalfsen, V.

Anisosticta CHEVR.

- 1673 *19-punctata*, L. N. n. 1106. M. 1429, 1. Redt. 576 — 2 ed. 961.
 Op riet bij Rotterdam, in Augustus en September tamelijk gemeen, Snell. — Aldaar in Junij, Piag. — In Mei op de Glijphoeve, v. V. — In Februarij, Augustus en November bij Amsterdam, Kink. — In Mei bij Utrecht, Six.

Coccinella L

- 1674 *Mutabilis*, Scrib. N. n. 1114. M. 1430, 1. Redt. 582 — 2 ed. 962.
 Bij Leyden; in Sept. te Renkum; in groot aantal op bloeiende wortelen te Brummen, v. V. — In Oct. te Overveen, Kink. — In de duinen, Piag. — Te Hoogeveen, Steenb.
- 1675 *M-nigrum*, Ill. Bijvoegs. n^o. 1114^a. M. 1431, 1 (*Idalia obliterata*, L.). Redt. *ibid.*
 Te Brummen, v. Itt. — Bij Utrecht, Six. — Op Lokhorst bij Amersfoort, Grebn. en v. Woerden. — Bij Driebergen, de Gav. — Te Beek en te Wort-Rhede in Aug., v. V.
- 1676 *Bipunctata*, L. N. n. 1115. M. 1431, 5. Redt. 582 (*Dispar*) — 2 ed. 963.
 Zeer gemeen. — Eene fraaije naamlooze verscheidenheid bij Utrecht. Six. — De var. *6-pustulata* werd in Febr., Mei en Oct. te Leyden aangetroffen, v. V. — Te Driebergen, v. Bemm. en Six. — Te Groningen in Sept., de Gav. — De var. *4-pustulata* te Leyden, Kopp. — Te Utrecht en Driebergen, Six. en v. Bemm.

- 1677 *Impustulata*, L. N. n. 1120 et 1126. M. 1433, 3. Redt. 584 — 2 ed. 965.
De geheele zwarte verscheidenheid te Driebergen in Sept., Six. —
De var. *Conglobata* te Rotterdam op rozen gemeen, Sn. — In Hol-
land, v. V. — In Groningen, de Gav.
- 1678 *Variabilis*, Ill. N. n. 1118 et 1119. M. 1434, 4. Redt. 584 — 2 ed. 964.
Alom zeer gemeen.
De var. *Humeralis*, Schönh. te Wassenaar, Piag. — In April bij
den Haag, v. d. W. — Te Amsterdam in Mei, Grebn. — Dikwijls
bij Driebergen, Six. — Meer dan eens bij Leyden, v. V.
- 1679 11-*punctata*, L. N. n. 1129. M. 1434, 6. Redt. 582 — 2 ed. 963.
In Zeeland, H. — In de duinen, Piag. — Bij Katwijk, Kopp. —
In Mei en Augustus bij Amsterdam, Kink.
- 1680 *Hieroglyphica*, L. Bijvoegs. n^o. 1129^a. M. 1434, 8. Redt. 583 — 2 ed. 963.
Een voorwerp te Utrecht, Six.
- 1681 *Quinquepun-*
ctata, F. N. n. 1116. M. 1434, 9. Redt. 583 — 2 ed. 964.
In Holland en Gelderland niet zeldzaam, v. W. en v. V. —
Verscheidene popjes te Noordwijk op duinwilg, v. V. — In Aug.
bij Amsterdam, Kink. — In April bij de Bildt, Six.
- 1682 *Septempun-*
ctata, L. N. n. 1117. M. 1434, 11. Redt. *ibid.*
Alom zeer gemeen, somtijds zeer nuttig.
- *1683 *Tigrina*, L. M. 1435, 1. Redt. 585 — 2 ed. 966.
In Mei bij Arnhem en in October te Ede, Groll.
- 1684 18-*guttata*, L. N. n. 1121. M. 1436, 1. Redt. 584 — 2 ed. 965.
In October te Heemstede en in Augustus op Schothorst, v. V. —
Bij Driebergen in October, Six. — Te Zeist in Mei, Six.
- 1685 14-*guttata*, L. N. n. 1124. M. 1437, 2. Redt. 585 — 2 ed. 966.
In September bij Maarssen, in Mei en October op Rhienderstein
bij Brummen, v. V. — Een gepaard paar bij den Haag in Mei,
Snell. — Bij Zeist, Mart. — Bij Brummen, v. W.
- 1686 10-*guttata*, L. M. 1437, 3. Redt. *ibid.* Herbst V, 376, Pl. LIX, fig. 3.
Op de entomologische excursie van 6 Julij 1861 te Wassenaar
of Katwijk gevangen, v. V.
- 1687 16-*guttata*, L. N. n. 1125. M. 1438, 1. Redt. *ibid.*
Gemeen in den herfst en weder in Maart en Mei tegsn beuken-
stammen in het Haagsche bosch, Snell. en v. V. — In Septem-
ber aldaar uit de larve opgekweekt, v. V. — In September te
Overveen, Kink.
- 1688 22-*punctata*, L. N. n. 1127. M. 1439, 1. Redt. 586 — 2 ed. 967.
Niet ongemeen bij den Haag, v. d. W. — Op de duinen in
September, Snell., Piag. en v. V. — Bij Hoogeveen, Steenb. — In
Mei bij Utrecht, Six. — In October bij Overveen, Kink.

- 1689 *14-punctata*, L. N. n. 1130 (*Conglomerata*, F.). M. 1440, 1. Redt. 586 — 2 ed. 966.
Overall gemeen.

Micraspis CHEVR.

- 1690 *12-punctata*, L. N. n. 1107. M. 1441, 2. Redt. 576 — 2 ed. 967.
Bij Rotterdam en den Haag, Snell. — In de Wassenaarsche duinen, Piag. — In October bij Amsterdam, Kink. — Bij Brummen in Julij, v. V. — Omstreken van Groningen, de Gav.

Chilocorus LEACH.

- 1691 *Renipustulatus*, F. N. n. 1103. M. 1446, 1. Redt. 574 — 2 ed. 967.
Op esschen en elzen te Voorschoten en in het Haagsche bosch; leeft van de *Coccus*-soort dier boomen, v. V. — Bij Wassenaar in October, Piag. — Bij Amersfoort in Augustus, v. V. — In Julij bij Utrecht, Six.

- 1692 *Bipustulatus*, L. N. n. 1104. M. 1446, 2. Redt. *ibid.*
Op eiken bij den Haag; te Driebergen in Julij en bij Amersfoort in Augustus, v. V. — In September bij Utrecht, Six. — In Mei bij Amsterdam en in Junij te Wolfheze, Kink. — In September bij Rotterdam, Snell. — Bij Dalfsen, V. — Te Hoogeveen, Steenb.

Exochomus REDT.

- 1693 *Anritus*, Scrib. Bijvoegs. n°. 1105^a. M. 1447, 3. Redt. 575 — 2 ed. 968.
Bij Amsterdam in Maart, en te Velp in Julij, Kink. — In Junij te Voorst en te Molenate bij Hattem in Aug, op *Juncus*, v. V. — Bij Hoogeveen, Steenb. — In Limburg, Maur. *Sub sp. nov. 1105^a*
1694 *4-pustulatus*, L. N. n. 1105 (*4-verrucatus*, F.). M. 1447, 7. Redt. *ibid.*
Bij Leyden en in September bij Utrecht, v. V. — Bij Zeist, Mart. — In Julij bij Utrecht, Six. — In Maart op Wikkenburg, Wtt. — Bij Dalfsen, V.

Epilachna CHEVR.

- 1695 *Globosa*, Ill. N. n. 1131. M. 1451, 1 (*Lasia glob.*) Redt. 586 — 2 ed. 969.
Gemeen bij Zeist, Mart. — Gemeen in Holland, v. V. — Gemeen te Driebergen, Six. — Te Voorst, Brummen en Amersfoort, v. V. — Te Noordwijk in Junij, Kink. — Te Hoogeveen, Steenb. — Bij Zwol en Dalfsen, V.

Anatis MULS.

- 1696 *Ocellata*, L. N. n. 1123. M. 1453, 1. Redt. 585 — 2 ed. 966.
Bij Utrecht, Maitl. en V. — Bij Driebergen half Julij en op Schothorst in Aug., v. V. — Te Zeist in Mei, Kink. — Op Lokhorst bij Amersfoort, Albarda. — Bij Groesbeek, Lewe. — Te Noordwijk, v. Bemm. — Bij Rotterdam, Sn.

Mysia MULS.

- 1697 *Oblongoguttata*, L. N. n. 1122. M. 1454, 1. Redt. 584 — 2 ed. 965.
 Niet zeldzaam op grove den bij Utrecht, V. — Te Driebergen in October, Six. — Te Zeist in Mei en te Wolfheze in Junij, Kink. — Op Sterkenburg in Julij en te Wort-Rhede in Augustus, v. V. — Op Walcheren, G. — Zeeland, de Bruyne. — Bij Brummen, v. W. — Varieteiten vingen: Schubärt bij Utrecht, de Graaf te Noordwijk en Ritsema bij Haarlem.

Scymnus KUG.

- 1698 *Pygmaeus*, Fourcr. N. n. 1108. M. 1458, 11. Redt. 577 — 2 ed. 971.
 In Mei op berken bij den Haag, v. d. W. en v. V. *Scymnus pygmaeus*
 1699 *Frontalis*, F. N. n. 1109. M. 1458, 18. Redt. 578 — 2 ed. 971.
 In September bij Scheveningen, v. Br. *Scymnus frontalis*
 *1700 *Discoideus*, Illig. M. 1458, 28. Redt. 579 — 2 ed. 973.
 In April aan de Bildt, Kink. *Scymnus discoideus*
 *1701 *Capitatus*, F. M. 1458, 42. Redt. 579 — 2 ed. 972.
 In Augustus te Wolfheze, Piag.

Rhyzobius STEPH.

- 1702 *Litura*, F. N. n. 1110. M. 1460, 1. Redt. 580 — 2 ed. 974.
 Bij Leyden en op de Gliphoeve in Augustus, v. V. — Bij den Haag, Snell. — Omstreken van Utrecht, v. Hass. — Te Driebergen in September tusschen het gras, Six. — In April bij Amsterdam en in Julij te Velp, Kink.

Coccidula KUGEL.

- 1703 *Scutellata*, Herbst. N. n. 1111. M. 1461, 1. Redt. 580 — 2 ed. 974.
 In Junij bij den Haag, v. V. — Op rottend riet bij Rotterdam gemeen, Snell. — In December onder de schors van *Larix* in de vestingwerken te Breda, Heyl.
 1704 *Rufa*, Herbst. N. n. 1112. M. 1461, 2. Redt. *ibid.*
 Bij den Haag, v. d. W. — Aldaar op de aren van helm in Julij gemeen, en op de Gliphoeve in Augustus, v. V. — Vrij gemeen op het eiland Rozenburg, Piag. — Bij Amsterdam in Maart, Kink. — Bij Utrecht, Six. — Te Overveen in Junij, Rits.

AANTEKENINGEN.

- N^o. 66 en 67. In mijne eerste naamlijst van inlandsche Coleoptera zeide ik omtrent *Panagaeus crux-major*, L. dat de door mij gevangene exemplaren juist vallen tusschen deze soort en *Quadripustulatus*, Meg. en dus schijnen te bewijzen dat deze laatste slechts eene verscheidenheid en geene afzonderlijke soort is. Ofschoon nu sedert in ons vaderland van beide soorten voorwerpen gevangen zijn, die geheel aan de beschrijvingen beantwoorden, blijf ik evenwel nog altijd hechten aan de meening dat de twee zoogenaamde soorten slechts rassen zijn van eene soort, een groot en een klein ras, het eerste gewoonlijk (maar niet altijd) met iets breeder borststuk en gewoonlijk met meer rood op de dekschilden, zoodat de tweede band in den regel (niet altijd) den zijrand aanraakt.
- " 87 en 88. Ook hier is het verschil tusschen de twee soorten zoo bijzonder gering, dat men beide gewoonlijk naar de grootte determineert en het aannemen van twee rassen van eene en dezelfde soort voor de hand ligt. Het komt mij voor dat iemand die beide zoogenaamde soorten bij honderden individuen voor zich had, eene voortgaande serie zou kunnen maken in welke men niet zou kunnen zeggen waar de eene soort eindigde en de andere begon. Zullen de volgers van Darwin hier ook misschien het ontstaan zien eener nieuwe soort?
- " 90. Deze soort is twijfelachtig inlandsch. Het voorwerp van Walcheren kan ik niet meer nazien. De beide voorwerpen, die in de verzameling der N. E. V. onder den naam *Piger* voorkwamen en die in April op de Gliphoeve waren gevangen (een daarvan is vermeld op pag. 12 der eerste naamlijst), zijn later gebleken te zijn *Harpalus tardus*, Panz. — *Piger* moest met een sterretje geteekend zijn.
- " 97. Voeg bij: Twee voorwerpen in April op de Gliphoeve bij Heemstede.
- " 129. In de eerste lijst werd van *Amara plebeja* gezegd, dat zij even gemeen was als *Trivialis*. Ce n'est pas jurer gros! Beide soorten schijnen mij nu toe vrij zeldzaam te zijn. Het is echter moeilijk dit vast te stellen, tenzij men zich de moeite wil geven eenige jaren lang op verschillende plaatsen van ons land alle *Amaren* te laten opvangen en onderling te vergelijken. — Ik erken gaarne dat aan de uitspraken omtrent het veelvuldig voorkomen van enkele soorten, zoo als die in de eerste lijst voorkomen, niet altijd geloof te hechten is.
- " 199. Het is zeer mogelijk dat *Bembidium rupestre*, Ill. niet zeldzaam is, ten minste weinig zeldzamer dan *Andraea*, doch gewoonlijk daarmede verward wordt en dien ten gevolge zijne vrijheid mag behouden.
- " 212. De localiteit te Bleiswijk, waar deze soort in menigte voorkwam, was voor Holland tamelijk bijzonder. Een waterval van drie voet breedte stortte zijn water, dat uit de ringvaart van de droogmakerij kwam, van eene hoogte van vijf voet in een vijver, welks water daardoor eenigermate stroomend was. Het was in dien vijver dat de *Dytiscus* met andere watertorren leefde.
- " 251. Ik ben onzeker omtrent de juistheid mijner determinatie. Het eenige voorwerp dat de heer Six gevonden had, is zoek geraakt en ik herinner mij dat ik het, na de eerste determinatie voor *Decoratus* naar de beschrijvingen van Gyllenhal en Erichson, later weer voor *Inaequalis* hield.

- N^o. 304. *Holophorus grandis*. Ill. komt in de lijst van de Marseul niet voor, tenzij, gelijk de heer Kinker mij meldt, N^o. 12 *Aqualicus*. L. van die lijst dezelfde soort moet zijn als *Grandis*. Dan is evenwel weder de vraag: heeft de Marseul *Aqualicus*. L. (Erichs.) niet opgenomen of vermeldt hij deze soms weder onder een' anderen naam? Hoe dit zij, onze N^o. 303 en 304 zijn twee zeer duidelijk onderscheiden soorten.
- " 372. Indien ik mij niet geheel vergis, wordt de beschrijving uit de pen van den heer Fauvel nog in druk verwacht.
- " 427. In mijne eerste naamlijst van 1848 schreef ik van deze soort dat zij niet zeer zeldzaam is in Holland; sedert bleek mij echter het tegendeel.
- " 474. Er staat gedrukt *Oleus*; lees *Oleus*.
- " 476. *Ocytus brunipes* verspreidt, als hij aangeraakt wordt, een' zeer sterken en onaangenaamen wantsengeur. Voor zoo ver mij bekend is, treft men deze lucht bij geene andere *Staphylinide* aan, wel een' zuren geur, die volkomen gelijk is aan dien van vele *Carabiden* en die waarschijnlijk veroorzaakt wordt door *acidum formicarum*.
- " 499. Het door mij gevangen exemplaar wijkt van de beschrijving bij Erichson hierin af dat de beide rijen van 5 punten op het borststuk zeer sterk zijn ingedrukt.
Op deze soort volgt in de eerste naamlijst *Staphylicus pygmaeus*, eene soort die ik toenmaals voor nieuw en onbeschreven hield en waarvan ik twee voorwerpen bij elkander aangetroffen had. De heer A. Fauvel, die van de familie der kortschildigen eene bijzondere studie gemaakt heeft, verklaarde na inspectie mijne beide exemplaren te zijn *Philonthus nigritulus*, Grav., welke mede identiek is met *Aterrimus*, Grav.
- " 572. *Stenus rosoidus*, door mij als nieuw beschreven op bladz. 17 van de eerste naamlijst is mede gecasseerd en overtuigd te zijn een ietwat afwijkend exemplaar van *Tarsalis*, Ljung.
- " 616. Het veelvuldig of zelden voorkomen van eene soort hangt van zoovele omstandigheden af dat zij gedurende eene maand of zelfs slechts veertien dagen overvloedig kan zijn en daarna weder gedurende een zeer groot aantal jaren in dezelfde streek niet wordt bespeurd. Een zeer bekend voorbeeld daarvan levert *Vanessa Cardui*, L.
- " 678. De heer Kinker vond in Maart 1868 in *Hypnum* op een' boom bij Amsterdam een zonderling monstrum van *Silpha atrata*, waarvan het voorborststuk met den kop onderste boven waren gekeerd. Het dier liep op zijne vier achterste pooten en zag dan naar den hemel, of keerde zich (sonwijlen) om en liep dan of liever krabbelde vooruit op de beide voorpooten, terwijl de vier achterpooten in de lucht de gewone beweging van het loopen maakten, doch natuurlijk niets vonden, waarop zij konden gaan. Dit zonderling verkreupelde voorwerp wordt in de Insecten-Collectie der N. E. V. bewaard.
- " 697. Ik kan mij niet herinneren dat ik *Liodes orbicularis*, Herbst, dezelfde soort, die in de eerste naamlijst *Anisotoma orbiculare*, Ill. heet, ooit in bijzonder aantal gevangen heb; integendeel het komt mij voor dat dit dier altijd eene groote zeldzaamheid was. Ondertusschen heb ik in 1848 laten drukken (1^e Naamlijst, bladz. 31): „Bij Leyden niet zeldzaam." Ik neem het nu ook weder in deze lijst over, doch wil er niet voor instaan dat het insect niet door eene drukfout gemeen geworden is.
- " 700. Hier behoorde ook te volgen N^o. 465 der Nieuwe Naamlijst, *Agathidium minimum*, Voll. die op bladz. 46 der eerste lijst in twee regels beschreven is. Ik ben evenwel huiverig om die soort ook hier weder op te nemen en laat haar liever glijpen. Het eenige voorwerp dat ik bezat, is sedert verloren gegaan, zoodat eene nieuwe determinatie onmogelijk is. Mijne kennis van de zeer kleine kevervormen was destijds nog gering en het is dus wel wat gewaagd nu te willen volhouden dat ik toen werkelijk eene nieuwe soort van *Agathidium* in handen had.
- " 769. Ik twijfel er aan of de heer Gijsberti Hodenpijl zich niet vergist heeft, toen hij deze soort bij Rotterdam gemeen noemde; de heeren Snellen en Piaget hebben haar daar niet aangetroffen.
- " 805. Deze soort noemde ik in mijne eerste lijst gemeen in Zuid-Holland; ik moet dit terugnemen. Het kan zijn dat zij in enkele wijkelders op de vaten in zeker aantal voorkomt, gemeen is zij niet.
- " 863. Ook deze soort is niet gemeen, gelijk zij in de eerste naamlijst genoemd wordt.
- " 925. Van deze soort heb ik eens op een dag meer dan 40 mannetjes dood vinden liggen; ik denk dat zij na den coitus uitgeput van de wijfjes waren afgevallen. Het verwonderde mij dat ik ze in zoo groote menigte vond, daar doode insecten anders meestal zeldzaam zijn. Weinige insecten vinden een' natuurlijken dood.

- N^o. 945. Moest ik deze soort opnemen, wier aanwezig zijn in Zeeland voor jaren aangetoond werd door het vinden van een enkel voorwerp? Kan hier niet aan vergissing gedacht worden? Of heeft men hier te doen met het sporadisch voorkomen eener zuidelijke soort in noordelijker streken, gelijk dit nog bij enkele soorten b. v. *Cistela morio*, Dahl is opgemerkt?
- " 947. In de Naamlijst der Bouwstoffen staat betreffende *Cetonia stictica* dat daarvan 4 voorwerpen bij Brummen gevangen zouden zijn door den heer van Ittersum. Ik heb later vernomen dat deze aantekening, op eene vergissing berustte en dat de voorwerpen uit Noord-Brabant afkomstig waren, alsmede dat het niet zeker was of de Barou van Ittersum die wel zelf gevangen had.
- " 1011. Schijnt wel eene zeer locale soort te zijn.
- " 1023. Daar het aantreffen van niet licht gevende mannetjes (ik zou bijna gezegd hebben doove, even als men zegt doove kolen) eene zeldzaamheid is, wil ik hierbij opteekenen dat op den 17^{en} Julij 1869, toen de beide voorwerpen door mij bij Wassenaar in het schijnsel der lantaarn gevangen werden, de temperatuur voor den tijd van het jaar buitengemeen koud en sedert een veertiental dagen de wind noordelijk was.
- " 1034. Het verschil tusschen *Rafus*, L. en *Litaculus*, Fall. is zeer gering en bestaat alleen in de kleur van het achterlijf en het al of niet aanwezig zijn van een vlekje op den thorax, welk vlekje zeer in grootte en duidelijkheid bij de verschillende voorwerpen verschilt. Kweeking alleen kan uitmaken of beide twee of eene soort zijn, naar mijne meening is echter het laatste het waarschijnlijkst en nu reeds aan te nemen.
- " 1067. Hier is bij de vermelding van de Marscul, het soortnummer S uitgevallen. Zoo de kenmerken van het geslacht *Dolichosoma* vroeger door Stephens vastgesteld, sedert niet weder geheel veranderd zijn, behoort deze soort *Nobilis* wel degelijk tot het geslacht *Dasytes* en niet tot *Dolichosoma*, tot welk laatste zij in den Catalogus van Marscul gebracht wordt. Ook Stephens zelf en na hem Spry en Shuckard vermelden maar eene soort in het geslacht *Dolichosoma*.
- " 1009. Waarschijnlijk is ook de *Blaps noctisaga*, L. inlandsch. In de verzameling der N. E. V. wordt een voorwerp aangetroffen, met een nummer op het etiket, slaande op eene voormalige lijst, die ik niet heb kunnen ontdekken.
- " 1114. Sturm beschrijft de sprieten van *Phaleria cadaverina* als zwart en beeldt ze ook zoo af, zelfs nog al zeer donker. Alle inlandsche voorwerpen, die ik zag, hebben gele sprieten, ook die uit Frankrijk en Algiers, op 's Rijks museum aanwezig, zelfs de gevleete varieteit *Bimaculata* uit Engeland.
- " 1126. Het voorwerp zelf bevindt zich in de verzameling van 's Rijks Museum van natuurlijke historie te Leyden.
- " 1157. Het is niet geheel onwaarschijnlijk dat *An. quadripustulata* slechts eene verscheidenheid van *Huacralis* zou zijn.
- " 1161. Het is zonderling dat ik deze soort alleen vermeld vind bij Boitard naar Latreille. Kan zij ook slechts eene verscheidenheid eener andere welbekende soort zijn? De verzameling bezit tegenwoordig slechts een zeer beschimmeld voorwerp, dat zich niet best tot onderzoek leent.
- " 1234. Na het afdrukken van het 18^{de} blad zie ik eerst dat Schönherr in het zesde deel zijner *Caveationes* bladz. 375 *Phyt. pedestris*, die hij in zijn tweede deel als eigene soort optelde, als varieteit van *Phytonomus suspiciosus*, Herbst opgeeft. De lezer wordt dus verzocht hier dezen laatsten naam te willen lezen.
- " 1264. Het zou mij niet verwonderen indien een naauwkeurig onderzoek van vele voorwerpen van deze en de volgende soort aan het licht bragt, dat beiden slechts een zijn.
- " 1502. Zie hier weder eene soort, die eenmaal als niet zeldzaam werd opgegeven en die sedert niet teruggevonden is.
- " 1556. De verzameling der N. E. V. bezit twee voorwerpen, een bij den Haag, het ander bij Utrecht gevangen, die een' overgangsvorm uitmaken tusschen *Minutus* en *Gracilis*. Zijn dezen nu hybriden of zijn de genoemde soorten slechts elkanders type en varieteit?
- " 1579. De drie voorwerpen, die ik gezien heb, waren blaauw van kleur, te dien opzichte geheel gelijk aan *Agalastica Anni*.

Bijlage n^o. 2.L I J S T van *Coleoptera*, nieuw voor de *Fauna van Nederland*, medegedeeld door J. Kinker.

1	Notiophilus rufipes Curt.	M. 4. 6. Naturg. der Ins. Deutschl. Erichson. I. p. 67.	Zeyst en Oosterbeek, Mei 1871, Putzeys.
2	Notiophilus punctulatus Wesm.	M. 4. 9. Als voren p. 65.	Aan den Moerdijk, Julij 1863, Putzeys.
3	Leistus rufomarginatus Duft.	M. 10. 11. Redt. 2 ed. 9.	In het Haagsche bosch, gedurende de zomermaanden, Everts. Ook bij Rotterdam éénmaal, Snellen.
4	Chlaenius tibialis Dej.	M. 65. 40. Redt. 2 ed. 29.	Bij Vianen langs de Lek, in Junij, één exempl., Everts.
5	Chlaenius sulcicollis Payk.	M. 65. 54. Redt. ib.	Bij Venlo, van den Brandt.
6	Anisodactylus signatus Panz.	M. 79. 2. Redt. 2 ed. 54.	In Holland, Snellen.
7	Anisodactylus nemorivagus Duft.	M. 79. 4. ib.	Aan het Buikslooter tolhuis op kleigrond, in September, Kinker.
8	Harpalus punctatulus Duft.	M. 84. 9. Redt. 2 ed. 55.	Bij Oosterbeek, in Mei 1871, Putzeys.
9	Harpalus quadripunctatus Dej.	M. 84. 111. Redt. 2 ed. 59.	Bij den Haag éénmaal, Everts.
10	Harpalus flavitarsis Dej.	M. 84. 150. Redt. 2 ed. 60.	Bij Kuyk, Everts.
11	Acupalpus suturalis Dej.	M. 86. 10. Redt. 2 ed. 63.	Bij Utrecht op bouwland, in Augustus, Groll.
12	Acupalpus flavicollis Sturm.	M. 86. 12. Redt. 2 ed. 63.	Te Driebergen aan een' slootkant, in Mei, Kinker.
13	Feronia inaequalis Marsh.	M. 93. 60. Redt. 2 ed. 44.	Te Noordwijk aan Zee, onder helm, in Augustus, Kinker.
14	Feronia parallela Duft.	M. 93. 216. Redt. 2 ed. 41.	Te Zeyst, in Mei 1871, Putzeys. — Bij Dieren, in Julij. L. H. B. (1)
15	Amara vulgaris Panz.	M. 95. 24. Redt. 2 ed. 50.	Bij Rotterdam, in April, Snellen. — Ook door mij in Holland gevangen en als zoodanig door den heer Putzeys gedetermineerd, Kinker
16	" anthobia Villa.	M. 95. 34.	Bij den Haag, Snellen.
17	Calathus piceus Marsh.	M. 97. 31. Naturg. Ins. Deutschl. I. p. 398.	Als voren, in het Bosch onder mos-gemeen, door het gansche jaar, v. d. Wulp en Everts.
18	Anchomenus versutus Gyll.	M. 103. 40. Redt. 2 ed. 35.	Op Beekhuizen, onder Velp, in Junij, Kinker.
19	Anchomenus dolens Sahlb.	M. 103. 42. Redt. ib.	Bij Breda, Heylaerts.

(1) Beteekent door een leerling der Haagsche Hoogere Burgerschool.

- 20 **Anchomenus piceus** L. M. 103. 51. Redt. 2 Bij Rotterdam, Snellen.
(picipes F) ed. 37.
- 21 **Trechus micros** Herbst M. 109. 2. Naturg. Ins. Als voren.
(= pallidus Ziegl.) Deuschl. I. p. 634. *not 267 (Blaserna)*
- 22 **Gillenium laterale** Curt. M. 114. 1. id. p. 753. Op Walcheren, 4 exemplaren,
pl. 200. de Man.
- 23 **Bembidium striatum** M. 117. 5. Redt 2 ed. Oosterbeek aan de oevers van
Fabr. 72. den Rijn, in Mei 1871,
Putzeys; bij Ellecom aan
den IJssel, in Junij, Kinker.
- 24 **Bembidium punctula-** M. 117. 8. Redt. 2 ed. Als de vorige.
tum Drap. 73.
- 25 **Bembidium gilvipes** M. 117. 12. Redt. 2 ed. Bij Amsterdam in het Vondels-
Sturm. 74. park onder dorre bladeren,
in Maart, Kinker; aan den
Moerdijk, in Julij, Putzeys;
In het Gooi, in September,
Roelofs
- 26 **Bembidium modestum** M. 117. 72. Redt. 2 ed. Te Oosterbeek en bij Ellecom
F. 74. als hiervoren.
- 27 **Bembidium concionum** M. 117. 112. Naturg. Bij Amsterdam op de dijken
Putz. Ins. Deuschl. Erich- naar
son. I. p. 700. (not)
- 28 **Bembidium adustum** M. —. —. Redt. 2 ed. Te Dieren aan de sluis onder
Sch. 80, onder Varium steenen, Kinker.
Oliv. N. Ins. D. I.
686.
- 29 **Agabus femoralis** Payk. M. 128. 9. Redt. 2 ed. Bij Kuyk een paar exemplaren,
96. Everts.
- 30 " **chalconotus** M. 128. 14. Redt. ib. Bij Utrecht, Six; bij Kuyk,
Panz. Everts.
- 31 **Hydroporus cuspidatus** M. 134. 8. Redt. 2 ed. Bij Utrecht, in Mei en Junij,
Kunze. 86. Groll.
- 32 **Hydroporus angustatus** M. 134. 20. Redt. 2 ed. Bij den Haag, Utrecht en
Sturm. 91. Assen, van April tot Junij,
bij Vorden, in Augustus,
Groll; te Hillegom in slo-
ten, in Mei, Kinker.
- 33 **Hydroporus flavipes** M. 134. 129. Redt. 2 Bij Vorden, in Aug, Groll.
Oliv. ed. 91.
- 34 **Halipilus lineatus** Aubé. M. 136. 4. Redt. 2 ed. Bij Haarlem, in Mei, id.
(confinis Steph.) 84.
- 35 **Halipilus variegatus** M. 136. 12. Redt. 2 ed. Bij Hengelo, in Julij, id.
Sturm. 84.
- 36 **Hydrochus brevis** Hbst. M. 154. 1. Redt. 2 ed. Bij Utrecht en Assen, in Mei
109. en Junij, id.
- 37 " **elongatus** Schall. M. 154. 3. Redt. 2 ed. Bij de Bilt, in April; bij
109. Hengelo, in Julij, id.
- 38 **Ochthebius exsculptus** M. 155. 2. Redt. 2 ed. Bij Utrecht, in Mei, id.
Germ. 110.
- 39 **Hydraena gracilis** Germ. M. 156. 16. Redt. 2 ed. Uit sloten in de onmiddelijke
113. nabijheid van Breda, Hey-
laerts.
- 40 **Thiasophila angulata** M. 174. 1. Redt. 2 ed. Bij Breda in de nesten van
Er. 144. *Formica rufa*, in April, id.
- 41 **Thiasophila inquilina** M. 174. 2. Redt. ib. Als voren.
Maerk. (Zie de noot.)
- 42 **Aleochara brunneipen-** M. 179. 43. Redt. 2 ed. Bij Ellecom in paddestoelen,
nis Kr. 157. in Junij, Kinker.
- 43 **Dicarda Maerkelii** Kies. M. 181. 1. Redt. 2 ed. Bij Breda één voorwerp in
159. een nest van *Formica rufa*,
Heylaerts.
- 44 **Calodera nigricollis** M. 189. 2. Redt 2 ed. Bij Ellecom onder dorre bla-
Payk. 150. deren, in Junij, Kinker.

420. *Agabus fulvipes* Sch. Curt. pl. 203 op eenen zucht onder stenen niet voorkomend?

- 45 **Calodera longitarsis** Er. M. 189. 20. Redt. 2 ed. Bij Hillegom langs het kanaal
(= *Chilopora*) 150. onder aangespoeld riet, in
April, Kinker; te Scheve-
ningen aan het strand, in
October, Everts.
- 46 **Tachyusa constricta** Er. M. 190. 4. Redt. 2 ed. Bij Hillegom onder aangespoeld
riet, in Maart, Kinker. 123.
- 47 **Oxypoda ruficornis** Gyll. M. 193. 1. Redt. 2 ed. In het Haagsche bosch tegen
146. een boom, Everts.
- 48 " **flavicornis** Kr. M. 193. 65. Naturges. Bij Amsterdam aan den Hoo-
amoena Fairm. Ins. Deutschl. II. p. gendijk onder dood riet, in
135. — Guttleisch. Mei, Kinker.
p. 95.
- 49 **Homalota angustula** M. 195. 65. Redt. 2 ed. Als voren aan den Schinkel,
Gyll. 127. in Maart, id.
- 50 **Homalota pallescens** Er. M. 195. 105. Redt. 2 Te Zeyst in het bosch in pad-
ed. 132. destoelen, in Julij, id.
- 51 " **flavipes** Grav. M. 195. 112. Redt. ib. Bij Breda in de nesten van
Formica rufa, in April,
Heylaerts.
- 52 " **anceps** Er. M. 195. 114. Redt. 2 Als voren.
ed. 126.
- 53 " **circellaris** Grav. M. 195. 225. Redt. 2 Bij Haarlem onder dorre bla-
ed. 128. deren, in Maart, Kinker.
- 54 **Hyeronoma dimidiata** M. 199. 1. Redt. 2 ed. Bij den Haag, in Mei, v. d.
Grav. 152. Wulp; aan de Lek bij Via-
nen, in Junij, onder dood
riet, Everts.
- 55 **Gyrophaena affinis** M. 203. 6. Redt. 2 ed. Te Ellecom in paddestoelen,
Sahlb. 161. in Junij; te Noordwijk in
Augustus als voren, Kinker.
- 56 **Boletobius cingulatus** M. 218. 2. Redt. 2 ed. Bij Breda in een bosch, Hey-
Mannh. 175. laerts.
- 57 **Quedius xanthopus** Er. M. 224. 9. Redt. 2 ed. Als de vorige.
201.
- 58 " **tristis** Grav. M. 224. 23. Redt. 2 ed. In Holland, Snellen.
fontalis Nordm. 201.
- 59 **Quedius peltatus** Er. M. 224. 35. Redt. 2 ed. In den Haarlemmerhout on-
204. der dorre bladeren, in Maart,
Kinker.
- 60 " **nigriceps** Kr. M. 224. 44. Redt. 2 ed. Te Noordwijk als voren, id.
986.
- 61 **Ocypus similis** F. M. 227. 9. Redt. 2 ed. Bij Vianen en Kuyk, Everts.
187.
- 62 **Philonthus sordidus** M. 228. 39. Redt. 2 ed. Te Hillegom op duin, in April,
Grav. 190. Kinker.
- 63 **Philonthus ebeonius** M. 228. 54. Redt. 2 ed. Te Ellecom, in Junij, onder
Grav. **Var. corruscus** 194. een steen, Kinker; bij
Nordm. Kuyk, Everts.
- 64 **Philonthus quisquiliaris** Redt. 2 ed. 194. Bij Amsterdam aan den Hoo-
Gyll. **Var. rubidus** gendijk onder dood riet,
Er. in Mei, Kinker; bij den
Haag, Everts.
- 65 **Philonthus procerulus** M. 228. 117. Redt. 2 Bij Amsterdam, als voren.
Grav. ed. 198.
- 66 **Stilicis orbiculatus** M. 245. 12. Redt. 2 ed. Bij Hillegom langs het ka-
Payk. 214. naal onder dood riet, in
April; te Velzen in Junij
op de Excursie der Ver-
eeniging Kinker, ook al-
daar, Everts en v. V. *2 Sept 21. 1898*
4. 2. 21. (P.)
- 67 **Sunius filiformis** Latr. M. 249. 3. Redt. 2 ed. Te Ellecom onder een steen,
215. in Junij, Kinker.
- 68 **Dianous coeruleus** M. 255. 1. Redt. 2 ed. Bij Velp op Beekhuizen aan
Gyll. 247. den vijver, in Junij, id. *1. 1. 1898*
van roudt 1898

- 69 **Stenus atratulus** Er. M. 256. 41. Redt. 2 ed. Bij Amsterdam aan den Schinkel, in Maart en Nov., id. 160.
- 70 " **subimpressus** Er. M. 256. 82. Redt. 2 ed. Bij den Haag, in Maart, 223. Snellen.
- 71 **Bledius subterraneus** Er. M. 258. 20. Redt. 2 ed. Bij Ellecom aan den IJssel op het zand, in Junij, Kinker. 228. Aan een duinplas, 30 Dec., Everts.
- 72 " **arenarius** Payk. M. 258. 25. Redt. 2 ed. Bij den Haag, in April, als voren, L. H. B. 230.
- 73 " **fracticornis** Payk. M. 258. 32. Redt. 2 ed. Op de duinen bij 's Gravenhage, in April, één exemplaar, Everts. 229.
- 74 " **dissimilis** Er. M. 258. 43. Redt. ib. Met *subterraneus* Er., Kinker. 230.
- 75 **Trogophloeus scrobiculatus** Er. M. 262. 2. Redt. 2 ed. Te Abcoude onder dood riet, in Februarij, Kinker. 236.
- 76 **Deleaster dichrous** Grav. M. 271. 1. Redt. 2 ed. Bij Ellecom aan den IJssel onder steenen, id. 238.
- 77 **Lesteva punctata** Er. M. 274. 10. Redt. 2 ed. Bij Oosterbeek aan den Oorsprong op vochtige klei in een vijver, id. 244.
- 78 **Omalium Oxyacanthae** Grav. M. 290. 19. Redt. 2 ed. Op Frankendaal bij Amsterdam in rottende paddestoelen, in Mei, id. 251.
- 79 **Catops neglectus** Kr. M. 342. 17. Redt. 2 ed. Bij Rozenburg bij Amsterdam onder dorre bladeren, in April, id. 282.
- 80 **Orthoperus brunripes** Gyll. M. 365. 1. Redt. 2 ed. Bij den Haag, in April, Everts. 299.
- 81 **Ptenidium alutaceum** Gilhm. (**punctatum** Gyll. M. 375. 1. Redt. 2 ed. Bij Amsterdam aan den Hoogendijk onder dood riet, in September, Kinker. 305.
- 82 **Dendrophilus pygmaeus** L. M. 391. 2. Redt. 2 ed. Bij Breda in de nesten van *Formica rufa*, in April, Heylaerts. 312.
- 83 **Onthophilus sulcatus** F. M. 398. 1. Redt. 2 ed. Bij Breda, in December, id. 318.
- 84 **Epuraea florea** Er. M. 409. 21. Redt. 2 ed. Bij Rotterdam, in Julij, Snellen. 326.
- 85 **Meligethes tristis** Sturm. M. 416. 57. Redt. 2 ed. Bij Velzen, in Junij, Everts. 333.
- 86 **Sylvanus unidentatus** F. M. 463. 4. Redt. 2 ed. Te Rotterdam, in Januarij, Snellen. 357.
- 87 **Telmatophilus Schoenherri** Gyll. M. 468. 5. Bij Rotterdam, in October, Snellen.
- 88 **Emphylus glaber** Gyll. M. 471. 1. Redt. 2 ed. Bij Breda in de nesten van *Formica rufa*, in April, Heylaerts. 361.
- 89 **Cryptophagus saginatus** St. M. 472. 13. Redt. 2 ed. Te Rotterdam, in Januarij, Snellen. 362.
- 90 **Atomaria fimetaria** Hbst. M. 476. 2. Redt. 2 ed. Bij Rotterdam, in Julij, Snellen. 366.
- 91 **Monotoma angusticollis** Gyll. M. 489. 5. Redt. 2 ed. Bij den Haag, in Junij, één exempl. vliegende, Everts. 378.
- 92 **Monotoma spinicollis** Aubé. M. 489. 10. Redt. ib. Bij Vianen van lage planten gesleept, Everts.
- 93 **Elmis aeneus** Mull. M. 527. 3. Redt. 2 ed. Bij Velp op Beekhuizen aan eenen steen in de Beek, Kinker. 412.
- 94 **Heterocerus fuscus** Kies. M. 531. 18. Redt. 2 ed. Bij Amst. aan den Hoogendijk onder dood riet, in Mei, id. 416.
- 95 **Serica holosericea** Scop. M. 571. 2. Redt. 2 ed. Aan het strand te Scheveningen eenige exemplaren onder aangespoeld stroo L. H. B. 449.

- 96 *Anthaxia nitidula* L. M. 617. 36. Redt. 2 ed. Bij Maastricht, Maurissen.
473.
- 97 *Agrilus biguttatus* F. M. 625. 5. Redt. 2 ed. Bij Breda in het Liesbosch
476. op een eikenstruik, v. Hall.
- 98 " *olivaceus* Gyll. M. 625. 21. In den omtrek van Breda op
olivicolor Kiesw. eiken, Heylaerts.
- 99 *Trachys troglodytes* M. 628. 5. Redt. 2 ed. Te Driebergen, in Junij, Six.
Gyll. 482.
- 100 *Cardiophorus asellus* Er. M. 662. 38. Redt. 2 ed. Als voren, in Mei, Kinker.
497.
- 101 " *Equiseti* Hbst. M. 662. 53. Redt. ib. Te Hillegom op duin aan helm
in het zand, id.
- 102 *Agriotes pilosus* Panz. M. 670. 3. Redt. 2 ed. Bij Dieren, in Augustus, een
509. paar exemplaren L. H. B.;
bij Maastricht, Maurissen.
- 103 " *pallidulus* Ill. M. 670. 22. Redt. 2 ed. Te Oosterbeek, in Mei 1871,
511. Roelofs.
- 104 *Dascillus cervinus* L. M. 684. 1. Redt. 2 ed. In Gelderland, in Junij, Snel-
516. len.
- 105 *Cyphon coarctatus* Payk. M. 687. 1. Redt. 2 ed. Bij den Haag in Mei, en
518. Vianen in Junij, Everts.
- 106 *Drilus flavescens* F. M. 699. 1. Redt. 2 ed. Te Houthem in Limburg, in
Mei, Maurissen.
- 107 *Drilus concolor* Ahr. M. 699. 3. Redt. 2 ed. Bij Vianen op waterplanten,
(*pccetinatus* Schh.) 525. in Junij, Everts.
- 108 *Telephorus assimilis* M. 702. 42. Redt. 2 ed. Te Ellecom, op bloeiende
Payk. 528. vlier, in Junij, Kinker.
- 109 *Silis ruficollis* F. M. 706. 2. Naturges. Te Noordwijk, in Junij, Kin-
d. Ins. Deutschl. Er. ker.
IV. p. 521.
- 110 *Ennearthron cornutum* M. 766. 1. Redt. 2 ed. Bij den Haag op Polyporus,
Gyll. 575. in Junij, Everts.
- 111 *Scaphidema aenea* Payk. M. 919. 1. Redt. 2 ed. Bij Breda onder beukenschors,
(*bicolor* F.) 604. in December, Leesberg.
- 112 *Ciste/a rufipes* F. M. 960. 7. Redt. 2 ed. Bij Overveen op duinwilg, in
624. Junij, Kinker.
- 113 *Rhinosimus ruficollis* L. M. 968. 3. Redt. 2 ed. In het Haagsche bosch eenige
669. malen onder beukenschors,
Snellen, Leesberg en Everts.
- 114 *Strophosomus obesus* M. 1060. 2. Redt. 2 ed. Bij den Haag met S. Coryli,
Marsch. 699. Everts; ook door mij op
duin gevonden.
- 115 *Sitones regensteinensis* M. 1071. 28. Redt. 2 Te Ellecom, in Junij, Kinker.
Hbst. ed. 703.
- 116 *Sitones discoideus* Gyll. M. 1071. 38. Redt. ib. Tusschen de Lek en de Mer-
wede, Everts.
- 117 " *humeralis* Steph. M. 1071. 39. Redt. ib. Bij Vianen, in Junij, Everts.
- 118 *Otiorynchus niger* F. M. 1082. 60. Redt. 2 Te Haeren bij Maastricht, in
ed. 742. Junij, Maurissen.
- 119 *Coenopsis fissirostris* M. 1088. 1. Redt. 2 ed. Bij Ellecom aan den IJssel,
Walton. 741. in Junij, Kinker.
- 120 *Peritelus hirticornis* M. 1089. 24. Redt. 2 Bij Maastricht, in April, Mau-
Hbst. ed. 746. rissen
- 121 *Phyllobius Pomonae* M. 1100. 30. Redt. 712. Bij den Haag, in Mei, Everts.
Oliv.
- 122 *Phyllobius Betulae* F. M. 1100. 46. Redt. 711. Te Valkenburg, in Julij, Roc-
lofs.
- 123 *Phytonomus fascicula-* M. 1131. 7. Redt. 727. Op de Haagsche duinen, in
tus Hbst. April, onder eenen steen,
Everts.
- 124 *Phytonomus Arundinis* M. 1131. 44. Redt. ib. Bij den Haag, in April, Lees-
F. berg.
- 125 *Phytonomus dissimilis* M. 1132. 1. Redt. 2 ed. Bij Velzen, in Junij, Everts. *6. 5. 2. 1. 1.*
Hbst. (= *Limobius*). 731.

- 126 **Eriehinus infirmus** Hbst. M. 1157. 11. Redt. 2 Aan de Meern bij Utrecht onder mos in Maart, Kinker. ed. 760.
- 127 " **Nereis** Payk. M. 1157. 16. Redt. 2 Aan de plassen bij Rotterdam, in April, Snellen. ed. 764.
- 128 **Bagous limosus** Gyll. M. 1161. 8. Redt. 2 ed. Bij Haarlem in sloten op Myriophyllum, in Augustus, Kinker. ed. 795.
- 129 " **frit** Hbst. M. 1161. 13. Redt. 2 Bij Nieuwersluis, in April onder dood riet, id. ed. 794.
- 130 " **lutosus** Gyll. M. 1161. 23. Redt. 2 Bij Rotterdam, Snellen. ed. 795.
- 131 **Apion stolidum** Germ. M. 1170. 23. Redt. 2 Aan het Buiksloter tolhuis, in Augustus, op lage planten, Kinker. ed. 684.
- 132 " **fuscirostre** F. M. 1170. 52. Redt. 2 Te Driebergen op brem, in Mei, Kinker; in Gelderland, Snellen. ed. 686.
- 133 " **Malvae** F. M. 1170. 60. Redt. 2 Bij den Haag, Six. ed. 687.
- 134 " **immune** Kirby. M. 1170. 118. Redt. 2 In Holland, Snellen. ed. 689.
- 135 " **columbinum** Germ. M. 1170. 124. Redt. 2 Bij Groningen, de Gavere. ed. 691.
- 136 " **Loti** Kirby. (**angustatum** Kirby.) M. 1170. 140. Redt. 2 Te Oosterbeek, in Mei, Roelofs. ed. 690.
- 137 **Apion Hydrolapathi** Marsh. M. 1170. 189. Redt. 2 In Holland, Snellen. ed. 693.
- 138 **Rhynchites aeneovirens** Marsh. M. 1173. 16. Redt. 2 Te Driebergen, op brem, in Mei, Kinker. ed. 681.
- 139 **Rhynchites Alliariae** Payk (**interpunctatus** Steph.) M. 1173. 18. Redt. 2 Te Ellecom op vruchtboomen, in Junij, id. ed. 681.
- 140 **Rhynchites pubescens** Hbst. M. 1173. 29. Redt. 2 Bij Voorst in Junij 1858, van ed. 682. Voll.
- 141 **Magdalinus duplicatus** Germ. M. 1178. 4. Redt. 2 ed. Bij Amersfoort, in Augustus, Six; te Oosterbeek, in Junij, Snellen. ed. 757.
- 142 **Magdalinus barbicornis** Latr. M. 1178. 17. Redt. 2 Bij Utrecht een ♀, 15 Mei, Six. ed. 759.
- 143 **Ceuthorhynchus pumilio** Gyll. M. 1208. 8. Redt. 2 ed. Bij Utrecht, half Mei, id. ed. 806.
- 144 **Ceuthorhynchus Querceti** Gyll. M. 1208. 39. Redt. 798. Op de Haagsche duinen, in April, Everts.
- 145 **Ceuthorhynchus campestris** Gyll. M. 1208. 77. Redt. 2 Als voren, in Junij, id. ed. 803.
- 146 **Ceuthorhynchus Raphani** F. M. 1208. 88. id. 805. Als voren, in April, id.; aan de Meern bij Utrecht, in Mei, Roelofs.
- 147 **Phytobius velatus** Beck. M. 1212. 2. Redt. 2 ed. Te Hillegom onder dood riet, in Maart, in sloten op waterplanten, in Mei, Kinker. ed. 777.
- 148 " **leucogaster** Koch. M. 1212. 3. Redt. *ibid.* Bij Amsterdam aan den Hoogendijk onder dood riet, in Mei, id.
- 149 **Phytobius quadricornis** Gyll. M. 1212. 11. Redt. 2 Te Hillegom aan het kanaal onder dood riet, in Maart, id. ed. 779.
- 150 **Rhinocnus Castor** F. M. 1213. 1. Redt. 2 ed. Te Ellecom van planten geslept, in Junij, Kinker. ed. 809.
- 151 **Hylurgus ligniperda** F. M. 1230. 1. Redt. 2 ed. Bij Velzerend op duin aan dood hout in het zand, in Mei, id. ed. 827.
- 152 **Eccoptogaster rugulosus** Panz. (**Scolytus**) M. 1238. 8. Redt. 2 ed. Te Rotterdam onder de schors van een kersenboom, in Julij, Snellen. ed. 838.

- 153 **Bostrychus typographus** L. M. 1244. 1. Redt. 2 ed. 834. Onder inlandsche Coleoptera, afkomstig van Snellen, doch zonder nadere opgave van vindplaats, v. Voll.
- 154 **Strangalia revestita** L. M. 1346. 8. Redt. 2 ed. 874. In het Liesbosch bij Breda, in Junij, v. Hal.
- 155 **Donacia discolor** Hoppe. M. 1353. 28. Redt. 2 ed. 881. Bij Utrecht, Six.
- 156 **Clytra aurita** L. M. 1360. 98. Redt. 2 ed. 892. Te Bronde, bij Maastricht, Maurissen.
- 157 **Cryptocephalus Goryli** Panzer. M. 1370. 21. Redt. 2 ed. 897. Bij Arnhem, in Julij, Snellen.
- 158 **Cryptocephalus marginatus** F. M. 1370. 104. Redt. ib. 902. In Gelderland, v. Medenbach de Rooy.
- 159 **Cryptocephalus bilineatus** L. M. 1370. 119. Redt. 2 ed. 902. Op de Meerdervoortsche duinen, in Augustus, Everts.
- 160 **Galleruca tenella** L. M. 1385. 11. Redt. ib. 928. Bij den Haag, in Mei, id.
- 161 **Haltica pubescens** E. H. M. 1393. 30. Redt. ib. 934. Bij Vianen, in Junij, id.
- 162 **Apteropeda ciliata** Oliv. M. 1406. 1. Redt. ib. 950. In Noord-Brabant, in Mei, Snellen.
- 163 **Psylliodes marcida** Ill. M. 1411. 24. ib. 946. Te Noordwijk aan Zee op het duin, in Augustus, Kinker.
- 164 **Scymnus nigrinus** Kugelan. M. 1458. 10. ib. 971. Te Voorthuizen van planten gesleept, in Augustus, id.

Bijlage n^o. 3.L I J S T van in Nederland waargenomen soorten van
Suctorìa of Aphaniptera, door C. Ritsema Cz.

1 <i>Pulex irritans</i> Linn.	Op <i>Homo sapiens</i> Linn.	Te Haarlem en te Leiden, Rits.
2 <i>Trichopsylla cuspidata</i> Kol.	Op <i>Erinaceus europaeus</i> Linn.	Bij Haarlem en Leiden, Rits.
3 <i>Trichopsylla Melis</i> Leach.	Op <i>Meles taxus</i> Linn.	In Gelderland, Marshall; in de Rotterdamsche diergaarde, van Bemmelen en Piaget.
4 <i>Trichopsylla?</i> <i>Gallinae</i> Schrank.	In het nest van <i>Gallus Gallorum</i> Less.	Te Haarlem, Rits.
5 <i>Trichopsylla?</i> <i>Fringillae</i> Steph.	In het nest van <i>Passer domesticus</i> Gessn.	Te Haarlem, Rits.
6 <i>Trichopsylla?</i> <i>Columbae</i> Bouché.	In het nest van <i>Columba livia</i> Gessn.	Te Haarlem, Rits.
7 <i>Ctenonotus octodentatus</i> Kol. ¹ .	Op <i>Mus musculus</i> Linn.	Te Rhoon bij Rotterdam, Schepman.
	Op <i>Mus decumanus</i> Pall.	Te Leiden, Rits.
	Op ?	In de Rotterdamsche diergaarde, Piaget.
8 <i>Ctenophthalmus bis-octodentatus</i> Kol.	Op <i>Talpa europaea</i> Linn.	Bij Haarlem, Weyenbergh; te Rhoon, Schepman.
9 <i>Ctenophthalmus bis-septedentatus</i> Kol.	Op <i>Sorex vulgaris</i> Linn.	Te Arnhem, Brants.
	Op <i>Mus decumanus</i> Pall.	Te Rotterdam, Piaget.

¹ Naar alle waarschijnlijkheid is het deze soort, welke door Bosc in 1801 als *Pulex fasciatus* is beschreven en door hem was aangetroffen op de mol, de rat en *Myoxus nitela* Linn. (Bull. des Sciences par la Soc. Philom. t. II. p. 156, n^o. 44).

	Op <i>Mus sylvaticus</i> Linn.	Te Rhoon, Schepman.
	In een kogelrond muizennest.	Te Overveen bij Haarlem, Rits.
10 <i>Ctenopsyllus quadri-</i> <i>dentatus</i> Kol.	Op <i>Mus musculus</i> Linn.	Te Haarlem en te Leiden, Rits.
	Op <i>Mus sylvaticus</i> Linn.	Te Rhoon, Schepman.
	Op <i>Arvicola arvalis</i> Pall.	Te Rhoon, Schepman.
	In een kogelrond muizennest.	Te Overveen, Rits.
11 <i>Ctenopsyllus hiden-</i> <i>tatus</i> Kol.	Op <i>Sciurus vulgaris</i> Linn.	Te Oosterbeek, Weyen- bergh; in de Rotterdam- sche diergaarde, Piaget; bij Utrecht, van Meden- bach de Rooy.
12 (<i>Pulex</i>) <i>obtusiceps</i> Rits.	In een nest van <i>Bombus</i> <i>subterraneus</i> Linn.	Te Haarlem, Rits
	Op een mesthoop.	Bij den Haag, Groll.
	Tweemaal op <i>Arvi-</i> <i>cola arvalis</i> Pall.	Te Rhoon, Schepman.
13 <i>Ceratopsyllus tetra-</i> <i>ctenus</i> Kol.	Op <i>Vespertilio pipi-</i> <i>strellus</i> Daub.	Te Rotterdam, Piaget.
14 <i>Ceratopsyllus hexa-</i> <i>ctenus</i> Kol.	Op <i>Vespertilio auri-</i> <i>tus</i> Linn.	Te Leiden, Rits.
15 <i>Ceratopsyllus octa-</i> <i>ctenus</i> Kol.	Op <i>Vespertilio pipi-</i> <i>strellus</i> Daub.	Te Leiden, Rits.
16 <i>Ctenocephalus novem-</i> <i>dentatus</i> Kol.	Op <i>Canis familiaris</i> Linn.	Te Haarlem, Rits.; te Rot- terdam, Piaget.
	Op een Japansch hondje.	In de Rotterdamsche dier- gaarde, Piaget.
	Eenmaal op <i>Lepus ti-</i> <i>midus</i> Linn.	Bij Utrecht, van Meden- bach de Rooy.
17 <i>Ctenocephalus enne-</i> <i>odus</i> Kol.	Op <i>Felis domestica</i> Linn.	Te Haarlem en te Leiden, Rits.