



# **Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de verloskunde**

<https://hdl.handle.net/1874/260358>

17

# STELLINGEN

TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD

VAN

## Doctor in de Verloskunde,

NA MACHTIGING VAN DEN PRO-RECTOR MAGNIFICUS

### MR. B. J. L. DE GEER,

GEWOON HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID,

MET TOESTEMMING VAN DEN ACADEMISCHEN SENAAT

EN

VOLGENS BESLUIT DER GENEESKUNDIGE FACULTEIT,

AAN DE HOOGESCHOOL TE UTRECHT,

DOOR

### ANDREAS JACOBUS MOLENAAR,

GEBOREN TE DE LEMMER,

MEDICINAE DOCTOR TE FRANKER.

TE VERDEDIGEN

op Woensdag 25 Januari 1871, des avonds te 7 uur.



APPENDIX

CHAPTER I

SECTION I

THE FIRST PART OF THE APPENDIX

SECTION II

THE SECOND PART OF THE APPENDIX

THE THIRD PART OF THE APPENDIX

THE FOURTH PART OF THE APPENDIX

THE FIFTH PART OF THE APPENDIX

# STELLINGEN.



## I.

Bij, in de conjugata, vernaauwde bekkens is het gebruik der tang, om de vernaauwing zelve, tegen aangewezen.

## II.

Bij nakomend hoofd is het gebruik der tang nimmer aangewezen.

## III.

Ten onregte zegt *Schroeder* over de sectio cesarea sprekende: Lässt sich auch durch Reiben des Uterus eine stärkere Vereinigung der Wunde nicht erzielen, so kann die Nath nothwendig werden, *womöglich ist dieselbe aber zu vermeiden.*

## IV.

Teregt zegt *Schroeder* van het secale cornutum, als middel ter bevordering der weëen tijdens de baring: so ist der Gebrauch des secale corn. zur Austreibung des Kindes als unmützig und unter umständen für das kind gradezu schädlich, zu verbannen.

## **V.**

Ten onregte beweeren sommigen dat de perforatie alleen bij een dood kind mag geschieden.

## **VI.**

Bij eclampsia parturientium mag de partus dan alleen kunstmatig getermineerd worden, wanneer de extractie van het kind gemakkelijk en snel kan plaats hebben.

## **VII.**

Het is onjuist, bij hoofd en bekkenliggingen, niet meer of niet minder dan vier verschillende posities, te onderscheiden.

## **VIII.**

Onder de noodzakelijkste instrumenten die de verloskundige, bij elke baring bij zich moet hebben, behoort een dunne elastieken katheter van ongeveer  $3\frac{1}{2}$  m. m. dikte.

## **IX.**

De theorie, aangaande het opnemen van het menschelijk ei, door de fimbriae dertubae, is onhoudbaar.

## **X.**

Tot het opwekken van kunstmatige vroeggeboorte is het inbrengen van een elastieken katheter, in den regel, het doelmatigste middel.

### XI.

Wanneer men, bij dreigenden abortus de tamponade der scheede, tot stilling der bloeding, wil aanwenden dan is de plukseltampon te verkiezen boven den colpeurijnter.

### XII.

Bij bekkenvernaauwing kan men soms reeds alleen uit de wijze, waarop het kindshoofd door de vernaauwde plaats gaat, niet slechts de vernaauwing zelve, maar ook den aard der vernaauwing, met groote waarschijnlijkheid, diagnosticeren.

### XIII.

De, door *E. v. Siebold* gegevene, bepaling van de bekkenwijdte, als „een plat vlak dat aan het heiligbeen de vereeniging van den tweeden en derden valschen wervel, regts en links het foramen sacrale secundum, de bovenste helft der groote zitbeens insnijding, het bovenste gedeelte van de achtervlakte der heupkom en van het eironde gat en naar voren het midden van de achtervlakte der schaambeensvereeniging tot grenzen heeft” is onnaauwkeurig.

### XIV.

De temperatuurs bepaling in koortsachtige ziekten is, op zich zelve, in den regel, geen voldoende maatstaf voor de prognose. —

### XV.

Ten onregte zegt *Dr. Werber* in zijn leerboek der bijzondere geneesmiddelleer: het kwik is en blijft steeds het hoofdmiddel tegen den sjanker.

### XVI.

De hypothese van *Dr. Richter* dat bij de, door sijphilitische besmetting veroorzaakte, klierzwellings, de verdere verbreiding der sijphilis door het ligchaam, zóólang tegengegaan wordt, totdat de gezwollen klier geheel of ten deele door verettering verwoest is, is onaannemelijk.

### XVII.

De theorie van *Traube*, volgens welke de temperatuursverhooging in koorts een gevolg zoude zijn van verminderde warmte afgave van het ligchaam, is valsch.

### XVIII.

Mijns inziens moet de indicatie voor de hypodermatische aanwending der chinine, bij tusschenpoozende koortsen, aldus gesteld worden:

- a. in pernicieuse gevallen;
- b. wanneer eene gelijktijdig bestaande aandoening van het darmkanaal het inwendig gebruik der chinine verbiedt;
- c. in hardnekkig recidiverende gevallen waarin het herhaald inwendig gebruik der chinine te vergeefs beproefd is;
- d. wanneer een zuinig gebruik der chinine een volstrekt vereischte is. —