



Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de verloskunde

<https://hdl.handle.net/1874/267305>

10

STELLINGEN

TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD

VAN

Doctor in de Verloskunde,

AAN DE HOOGESCHOOL TE UTRECHT,

OP GEZAG VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS

D^R. J. J. VAN OOSTERZEE,

GEWOON HOOGLERAAR IN DE GODGELEERDHEID,

MET TOESTEMMING VAN DEN ACADEMISCHEN SENAAAT

EN

VOLGENS BESLUIT DER GENEESKUNDIGE FACULTEIT,

TE VERDEDIGEN

Op Vrijdag, den 19ⁿ Juni 1868, des namiddags ten 6¹/₂ ure.

DOOR

ARIE TERNÉ VAN DER HEUL,

Geboren te Zelhem.

Medicinae Doctor.



UTRECHT,

Ter Stoomdrukkerij van

P. W. VAN DE WEIJER.

—
1868.

STUBBINS

Office in the City of New York

J. VAN ORNSTEIN

STUBBINS

ALL THESE ARE NEW



J. VAN ORNSTEIN

STELLINGEN.

I.

Tot het vroegtijdig verwekken der baring, verdient de methode van LEHMANN de voorkeur boven iedere andere.

II.

Het is beter, bij vrees voor haemorrhagie na de baring, secale cornutum toe te dienen, dan de forceps te appliceren of de uitdrijving van het foetus aan de natuur over to laten.

III.

De hand is het beste middel tot repositie der navelstreng.

IV.

Bij syphilis is zwangerschap eene indicatie tot behandeling met mercurialia.

V.

Bij haemorrhagia uteri, na het midden der zwangerschap wachte men zich voor het aanwenden van tampons.

VI.

Het stethoscoop kan ons geene zekerheid geven omtrent den dood van het nog ongebooren kind.

VII.

Decapitatie is te verkiezen boven embryotomie, wanneer bij schouderligging de keering niet meer mogelijk is.

VIII.

De hefboom is geen noodzakelijk instrument.

IX.

Voor inwendige bekkenmeting verdienen de vingers de voorkeur boven de verschillende pelvimeters.

X.

De placenta moet zoo spoedig mogelijk na den partus verwijderd worden.

XI.

Bij prolapsus van de zwangere baarmoeder wende men geen pessaria aan.

XII.

Bij haemorrhagiën na de baring zijn injecties van koud water het beste middel.

XIII.

Men moet steeds trachten, wanneer men gedurende de zwangerschap eene dwarsligging heeft kunnen diagnostiseren, vóór de baring door uitwendige handgrepen keering te doen.

XIV.

Bij eclampsie is het gebruik van chloroform aangewezen.

XV.

Ter genezing van fistula vesico-vaginalis is de bloedige naad de beste methode.

XVI.

Bij menstruatie-stoornissen heeft men meer nut te verwachten van eene plaatselijke dan van eene algemeene behandeling.
