



Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de verloskunde

<https://hdl.handle.net/1874/267311>

16

STELLINGEN

TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN

Doctor in de Verloskunde,

AAN DE HOOGESCHOOL TE UTRECHT,

NA MAGTIGING VAN DEN RECTOR-MAGNIFICUS

DR. J. J. VAN OOSTERZEE,

GEWOON HOOGLEERKAAR IN DE GODGELEERDHEID,

met toestemming van den Academischen Senaat

EN

volgens besluit van de Geneeskundige Faculteit,

TE VERDEDIGEN

OP VRIJDAG, DEN 18den SEPTEMBER 1868, DES NAMIDDAGS TEN 6½ URE,

DOOR

PETRUS PEEL,

geboren te Kuirre.


MEDICINAE DOCTOR.



AMSTERDAM,

C. G. VAN DER POST.

1868.



STELLINGEN.

I.

De vermeerdering van het aantal spiervezelen van den zwangeren uterus, zooals de meeste schrijvers aannemen, is door niemand bewezen.

II.

De schijndood der vrucht moet niet uitsluitend aan suffocatie worden toegeschreven.

III.

Den naam "foetus vivus sed non vitalis" kan men niet geven aan elk levend product dat vóór de zevende maand wordt geboren.

IV.

De raad van v. SIEBOLD om, bij de diagnose van zwangerschap, in geen symptoom volkomen vertrouwen te stellen, behoeft niet behartigd te worden.

V.

Ruptura perinaei behandele men zoo spoedig mogelijk met den bloedigen naad.

VI.

Bij stuipen der barenden is eene schielijke voleinding der verlossing het zekerste hulpmiddel, om het leven van het kind te redden.

VII.

Na de geboorte van het kind nog eenigen tijd te wachten met het onderbinden der navelstreng, is doelloos.

VIII.

Het oprigten van afzonderlijke kraaminrigtingen is hoogst wenschelijk.

IX.

De *Condylomata acuminata*, als zij bij zwangeren voorkomen, moeten niet gecauteriseerd worden.

X.

Het scheef-vernaauwde, zoogenaamde NAEGELE'sche bekken, kan even goed aangeboren zijn als na de geboorte ontstaan.

XI.

De diagnose van bovengenoemde bekkens, die op een uitwendig onderzoek zoude berusten, is onzeker.

XII.

De meest gepaste kuur bij syphilis van zwangeren is de smeerkuur.

XIII.

Bij bloedvloeijingen door placenta praevia is het tamporen van het halskanaal met adstringentia, na verwijdering der placenta, zeer aan te bevelen.

XIV.

De gewoonte om, bij ziekten van het kind, de geneesmiddelen aan de moeder of de min te geven, is af te keuren.
