



Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de verloskunde

<https://hdl.handle.net/1874/267312>

STELLINGEN

TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN

DOCTOR IN DE VERLOSKENDE,

NA MACHTIGING VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS

DR. J. J. VAN OOSTERZEE,

GEWOON HOOGLEERAAR IN DE ~~RECHTGELEERDHEID~~ GODGELEERDHEID,

MET TOESTEMMING VAN DEN ACADEMISCHEN SENAAAT,

EN

VOLGENS BESLUIT DER GENEESKUNDIGE FACULTEIT/

AAN DE HOOGESCHOOL TE UTRECHT TE VERDEDIGEN,

OP DINSDAG DEN 13^{den} OCTOBER 1868, DES NAMIDDAGS TE HALF ZEVEN UUR,

DOOR

FREDERIK KAREL ALEXANDER ROMBACH,

DOCTOR IN DE GENEES- EN HEELKUNDE,

GEBOREN TE HELLEVOETSLUIS.



LEIDEN,

GEBROEDERS VAN DER HOEK.

1868.

MEMORANDUM

MEMORANDUM FOR THE RECORD

DATE: 1900

TO: THE BOARD OF DIRECTORS

FROM: [Name]

SUBJECT: [Topic]

[Faint, illegible text follows, likely the body of the memorandum.]



STELLINGEN.

I.

Men moet wel onderscheiden tusschen neiging van den voorsten bekkenwand en bekkenhelling.

II.

Het is waarschijnlijk dat de uterus zich uit de Mullersche buizen vormt.

III.

Door het stethoskoop kan wel het leven, niet de dood der vrucht geconstateerd worden.

IV.

De weerstand van het perineum draagt wezentlijk bij tot het volbrengen van den spildraai.

V.

Rheumatismus uteri komt niet voor.

VI.

Tegen herhaalden partus immaturus kunnen mercurialia als geneesmiddel aangewezen zijn.

VII.

Door het ondersteunen van het perinacum belette men het plotseling geboren worden van het hoofd en gebruike daartoe beide handen.

VIII.

Bij tweelinggeboorte is het afwachten van weeën ter uitdrijving van de tweede vrucht regel, de kunstmatige verlossing uitzondering.

IX.

Het terugblijven der placenta zonder vloeijing vordert het kunstmatig afhalen daarvan niet onvoorwaardelijk.

X.

De raad van Seanzoni om geen secale cornutum toe te dienen vóórdat het ostium zoover verwijd is dat men den partus des noods kan termineeren, en de werking van dit geneesmiddel niet langer dan $\frac{1}{2}$ uur af te wachten, is zeer te behartigen.

XI.

Zoowel met oog op nabloeding in het 5^{de} tijdperk, als op den voortgang van den partus verdient het gebruik van *secale cornutum* bij weeënzwakke aanbeveling.

XII.

Bij prolapsus funiculi kan gewijzigde ligging bijdragen tot het binnenhouden der teruggebrachte streng, zoo de poging tot duurzame repositie mislukt, termineere men den partus.

XIII.

Op theoretische gronden schijnt mij de raad van Hohl e. a., om bij naar voren gekeerde buikvlakte van het dwarsliggende foetus de keering aan de naar boven gelegen onderste extremiteit te verrichten, volkomen gerechtvaardigd.

XIV.

Aan de kephalotripsie behoort perforatie vooraf te gaan. De kephalotribe van Cohen is een ongeschikt instrument.

XV.

Scanzoni gaat van een onjuist beginsel uit wanneer hij, sprekende over het opwekken van kunstmatigen abortus bij verschillende ziekte-toestanden der moeder, ter verdediging daarvan zegt: Das Verfahren muss endlich auch nur als die Nachahmung des natürlichen Vorganges betrachtet werden.

XVI.

Bloedingen gedurende den partus behandelde men bij voorkeur met plaatselijke middelen.

XVII.

De raad van Scanzoni om na partus met placenta praevia door het aanleggen van een goed aansluitend lijfverband en tampo-nade der scheede nabloedingen te voorkomen verdient behar-tigd te worden.

XVIII.

Er zijn gevallen, waar de ontleding der baarmoeder dienstig wezen kan, ook vóórdat er merkbare weeënwerkzaamheid bestaat.

XIX.

Een bij den partus ingescheurd perineum worde dadelijk na den afloop der baring gehecht.

XX.

Het is wenschelijk dat de stand der vroedvrouwen opgevoerd worde tot die van vroedmeesteressen.

XXI.

De verloskundige hulp aan huis verdient de voorkeur boven die in klinieken.
