



Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de verloskunde

<https://hdl.handle.net/1874/267317>

STELLINGEN

TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN

DOCTOR IN DE VERLOSKUNDE,

NA MACHTIGING VAN

DEN RECTOR MAGNIFICUS

Dr. J. J. VAN OOSTERZEE,

gewoon Hoogleeraar in de Godgeleerdheid,

MET TOESTEMMING VAN DEN ACADEMISCHEN SENAAAT,

EN

VOLGENS BESLUIT VAN DE GENEESKUNDIGE FACULTEIT

AAN

DE HOOGESCHOOL TE UTRECHT,

TE VERDEDIGEN

op Dingsdag den 17^{den} November 1868, des avonds ten 6½ ure,

DOOR

ADRIAAN JOHANNES WILLEM MONNIK,

MED. DOCT.

Geboren te Polsbroek.



UTRECHT,

KEMINK EN ZOON.

1868.

STELLINGEN.



I.

De geschiedenis der verloskunde toont aan, hoe na-deelig het is aan vrouwen de beoefening van een tak van wetenschap over te laten.

II.

De volksvrees voor het verwisselen van linnen der vrouw, tijdens de menstruatie, is ongegrond.

III.

De hypothese van PFLÜGER over het ontstaan der menstruatie is de meest aannemelijke.

IV.

De klieving van den dooier is niet het gevolg van het indringen van spermatozoïden in het ei.

V.

Bij het opwekken van partus praematurus bediene men zich van de methode van COHEN.

VI.

Een instrument voor het breken der eivliezen is overbodig.

VII.

Bij het hypodermatisch aanwenden van acetas morphiï, in gevallen van eclampsie, verdienen vele kleine giften de voorkeur boven weinige groote.

VIII.

Men neme als regel aan, de navelstreng op ééne plaats te onderbinden.

IX.

Keering op de knie is te verkiezen boven die op den voet.

X.

Bij dwarsligging der vrucht beproeve men het allereerst de bimanuale methode van BRAXTON HICKS.

XI.

Te recht verwerpt HEGAR bij keering op het hoofd de methode van WIGAND.

XII.

De dynamische werking van den forceps is eer na-deelig dan voordeelig.

XIII.

Een repositorium voor de navelstreng is meestal overbodig, zoo niet schadelijk.

XIV.

Bij prolapsus funiculi reponeere men deze in de knie-ellenbogen-ligging, en late de zwangere deze positie zoo lang mogelijk behouden; kan dit niet langer, zoo is de ligging op die zijde te verkiezen, in welke de funiculus niet is afgezakt.

XV.

Vooraf bij schuinschen stand van het hoofd moet de extractio foetus met roteerende bewegingen van den forceps plaats hebben.

XVI.

De inplanting der placenta in de nabijheid van het ostium uteri schijnt de naaste oorzaak voor het ontstaan van prolapsus funiculi te zijn.

XVII.

De raad van LOEWENHARDT en anderen, om bij placenta praevia centralis deze in het midden te doorboren, moet nitdrukkelijk worden afgekeurd.

XVIII.

La quantité d'air nécessaire pour qu'un enfant, dans le sein de sa mère, puisse pousser des cris, doit être assez grande, et c'est probablement ce qui rend les faits de ce genre très-rares. DE RANSE.

XIX.

De methode van CREDÉ tot verwijdering der secundinae is de meest aanbevelingswaardige.

XX.

Bij schijndood van kinderen verzuime men niet het uitzuigen van vloeistoffen uit de trachea en bronchi te beproeven.

XXI.

De raad van ABEGG, om aan iedere multipara terstond na den partus secale cornutum toe te dienen, is zeer aan te bevelen.

XXII.

VON SIEBOLD gaat te ver, wanneer hij het gebruik van een sluitlaken onnoodig en zelfs schadelijk noemt voor de kraamvrouw.

XXIII.

Het acidum phenicum verdient bij de behandeling van stinkende lochiën alle aanbeveling.
