



Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de heelkunde

<https://hdl.handle.net/1874/267324>

29

STELLINGEN

TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN

Doctor in de Geneeskunde,

AAN DE HOOGESCHOOL TE UTRECHT,

NA MAGTIGING VAN DEN RECTOR-MAGNIFICUS

Dr. J. J. VAN OOSTERZEE,

GEWOON HOOGLEERAAR IN DE GODGELEERDHEID,

met toestemming van den Academischen Senaat

EN

volgens besluit van de Geneeskundige Faculteit,

TE VERDEDIGEN

OP WOENSDAG 3 MAART 1869, DES AVONDS TEN 7 $\frac{1}{2}$ URE,

DOOR

HERMAN JACOB JACOBSON,

Geboren te Amsterdam.

MEDICINAE DOCTOR.



AMSTERDAM,
J. C. A. SULPKE.

1869.

STELLINGEN.

I.

Bij boennecrose moeten de vrijliggende sequesters, wanneer zij tot sterke ettervorming aanleiding geven, ook dan verwijderd worden, wanneer de beenlade nog onvolkomen gevormd is.

II.

Bij verwonding der arteriën van de handpalm verdient de onderbinding der art. brachialis de voorkeur boven de weder onlangs door ROSEK aanbevolen onderbinding der verwonde vaateinden.

III.

De onderbinding der art. iliaca externa bij elephantiasis van de onderste extremiteiten is niet te regtvaardigen.

IV.

Wanneer bij ziekteprocessen in beenderen de daarvan afhankelijke veranderingen in de weeke deelen ver verbreid zijn, dan behoeft men niet altijd de amputatie in gezonde gedeelten dezer laatsten te verrigten.

V.

Ten onregte vergelijkt BILLROTH de verwonding na resectie bij pseudarthrosen met eene gecompliceerde fractuur.

VI.

De verdeeling der wonden naar den toestand der wondvlakten (SIMON) heeft voor de praktijk meer waarde dan die naar de aetiologische momenten.

VII.

Wanneer nevens blaassteen hypertrophic der prostata voorhanden is, zoo is dit geene contraindicatie voor het verrigten der sectio lateralis.

VIII.

Bij het maken van lappsneden bij amputatiën mag men niet als algemeenen regel aannemen, dat die lappen het laatst moeten gevormd worden, waarin de groote vaten gelegen zijn.

IX.

Bij gezwellen aan de tong van onzekeren oorsprong, beproeve men, voordat eene operatieve behandeling wordt ingesteld, eene antisyphilitische behandeling.

X.

De inspuiting van chloroform na de punctie van hydrocele moet verworpen worden.

XI.

Voor de hygromata is de permanente compressie de meest zekere therapie.

XII.

De doorsnijding der nervi ciliares, volgens de methode van MELJER, bij neurosis sympathica na verwonding in de regio ciliaris, verdient nader beproefd te worden.

XIII.

Wanneer bij chronische ulcera aan het onderbeen granulatievorming is ingetreden, zijn herhaalde ligte contractiën der daartoe behoorende spieren van veel nut.

XIV.

De plotseling optredende aanvallen van pijn bij het bestaan van gewrichtsmuizen moeten niet afgeleid worden van het geraken daarvan tusschen de gewrichtsvlakten.

XV.

Vooral bij de operatie van dubbelde hazenlip is de geknoopte hechting te verkiezen boven de omwonden hechting.

XVI.

Ten onregte verwerpt STROMEIJER de punctie van het gewricht bij pyarthros.

XVII.

De verwijdering van vloeistoffen uit de pleuraholten volgens GUÉRIN verdient afkeuring.





