



# **Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de Verloskunde**

<https://hdl.handle.net/1874/274710>

17

# STELLINGEN

TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD

VAN

## Doctor in de Verloskunde,

NA MAGTIGING VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS

### D<sup>r</sup>. W. KOSTER,

GEWOON HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER GENEESKUNDE,

MET TOESTEMMING VAN DEN ACADEMISCHEN SENAAAT

EN

VOLGENS BESLUIT DER GENEESKUNDIGE FACULTEIT,

AAN DE HOOGESCHOOL TE UTRECHT,

TE VERDEDIGEN

OP DINGSDAG DEN 17den MAART 1868, DES NAMIDDAGS TEN HALF ZEVEN URE,

DOOR

### FLORIS EGBERTUS VOS,

*Med. Doct.*

GEBOREN TE BREUKELEN.



UTRECHT,

Boek-, Plaat- en Steendrukkerij, „de Industrie“.

(K. A. MANSSEN.)

1868.



## STELLINGEN.

---

### I.

Niet digtdrukking der aorta, maar wrijvende drukking op deze, verdient aanbeveling bij Haemorrhagia post partum.

### II.

Houden de dolores op of verzwakken zij voortdurend bij drukking van het voorliggend deel tegen het promontorium dan mag men geene hulp meer van den uterus verwachten.

### III.

De hellingshoek van het bekken heeft geene waarde; beter is het ter bepaling van de helling van het bekken den hoek te nemen, dien de conjugata interna maakt met de lendenwervelkolom.

### IV.

Ter verklaring van het menigvuldiger voorkomen eener eerste schedelliging boven eene tweede is de uitspraak van Dr. SCHATZ: „die ziemlich gleiche Häufigkeit der rechten und der linken Seitenlage der Frau, die relative Seltenheit der Rückenlage und die grosse Häufigkeit der aufrechten Stellung des Leibes derselben beim Stehen und Sitzen, welche die Häufigkeit jeder Seitenlage um das Dreifache übertrifft.“ zeer aannemelijk.

### V.

De baarmoeder vergroot zich regelmatig naar de toename harer inhoud; wordt deze regelmaat gestoord, dan vangt de partus aan.

### VI.

Het doelnemen van het liquor amnii aan de ontwikkeling der vrucht, kunnen wij niet ontkennen.

### VII.

De uitdrijving eener decidua menstrualis, is een abortus van het tot decidua veranderde uteruslijmvlies.



## VIII.

Bij febris puerperalis moet men altijd het uitgangspunt in de genitaliën zoeken.

## IX.

Bij prolapsus funiculi voere men den funiculus op en tamponere men het ostium internum der opening met watten.

## X.

Te regt verklaart WINCKEL zich tegen directe bloedonttrekkingen aan den puerperalen uterus.

## XI.

De uitdrijving der vrucht door uitwendige handgrepen is eene methode eerder afkeuring dan aanbeveling waardig.

## XII.

Tot keering bij dwarsligging is het vatten van den laagsten voet bij eene eerste, van den hoogsten bij eene tweede positie, aangewezen.

## XIII.

Het gebruik der zuigflesch met slinger, bij kunstmatige voeding, is zeer af te keuren.

## XIV.

De oorzaak van Hydatiden-mola moet eerder bij de moeder dan bij de vrucht gezocht worden.

## XV.

Bij keering op de onderste extremiteiten handelt men het veiligst door tot den navel te gaan en van hier uit onmiddelijk het af te halen deel te zoeken.

## XVI.

Het gebruik van secale cornutum als ebolicum is af te keuren.

## XVII.

Het nec gravidæ abortum procuraturum, moest uit den eed, dien de medicus bij zijne promotie aflegt, gelaten worden.

## XVIII.

Het chloroformiseren, na de barende in Morphine slaap gebracht te hebben, (door hypodermatische injectie) komt mij zeer wenschelijk voor.