




Catalogus van boetseersels in was

<https://hdl.handle.net/1874/283420>

Catalogus
per
Mas-præparaten



Enige aanvijzingen.

L. M. = Zoologisch Museum.

S. = Verzameling Sierman

Bl. = Verzameling Bleuland.

* = heeft niets te betekenen.

Schubärtl = Vervaardigd door S. Prosector

van 1840 - 1860?

n.d.y.p. = Vervaardigd door n.d. Wulff, Prosec-

tor van 1860 - 1885

A 2549074

Wagon Springs

Wagon Springs, Colorado

Wagon Springs, Colorado

Wagon Springs, Colorado

Wagon Springs, Colorado

Wagon Springs, Colorado

Wagon Springs, Colorado

Wagon Springs, Colorado

Wagon Springs, Colorado

Wagon Springs, Colorado

Wagon Springs, Colorado

Wagon Springs, Colorado

Wagon Springs, Colorado

Wagon Springs, Colorado


Wagon Springs, Colorado

Wagon Springs, Colorado

Wagon Springs, Colorado

C. W. p. N. S. memb.

↓




10
23
41
42

Catalogus
van
Boetsmasels in Was.

Van het menschelijke Lichaam.

- N^o 1. Een Colosfale schedel, waarvan de deksel kan worden afgenomen, om de bloedboezems en den uitgang van eenige zenuwen te zien.
- " 2. Een dito Colosfual hoofd, met alle de spieren, slagaderen, aderen en zenuwen. De kringspier van het oog aan de eene zijde kan weggenomen worden, om de ligging en de spieren van het oog te zien.
- " 3. Een gedeelte van het aangezicht, om de uitswendige samenstellende deelen van het oog te toonen.
- " 4. De rondgaande en opsligende spier van het bovenste ooglid en de oogleden aan de binnenste oppervlakte te zien.
- " 5. Het rechter zijdelijke gedeelte van het aangezicht; de oogholte geopend, de spieren en zenuwen van het oog, als mede de traanklier duidelijk voorgesteld.
- " 6. Een oogbal met de spieren en bloedvaten zeer duidelijk voorgesteld.
- " 7. Een dito met de spieren, slagaderen en alle de zenuwen duidelijk zichtbaar.
- " 8. Een hoofd van een krankzinnig man, met een gedeelte van den hals, waar ter linkerzijde de spieren en slagaderen zijn gerepareerd.
- " 9. Het hoofd van een man van middelbaren leeftijd op het achterhoofd geplaatst, waaraan ter linkerzijde de spieren van het aangezicht, en een gedeelte van den hals zijn zichtbaar gemaakt; terens ziet men hier den fraaien loop der slagaderen, als ook de gebaats-zenuw, deszelfs verbindingstakken met het vijfde paar zenuwen.
- " 10. Een dito als N^o 8, maar meer op de zijde geplaatst, om de achterhoofdspier met zijne peesachtige uitspreiding over het hoofd te doen zien.
- " 11. Een hoofd en eene hals van een mensch, waaraan ter linkerzijde de spieren met de slagaderen en eenige zenuwen duidelijk worden voorgesteld.



- N^o 12. Een hoofd met een gedeelte van den hals van een volwasfchen mensch, waaraan ter rechterzijde de verdeeling der krooslagader, arteria carotis, en deszelfs loop over het geheele uütwendige gedeelte des hoofds te zien is. Nadat men hier een gedeelte van het aangezicht wegneemt, ziet men alle de takken, die uit de uütwendige krooslagader ontspruiten, en hoe elk derzelven zijnen loop vervolgt. -
- " 13. Een half hoofd, waaraan zeer duidelyk wordt voorgesteld de loop der inwendige krooslagader, de boogwize gang in het steenachtig gedeelte van het slaapbeen, deszelfs binnen-treding in het hoofd; als mede de werzelagader, die boog, die dezelve maakt onder het achterhoofds-been, om het groote achterhoofds-gat te bereiken. -
- " 14. Een vlooggeraagd hoofd met een gedeelte van den hals, waarin men zeer duidelyk opmerkt de hersenhollen, de holte van den mond, de communicatie van den neus in de keel, de overgang van de keel in den slokdarm, het donorgespedene strottenhoofd en de luchtspijp, enz. -
- " 15. Het hoofd van een meisje van 15 jaren, waarin men onderscheidene gedeelten der hersenen vindt voorgesteld. -
- " 16. Een dito hoofd op dezelfde wijze zamengesteld met eene eenigzints andere plaatsing der deelen. -
- " 17. Een hoofd van eenen man van middelbare jaren zoodanig zamengesteld, dat men het harde hersenvlies, Dura mater, aan de bovenste opsvlakte kan oplichten, om de groote hersenen in hare natuurlijke ligging te zien. -
- " 18. Het hoofd van eenen hoog bejaarden man, waar men den schedel kan afnemen, om onderscheidene gedeelten der hersenen te zien. -
- " 19. Het hoofd van eenen man van 60 jaren, aan de linkerzijde van zijne jeugel of blind. Nadat men de groote kwabben der hersenen oplicht, ziet men de gezichts-zenuw van de rechterzijde zeer gevond, die van de linker vermagard en ingetrokken; Daarenboven het gezichts-zenuwbed van de rechterzijde verkleind, dat van de linker van de gewoone grootte, zoodat men hier een klaar voorbeeld vindt voor den kruiswizen oorsprong der zenuwen. -
- " 20. De grondvlakte der hersenen, waaraan de 11 paaren hersenzenuwen duidelyk kunnen bechoond worden met de grondlagader, Arteria Basilaris, opgespoien op het verlengde merg met deszelfs communicatie-takken met de inwendige krooslagader. -

- N^o 21. - Een half doorgesneden hersenkolom, om de onderscheidene kwabben des hersenen te toonen met het verlengde merg. -
- " 22. - Het bovenste gedeelte van de borst, den hals en het hoofd zoodanig bereid, dat men het hoofd geopend, de hersenen in hare ligging, de linker oogkuil geopend, het oog met de spieren, de blaasvlies en de zenuwen, die na hetzelve gaan, ziet; als mede de mondholte geopend, de spieren, bloedvaten en zenuwen van de long geprepareerd; - ook ziet men de dwalende zenuw met de groote medelijdende uit den grond van het bekken uitkomen; - voorts het strottenhoofd, de lichte pijp, de boog van de groote slagader met de uitkomst der vaten, die langs den hals naar het hoofd opstijgen, de zeer naauwkeurige verdeling van de uitwendige klopslagader in 8 takken; - aan de rechterzijde van het hoofd en den hals ziet men den loop der adellijke vaten, de zamenstelling van de bovenste holle ader, eenige spieren van den hals en het bovenste gedeelte der longen, enz. -
- " 23. - Een clito op dezelfde wijze bereid. -
- " 24. - Stelt voor den rug van eenen man met het achterhoofd en de kleine gedeelten der ledematen, om de vasthechting van de eerste en tweede laag ruggspieren duidelijk voor te stellen. - Dit het middel kan een langwerpige gedeelte weggenomen worden, om het ruggenmerg met de achterhuiden te zien. -
- " 25. - De romp van eenen zeer mageren man, waar men aan de voorzijde de spieren van den hals, de borst en den buik opmerkt. Het deksel van beide deze hollen kan worden weggenomen, om den loop en de verbinding van de groote medelijdende en de dwalende zenuw met meest alle de zenuwen van den romp, die uit het ruggenmerg voortkomen, te toonen. -
- " 26. - Eene jonge magere vrouw, waaraan de zenuwen als in N^o 25 worden voorgesteld. -
- " 27. - Is een gedeelte van het bekken met het bovenste van de dije, zoodanig bereid, dat men den juiststen loop van de Arteria Epigastrica duidelijk kan beschouwen. -
- " 28. - Een arm met meest alle de spieren geprepareerd. -
- " 29. - Een clito met spieren, slagadereen, aderen en zenuwen zeer naauwkeurig voorgesteld. -
- 368 " 30. - Het been van eenen sterk gespierden man met alle de spieren, bloedvaten en zenuwen geprepareerd, aan de voorzijde te zien. -
- 366 " 31. - Een clito been met de spieren, bloedvaten en zenuwen aan de achterzijde. -
- " 32. - Eene jonge vrouw, waarin de ingewanden van borst en buik worden voorgesteld, welke stukjes gewijze kunnen uitgenomen worden, om de grondvaktenslevens met de deelen, die aldaar gevonden worden, te zien. -

- N^o 33. - Een pasgeboren kind, op den buik liggende, waarvan men laagsgewijze de huid en spieren afnemen, om de ligging der ingewanden aan de achterzijde te beschouwen.
- " 34. - Een selts kind met de vaten in de navelstreng opgespoten. Nadat men de buitwendige deelen van borst en buik heeft weggenomen, ziet men in den buik den loop der navelvaten, de ligging der ingewanden, als mede het hart en de longen in de borst. - Ook kan men de ingewanden van den buik wegnemen, om het vervolg der navelader in de buis van Aranciis aantetoonen.
- " 35. - Het hart met alle deszelfs voornamste bloedvaten opgespoten.
- " 36. - De maag van een volwaschen mensch met de slagaderlijke en aderlijke bloedvaten.
- " 37. - De lever, milt en het dunne darmkanaal van een volwaschen mensch zoo danig zamengesteld, dat men de poortader met eenige voornamste slagadren zeer duidelyk kan beschouwen.
- " 38. - Het geheele dikke darmkanaal van een volwaschen mensch.
- " 39. - De lever aan de holle zijde voorgesteld met de galblaas en een gedeelte van den twaalfvingerigen darm, benevens de galbuisen tegennatuurlijk uitgeret door een aantal wormen, die dezelve vervullen.
- " 40. - Eene dergelyke lever, waarin de galbuisen geopend zijn, om de wormen, in dezelve aanwezig, duidelyk te kunnen beschouwen.
 De naauwkeurige omschrijving van dit gebruik vindt men in Deel van het koninklyk Instituut der eerste klasse in 1827 uitgegeven.
- " 41. - Een man ongeveer vachten lang, uitgestrekt liggende, met alle de spieren van de eerste en tweede laag aan den hals, de borst en den buik, als mede de rechterarm en het rechterbeen. Men ziet overal bloedvaten, die deze spieren verzorgen. Ook kunnen na wegneming der deksels de ingewanden van de borst en den buik in hunne natuurlijke ligging beschouwd worden.
- " 42. - Eene jonge vrouw, op dezelfde wijze voorgesteld als N^o 41. met des spieren, bloedvaten en ingewanden, zoodat men, na de beschouwing der ingewanden in hunne ligging, dezelve kan wegnemen, om den omloop des bloeds aantetoonen.
- " 43. - Het zijdelijk gedeelte van het hoofd met alle deszelfs spieren.
- 364 " 44. - Een gedeelte van den hals en de borst, met de spieren geprepareerd, die in de eerste laag voorkomen.
- 361 " 45. - Een gedeelte van de borst met de spieren van de tweede laag.
- 362 " 46. - Het heupgedeelte van eene vrouw met de groote bilspier.
- 360 " 47. - Een dito heupgedeelte met de middelste bilspier.
- 350 " 48. - Een dergelyk heupgedeelte met de kleine bilspier.
- 362 " 49. - Een been met alle deszelfs spieren, eenige bloedvaten en te-
 -ruwen aan de voorzijde te zien.

- N^o 50. Een dergelyk been met alle dezelve spieren aan de achterzijde geppareerd.
51. Het hoofd van eene vrouw, waarin men een gedeelte van de hersenen in hare natuurlijke ligging kan beschouwen.
52. De beeltenis van eenen Laplandischen man, 37 etuiemen lang, 46 jaren oud.
53. Een zeer vergroot menschelijk oor in Gips.
54. De gehoorbeenderen in Was op dezelfde wijze als het oor vergroot.
55. Een arm, met meest alle de spieren, eenige aderen en zenuwen voorgesteld.
56. Een gedeelte van de boven en onderkaak met de binnenste en buitenste vleugelspieren.

Latre vermaardigde in tot de verzameling toegezogde boetsensels in Was, van het menschelijke ligchaam.

N^o 57. De geheele Hersenen-kolom van een volwasen mensch, waar aan de oorspronkelijke de oorsprong der Zenuwen en verdere bijzonderheden zijn op te merken.

58. De hersenen van een mensch geheel ontwikkeld, om den loop der nergzelen in de holligheden te zien volgens de manier van Laurensset.

59. Een Dito-kolom hersenen, waar de nergzelen op eene andere wijze worden voorgesteld volgens de manier van Doct. Gall.

60. Eene vrouwelijke onderarm zodanig voorgesteld, dat alle de spieren en de zenuwen tot aan de uiteinden der vingeren aan de binnenzijde duidelĳk te zien zijn.

61. Eene vrouwelijke onderarm (van hetzelfde voorwerp op dezelfde wijze bereid) om de spieren aan de buitenzijde te beschouwen.

62. Eene onderarm van eene vrouw, 40 jaren oud, met eene belangrijke Species van Fungus Haemathodes, bij het leven weggenomen.

63. Het linkerbeen van een kind, oud 9 jaren door Gonarthrocacia aangetast bij het leven weggenomen en volkomen genezen. Het oorspronkelijke been is bij het geboortseeris geplaatst.

N^o 64. De Ring-vinger van een meisje, veld 14 jaren,
met eene spinna ventosa, by het Leven wegge-
men en genezen. De vorspronkelyke vinger is by
het getoetsteerde geplaatst, even als in het voorgaande
Stimmo.

N^o 65. De hand van eenen man by den dood wegge-
nomen, die door een gewerfshot de ring-vinger
en een gedeelte van de middenste vinger had
verloren en volkomen was genezen. De vorspronke-
lyke hand ligt hiernesens om de verandering
in de beenderen van naby te beschouwen.

N^o 66. De Nieren met de pisleiders, de blaas, de
penes met de groote bloedvaten van eenen man
37 jaren oud. De linkernier is zeer ontlaad.
In de blaas ziet men een vlesachtig uitwas,
zoo groot als de blaas bevatten kan. Deze lijder
heeft gedurende het laatste jaar zijns levens
vele smarten by de urine-lozing uitgestaan.

N^o 67. De elje met de knie van eenen jongeling
met een aanmerkelyk zet-gezwell naar het
Leven verswaardigd.

N^o 68. Eene Biste in Was, naar het Leven verswaardigd,
van eenen man, 44 jaren oud, met een allerbelang-
rykst gezwell aan de zegterwang en kaak.

N^o 69. Een half Hoofd met de zenuwen van het
ryfde, Lebde en Levende paar alternaatweyzigst
geprepareerd. -

N^o 70. De elje van een mensche met de knie met een
aanmerkelyk gezwell aan de elje.

N^o 71. Eene voet met Actrocacia.


N^o 72. Eene Lezer met Hydaticles van de bovenzijde
te zien.

N^o 73. Eene elito met dito van de onderzijde te
zien. -

7
Van de Viervoetige Dieren.


- N^o 1. Een paarden-kop met een gedeelte van de hals, waaraan de spieren, de bloedvaten, de zenuwen en de speekselklieren met de ontlastbuis zeer duidelijk te zien zijn.
- " 2. De kop van eenen bok met een groot gedeelte van de hals, waaraan de spieren en bloedvaten gevonden worden.
- " 3. Een dito-kop, de hoornen van hetzelfde afgenomen, om het werktuig van de zeuk, de uitgebreidheid der voorhoofdsboesems tot in de hoornen, en, na wegneming van dat gedeelte, de hersenen in hare ligging te beschouwen.
- " 4. Een jonge bok voor de ligging der ingewanden bereid zoowel van de borst als buik.
- " 5. Een dito met de vier magen duidelijk te beschouwen.
- " 6. Het hart met de longen van een bok.
- " 7. De baarmoeder van een schaap met twee vruchten.
- " 8. De baarmoeder van een koe met ééne vrucht.
- " 9. Een geheel kalf voor de ligging der ingewanden van de borst en buik daargesteld.
- " 10. Een jong konijn zoodanig bereid, dat men de ingewanden van de borst en buik in hunne natuurlijke ligging kan beschouwen.
- " 11. Eene kat met de buik en de borstholte geopend, waarin de bezwangerde baarmoeder gedeeltelijk geopend en gedeeltelijk gesloten voor het oog zichtbaar is.
- " 12. Afzonderlijke gedeelten van de bezwangerde lijfmoeder der kat met de jongen.
- " 13. Een groote huisrot met de borst en buikholte geopend om de ingewanden te zien. De genitalia masculina zijn te beschouwen in hunne ligging en afzonderlijk uit het dier genomen en bij hetzelfde geplaatst.

- 8
- N^o 14. Een Hazenkop met de spieren.
" 15. Een Egelantier met de huid's en andere spieren.
" 16. Een doorgezaagde Bokken-hoorn.
" 17. Twee Bokken-hoorns.




Van de Vogelen.

- X
 1. Een kalkoen zoo klaarig bereid, dat men alle de ingewanden der spijsvertering hierin zeer duidelijc vindt voorgesteld.
2. Eene haan bysonder voor de geslachtsdeelen geprepareerd.
3. Een dito met de ingewanden van borst en buik geprepareerd.
4. Een dito.
5. Een poot van dito met de spieren.
6. Eene Hen met de onderscheidene ingewanden geprepareerd, vooral ook de eijerstok met deszelfs gang, de Cloaca, enz.
7. Eene Hen, waarin de eijerstok is zichtbaar gemaakt met den gang in eenen bevruchten staat.
8. De romp van eene hen met den eijergang geopend om het volgroeide ei te zien.
9. 24 stuks eijeren van eene hen in den bebroeid wordende staat, waaraan men de ontwikkeling van de vrucht van den eersten aanvang af tot hare volkomeene rijpheid zien kan.
10. 10 stuks hoender eijeren in den bevruchten staat, waarin men de ontwikkeling van het kintje zeer duidelijc kan opmerken.
11. 23 stuks eijeren van de kalkoen in den bevruchten staat als voren.
12. 30 stuks vander eijeren als voren.
13. Een Lindvogel van het mannelijk geslacht met de ingewanden voor de adembaling, bloedsomloop, spijsvertering en de deelen tot voortplanting van het geslacht bereid.
14. Een dito.
15. Een Lindvogel van het vrouwelijke geslacht op dezelfde wijze bereid als de vorige.
16. Een Lindvogels poot met de spieren.
17. Twee Lindvogelskoppes met de spieren.
18. Een Speurvet met de ingewanden in de natuurlijke ligging.
19. Een Klauwvier op dezelfde wijze bereid als de vorige.
20. Een Nat. schollesaar, op dezelfde wijze bereid.




Van de Amphibiën.

- G N^o 1. - Eene Phoca met spieren en ingewanden.
2. - Een Schildpad in zyne geheel uiterlyke gedaante voorgesteld.
3. - De onderste schelp van dit dier afgezagt. Aan hetzelfde zijn zichtbaar spieren, hart, longen, lever, maag enz.
4. - Dit dier op dezelfde wijze geprepareerd. Aan hetzelfde is nog zichtbaar de lucht pijp met derselver takverdeling in de longen en het geheele darmkanaal.
5. - Eene Indische Slang van de rugzijde te zien.
6. - Eene dito van de buikzijde.
7. - Eene dito geopend met alle de ingewanden en eijer. stekken.




Van de Vifchen.


- N^o 1. Een Kabeljaauw, Gadus, met de ingewanden van de spijs vertaering, bloedsomloop en ademhaling in natuurlijke ligging.
- " 2. Een zeer groote Snoek, Esoc, op dezelfde wijze bereid.
- " 3. De maag en darmkanaal van denzelfden.
- " 4. De maag geopend van denzelfden.
- " 5. De opengespaarde kops van denzelfden om de tanden of haken in den bek te zien, alsmede het hart met de kieuwen.
- " 6. Het bovenste gedeelte van den kops van eenen snoek met de hersenen in hare ligging en het werktuig van het gehoor geprepareerd.
- " 7. Een zeer groote Stein, Aegipenser Sturio, met alle de ingewanden, welke uitgenomen kunnen worden, bereid.
- " 8. Eene wijffer rog, Raja, in zijn geheel daar gesteld om het dier aan zijne rugzijde te beschouwen.
- " 9. Een rog van het mannelijke geslacht met de voortplantingswerktuigen in hante ligging geprepareerd.
- " 10. Eene rog van het vrouwelijke geslacht met alle de ingewanden van den buik in denzelfden ligging.
- " 11. De slokdarm, de maag, het darmkanaal en de lever van eene rog.
- " 12. De Eijerstokken met de buizen, de uitkomst van dezelve in de Cloaca met de inplanting van het Intestinum rectum in dezelve van eene rog.
- " 13. Eene rog met de eijerstokken en de buizen in hare natuurlijke ligging, waarin men het Ei in de opening van de anus ziet.
- " 14. Gedeelten van eene rog met de Cloaca geopend, waarin een volgroeid ei zichtbaar is.
- " 15. De Eijerstok met de buizen uit eene rog met de Cloaca geopend.
- " 16. Eene geheele rog, waarin men de Eijerstokken, de buizen en de Cloaca geopend vindt, om de eijeren van onderscheidene grootte in dezelve te zien. - Bovendien ziet men aan het regter zijdelijke gedeelte de slijmbuizen, die in de huid gelegen zijn, zeer duidelijk zichtbaar gemaakt.
- " 17. Een gedeelte van eene rog met de eijerstokken en dezelve gangen in een' onvruchtbaren staat.
- " 18. 3 Eijeren van de rog, waarvan er één is geopend, om den dojer te kunnen zien.



- N^o 19. - Een wijfjes rog, waarin men naar opening der buiksholte de ingewanden in dierzelfer ligging ziet; als mede het hart met deszelfs boezem, het ontspingen der Arteria pulmonalis met dierzelfer verdeeling naar de kieuwen. -
- " 20. - Een bevrucht Ei van de rog met deszelfs slieren. -
- " 21. - Eene rog waarin men naal de ingewanden van den buik en borst te hebben weggenomen, de slagaderlijke vaten uit het achterste gedeelte der kieuwen ontspruiten ziet en de arteria aorta zamenstellen. - Voorts aanschuift men de hofte des hoofds aan de onderzijde geopend, de harsenen met de uitkomst van vele zenuwen zeer duidelijkt zichtbaar gemaakt. -
- " 22. - Een gedeelte van de rog op dierzelfde wijze geprepareerd als de voorgaande. -
- " 23. - Eene kleine tarbot, Pleuronectes Maximus, met de ingewanden. -
- " 24. - Eene griet met dito. -
- " 25. - Eene schol met dito op den rug liggende. -
- " 26. - Eene dito met dito op den buik liggende. -
- " 27. - Eene Bot, Pleuronectes Flesius op dierzelfde wijze en tot hetzelfde doel bereid. -
- " 28. - Twee dito. -
- " 29. - Drie Jongen op onderscheidene wijze voor de ingewanden geprepareerd. -
- x " 30. - Eene zeer groote Karper, Cyprinus, waan de ingewanden laagsgewijze kunnen uitgenomen worden. -
- " 31. - Eene jonge Karper. -
- " 32. - Een Meerval, Silurus Glanis; waar dat men de bekleedselen van den buik kan wegnemen, om de ingewanden in dierzelfer ligging te zien. -
- " 33. - De Stokdarm, de maag en het darmkanaal; de lever de galblaas, de luchtblaas van hetzelfde dier. -
- G x " 34. - Eene groote Paling, Muraena Inguilla, met de ingewanden bereid. -
- " 35. - Een Palingkop met een gedeelte van den hals om het hart met de kieuwen te zien. -
- " 36. - De stokdarm, de maag en het darmkanaal van hetzelfde dier. -
- G " 37. - De Sal, Muraena, zodanig bereid, dat men de ingewanden van den omloop des bloeds en de spijsverteringswerktuigen duidelijkt ziet voorgesteld. -
- " 38. - Het hart met de kieuwen, de stokdarm, de maag, het darmkanaal en de verdere ingewanden der buiksholte van hetzelfde dier. -
- + " 39. - De Meeraal. -
- " 40. - Eene Jong met den kop als van eene schol. -



- N^o 41. De Heelbot, *Pleuronectes Hippoglossus*, de buik geopend, het hart met de lieven en buiksingewanden zeer duidelijk voorgesteld.
- " 42. De maag en andere ingewanden der buikholte van dezelfde visch met de galwegen geprepareerd.
- " 43. De opengesnedene maag en het darmkanaal van hetzelfde dier, waarin men aanmerkelijke grote plooyen opmerkt.
- " 44. Eene Bot, *Pleuronectes Flesus*, met deszelfs ingewanden van buik en borst aan de rugzijde voorgesteld.
- " 45. Eene dito op dezelfde wijze aan de buikzijde voorgesteld.
- " 46. Eene Bot wit en zwart gespikkeld op den rug.
- " 47. Eene dito geheel wit aan de rugzijde.
- " 48. Eene dito geheel donker van kleur aan den buik of de witte zijde.
- " 49. Eene dito zonder staart.
- " 50. Eene Zeelt, *Cyprinus Tinca*, met de ingewanden in hunne ligging en de ingewanden uit derselver er by geplaatst.
- " 51. Een Stenkarper, *Cyprinus Carasius*, op dezelfde wijze geprepareerd.
- " 52. Een Zalm, *Salmo Salar*, met de ingewanden.
- " 53. Een Zalmkop geopend.
- " 54. Een Baars, *Perca Fluviatilis*, met de ingewanden.
- " 55. Een Leehaan, *Trigla*, waar de ingewanden laaggewijze kunnen uitgenomen worden.
- " 56. Een dito.
- " 57. Een dito.
- " 58. Een zeer jonge dito.
- " 59. Een Bradem, *Cyprinus Brama*, met de ingewanden.
- " 60. De Brünvisch, *Delphinus Phocaena*, 5 voeten 4 duim lang, op zijde gelegd, om het dier in zijn niterlijke te beschouwen.
- " 61. Hetzelfde dier op den rug geplaatst, de buik en borstholte geopend, om de ingewanden in hunne ligging aantetoonen. De darmen kunnen weggenomen worden om de werktuigen der afscheiding van de urine te zien.
- " 62. Het hart met de longen, de lever en de groote bloedvaten der Brünvisch zeer duidelijk voorgesteld, te gelijk met het strottenheest, het tongbeen enz.
- " 63. De slokdarm, de maag en het bovenste gedeelte van het darmkanaal, als mede de alvleeschkliew van hetzelfde dier.
- " 64. De tong met den slokdarm, het strottenheest met deszelfs opening, de verdeeling der luchtpijp en de longen van hetzelfde dier.



N^o 65. De mannelijke geslachtsdeelen van hetzelfde
dier. -

" 66. Het hoofd met het bovenste gedeelte van den
romp van hetzelfde dier, waarin

- 1^o het spuw. gat, en
- 2^o de grote en kleine hersenen met het zug-
-genierg in hare natuurlijke ligging
geprepareerd zijn. -

