



Heelkundige stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de heelkunde

<https://hdl.handle.net/1874/286387>

10

HEELKUNDIGE STELLINGEN

TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD

VAN

Doctor in de Heelkunde,

AAN DE HOOGESCHOOL TE UTRECHT,

NA MAGTIGING VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS,

Dr. H. C. MILLIES,

GEWOON HOOGLEERAAR IN DE WIJSEGEERTE EN LETTLEN,

MET TOESTEMMING VAN DEN ACADEMISCHEN SENAAAT

EN

VOLGENS BESLUIT VAN DE GENEESKUNDIGE FACULTEIT,

TE VERDEDIGEN

op Vrijdag den 29^{en} Junij 1866, des namiddags ten 7½ ure,

DOOR

PIETER ADRIAAN VAN DER LAAN,

GEBOREN TE SPANROEK,


MEDICINAE ET ARTIS OBSTETRICIAE DOCTOR.



UTRECHT,

J. VAN BOEKHOVEN.

1866.



STELLINGEN.

I.

De onderbinding der Art. axillaris in de okselholte is steeds te verkiezen boven die onder of boven het sleutelbeen.

II.

De raad van Trousseau om bij croup niet lang met tracheotomie te wachten, verdient navolging.

III.

Ter genezing eener breuk van het olecranon is de gestrekte stand van den arm ondoelmatig.

IV.

„Die geradlinige Extension bei Luxation des ersten Phalanx des Daumens ist ganz zu verwerfen.“

Busch.

V.

Voor paracentesis abdominis is het onnoodig en soms gevaarlijk vaste punten aan te geven.

VI.

Het is onnoodig bij resectio capitis humeri het lange hoofd van den musculus biceps te bewaren.

VII.

Bij bekkenfracturen werken alle bekkenverbanden of gordels schadelijk.

VIII.

Ten onregte zegt Ignaz Meijer: „Wenn bei Iritis eine bedeutende Eiteransammlung in der vorderen Kammer besteht, soll die Eiter durch die Paracentese der Cornea entleert werden.“

IX.

Bij protusio bulbi afhankelijk van extra-oculairen tumor trachte men altijd alvorens over te gaan tot geheele exstirpatie met in begrip van het oog, het gezwel afzonderlijk te enuclëeren.

X.

Voor de lithotomie bij vrouwen verdient de vestibulair-snede nooit in aanmerking te komen.

XI.

Geen chronische beenzweer geeft regt tot amputatie.

XII.

Bij amputatie aan den voet moet de bijzonderheid van ieder geval de te volgen methode aanwijzen.

XIII.

Bij inwendige beklemming en obstructie van den darm late men steeds de laparotomie aan de enterotomie voorafgaan.

XIV.

Perinaeorraphie verdient bij prolapsus uteri de voorkeur boven de aanwending van pessaria.

XV.

Beenverkromming zoeke men door subcutane osteotomie te herstellen.

XVI.

„In allen Fällen, in welchen nicht die äussere Beschaffenheit sofort einen brandigen Bruch erkennen lässt, muss man immer erst versuchen, ob man nicht mit dem äusseren Bruchschnitt ausreicht.“

Busch.

XVII.

Bei fast allen acuten wie chronischen Gelenkentzündungen sind absolute Ruhe des Gliedes und locale Wärmeentziehung die wichtigsten Mittel.

Esmarch.