



# Quaestiones argumenti obstetricii

<https://hdl.handle.net/1874/286389>

QUAESTIONES  
ARGUMENTI OBSTETRICII,

QUAS,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

H. C. MILLIES,

THEOL. DOCT<sup>o</sup> ET LITT. HUM. PROF. ORD.,

NEC NON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

**Pro Gradi Doctoratus,**

SUMMISQUE IN

ARTE OBSTETRICIA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

**IN ACADEMIA RENO-TRAJECTINA**

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,

ERUDITORUM EXAMINI SUBMITTET

**CAROLUS FERDINANDUS GUSTAVUS VAN WOERDEN,**

ULTRAJECTINUS

MEDICINAE ET CHIRURGIAE DOCTOR,

D. XXI NOVEMBRIS, A. MDCCCLXVI, HORA 6½.



TRAJECTI AD RHENUM

P. W. VAN DE WEIJER TYPIS MANDAVIT.

MDCCCLXVI.

WILLIAM H. DAVIS

# T H E S S.

---

## I.

Recte Nacgele: »Zur Zurückbringung und Zurückhaltung der Nabelschnur eignet sich im allgemeinen kein Werkzeug, so viele deren auch erfunden sind, besser als die Hand des Geburtshelfers.“

## II.

*Placenta retenta, methodus exspectativa est reprobanda.*

## III.

Ubi haemorrhagia uteri adest, aortae compressio nullius momenti.

## IV.

Etiamsi non audiantur soni cordis foetus nondum de ejus morte constat.

## V.

In ruptura perinaei in rectum pertinenti sutura cruenta statim post partum applicanda.

## VI.

Ab auxilio mechanico abstinendum est uteri spasmo presente.

## VII.

Vis forcipis, dynamica dicta, minoris momenti est.

## VIII.

Placenta praevia, dilatatio cruenta ostii uteri convenit.

## IX.

Ubi in sectione foetus, ex prolapsu funiculi mortui, symptomata anaemiae reperiuntur, verosimiliter vena umbilicales magis fuit compressa quam arteriae.

## X.

Usus forcipis in partu clunibus praeviis nonnunquam probandus.

## XI.

Venaesectio ad praecavendum abortum tempore mensium fluxui respondente est instituenda.

## XII.

Fieri postest ut major minorve pars pulmonum neonatorum, postquam aëre exstensa fuerit, aëre rursus exeunte, in conditionem foetalem redeat.

## XIII.

Versio foetus in caput rarissime tantum convenit.

## XIV.

In haemorrhagia ab atonia uteri repetenda manus  
optimum est ad contractiones excitandas praesidium.