



Heelkundige stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de heelkunde

<https://hdl.handle.net/1874/286395>

18

HEELKUNDIGE STELLINGEN

TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD

V. 13

DOCTOR IN DE HEELKUNDE,

NA MACHTIGING VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS

Dr. W. C. Millier,

GEWOON HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER LETTEREN EN DER WISBEHEERTE

MET TOESTEMMING VAN DEN ACADEMISCHEN SENAAAT

EN

VOLGENS BESLUIT DER GENEESKUNDIGE FACULTEIT

AAN DE HOOGESCHOOL TE UTRECHT,

TE VERDEDIGEN

op *woensdag* den *16* Januarij 1867,
des avonds ten *7 1/2* ure

DOOR

HERMANUS JOHANNES FRANCISCUS GIESBERS,

GEBOREN TE HEUMEN (GELDERLAND).

MED. ET ART. OBST. DOCTOR.



TE GENNEP BIJ
W. F. G. NOMAN.
1867.

RECEIVED AT BOSTON

APR 18 1864

1864

DOCTOR J. W. HILL

100 N. BOSTON ST. BOSTON

DEAR DOCTOR

I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 14th inst.

and in reply to inform you that the same has been forwarded to the

proper authorities for their consideration.

I am, Sir, very respectfully,
Your obedient servant,

J. W. HILL

[Handwritten signature]

Yours truly,
J. W. HILL

100 N. BOSTON ST. BOSTON

APR 18 1864

I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 14th inst.

and in reply to inform you that the same has been forwarded to the

proper authorities for their consideration.

17

I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 14th inst.

and in reply to inform you that the same has been forwarded to the

proper authorities for their consideration.

STELLINGEN.

I.

Bij de operatie van beklemde breuken moet zooveel mogelijk de breukzak gesloten blijven.

II.

Voor den operateur is het van weinig gewicht vooraf te bepalen of de beklemming veroorzaakt wordt door den annulus fibrosus of door den hals van den breukzak.

III.

Bijna voor alle ontwrichtingen geldt het gezegde van GALENUS, dat de repositie het gemakkelijkst is in die stelling, waarin de ontwrichting geschied is.

IV.

Bij versche luxaties van den schouder naar voren is de repositiemethode van SCHINZINGER zeer aan te bevelen.

V.

Bij distorsie of contusie van een gewricht is een onbewegelijk verband het beste antiphlogisticum.

VI.

Die Versuche den Inhalt eines aneurysmatischen Sackes durch Einspritzungen von Eisenperchlorid zur Gerinnung zu bringen, sind unwissenschaftlich und müssen im Vergleiche mit der Unterbindung und Compression als Rückschritte betrachtet werden.

ERICHSEN.

VII.

DEVERGIE is te voorzichtig, wanneer hij sprekende van het eczema van kinderen (croûtes de lait) zegt: Il faut que le médecin sache respecter ces maladies, qu'il fasse entrevoir tous les dangers d'une guérison, et qu'il résiste aux obsessions fussent-elles les plus impérieuses par cela même qu'elles sont compromettantes.

VIII.

Bij abnormaal verhoogde spanning van den oogbol is iridectomie aangewezen.

IX.

Die Einimpfung der Blennorrhæ bei Pannus ist und bleibt ein heroïsches Mittel, dessen Benützung nur durch die Noth, durch die bereits erwiesene Unzulänglichkeit der übrigen Methoden gerechtfertigt werden kann.

STELLWAG VON CARION.

X.

Wanneer de iris beledigd is door operatie of door toeval, dan moet iridectomie gedaan worden.

XI.

Zelfs wanneer men bij iritis geene verschijnselen van algemeene luës waarneemt is het in vele gevallen raadzaam eene antisyphilitische kuur te doen, daar men aan de iritis niet zien kan of zij van syphilitischen oorsprong is.

XII.

Bij belangrijke inscheuring van den bilnaad moet terstond na de baring eene bloedige hechting gemaakt worden.

XIII.

Waar bij kysten van het ovarium ovariotomie kan gedaan worden, moeten niet eerst palliatieve puncties gemaakt worden.

XIV.

De verdeeling van gezwellen in goed- en kwaadaardige is op practisch standpunt nog de beste.

XV.

Wanneer er nog geene verschijnselen van algemeene syphilis zijn, is het gebruik van kwik bij harde chankers niet noodig en zelfs af te keuren.

XVI.

Kanker kan als zuiver plaatselijk lijden beginnen en dan eerst later constitutioneel worden.

XVII.

Wanneer er kans is een kankergezwell geheel weg te nemen, en de algemeene toestand van den lijder geene contraindicatie is, moet men tot de operatie overgaan.

XVIII.

Chloroformnarcose moet met de noodige voorzichtigheid zooveel mogelijk bij operaties tot stand gebracht worden.

XIV.

De methode om door middel van onderhuidsche injecties medicamenten aan te wenden, verdient zeer te worden aanbevolen.

XX.

Die Strangmarke bei Erhängten ist eine blosse Leichenerscheinung.

CASPER.
