



Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de heelkunde

<https://hdl.handle.net/1874/286396>

STELLINGEN,

TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD

VAN

Doctor in de Geneeskunde,

NA MAGTIGING VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS

DR. H. C. MILLIES,

GEWOON HOOGLEERAAR IN DE FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE,

MET TOESTEMMING VAN DEN ACADEMISCHEN SENAAAT

EN

VOLGENS BESLUIT DER GENEESKUNDIGE FACULTEIT,

AAN DE HOOGESCHOOL TE UTRECHT

TE VERDEDIGEN

op Donderdag den 17^{en} Januarij 1867, des namiddags ten 7^{1/2} ure,

DOOR

KAREL SNELLEN,

Geboren te Zeijst,

Medicinae et Artis Obstetriciae Doctor.



UTRECHT,
P. W. VAN DE WEIJER,
1867.

STRENGTHEN

Journal of the

THE NEW YORK

of the

of the

of the

of the

of the

KARL SCHLIER

of the

of the

of the

STELLINGEN.

I.

De mechanische theorie van Bonnet voor constante buigingen bij gewrichtsontsteking is niet aannemelijk.

II.

Bij tumor albus is amputatie steeds na te laten of door resectie te vervangen.

III.

Rust is het beste antiphlogisticum.

IV.

Bij breuken van het dijbeen moet het gipsverband bij knie- en heupbuiging aangelegd worden.

V.

Bij de behandeling van gewrichtsontsteking is absolute rust als eerste indicatie het best met gipsverband te verkrijgen.

VI.

Pijn en beginnende zwelling bij fractuur eener extremiteit vormen indicaties voor het gipsverband.

VII.

Arthromeningitis gonorrhoeica ontstaat door infectie van het bloed met druipercontagium.

VIII.

Sedert de nieuwe cataract-operatie van von Graefe kan de vectis-operatie tot de historie verwezen worden.

IX.

Bij operatie van hernia incarcerata beproeve men steeds de verwijding buiten de zak.

X.

De gagradeerde compressen bij fractura antibrachii ter uiteendrijving van ulna en radius zijn te verwerpen.

XI.

De osteoplastiek van het olecranon is boven exarticulatie in de elleboog of amputatie van den humerus te verkiezen.

XII.

Bij arteriekwetsing in de handwortelstreek is geene onderbinding aangewezen dan in de wond zelve.

XIII.

Bij amputaties mag als tourniquet alleen een plaatselijk op de arterie drukkend, aangewend worden.

XIV.

De geknopte bistouri en dubbele scherpe haak in de vaardige hand is de beste tonsillotoom.

XV.

Bij vesico- en rectovaginaal fistels zijn transversale hechtingen boven longitudinale te verkiezen.

XVI.

Bij aneurisma's is drukking op het aneurisma zelve geheel te verwerpen en manipulaties tot onderzoek zooveel mogelijk te vermijden.

XVII.

Bij diep achter de spieren gelegen abcessen snijden men de spiervezels dwars door.

XVIII.

Bij de beoordeeling over maligniteit of benigniteit van gezwellen staat voor als nog klinische waarneming boven microscopisch onderzoek.
