



Heelkundige stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de Heelkunde ...

<https://hdl.handle.net/1874/288764>

HEELKUNDIGE STELLINGEN

TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD

VAN

DOCTOR IN DE HEELKUNDE,

NA MAGTIGING VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS

Mr. J. A. FRUIN,

GEWOON HOOGLEERAAR IN DE RECHTSGELEERDE FACULTEIT,

MET TOESTEMMING VAN DEN ACADEMISCHEN SENAAAT

EN

VOLGENS BESLUIT DER GENEESKUNDIGE FACULTEIT


AAN DE HOOGESCHOOL TE UTRECHT,

DOOR

PAULUS QUIRINUS BRONDGEEST,

GEBOREN TE 'S HAGE,

op Zaterdag 21 October 1865, des namiddags ten 7 $\frac{1}{2}$ ure.



UTRECHT,

J. VAN BOEKHOVEN.

1865.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHILOSOPHY DEPARTMENT

PHILOSOPHY 101

LECTURE NOTES

BY [Name]

DATE

CHAPTER I

Introduction

1.1 The Philosophy of Language

1.2 The Philosophy of Mind

1.3 The Philosophy of Action

1.4 The Philosophy of Science

1.5 The Philosophy of Law

1.6 The Philosophy of Religion

1.7 The Philosophy of Art

HEELKUNDIGE STELLINGEN.

I.

Amputatie boven het kniegewricht is te verkiezen boven totale resectie van dit gewricht.

II.

De osteoplastische exarticulatie van het onderbeen, volgens GRITTI'S voorschrift, verdient de voorkeur boven de amputatie.

III.

Bij recidiverenden hydrops articuli genu is het inspuiten met tinctura jodii, na punctie der gewrichtskapsel, te verwerpen.

IV.

Tot het verwijderen van kiezen gebruike men niet den sleutel maar de tang.

V.

De lithotritie zal de lithotomie nimmer geheel kunnen vervangen.

VI.

Het gebruik van het laryngoskoop is voor den chirurgijn onmisbaar.

VII.

Producten van nieuwe vorming in den larynx trachte men steeds met behulp der laryngoskopische chirurgie, zonder bloedige opening der luchtwegen, te verwijderen.

VIII.

Ter verwijdering van vreemde lichamen uit den oesophagus, diene men nimmer braakmiddelen toe; maar men make ze langs mechanischen weg onschadelijk.

IX.

Bij de dubbele hazelip opereere men eerst de eene, en geruimen tijd daarna de andere helft.

X.

Ter vernietiging van hypertrophische tonsillae is de cauterisatie door middel van chroomzuur af te keuren.

XI.

Parotis-gezwellen, wanneer zij diep gelegen zijn, extirpere men nimmer in hun geheel.

XII.

Tot het wegnemen van groote pseudoplasmata is het mes boven alle andere middelen te verkiezen.

XIII.

De radicale operatie van breuken moet als onvolkomen en gevaarlijk uit de operatieve chirurgie verbannen worden.

XIV.

Bij beklemde breuk make men de uitwendige breuksnede, zonder opening van den breukzak, en eerst wanneer deze blijkt ontoereikend te zijn, ga men tot de opening van den breukzak over.

XV.

Wanneer bij oude lieden de verduisterde lens moet verwijderd worden, verrigte men de extractie, nadat, eenigen tijd te voren, iridectomie gedaan is.