



Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de Verloskunde ...

<https://hdl.handle.net/1874/288776>

23

STELLINGEN

TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD

VAN

Doctor in de Verloskunde,

AAN DE HOOGESCHOOL TE UTRECHT,

NA MAGTIGING VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS

M_r. J. A. FRUIN,

GEWOON HOOGLEERAAR IN DE RECHTSGELEERDE FACULTEIT,

MET TOESTEMMING VAN DEN ACADEMISCHEN SENAAAT

EN

VOLGENS BESLUIT DER GENEESKUNDIGE FACULTEIT,

DOOR

KAREL SNELLEN,

Geboren te Zeijst,

MED. DOCTOR.

TE VERDEDIGEN


op Dingsdag den 13den Februarij 1866, des namiddags ten 6¹/₂ ure.



UTRECHT.

P. W. VAN DE WEIJER,

1866.



I.

De toediening van *secale cornutum* tot het opwekken van weeën is zooveel mogelijk te vermijden.

II.

Het kunstmatig opwekken van abortus kan aangewezen zijn.

III.

Het scheefvernaauwde bekken is eene gedurende het leven verkregene misvorming.

IV.

Aan de convulsies bij morbus Brightii en aan eclampsia gravidarum ligt dezelfde oorzaak ten gronde.

V.

Bij nakomend hooft is de gemengde methode (de gecombineerde van Smellie en die van Kiwisch von Rotterau) tot extractie van hetzelfde te verkiezen boven elke afzonderlijk.

VI.

Wanneer er zeer groote kracht wordt vereischt tot het extraheren van het hooft met den forceps, zij men niet te angstig voor het doen van perforatie.

VII.

Die schwere Vulneration dieser eiteln Versuche (nl. der Zange) ist es meistens, welche den Grund der späteren Tod der Mutter legt, es mag endlich noch perforirt werden oder nicht.

W. J. SCHMIDT.

VIII.

Gewaltsames Operiren mit der Zange tödtet die Frucht und gefährdet die Mutter auf's Aeusserste.

Naegele's Lehrb. der Geburtsh.

Mainz 1863 p. 540.

IX.

Bij omwinding van den hals door den navelstreng, binde men denzelve dubbel, voor men afknipt.

7

X.

Bij perforatie van het hoofd, zij men wel bedacht niet te na aan eene sutura te perforeren.

XI.

Bij habitueel vastzittende placenta ga men dadelijk na den partus met de hand in om dezelve te verwijderen.

XII.

Te regt beweert de geniale Wigand, dat voor de barendende ééne kunstbewerking hoewel zeer zwaar, maar die schielijk afloopt veel minder gevaarlijk is, dan twee geringere bij lange tusschenpozen verrigt.

XIII.

Het afsterven der vrucht, wanneer het vruchtwater vroegtijdig is afgevlóeid, vindt zijne oorzaak in de belemmering der bloedsomloop in placenta en foeniculus umbilicalis.

XIV.

Te regt zegt Flamant: la plus précieuse qualité d'un accoucheur est de savoir attendre.

XV.

De perforatie is boven de cephalotripsie te verkiezen, waar deze vermeden kan worden.

XVI.

De reden waarom eene zwangere gemakkelijker gaat dan staat, is daarin gelegen dat bij staan de buikspieren gespannen worden om het evenwigt te bewaren.

XVII.

De elkander opvolgende verschijnselen van syphilis zijn niet uit eene permanente dyscrasie te verklaren, maar als metastasen op te vatten.

XVIII.

De ligging der barende op knieën en ellebogen bezit (behalve andere) nog dit eigenaardige voordeel, dat de vrouw noch door sluiten, noch door uitstrekken der beenen, den opererende in zijn werk kan belemmeren.

Dr. F. A. SNELLEN:

Ned. Tijdschr. voor Verloskunde 1856.

XIX.

»Der Kopf muss zangenrecht d. h. so stehen dass er mit der Zange sicher gefasst werden kann. Dies ist nicht möglich, so lang er frei und beweglich über den Beckeneingang verweilt, sondern nur erst dann, wenn er in den Eingang eingedrungen, oder wenigstens fest gegen denselben angepresst ist.»

Naegle's Hdb. der Geburtsh. Mainz 1863 p. 337.

»De reden waarom een hoogliggend hoofd zoo moeilijk door de tang wordt gevat, is niet zoo zeer te zoeken

in de onbereikbaarheid van het hoofd, als wel in deszelfs beweeglijkheid, en vooral in den dwarsen stand, dien het boven het bekken aanneemt, als het aan zich zelf is overgelaten."

Dr. F. A. SNELLEN:

Ned. Tijdschr. v. Verlosk. 1856.

De tegenstrijdigheid in beide aanhalingen wordt opgelost door hetgeen op de laatste volgt:

»Beide deze zwaarigheden worden voorgekomen als het hoofd met de hand wordt vastgehouden en in den begeerden stand gebracht" (terwijl de tang wordt aangelegd).

Dr. F. A. SNELLEN, l. e.

