



Quaestiones argumenti obstetricii

<https://hdl.handle.net/1874/292741>

20

QUAESTIONES
ARGUMENTI OBSTETRICII,

QUAS,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

BERNARDI TER HAAR,

THEOL. DOCT. ET PROF. ORD.,

NEC NON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

Pro Gradu Doctoratus,

SUMMISQUE IN

ARTE OBSTETRICIA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS,

IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,

DEFENDET

HENRICUS JANUS LAMBERT,

Bredanus,

MEDICINAE DOCTOR.

A. D. XXII M. NOVEMBRI ANNI MDCCCLIX, HORA VII DIMIDIATA.



TRAJECTI AD RHENUM.

P. W. VAN DE WEIJER TYPIS MANDAVIT.

MDCCCLIX.

QUESTIONS

ARGUMENTI OBSTETRICI

AVRENTI SCIMO NOMINE

di medicina e chirurgia

FRANCESCO TERESA

di

di

di medicina e chirurgia

di medicina e chirurgia

di medicina e chirurgia

di

di medicina e chirurgia

di medicina e chirurgia

di medicina e chirurgia

di

di medicina e chirurgia

di medicina e chirurgia

di medicina e chirurgia



di medicina e chirurgia

THESES.



I.

Hypothesis ANKERMANNI de motu spermatozoidum mihi valde probabilis videtur.

II.

Non facio cum Cl. FUNKE motum ovuli in tuba a fibrillis negante.

III.

Susurrus uterinus, qui dicitur, non semper eodem modo explicandus.

IV.

Errant, qui nutricem sanam rusticam semper urbanae praeferent.

V.

Non concedo Cl. KIWISCH, susurrum uterinum non esse signum graviditatis.

VI.

Nomen »febris lactea» non probandum.

VII.

Non assentior Cl. SPIEGELBERGIO, dicenti: »Man bedenke, dass da wo beider Leben mit einander in Conflict geräth, das mütterliche dem kindlichen vorzuziehen ist.»

VIII.

Non concedo Cl. NAEGELE, dicenti: »dass die Resultate der Manualen Beckenmessung eben so genau sind als die mit Instrumenten.»

IX.

Nec dicenti: »Sind schon mehrere Fehlgeburten vorausgegangen, so darf sie um diese Zeit die horizontale Lage gar nicht verlassen.»

X.

Methodus partus praematuri provocandi, quam KIWISCH proposuit, optima est.

XI.

In situ foetus humero praevio, non urgente indicatione partus terminandi, versio in caput tentanda est.

XII.

Non audiendus est Cl. NAEGELE in prolapsu funiculi secale cornutum ad partum^u accelerandum praescribens.

XIII.

In haemorrhagiis gravioribus durante partu et

1901657

post partum colpeurynter optimum haemostaticum
est habendus.

XIV.

Foetus extractio post versionem in pedes facienda.

XV.

Scarificationes in collum uteri ad dilatandum,
placenta praevia, non commendandae.

XVI.

Duobus locis funiculum umbilicalem ligare super-
flua est, nisi post natum infantem pateat adhuc
unum vel plures foetus in utero adesse.