Utrecht University Library
Partner in Science
Universiteit Utrecht

Theses inaugurales argumenti obstetricii

https://hdl.handle.net/1874/295181

18

THESES INAUGURALES
ARGUMENTI OBSTETRICII,

QUAS,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

CHRISTOPHORI HENRICI DIDERICI BUYS BALLOT,

IN FACULTATE MATH. ET PHIL. NAT. PROF. ORD.,

NEC NON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

Pro Gradu Doctoratus,

SUMMISQUE IN

ARTE OBSTETRICIA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,

DEFENDET

HENRICUS ANTONIUS GROSKAMP,

Campensis,

MEDICINAE DOCTOR.

A. D. XVI M. DECEMBRIS, A. MDCCCLXIII, HORA VII DIMIDIATA.

TRAJECTI AD RHENUM.

P. W. VAN DE WEIJER.

MDCCCLXIII.

THESES.

I.

Menstruationem etiam durante graviditate redire pro certo habeo.

II.

Funiculum umbilicalem justo breviorem non nisi manus ope dignosci posse contendo.

III.

Immerito contendit VAN EEDEN (Nederl. Tijdschr. voor Heel- en Verlosk. VII) positionem, à la vache quam dicunt, omnium aptissimam esse ad versionem instituendam

IV.

Kephalothryptorem a Doctiss. Cohen cultris munitum aliis praeferendum esse statuo.

V.

Recte Spiegelberg: „Bei $3^1/_4$ Zoll im kürzesten Durchmesser ist es bei Erstgeschwängerten erlaubt die Geburt einzuleiten und kein Grund vorhanden, warum man in einem derartigen Falle Mutter und Kind fast immer den Gefahren der rechtzeitigen Entbindung aussetzen soll."

VI.

Vis forcipis, dynamica dicta, minoris momenti est.

VII.

In 3o vel 4° capitis situ, rotatio quam Clariss. Scanzoni proposuit, bis forcipem applicando, mihi reprobanda videtur.

VIII.

Injuria a Clariss. von Siebold pelvis latus refertur inter causas funiculi prolapsi.

IX.

Inter diversas metrorrhagiam sistendi methodos, compressio aortae abdominalis longe incertissima est.

X.

Methodo Meissneri partus praematurus pro magna parte irritatione instrumenti inducti provocatur, nec tamen solis evacuationis liquoris sequelis.

XI.

In versione instituenda elevatio partis praeviae maximi momenti est.

XII.

Regulae forcipem non applicandum esse, ubi caput in pelvis introitu adhuc moveri potest, nulla sit exceptio.

XIII.

Inclinatio anterioris pelvis lateris majoris momenti est quam inclinatio totius pelvis quoad partus decursum.

XIV.

Repositoria quibus funiculum umbilicalem prolapsum reducere conantur, prorsus rejicienda sunt.

XV.

In situ foetus transverso, velamentis integris, versio manipulatione, quae dicitur externa, praeferenda.

XVI.

Recte Spiegelberg de partu praematuro: „Durch die Zuverlässigkeit, durch die Leichtigkeit und Schmerzlosigkeit ihrer Ausführung und durch die Schnelligkeit ihrer Wirkung verdient die Methode der Uterin-injectionen vor den übrigen, selbst vor der Uterindouche und dem Eihautstiche, den Vorzug.

XVII.

Instrumenta ad foetus cranium perforandum, quae trepani formam habent, praeferenda sunt illis quae forficis formam simulant.