



Quaestiones argumenti chirurgici

<https://hdl.handle.net/1874/295843>

II

A

QUAESTIONES

ARGUMENTI CHIRURGICI.

OF TESTIMONY

ARGUMENTS IN FAVOR OF

THE ADULTERATION OF THE BREAD

AND THE USE OF THE

POUNCE AND THE WEIGHT

AND THE MEASURE

AND THE QUANTITY

AND THE QUALITY

OF THE BREAD

ARGUMENTS IN FAVOR OF

THE ADULTERATION OF THE BREAD

AND THE USE OF THE

POUNCE AND THE WEIGHT

AND THE MEASURE

AND THE QUANTITY

AND THE QUALITY

OF THE BREAD

4

QUAESTIONES
ARGUMENTI CHIRURGICI,

QUAS,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

GOZEWINI JANI LONCQ, CORN. JAN. FIL.

MED. DOCT. ET PROF. ORD.,

NEC NON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

Pro Gradu Doctoratus,

SUMMISQUE IN

CHIRURGIA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS,

IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS

DEFENDET

FRIDERICUS REINHARDUS WESTHOFF,

Noviomagensis,

MED. ET ART. ORST. DOCTOR.

A. D. X M. MAJI ANNI MDCCCLXII, HORA VIII DIMIDIATA.

AMSTELODAMI,

D. B. C E N T E N.

MDCCCLXII.

AMERICAN CHIRURGICAL ASSOCIATION

ANNUAL MEETING

AT THE UNIVERSITY OF CHICAGO

CHICAGO, ILLINOIS

SEPTEMBER 15-19, 1906



OFFICE OF THE SECRETARY

150 NORTH LAKE STREET

CHICAGO, ILLINOIS

AMERICAN CHIRURGICAL ASSOCIATION

MEMBERSHIP LIST

1906

SECRETARY

J. P. GALT

CHICAGO

T H E S E S.

I.

Dolores lancinantes in tumoribus carcinomatosis non tantum pendent e nervorum mutationibus mechanice vel chemice ortis.

II.

Tumorem carcinomatosum auferre est mortem properare.

III.

Ad aneurysmatum curam electropunctura, quam vocant, in considerationem venire meretur.

IV.

Ad resectionem una mollium partium incisio vulgo sufficit.

V.

In resectionibus periosteum, quantum fieri possit, servari debet.

VI.

In acuta periostitide incisiones periostei prosunt.

VII.

In capitis vulneribus a suturis cruentis non abstinendum est.

VIII.

In conjunctivitide et keratitide scrophulosa chronica usus internus liquoris Fowleri commendabilis est.

IX.

Cataracta senilis mollis, quae nucleum durum habet, extractione lineari auferri debet.

X.

Granulationes conjunctivae atonicae melius

per sulphas cupri crystallinum quam per nitras argenti sanantur.

XI.

Ad oculum extirpandum methodum adhibeatur, quam vocant subconjunctivalem.

XII.

Injectio liquorum irritantium in cavum pleurae vel peritonaei non prorsus improbanda est.

XIII.

Quodsi herniae incarcerationio, chloroformylo adhibito, non tollitur, non licet operationem differre.

XIV.

Paracentesis eamque secuta liquoris irritantis injectio optimam faciunt curam hydroceles radicalem.

XV.

Lithotripsiae universe praeferrri meretur lithotomiae.

XVI.

Femoris amputatio praeferri debet exarticulationi genu.

XVII.

Non semper licet ulcera artuum inferiorum ad sanationem perducere.

XVIII.

Ad pedis exarticulationem Pirogoffii methodus Symianae praeferri meretur.