



Theses argumenti chirurgici

<https://hdl.handle.net/1874/295846>

II 7

THESES
ARGUMENTI CHIRURGICI.

и съвѣтъ
и вѣдѣніе

2

THESES ARGUMENTI CHIRURGICI,

QUAS,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

GOZEWINI JANI LONCQ, CORN. JANIFIL,

MED. DOCT. ET PROF. ORD.,

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU,

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

Pro Gradu Doctoratus

SUMMISQUE IN

ARTE CHIRURGICA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,

DEFENDET

ANDREAS DONCAN,

ex oppido Purmerend,

MEDICINAE ET ARTIS OBSTETRICIAE DOCTOR,

A. D. XXII M. MAI, A. MDCCCLXII, HORA VII DIMIDIATA.

TRAJECTI AD RHENUM,

TYPIS MANDAVIT P. W. VAN DE WEIJER.

MDCCCLXII.

T H E S E S.

I.

Curvaturaे spinae dorsi, quibus inaequalis muscularum antagonisticorum actio vel sola vel praecipue ansam præbuit, gymnastice tantum tolli possunt.

II.

In hernia incarcerata methodus CL. SEUTIN, quac consistit in violenta annuli sive ampliatione sive dilaceratione, commendationem non meretur.

III.

Adstringentia urethrae blennorrhœa laboranti injecta stricturam non adferunt.

IV.

In cura aneurysmatum pressio, ubi fieri possit,
aliis methodis praefferenda est.

V.

Non dantur artis praesidia uteri prolapsum
certo curantia.

VI.

Ad rhinoplastice pericranium una cum cute
transferri debet.

VII.

Operatio PIROGOFFI Symianae anteponenda est.

VIII

In abscessibus frigidis majoribus tubuli e
gummi elasticō confecti secundum methodum,
quam CHASSAGNAC proposuit, adhibiti commen-
dationem merentur.

IX.

Syphilisatio in praxi civili adhiberi nequit.

X.

Resectio genu et cubiti amputationi non anteponenda est.

XI.

In fistulis vesico-vaginalibus sutura cruenta ferro candenti aliisque causticis praferenda est.

XII.

Perinaei vulnere glutinato, opium ad alvum cohibendam non convenit.

XIII.

In vulneribus ambustione productis gossypium rejici debet.

XIV.

Quando sub finem graviditatis hernia incarcatur, partus praematurus non provocandus est, sed herniotomia instituenda, taxi frustra tentata.

XV.

Recte PITHA catheterismum violentum paracentesi vesicae anteponit.

XVI.

Unica trepanationis indicatio est compressio
cerebri cranio vulnerato tribuenda.

XVII.

Sulphatis atropini solutionis instillatio in omni
iritidis forma adhiberi debet.

XVIII.

Muscae volitantes, quae dicuntur, tum demum
morbosi quid denotant, ubi corpuseula, unde
pendent, ophthalmoscopo distingui possunt.

