



Quaestiones argumenti obstetricii


<https://hdl.handle.net/1874/295858>

II

18

Q U A E S T I O N E S

ARGUMENTI OBSTETRICII.



Q U A E S T I O N E S
A R G U M E N T I O B S T E T R I C H I ,

QUAS,

A N N U E N T E S U M M O N U M I N E ,

E X A U C T O R I T A T E R E C T O R I S M A G N I F I C I

G O Z E W I N I J A N I L O N C Q , C O R N . J A N . F I L . ,
M E D . D O C T . E T P R O F . O R D . ,

A M P L I S S I M I S E N A T U S A C A D E M I C I C O N S E N S U

E T

N O B I L I S S I M A E F A C U L T A T I S M E D I C A E D E C R E T O ,

P r o S r a d u D o c t o r a t u s

S U M M I S Q U E

I N A R T E O B S T E T R I C I A H O N O R I B U S A C P R I V I L E G I I S

I N A C A D E M I A R H E N O - T R A J E C T I N A

R I T E E T L E G I T I M E C O N S E Q U E N D I S ,

D E F E N D E T

H E N R I C U S G E R A R D U S C H R I S T O P H I L U S V A N B A E R L E .

H a g a n u s .


M E D I C I N A E D O C T O R .

A . D . X X I V M . M A R T I S , A . M D C C C L X I I I , H O R A V I I D I M I D I A T A .

T R A J E C T I A D R H E N U M ,

T Y P I S M A N D A V E R U N T G I E B E N & D U M O N T .

M D C C C L X I I I .



T H E S S.

I.

Albuminuria non semper eclampsiae causa.

II.

Partus violentus (accouchement forcé) in eclampsia gravidarum raro tantum instituendus.

III.

Digitus non optimus pelvimeter.

IV.

Liquor amnii non alimentum foetus.

V.

Applicatio forcipis in partu clunibus praeviis non raro approbanda.

VI.

Faciei praeviae distinctio in quatuor positiones recentiorum divisioni in duas praefferenda.

VII.

Polypum uteri excidere non licet in feminis, sanguinis jactura multum iam debilitatis.

VIII.

Decapitationem foetus tunc demum instituere licet, quum conatus foetus vertendi in situ foeminae laterali, vel in situ, qui à la vache dicitur, irriti fuerint.

IX.

Vaginae non est vis expellens.

X.

Nonnumquam licet abortum provocare.

XI.

Transfusio sanguinis in anaemia post partum laudabilis operatio, apud nostrates tamen nimis neglecta.

XII.

Cephalotripsy plerumque excerebrationi praeferranda.

XIII.

In provocando partu praematro methodus SCHEELLI reiicienda.

XIV.

Obturamentum, quod WIGAND commondavit, plo-

rumque obturamentis e gummi elastico paratis anteponendum.

XV.

Usus localis extracti belladonnae in spasmo colli uteri non convenit.

