



Quaestiones argumenti obstetricii

<https://hdl.handle.net/1874/298935>

1

QUAESTIONES
ARGUMENTI OBSTETRICII,

QUAS,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

GEORGII GUILIELMI VREEDE,

JUR. ROM. ET HOD. DOCT. ET PROF. ORD.,

NEC NON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU,

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

Pro Gradu Doctoratus.

SUMMISQUE IN

ARTE OBSTETRICIA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS,

IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,

DEFENDET

ARNOLDUS HERMANUS KUYPER,

a pago Soest.

MED. DOCTOR.

DIE XXVI M. APRILIS ANNI MDCCCLX, HORA VII DIMIDIATA.



Trajecti ad Rhenum.

APUD J. VAN BOEKHOVEN,

MDCCCLX.

OF THE
MOUNTAIN DISTRICT

THE
MOUNTAIN DISTRICT

THE
MOUNTAIN DISTRICT

THE
MOUNTAIN DISTRICT

THE
MOUNTAIN DISTRICT

THE
MOUNTAIN DISTRICT

THE
MOUNTAIN DISTRICT

THESES.

—+ 88 +—

I.

In febre puerperali sanguinis detractiones locales venaesectioni, anteponeandae.

II.

Venaesectio in quibusdam eclampsiae speciebus contra-indicata est.

III.

Instrumentum, quod dicitur vectis, e praxi obstetricia rejiciendum esse, non censeo.

IV.

Explorationem graviditatis non licet instituere ope specilli Simpsoniani, etiamsi adsit graviditas extra-uterina.

V.

Prima et secunda foetus positio facie praevia (BUSCH) plurimum tuto naturae relinqui possunt.

VI.

Consilium, ante extractionem infantis ligandi funiculum umbilicalem, rejiciendum.

VII.

Non assentior clarissimo A. F. HOHL dicenti: «Wir müssen allerdings in den Fällen, wo die Berechnung der Schwangerschaft eine längere Dauer derselben ergiebt, oder diese auch nur wahrscheinlich macht, jene gewöhnlich nur schwachen Wehen als ein brauchbares Kriterium für die Spätgeburt bezeichnen.»

VIII.

In graviditate extra-uterina laparotomia praeferenda colpotomiae.

IX.

Secale cornutum non licet adhibere ad provocandum partum praematurum.

X.

Vis electro-galvanica optimum remedium habendum contra amenorrhoeam.

XI.

Ovum morbosum est proxima causa abortus.

XII.

Instrumentum nuper nomine lenicipsis inventum, non commendabile.

XIII.

Sulphas quinicus rarissime, contra febrem intermittentem, gravidis administrandus.

XIV.

In excitando partu praemature, vaginae obturatio ceteris methodis anteponenda.

XV.

Errunt qui in forcipe curvaturam Naegelianam (de bogt van Naegele) admittunt.

XVI.

Speculum uteri in dignoscenda graviditate nullius momenti habendum est.

