



Quaestiones argumenti obstetricii

<https://hdl.handle.net/1874/298943>

9

QUAESTIONES
ARGUMENTI OBSTETRICII,

QUAS,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

GEORGII GUILIELMI VREEDE,

JURIS ROM. ET MOD. DOCT. ET PROF. ORD.,

NEC NON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

Pro Gradu Doctoratus,

SUMMISQUE IN

ARTE OBSTETRICIA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS,

IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,

DEFENDET

ANTONIUS HENRICUS SCHOEMAKER,


e pago Borne,

MEDICINAE DOCTOR.

DIE XVI JUNII HORA VII DIMIDIATA 1860.

AMSTELODAMI,
C. G. VAN DER POST.

MDCCLX.



T H E S E S.

I.

Atresia ostii uteri minime tanquam exsudationis productum considerari debet.

II.

Non recte EICHSTEDT spermatis in uterum immissionem ex ostii uteri vi sugillatoria explicare conatur.

III.

In haemorrhagiis uteri post laesiones traumaticas sine graviditate, injectio aquae frigidae commendari meretur.

IV.

In haemorrhagiis quinta partus periodo ortis placenta statim solvenda est.

V.

In situ foetus transverso, velamentis integris, versio manipulatione quae vocatur externa praeferenda.

VI.

Quando capitis extractio post natum truncum requiritur, methodus complicata recentiorum maxime convenit.

VII.

Inter diversas partum praematurum artificialem promovendi methodos, illa, quam LEHMANN proposuit, omnino praeferenda.

VIII.

Dilatatio ostii uteri instrumentalis per dilatatoria penitus rejicienda.

IX.

In pertinaci ostii uteri strictura spasmodica incisio ostii commendanda.

X.

Eclampsis gravidarum et parturientium est morbi symptoma, e variis causis repetendum.

XI.

In curanda eclampsia parturientium partus quantocius absolvendus.

XII.

In asphyxia neonatorum, applicatio galvanismi ad vitam revocandam, si fieri potest, numquam omittenda.

XIII.

Febris quae vulgo vocatur lactea, saepe febris traumaticae indolem refert, et haud raro propterea in febrem puerperalem mutatur.

XIV.

Diagnosis affectionis hystericae in paululis solum casibus fidem meretur, in mulieribus gravidis et parturientibus numquam laudanda.

XV.

Pyæmia idiopathica non adest.

