



Quaestiones argumenti chirurgici

<https://hdl.handle.net/1874/298944>

10

QUAESTIONES
ARGUMENTI CHIRURGICI,

QUAS,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

GEORGII GUILIELMI VREEDE,

JURIS ROM. ET HOB. DOCT. ET PROF. ORD.,

NEC NON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

Pro Gradu Doctoratus,

SUMMISQUE IN

ARTE CHIRURGICA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS,

IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,

DEFENDET

ANTONIUS HENRICUS SCHOEMAKER,

e pago Borne,

MEDICINAE DOCTOR.


DIE XVIII JUNII HORA VIII DIMIDIATA 1860.



AMSTELODAMI,

C. G. VAN DER POST.

MDCCCLX.



T H E S E S.

I.

E complicatione fracturarum ossium, cum articulis majoribus apertis, amputationis immediatae indicatio non est petenda.

II.

Non assentior chirurgis statuentibus, tracheotomiam indicatam esse, simul ac asphyxiae symptomata adsint.

III.

Injectiones irritantes in hydrocele congenita rejiciendae.

IV.

Nulla alia cura hydroceles in omnibus casibus radicalis est, praeter incisionem.

V.

Si herniae incarceratae in narcosi ex usu chloroformi reponi nequeunt, operatio non diutius differenda.

VI.

Minus recte Hyrtl: »So lange die Haut und die Fascia superficialis sich über den Bruchgeschwulst in eine Falte erheben lassen, ist bei incarcerirten Brüchen kein Brand vorhanden.»

VII.

In herniis inguinalibus externis incarceratio spasmodica negari nequit.

VIII.

In fractura patellae unci Malgagnii rejiciendi.

IX.

In repositione luxationum usus chloroformi maxime probandus.

X.

Non licet trepanationem instituere, nisi fragmentis ossium profunde impressis.

XI.

Obstructio unius vel amborum narium optime cognoscenda est, percussione laryngis.

XII.

Fabricii ab Aquapendente methodus vulnerum ligationis prae omnibus laudanda.

XIII.

Exstirpatio glandulae thyreoideae colloidea degeneratione correptae numquam est probanda.

XIV.

Tracheotomiae methodus quam Chassaignac proposuit rejicienda.

XV.

Consolidatio superficiei vulnerum non organisationi exsudationis, sed evolutioni e textura labiorum vulnerum est attribuenda.

XVI.

In amputationibus periosteum reclinari debet, quo superficies ossis tegatur.

XVII.

Gravissime errat OLLIER: » le blastème sous-périostal est l'élément essentiel de l'ossification hétéropique." *Journal de Phys.*, Janv. 1859, p. 24.

XVIII.

Symptomata pathognomonica ulcerum syphyliticorum non existunt.

XIX.

Usus mercurialium in morbo syphylitico non indicatus est, nisi symptomata affectionis universalis adsint.

XX.

Hypermetropia causa vulgaris hebetudinis visus. DONDERS.

XXI.

In cataractis duris extractio reclinacioni praeferenda.

XXII.

In iritide punctiones corneae et iridis, les ponctions keratopariennes de TAVIGNOT, rejiciendae sunt.

XIII.

Cataractam operandi methodus (die Auslöfflung des Staars) quam doctissimus SCHUFT proposuit, extractione non praeferenda.

