




# **Theses inaugurales argumenti obstetricii**

<https://hdl.handle.net/1874/299904>

THESES INAUGURALES  
ARGUMENTI OBSTETRICII.



18

THESES INAUGURALES  
ARGUMENTI OBSTETRICII,

QUAS,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

JACOBI ADOLPHI CAROLI ROVERS,

PHIL. THEOR. MAG. LITT. HUM. ET JUR. ROM. ATQUE MOD. DOCT.,

IN FAC. LITTER. PROF. ORD.,

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU,

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

**Pro Gradu Doctoratus**

SUMMISQUE IN

ARTE OBSTETRICIA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,

DEFENDET

**HERMANUS GERARDUS MAES,**

Amstelodamensis,

MEDICINAE DOCTOR.

A. D. X M. DECEMBRIS, A. MDCCCLXI, HORA VII DIMIDIATA.

---

TRAJECTI AD RHENUM,  
APUD NOLET ET FILIUM.

MDCCCLXI.



# THESES.

I.

Situs capite praevio pendet e gravitatis lege.

II.

Versio in pedes versioni in caput praeferenda est.

III.

Instrumenta velamentis perforandis accommodata  
supervacua sunt.

## IV.

Recte SPIEGELBERG: *Die Unterscheidung zwischen Fehlgeburt Abortus, und Partus immaturus, von denen die erste die Frühgeburt innerhalb der ersten 3 Monaten, der letztere, die innerhalb des 4 bis 7 Monates bezeichnen soll, ist ganz unpractisch und überflüssig.*

## V.

In flexionibus uteri auxilium mechanicum reiiciendum est.

## VI.

Assentior SPIEGELBERGIO dicenti: *Bei  $3\frac{1}{4}$  Zoll im kürzesten Durchmesser ist es bei Erstgeschwängerten erlaubt die Geburt einzuleiten, und kein Grund vorhanden, warum man in einem derartigen Fall Mutter und Kind erst immer den Gefahren der rechtzeitigen Entbindung aussetzen soll.*



## VII.

Irrigatio uteri optima est partus praematuri provocandi methodus.

## VIII.

Dilatatio ostii uteri cruenta dilatationi manu perfectae anteponeunda est.

## IX.

Placentam praeviam perforare non licet.

## X.

Symphysiotomia numquam instituenda est.

## XI.

In ruptura perinaei graviore sutura cruenta ilico facienda est.

## XII.

Improbo methodum BAKERI BROWNI incidentis partem parietis tumoris ovarii (cyste).



## XIII.

In carcinomate mammae culter causticis praeferendus est.

## XIV.

Balnea quotidiana tenellis noxia sunt.

## XV.

Gastromalacia infantum gelatiniformis quae dicitur, non oritur durante vita.

