



Theses inaugurales argumenti chirurgici

<https://hdl.handle.net/1874/299905>

THESES INAUGURALES
ARGUMENTI CHIRURGICI.

19

THESES INAUGURALES
ARGUMENTI CHIRURGICI,

QUAS,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

JACOBI ADOLPHI CAROLI ROVERS,

PHIL. THEOR. MAG. LITT. HUN. ET JUR. ROM. ATQUE MOD. DOCT.,

IN FAC. LITTER. PROF. ORD.,

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU,

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

Pro Gradu Doctoratus

SUMMISQUE IN

ARTE CHIRURGICA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,

DEFENDET

JOSEPHUS HENRICUS AUGUSTINUS HAFFMANS,

MEDICINAE DOCTOR,

e pago Horst.

A. D. XII M. DECEMBRIS, A. MDCCCLXI, HORA VIII DIMIDIATA.

TRAJECTI AD RHENUM,

APUD P. W. VAN DE WEIJER.

MDCCCLXI.

THE ...
...

...

...

...

...

...

...

THESES.



I.

In ossium fractura simplice, continuo post repositionem, fasciæ de gypso paratæ sunt applicandæ.

II.

In pleuritide acuta, liquoris exsudati volumine adeo adaucto ut suffocationis periculum instet, paracentesis thoracis institui debet.

III.

Ad herniae in annulo crurali incarcerationem solvendam, uni incisioni majori qualicumque plures minores praeferri merentur.

IV.

Ad tonsillas hypertrophicas excidendas amygdalotomus optimum instrumentum.

V.

Ut palatum fissum claudatur, methodus LANGENBECKII, qui periosteum hunc in finem adhibet, prae ceteris commendari meretur.

VI.

Oedema glottidis, suffocationis periculum adducens, incisionibus levamine non allato, tracheotomiam requirit.

VII.

Plerisque in casibus, arteriae cruralis ligatura in medio crure, secundum HUNTERI methodum, est applicanda.

VIII.

Distinctionem benignos inter et malignos tumores defendo.

IX.

Genu articulationis resectio improbanda est.

X.

Ulcera laryngis nitrate argenti, laryngoscopio adhibito, uri debent.

XI.

In nasi polypis amovendis avulsio caeteris methodis praestat.

XII.

Ad curam hydroceles radicalem, tunica vaginalis solito duriore et crassiore, excisionem adhibendam censeo.

XIII.

In synechia iridis posteriore dissectionem (CORELYSIN) improbo.

XIV.

Pars iridis in quacunq̄ue oculi operatione contusa statim excidenda est.

