




# Quaestiones argumenti obstetricii

<https://hdl.handle.net/1874/299908>

QUAESTIONES  
ARGUMENTI OBSTETRICII.



QUAESTIONES  
ARGUMENTI OBSTETRICII,

QUAS,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

JACOBI ADOLPHI CAROLI ROVERS,

PHIL. THEOR. MAG., LITT. HUM. ET JUR. ROM. ATQUE HOB. DOCT.,

IN FAC. LITTER. PROF. ORD.,

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU,

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

**Pro Gradu Doctoratus**

SUMMISQUE IN

ARTE OBSTETRICIA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,

DEFENDET

**ABRAHAMUS HENRICUS ANTONIUS VAN ROOJEN,**

MEDICINAE DOCTOR,

e pago Vluten.

A. D. XXVI M. FEBRUARII, A. MDCCCLXII, HORA VII DIMIDIATA.

---

TRAJECTI AD RHENUM,  
APUD NOLET ET FILIUM.

MDCCCLXII.

OF THE

# AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION

RESOLUTIONS

ADOPTED AT THE ANNUAL MEETING

Held at Chicago, Illinois, June 15-18, 1914

AND

RESOLUTIONS

ADOPTED AT THE ANNUAL MEETING

Held at Chicago, Illinois, June 15-18, 1915

AND

RESOLUTIONS

ADOPTED AT THE ANNUAL MEETING

Held at Chicago, Illinois, June 15-18, 1916

AND

RESOLUTIONS

ADOPTED AT THE ANNUAL MEETING

# THESES.

## I.

Foetus et uteri forma et puncti gravitatis positio in foetu causae sunt quare caput praevium fiat.

## II.

Animi pathemata gravidarum foetus difformitates producere non possunt.

## III.

Digitus optimum pelvimetrum.

## IV.

In partu quoque normali chloroformylo uti licet.

## V.

Funiculi umbilicalis ligatura duplex expulsionem placentae accelerat.

## VI.

In haemorrhagias uteri post partum remediis externis plus confidendum est quam internis.

## VII.

In partu protracto praesertim auscultatio non est negligenda.

## VIII.

Placenta retenta parturienti magnum periculum sistit.

## IX.

In situ foetus transverso applicatio obturamenti, si partus inceperit, maxime commendanda est.



## X.

Si post partum strictura uteri haemorrhagia comitata est, ab usu chloroformyli abstinendum est.

## XI.

Pelvis angusta per se versionem non indicat.

## XII.

In situ foetus transverso, nulla urgente indicatione extrahendi foetum, post versionem factam partus naturae relinquendus.

## XIII.

Haemorrhagia post partum difficulter sistenda non licet uterum obturare.

## XIV.

Prolapsus foeniculus umbilicalis si nequeat reponi, non semper partus quam citissime absolvendus est.



8722161