



Theses inaugurales argumenti chirurgici

<https://hdl.handle.net/1874/301662>

THESES INAUGURALES
ARGUMENTI CHIRURGICI

QUAS,

FAVENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI,

P E T R I H A R T I N G,

MED. ET ART. OBST. DOCT. ET MATH. ET PHIL. NAT. PROF. ORD.,

NEC NON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

PRO GRADU DOCTORATUS

SUMMISQUE IN ARTE CHIRURGIA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS,

IN ACADEMIA RHENO-TRAIECTINA,

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,

ERUDITORUM EXAMINI SUBMITTIT

H E N R I C U S G U I L E L M U S C R A M E R ,

AMSTELAEDAMENSIS,

Medicinae Doctor.

AD DIEM XIV M. JUNII MDCCCLVIII, HORA VIII DIMID.

AMSTELAEDAMI,
APUD C. G. VAN DER POST.

MDCCCLVIII.

СИМФОНИЯ ГЛАДИАТОР

T H E S E S.

I.

Deligatio gypsea in fracturis membrorum infantum omnibus
aliis praestat.

II.

In injuriis vertebris colli allatis exploratio per pharyngem non
est omittenda.

III.

Methodus exarticulationis pedis, quam PIROGOFF proposuit,
methodo SYMIANAE praferenda mihi videtur.

IV.

JAESCHIANA methodus trichiasis operandi, modificata ab ARIT,
caeteris est praferenda.

V.

Applicatio viri gonorrhœici ad oculum, panni curandi gratia,
quam maxime est dissuadenda.

VI.

E serie medicamentorum, quae adversus photophobia adhiberi solent, *Conium* mihi optimum videtur.

VII.

Ich zweifle an der Möglichkeit einer Exstirpation der Parotis ohne vorläufige Unterbindung der *Carotis externa*, welche, da sie die Drüse durchbohrt, mit der Drüse exstirpiert werden muss.

HYRTL.

VIII.

Exstirpation cystidum capitis, quas *talpas* vocant, ope caustici, uti nonnulli recentiores suadent, valde commendanda.

IX.

Anaesthesia universalis chloroformi ope, praferenda anaesthesiae in parte singula ope frigoris.

X.

Recte Vir Cl. TILANUS (Behand. v. Aneur. Ned. Weekbl. voor Geneesk., 5e Jaarg. N°. V) „Indirecte drukking, d. i. op den aanvoerenden hoofdtak, waar zij maar aangewend en verdragen kan worden, verdient de voorkeur; goed aangewend, weert zij het gevaar van gangraen zoowel als van stolling in de adrenen van de zoo noodlottige secundaire ontsteking af.”

XI.

Chirurgus peritus in tracheotomia praeferat cultrum simplicem instrumentis, quae tracheotomata dicuntur.

XII.

In genere operatio labii leporini prima vitae aetate perficiatur.

XIII.

Facio cum SIMON (Virchow's Hdb. d. Spec. Path. und Therap. II Bd. IX Abschn.) de methodo abortiva blennorrhoeae urethrae loquente: „Wo also die Einspritzungen wirklich einmal einen so günstigen Erfolg haben, hängt dieser mehr von der Gutartigkeit des Falles, als von der grossen Wirksamkeit der Abortivmethode ab.”

XIV.

Die blutige Naht bei Amputationsstumpfen hat durchaus keine Nachtheile, wenn man sie, wie dies überall geschehen sollte, auf die Haut beschränkt, und niemals Muskelfasern mitfasst.

STROMEYER Max. d. Kriegsheilk.

XV.

Ubi fieri potest, epidermatoraphia suturae siccae praeferranda.

XVI.

Diaeta nutriens et medicamenta tonica, uti in plerisque ophthalmis commendant Angli, apud nostrates in genere non sunt adhibenda.

XVII.

Methodum incarcerationis herniae tollendae, quam ante aliquot annos loco herniotomiae proposuit SEUTIN, nequaquam admittendum censeo.

1910871
A 1052nd 8

XVIII.

Operationum radicalium hydroceles acquisitae, injectio optima.

XIX.

Recte STROMEYER (Hdb. der Heelk. Holl. vertal. p. 376). „In elk geval mogen slechts zoodanige aderspatten geopereerd worden, die zich op eene zeer begrensde plaats ontwikkeld hebben.”

XX.

Le succès des opérations depend de l'habileté du chirurgien.

SÉDILLOT.