



Quaestiones argumenti chirurgici

<https://hdl.handle.net/1874/301710>

96
40.

QUAESTIONES ARGUMENTI CHIRURGICI,

QUAS,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

PETRI HARTING,

MED. ET ART. OEST. DOCT. ET MATH. ET PHIL. NAT. PROF. ORD.,

NEC NON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

Pro Gradu Doctoratus,

SUMMISQUE IN

CHIRURGIA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS,

IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,

DEFENDET

GUilielmus Marius Gunning,

Hornanus.


MEDICINAE DOCTOR.

A. D. XXV, M. JANUARIJ, ANNI MDCCCLIX, HORA VIII DIMIDIATA.

TRAJECTI AD RILENUM.

P. W. VAN DE WEIJER TYPIS MANDAVIT.

MDCCCLIX.



THESES.

I.

Si dubitas de trepanatione instituenda ab ea
abstinere praestat.

II.

Exstirpatio totalis sola ranulae cura efficax.

III.

In hydrope ascite a paracentesi abdominis quam-
diu fieri potest abstinentum.

IV.

Recte ROSER (Handb. der Anat. Chir. 3^{te} Aufl. p. 306) de herniotomia instituenda: »im Allgemeinen wird die Regel gelten müssen, dass man erst den *aussern Bruchschnitt* mache, und sofort, wenn damit der Zweck nicht erreicht wird, die Eröffnung des Bruchsacks und die Erweiterung des Bruchsackhalses vornehme.”

V.

In hydrocele congenita ab omni operatione
abstinendum.

VI.

Usus tam internus quam externus liquoris Fowleri
in multis exanthematibus chronicis quam maxime
laudandus.

VII.

Non facio cum LINHART ubi (Oper. Chir. p. 17)
de ferri candardis usu perhibet: »zum Wohle des

Menschen hat diese Ausgeburt der alten Humoralpathologie in der neuesten Zeit einen tödtlichen Stoss erhalten."

VIII.

Aetas juvenilis lithothritiam non contraindicat.

IX.

Differentiam geneticam ulceris syphiliticum molle (chancre mou) inter et durum (chancre induré) nego.

X.

Induratio ulceris syphilitici symptoma secundarium non est.

XI.

Quae de syphilisatione hucusque experientia docuit, hacce curandi methodo, nisi ultimo refugio, uti vetant.

XII.

Mercurialia in syphilide, in primis constitutionali,
non nisi cautissime adhibenda.

XIII.

Frigus, dummodo continue adhibetur, optimum
orchitidis et epidydimitidis acutae remedium.

XIV.

Es giebt vielleicht keinen chirurgischen Kunstgriff, welcher so lediglich durch Uebung erlernt werden kann, ja erlernt werden muss, als die Einführung des Catheters (LINHART).

XV.

Non facio cum iis, qui exarticulationem pedis,
secundum PIROGOFF, methodo secundum SYME
universe praferendam censem.

XVI.

Laryngoscopium GARCIAE ad cognoscendos laryngis morbos magni pretii est habendus.

XVII.

Minus recte HYRTL (Topogr. Anat. 3^e Ausg. S. 169) „Beginnender Hydrocephalus wird symptomatische Myopie bedingen.”

XVIII.

Amblyopiae interdum morbum Brightii comitanti, praeter varias retinae affectiones, saepe alia quae-dam causa (uraemia?) subest.

XIX.

Operatio cataractae per reclinacionem, perpaucis exceptis casibus ubi alia methodus adhiberi nequit, plane relinquenda.

10

XX.

In curandis oculorum morbis, rationem habere totius corporis conditionis, ne negligatur.

XXI.

Ut de aliis, ita in primis de operationibus in oculum instituendis valet: »sat cito si sat bene».

XXII.

»Chirurgus nulli methodo tenaciter adhaereat, at singulis pro re nata uti sciatur" (HANLO).
