



Theses inaugurales argumenti obstetricii

<https://hdl.handle.net/1874/303865>

THESES
ARGUMENTI OBSTETRICII.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1800

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1800

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1800

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1800

25

THESES
ARGUMENTI OBSTETRICII,

QUAS,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

LUDOVICI CHRISTIANI VAN GOUDOEVER,

MED. CHIR. ET ART. OBST. DOCT. ET PROF. ORD.,

NEC NON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

Pro Gradu Doctoratus

SUMMISQUE IN

ARTE OBSTETRICIA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,

ERUDITORUM EXAMINI SUBMITTIT

ALEXANDER HENDRICUS CONRADUS VAN DRIEL,

e pago Voorst,

MED. DOCTOR.

A. D. IX M. DECEMBRIS, A. MDCCCLVII, HORA VII.



Trajecti ad Rhenum,

APUD L. E. BOSCH ET FILIUM,

MDCCCLVII.

THESES

THEO MEDICAL OBSERVATIONS

ANNUAL REPORT

OF THE

UNIVERSITY OF

THE

STATE

OF

AND

OF

THE

OF

THE

III

THE

THESES.

I.

Recte CAZEAUX: "La formation des corps jaunes succède toujours à la rupture d'une vésicule de GRAAF, et celle-ci étant le plus souvent spontanée, il est évident que les médecins-légistes ont eu tort de considérer leur existence dans l'ovaire comme l'indice certain d'une fécondation."

II.

Menstrua purgatio sequela est evolutionis vesiculae Graafianae.

III.

Vera menstrua durante graviditate obtinere non possunt.

IV.

Manus optimum pelvimetrum.

V.

Recte CAZEAUX: „Le doigt s'allonge par l'habitude du toucher.”

VI.

„Die Aufstellung einer Ovarial-schwangerschaft halten wir für noch nicht zureichend begründet.”

KIWISCH VON ROTTERAU.

VII.

Capitis praevii frequentia tantum hujus partis gravitati tribuenda.

VIII.

Abortum provocare licet.

IX.

Usus secalis cornuti, ostio uteri nondum aperto, nocet.

X.

In partu naturali anaesthesia artificialis penitus rejicienda.

XI.

Chloridi formyli inhalationes in eclampsia nequam semper commendandae sunt.

XII.

Errant, qui vim forcipis dynamicam negent.

XIII.

Si funiculus umbilicalis prolapsus reponi nequeat, partus, si fieri potest, quam citissime absolvendus est.

XIV.

In gravi haemorrhagia ex placenta praevia colpeu-
rynter optimum refugium est.

XV.

Perforatio placentae praeviae rejicienda est.

XVI.

Mutilatio foetus vivi sectioni caesareae non praefere-
nda est.

XVII.

Matris conservandae causa non licet caput foetus
vivi perforare.

XVIII.

Synchondrotomia prorsus rejicienda.

XIX.

Non concedo Cl. KIWISCH dicenti: „Die wir (die Perinaealrisse), wenn sie etwas beträchtlicher sind, immer gleich nach ihrer Entstehung blutig zu vereinigen rathen.“

XX.

Pro cauterio cavo uteri adhibendo lapis infernalis in substantia ipsius solutioni praeferendus est.

XXI.

„Un enfant n'a besoin que de lait dans les premiers mois qui suivent la naissance.“

BOUCHUT.

