



Theses argumenti obstetricii

<https://hdl.handle.net/1874/303871>

THESES ARGUMENTI OBSTETRICII.

THESES
ARGUMENTI OBSTETRICII,

QUAS,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

LUDOVICI CHRISTIANI VAN GOUDOEVER,

MED. CHIR. ET ART. OBST. DOCT. ET PROF. ORD.,

NEC NON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

Pro Gradu Doctoratus

SUMMISQUE IN

ARTE OBSTETRICIA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,

ERUDITORUM EXAMINI SUBMITTIT

ABRAHAMUS FRIDERICUS VAN WAGENINGE,

Roterodamensis,

MED. ET CHIR. DOCTOR.

A. D. XXII M. DECEMBRIS, A. MDCCCLVII, HORA VII DIMIDIATA.



Trajeti ad Rhenum,

APUD L. E. BOSCH ET FILIUM,

MDCCCLVII.

ЛІБАНІ
ПОДАВАТИ

СІРУМ СІРУМ СІРУМ СІРУМ

THESES ARGUMENTI OBSTETRICII.

I.

Uteri expansio in graviditate non est explicanda
vi mechanica.

II.

„Jede gesunde Mutter, deren Brüste zum Stillen
tauglich sind, sollte ihr Kind selbst säugen.“

NAEGELE.

III.

Placenta numquam in utero remaneat.

IV.

Methodus sectionis caesareae instituendae a DELEU-
RYE commendata praestat omnibus aliis operandi me-
thodis.

V.

In sectione caesarea placenta per vulnus removeatur.

VI.

Perforatio foetus capitis cephalotripsyiae praecedere
debet.

VII.

Errat honestissima matrona LACHAPELLE quae
pelvim justas dimensiones habere credit, si digitus
index obstetricatoris promontorium tangere nequit.

VIII.

Non adest pelvimeter ad omnes dimensiones in
femina viva rite indicandas aptus.

IX.

Unguenti de extracto belladonnae usus in colli
uteri spasmo est rejiciendus.

X.

Ea pelvis deformitas, quae formam oblique ovatam praese fert, merito a Cl. NAEGELE vitium primae conformatioonis habetur.

XI.

Placentam praeviam perforari non licet.

XII.

Recte HOHL de membranarum perforatione in partu praecipitato: „Wir halten dies Verfahren für zwecklos, selbst gefährlich, daher für verwerflich.”

XIII.

In ruptura perinaei sutura sicca, quae dicitur, collodii ope, suturae cruentae praferenda.

XIV.

Non assentior Cl. FRERICHS dicenti, veram eclampsiam parturientium semper sequelam morbi Brightii esse.

XV.

Venae sectio ad praecavendum abortum instituenda est tempore mensium fluxui respondentem.

XVI.

Abortum provocare licet in retroversione uteri,
quac reponi non possit.