



# Theses inaugurales argumenti chirurgici

<https://hdl.handle.net/1874/303876>

THESES INAUGURALES  
ARGUMENTI CHIRURGICI.

THE  
TREATISE

OF THE  
ARTS

AND  
MISCELLANEOUS

ESSAYS

BY  
JAMES

SMITH

ESQ.

THESES INAUGURALES  
ARGUMENTI CHIRURGICI,

QUAS,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

LUDOVICI CHRISTIANI VAN GOUDOEVER,

MED. CHIR. ET ART. OBST. DOCT. ET PROF. ORD.,

NEC NON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS JURIDICAE DECRETO,

Pro Gradu Doctoratus

SUMMISQUE IN

ARTE CHIRURGICA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,

ERUDITORUM EXAMINI SUBMITTIT

**ADRIANUS HENRICUS TELJER,**

MED. ET ART. OBST. DOCTOR.

e pago Jupphaas.

A. D. IX M. MARTII, A. MDCCCLVIII, HORA VI.



Trajecti ad Rhenum,

APUD L. E. BOSCH ET FILIUM.

MDCCCLVIII.

THESE PROVERBS  
FIRST PART

THESE PROVERBS  
OF THE  
FIRST PART

THESE PROVERBS  
OF THE  
FIRST PART

THESE PROVERBS  
OF THE  
FIRST PART

THESE PROVERBS  
OF THE  
FIRST PART

THESE PROVERBS  
OF THE  
FIRST PART

THESE PROVERBS  
OF THE  
FIRST PART

T H E S E S.



I.

Nulla inflammatio chronica sine complicatione.

II.

In ulceribus curandis maxime est respiciendum ad constitutionem aegri.

III.

Ad sanationem ulceris profundi nihil magis necessarium videtur, quam ut puri liber exitus concedatur.

IV.

Abscessus per congestionem, qui dicuntur, interdum aperiendi sunt.

V.

In panaritio, etiam incipiente, scalpellus praecipuum est artis auxilium.

VI.

Carcinoma non est morbus localis.

VII.

\*  
"The vulgar and mischievous habit of bleeding patients immediately after an *injury*, before they have recovered from a state of faintness and depression, needs only to be mentioned to be condemned."

DRUITT.

VIII.

Paracentesis vesicae supra symphysin ossium pubis instituenda est.

IX.

In herniarum incarcerationatione epithemata glaciata tepidis cataplasmatibus praeferenda sunt.

X.

Methodus herniotomiae, quam proposuit Clar. Petit, rejicienda videtur.

XI.

In herniae incarcerationis inflammatoria, herniotomia quam citissime instituenda est.

XII.

Cauterisatio, quae dicitur, in urethrae stricturis rejicienda est, dilatatio per cereolos ceteris curandi methodis praefenda.

XIII.

Amputatio penis deligationi praefenda.

XIV.

Recte Linhart. de varicoceles curatione: "Am wenigsten gefährlich und den Bedingungen einer Besserung am meisten entsprechend sind die Compression und subcutane Ligatur."

XV.

"Jedenfalls dürfen nur solche Varices operirt werden, die sich auf eine ganz begrenzte Weise entwickelt haben."

STROMEYER.



XVI.

Ani fistularum curatio per injectiones tincturae iodii  
semper tentanda est.

XVII.

Ad felicem ophthalmiae curationem causarum cog-  
nitio maximi momenti est.

XVIII.

Excisio, optima methodus est ad curandas ranulas.

XIX.

Trepanatio prophylactica rejicienda.

XX.

Methodus exarticulationis pedis, quam Pirogoff  
proposuit, methodo Symianae praeferenda mihi videtur.