




# Theses argumenti chirurgici

<https://hdl.handle.net/1874/310835>

THESES ARGUMENTI CHIRURGICI.



5

THESES ARGUMENTI CHIRURGICI  
Q U A S  
ANNUENTE SUMMO NUMINE

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

LUDOVICUS GERARDUS VISSCHER,

PHIL. THEOR. MAG. LITT. HUM. DOCT. ET PROF. ORD.,

NEC NON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

**Pro Gradu Doctoratus,**

SUMMISQUE IN

CHIRURGIA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,

ERUDITORUM EXAMINI SUBMITTIT

HENRICUS FRANCISCUS THIJSSEN,

MED. DOCT.

Amstelodamensis.


A. D. XIX MAII A. MDCCCLVI, HORA VI.



AMSTELODAMI.

APUD C. G. VAN DER POST.

MDCCCLVI.



---

## THESES.

---

### I.

In amputatione partis cruris supremæ fibulae ossis, pars remanens numquam exstirpetur.

### II.

Lithotritia, quamvis iterata vice instituenda sit, cuius sectioni tamen præferenda est.

### III.

Arteriae popliteae aneurysma, satis utpote frequens, causam anatomico-mechanicam accusare videtur.

### IV.

Digiti amputatione (ex articulo metacarpo-phalangeo) peractâ, extremitas articularis ossis metacarpi, prorsus resecetur, non opus est.

—  
V.

Tibiae resectionem (in articulatione genu) totius cruris amputationi postponendam censeo.

VI.

Chirurgus, qui partes amovendas strangulare vel constringere sibi proponit, moniti Cl. MAJOR (Lansonensis), memor esto: „qui trop embrasse, mal étreint.”

VII.

Facio cum celeb. MALGAIGNE de methodo a PORTAL in omni amputatione commendata; (quoad musculorum sectionem spectet): „Il est digne de remarque que tous les écrivains ont admis le principe comme fondé, et que la plupart ont rejeté le procédé.” (Méd. operat.)

VIII.

Rectissime FREDERICUS SKELJ, de labii leporini operandi methodo agens: „Young operators are prone to remove too little.” (Operat. Surgery. p. 430).

IX.

Imprudenter MONRO saccum herniosum non aperiendum contendit, in operatione herniae incarce-

ratae, sed cum intestini et omenti parte (si forte exierit) in abdominis cavum reducendum esse.

#### X.

Recte SKEIJ de variis tumoribus cum aneurysmate carotideo facile confundendis: „The real disease is rarely mistaken, diseases simulating it frequently.” o. l. p. 248.

#### XI.

Bene Cl. HYRTL, de operationibus, dictis cheiloplasticis, agens: „Die Lippenbildungen sehen nach gemachter Operation ganz leidlich aus, und man beeilt sich daher gewöhnlich die Leute so früh als möglich, als geheilt zu entlassen.

#### XII.

Fractura cranii cum impressione, non semper requirit trepanationem.

#### XIII.

Aurea verba Cl. HYRTL: „Auch Kleinigkeiten können für den Chirurgen von Werth sein, — denn jede grosse Operation ist nur eine Succession vieler kleinen.



—  
XIV.

Exceptis sternomastoideo musculo et tendine  
Achillis, musculi contracti non secandi sunt.

XV.

Adversus ulcera chronica optimum PINDARI prae-  
ceptum: „ἀριστον μὲν ὕδωρ.”

(Olymp. I.)