



Theses inaugurales argumenti chirurgici

<https://hdl.handle.net/1874/311543>

THESES INAUGURALES
ARGUMENTI CHIRURGICI.

32.

THESES INAUGURALES
ARGUMENTI CHIRURGICI,

QUAS

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

LUDOVICI GERARDI VISSCHER,

PHIL. THEOR. MAG. LITT. HUM. DOCT. ET PROF. ORD.,

NEC NON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU,

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

Pro Gradu Doctoratus

SUMMISQUE IN

CHIRURGIA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,

ERUDITORUM EXAMINI SUBMITTIT

JOANNES GEORGIUS MARIA HANLO,

Amstelodamensis.

Medicinae Doctor.

DIE XXI MENSIS MARTIS ANNI MDCCCLVII. HORA V.



AMSTELODAMI,

APUD C. G. VAN DER POST.

MDCCCLVII.

T H E S E S.



I.

Non facio cum Cl. Roser (Archiv für Phys. Heilk. H. 3, p. 355, Jahrg. 1856) ubi dicit „Die Brucheingklemmung beruht wesentlich auf einem Klappenmechanismus.“

II.

Methodus aneurysmatis curandi nuper a doct. Fergusson proposita, qua sacci aneurysmatici parietes, digitorum ope fortiter confricantur, („treatment by manipulation“) rejicienda.

III.

Paracentesis thoracis, nisi mox post factam exsudationem, instituatur, remedium anceps.

IV.

Bubones suppurantes ne cultro aperiantur.

V.

Recte Cl. Malgaigne (Med. Operat. p. 718) de operatione fistulae vesico-vaginalis. „Mais la méthode vraiment rationnelle, celle qui offre aujourd'hui le plus d'efficacité et la seule qui mérite d'être appliquée dans tous les cas de fistules d'un calibre notable, c'est la suture par le procédé de Jobert.”

VI.

Anaesthesia in parte singula frigore facta, ubi locum obtinere potest, anaesthesiae universali, per chloroformum, praeferenda.

VII.

Prolapsus uteri hostis est hucusque invictus.

VIII.

In concrezione digitorum congenita, operatio plastica, solum efficax remedium.

IX.

Recte Cl. Roser (Anat. Chir. p. 259) „Da man es in den meisten Fällen nicht wissen kann, an welcher Stelle der Sitz der Einklemmung ist, so wird es als Regel gelten müssen, dass man erst den äusseren Bruchschnitt mache, und sofort, wenn damit der Zweck nicht erreicht wird, die Eröffnung des Bruchsacks und die Erweiterung des Bruchsackhalses vornehme.”

X.

Ad vesicam urinariam perforandam, si fieri possit, adhibeatur paracenterium tenuius quod acum triquetram exploratoriam vocant.

XI.

Circa urethrotomiam, externam nempe aut internam, valeat illud „suum cuique;” neque haec prae illa aut laudetur aut damnetur.

XII.

Recte Linhart in capite de venaesectione (Comp. der Chir. Oper. p. 139) „Der Schnäpper ist ein so unsicheres Instrument, dass es zu wünschen wäre er käme ganz ausser Gebrauch.

XIII.

In periostitide femoris acuta incisio profunda mature instituatur.

XIV.

Incisio testis in orchitide acuta, quam proposuit Vidal, inutilis habenda est.

XV.

In orchitide chronica aut subacuta involutiones Frickianae optimum sistunt remedium.

XVI.

In hydrocele congenita injectio rejicienda est.

XVII.

Carcinomatis diagnosis nitatur cum experientia clinica tum examine anatomico.

XVIII.

Instrumentum nuper a Chassaignac inventum cui nomen „Écraseur lineaire” in armamentario chirurgico dignum occupet locum.

XIX.

Ad extractionem lentis keratotomia superior inferiori praeferatur.

XX.

Iridodialysis iridectomiae postponenda.

XXI.

Chirurgus nulli methodo tenaciter adhaereat, at singulis pro re nata uti sciat.



