




Quaestiones argumenti obstetricii

<https://hdl.handle.net/1874/312633>

QUAESTIONES
ARGUMENTI OBSTETRICII.



QUAESTIONES
ARGUMENTI OBSTETRICII,

QUAS,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

JACOBI VAN HALL,

ORD. LEON. NEDERL. EQUITIS, ORD. CORON. QUERN. DECURIONIS
JUR. ROM. ET HOD. DOCT. ET PROF. ORD.,

NEC NON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

Pro Gradu Doctoratus,

SUMMISQUE IN ARTE OBSTETRICIA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS,

IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,

DEFENDET


QUIRINUS JOHANNES MARIUS JANSSEN,
Gusanus.

MEDICINAE DOCTOR.

A. D. XXIII. M. JUNII A. MDCCCLV, HORA VI.

TRAJECTI AD RHENUM
P. W. VAN DE WEIJER
TYPIS MANDAVIT.

MDCCCLV.



THESES.

I.

Ictu cordis infantis non percepto, graviditatem abesse concludere non possumus.

II.

Expansio uteri gravidi non ovulo crescenti, verum proprio substantiae incremento est tribuenda.

III.

Abortus prognosis mense tertio et quarto semper dubia est.

IV.

Abortus sequela morbi acuti saepe solutionem faustum affectionibus inflammatoriis afferit.

V.

Vagina in partu revera suum confert, ut contractionibus expellatur foetus.

VI.

Partus praematurus cereola uteri parietem inter et velementa ovi introducta optime provocatur.

VII.

Universae membranae doloribus tantum debilibus praesentibus non rumpendae sunt.

VIII.

Recte dicit Gazeaux: Car ce n'est pas parce que le placenta est inseré sur l'orifice interne, mais bien parcequ'il est en rapport avec le tiers inférieur de l'uterus, que l'hémorragie survient pendant les derniers mois de la grossesse.

IX.

Funiculo umbilicali simul cum capite praevio, applicatio forcipis plerumque praefenda versioni.

X.

Sectio caesarea non nisi consentiente matre, instituenda est.

XI.

Nimia et subita extensio ventris gravidarum ad haemorrhagiam internam diagnoscendam praecipuum est signum.

XII.

Recte dicit Weidmann: Si sectione caesarea vita matris quidem magis periclitetur, saltem illa foetus secura est. Synchondrotomia neutram tutam praestat.

XIII.

Extractio placentae non semper subito post partum est instituenda, nec ab altera parte

eius expulsio nimis diu naturae est relinquentia.

XIV.

Perforatione indicata, omnia conamina fortiora ad partum forcipis ope terminandum, rejicienda sunt.

XV.

Optimum haemostaticum in haemorrhagiis parturientium saepe exhibet partus artificialis.
