



Quaestiones argumenti obstetricii

<https://hdl.handle.net/1874/313769>

15

QUAESTIONES
ARGUMENTI OBSTETRICII,
QUAS,
ANNUENTE SUMMO NUMINE,
EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI
HENRICI EGBERTI VINKE,
THEOL. DOCT. ET PROF. ORD.,
NEC NON
AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU
ET
NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,
PRO GRADU DOCTORATUS

SUMMISQUE IN
ARTE OBSTETRICIA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS
IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA
RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,
DEFENDET

STEPHANUS DANIEL CARTIER VAN DISSEL, J^{FIL.},
MED. DOCT.

e pago Winterswijk.

A. D. XXVIII M. NOVEMBRIS A. MDCCCLIV, HORA VI.



AMSTELODAMI,
APUD C. G. VAN DER POST.
MDCCCLIV.

T H E S E S.

I.

Contractiones uteri non a fundo incipiunt.

II.

Pelvis inclinatio etiamsi debito major partui impedimenta non praebet.

III.

Dari potest superfoetatio.

IV.

Inter varia criteria ad lactis materni virtutem dijudicandam allata, licet ambigua omnia, caeteris tamen certiora sunt ea, quae tum chemica analysis cum indagatio microscopica praebet.

V.

In gravidis nulla adhibeantur pessaria.

VI.

Incrementum aut decrementum conjugatae primae in pelvi rhachitica pendet tum a gradu morbi praegressi, cum ab aetate qua ortus fuerit.

VII.

Inter criteria, quibus diagnosis pelvis oblique ovatae statui potest, maximam fidem meretur exploratio interna, quippe quae distantiam inter utramque spinam ossis ischii et sacri curvaturam denotat.

VIII.

Ea pelvis deformatio, qua formam oblique ovatam prae se fert, immerito a Cl. Naegele vitium primae conformationis habetur.

IX.

Ex loco, ubi audiuntur ictus cordis foetus, nulla ad foetus situm, ex eorum absentia nulla ad ejus mortem fiat conclusio.

1905949

—
X.

In curando uteri spasmō tonico aut clonico inhalationes Chloridi formyli nec non Aetheris sulphurici, a recentioribus commendatae, rejiciendae sunt.

XI.

In ostiū uteri spasmō incisio ultimum refugium.

XII.

Ubi placenta praevia est, obturamentum non juvat nisi praevium sit caput.

XIII.

In retentione placentae nequaquam fiant in venam umbilicalem injectiones.

XIV.

Methodum partus praematuri artificialis provocandi, nuper a Cl. Scanzoni commendatam, non admittendam esse censeo.

XV.

Recte Doct. L. Lehmann (Tijdschr. t. bev. d. Geneesk., 1^e jaarg., Mei 1850, pag. 124.) "Waar door verkleining van het kind de verlossing nog mogelijk is, is aan deze onbepaald de voorkeur boven de Keizersnede te geven; te meer daar vroegtijdig verwekte baring toelaat in eene volgende zwangerschap het leven van beide te redden."

XVI.

Versio in caput versioni in pedes nunquam praeferenda.

XVII.

Ne mater tuberculosi pulmonum affecta infantem ipsa nutriet.

XVIII.

Intoxicatio uraemica, qualis a Cl. Frerichs ad eclampsiam parturientium explicandam in auxilium vocatur, minime valet.

XIX.

Inflammatio venae umbilicalis nequaquam originem icteri neonatorum explicat.

XX.

Cyanosis neonatorum ab atelectasi pulmonum plerumque pendet.
