



# Quaestiones argumenti obstetricii

<https://hdl.handle.net/1874/313784>

QUAESTIONES  
ARGUMENTI OBSTETRICII.



29

QUAESTIONES  
ARGUMENTI OBSTETRICII,

QUAS

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

HENRICI EGBERTI VINKE,

THEOL. DOCT. ET PROF. ORD.,

NEC NON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU,

ET

NOBILISSIMÆ FACULTATIS MEDICAE DECRETO

**Pro Gradu Doctoratus**

SUMMISQUE IN ARTE OBSTETRICIA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,


DEFENDET

**ANDREAS DONCAN,**

Ex oppido *Parmerend.*

MEDICINAE DOCTOR.

A. D. XXII. M. FEBRUARII ANNI MDCCCLV, HORA VI.



TRAJECTI AD RHENUM,  
P. W. VAN DE WELJER TYPIS MANDAVIT.



## THESES.

---

### I.

Ovulum non tantum in tuba Fallopii, sed ad ovarii quoque superficiem, quin in ipso uteri cavo foecundari potest.

### II.

Partus praecipitatus nullo modo retineri potest.

### III.

Errant qui in gravidis sulfatis chinini administrationem dissuadent.

## IV.

Omnis curatio radicalis varicum durante graviditate rejicienda.

## V.

Quelle qu'en soit la cause, l'hydropisie des femmes enceintes disparaît en général assez rapidement après l'accouchement.

## VI.

Immediata gravidarum auscultatio est rejicienda.

## VII.

Nimia uteri distentio saepe contractiones intempestivas atque abortum producunt.

## VIII.

Abortum provocare non licet.

## IX.

Synchondrotomia prorsus rejicienda.

## X.

Unguenti de extracto Belladonnae usus in colli uteri spasma est rejiciendus.

## XI.

In neonatis vesicatoria sunt rejicienda.

## XII.

Sectionis Caesariae eventus infelices pro parte saltem inde repetendi sunt, quod operatio non justo tempore instituat.

## XIII.

Versione peracta foetus expulsio naturae relinquenda.

## XIV.

Versio in pedes in omni casu versioni in caput praefenda.

## XV.

In gemellorum partu alterius foetus situ

vitiato versione indicata, versio differenda est donec dolores redierint.

### XVI.

Funiculus prolapsus nunquam reponendus, sed partus artis auxilio absolvendus.

### XVII.

In situ foetus transverso altero brachio descenso saepius prodest alterum detrahere.

### XVIII.

Secalis cornuti usus ad dolores provocandos rejiciendus.

### XIX.

In metrorrhagia post partum longe melius est manum in uterum inducere quam injectiones adhibere.

---