



Quaestiones argumenti obstetricii

<https://hdl.handle.net/1874/313786>

QUAESTIONES
ARGUMENTI OBSTETRICII.

QUAESTIONES
ARGUMENTI OBSTETRICII,

QUAS,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

HENRICI EGBERTI VINKE,

THEOL. DOCT. ET PROF. ORD.,

NEC NON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

Pro Gradu Doctoratus,

SUMMISQUE IN ARTE OBSTETRICIA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS,

IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA,

RITE AC LEGITIME CONSEQUENDIS,

ERUDITORUM EXAMINI SUBMITTIT

GERARDUS ANDREAS ALPHERTS,

Culemborgensis,

MEDICINAE DOCTOR.

A. D. XIII M. MARTII A. MDCCCLV, HORA VI.

TRAJECTI AD RHENUM
P. W. VAN DE WEIJER
TYPIS MANDAVIT.
MDCCCLV.

THESES.

I.

Perverse Montgomery dicit >que le corps luteum est complètement développé, quand s'opère la rupture vésiculaire et l'expulsion de l'ovule.

II.

Gemella graviditas abortui favet.

III.

Abortus etiam spermate vitiato produci potest.

IV.

Metrorrhagia, membranis intactis, uteri contractione aucta, non semper est ex placenta praevia.

V.

Symphyseotomia plane dissuadenda est.

VI.

Non facio cum illis, qui indiscriminatim dicunt: »Versione peracta, foetus expulsio naturae relinquenda.”

VII.

Errant, qui funiculum prolapsum nunquam reponendum esse docent.

VIII.

Partus praematurus arte provocatus sectioni caesareae praferendus est.

IX.

In partu gemello secundarum cura maximum requirit prudentiam.

X.

Mutilatio foetus sectioni caesareae praefenda est.

XI.

Ad partum praematurum provocandum, spongiae praeparatae introductio membranarum perforationi praferenda est.

XII.

Secalis cornuti tanquam ecbolici administratio non rejicienda.

XIII.

In eclampsia puerarum partus optimum est remedium.

XIV.

Non facio cum Berndtio, utero rupto, injectiones commendante.

XV.

Capite infantis partu laborioso distorto, vim mechanicam adhibere, quae formam normalem restituat, periculosum est.

XVI.

Purgantium administratio ad meconium eva-
cuandum reprobari debet.

XVII.

Primiparae atque hystericae in primis ad
eclampsiam sunt dispositae.

XVIII.

Febris puerperalis pyaemica, quae dicitur,
perverse ita vocatur.

XIX.

Phlegmasia alba dolens plures amplectitur
morborum species.

XX.

Phlebitis et lymphangeitis in febre puer-
perali sunt inflammations secundariae.

