



# Theses obstetriciae inaugurales

<https://hdl.handle.net/1874/313790>

**T H E S E S**  
**OBSTETRICIAE INAUGURALES,**

QUAS,

FAVENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

**HENRICI EGBERTI VINKE,**

THEOL. DOCT. ET PROF. ORD.,

NEC NON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

*Pro Gradu Doctoratus*

SUMMISQUE IN ARTE OBSTETRICIA HONORIBUS ET PRIVILEGIIS,

IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA,

RITE AC LEGITIME CONSEQUENDIS,

ERUDITORUM EXAMINI SUBMITTIT

**CORNELIUS JACOBUS PHILIPPUS WINKLER,**

MEDICINAE DOCTOR,

VIANENSIS.

AD DIEM XXIV MENSIS MARTII, ANNI MDCCCLV, HORA VII.

---

VIANAE,

*Apud G. S. A. STUART.*

MDCCCLV.

# THESES OBSTETRICIAE INAUGURALES.



## I.

Nunquam fere magis periclitatur fama medici quam ubi agitur de graviditate determinanda.

VAN SWIETEN.

## II.

Egregie ROEDERER: praecipua artis obstetriciae praxis circa explorationem versatur, cuius quidem frequens exercitatio satis commendari nequit.

## III.

Uteri contractio motus est per reflexum.

## IV.

Uteri contractiones pro maxima parte nervi sympathici systemati tribuendae.

## V.

Non cessat catameniarum activitas durante graviditate.

## VI.

Glandulae sic dictae Montgomerianae tumescentes in primiparis certum fere graviditatis signum.

## VII.

Fercipis vim dynamicam defendo.

## VIII.

Vecti obstetricio tuto carere possumus.

## IX.

Capitis praevii frequentia non tantum hujus partis gravitati tribuenda.

## X.

In pelvis angustia forcipis usus praestat versioni in pedes.

## XI.

Parenchymatis uteri atonia praecipua causa situs foetus vitiosi est habenda.

## XII.

Versio in caput non rejicienda est.

## XIII.

Licet abortum provocare.

## XIV.

Sola uteri haemorrhagia placentam statim solvere indicat.

## XV.

In versione melius mihi videtur utrumque pedem arripere quam unum tantum.

## XVI.

Manualis ostii uteri dilatatio in genere rejicienda.

## XVII.

Caput foetus optimum est haemostaticum in placenta praevia.

## XVIII.

Nie entschliesse man sich (bei Placenta praevia) zur Vornahme der gewaltsamen Entbindung, wenn sich die Schwangere in Folge der vorausgegangenen, heftigen Blütung in dem höchsten Grade von Schwäche und Anämie befindet, völlig erschöpft, puls- und bewusstlos ist.

SCANZONI.

## XIX.

Lineae albae incisio praevallet omnibus aliis sectionis caesareae instituendae methodis.

## XX.

In partu arte praemature provocando methodus Cl. KIRWISCH optimum praebet auxilium.

## XXI.

Peritonitis puerperalis ex utero originem trahit.

## XXII.

Cum largis sanguinis detractionibus in eclampsia parturientium caute mercandum.

