



Theses obstetriciae inaugurales

<https://hdl.handle.net/1874/313791>

THESES OBSTETRICIAE INAUGURALES.

T H E S E S
OBSTETRICIAE INAUGURALES,

QUAS,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

HENRICI EGBERTI VINKE,

THEOL. DOCT. ET PROF. ORD.,

NEC NON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

Pro Gradu Doctoratus

SUMMISQUE IN

ARTE OBSTETRICIA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS,

IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA,

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,

DEFENDET

**Emilius Rudolphius Von Eichstorff,
e Pago Winterswijk.**

A. D. XXIV M. MARTII ANNI MDCCCLV, HORA VIII POST MERIDIEM.

TRAJECTI AD RHENUM,
TYPIS GIEBEN & DUMONT.

MDCCCLV.

T H E S S.

I.

Sanguinis mutationes in gravidis e respiratione turbata
repetendae sunt.

II.

Bene auscultare obstetricatori summi momenti habendum.

III.

Sonus uterinus, quem vocant, non producitur in vasis
ad placentam pertinentibus, vel ex ea redeuntibus; ple-

rumque oritur in arteriis vel in venis uterinis, rariori autem casu quoque extra uterus produci potest.

IV.

L'hydraemie est, chez les femmes enceintes, la cause la plus fréquente des troubles fonctionnels attribués jusqu'à présent à la pléthore.

CAZEAUX.

V.

Graviditas administrationem remediorum antisyphiliticorum non vetat.

VI.

Non licet in eadem femina, pelvem nimis angustam habente, bis abortum provocare.

VII.

Liquore amnii defluxo atque utero foetum fortiter circumdante, secale cornutum numquam administretur.

VIII.

Funiculo prolapso partus terminandus est.

IX.

Qui forcipem ante completam capitum extractionem amo-
vendam esse docent, non audiendi.

X.

Vectis ad positionem capitum emendandam optimum
instrumentum.

XI.

Versio in caput versioni in pedes semper praeferri
meretur.

XII.

Versione instituta praestat extrahere foetum, quam ex-
pulsionem naturae relinquere.

XIII.

Placentae partes in utero relictas statim amovere me-
lius est, quam exspectare donec symptomata morbosa orta
sint.

XIV.

In metrorrhagiis, e placenta praevia ortis, partus quam
ocissime terminetur.

XV.

In metrorrhagiis post partum omnis sanguis ex uteri
cavitate statim removeatur.

XVI.

In ruptura perinaei recenti, durante partu orta, ope-
ratio non indicata est.

XVII.

In febre puerperali, pyaemica dicta, depletiones sanguini-
nis universales non convenient.

XVIII.

Un trait commun aux divers genres de grossesses extra-
utérines, c'est de ne point exclure la possibilité d'une
nouvelle foecundation.



1906668

