



Dissertatio anatomica inauguralis de cerebri et medullae spinalis systemate vasorum capillari in statu sano et morbo

<https://hdl.handle.net/1874/319001>

DISSERTATIO ANATOMICA INAUGURALIS

CEREBRI ET MEDULLAE SPINALIS

SYSTEMATE VASORUM CAPILLARIUM

IN STATU SANO ET MORBOSO.

be in, de aliter in curandis unum multo singulis
sunt vasa, quibusdam, adhaerentibus, vasa, vasa
et est, sub, dicitur, a, habet, vasa, vasa, vasa, vasa,

DISSERTATIO ANATOMICA INAUGURALIS
FRANCISCI CORNELII BONDERS,

DS

CEREBRI ET MEDULLAE SPINALIS

SYSTEMATE VASORUM CAPILLARIUM

IN STATU SANO ET MORBOSO.

MEDICINA HONORIBUS ET PRIVILEGIIS
IN ACADEMIA ROTTERDAMIENSIS,

FRANCISCI CORNELII BONDERS,

MDCCCXXXIII.

IN ROTTERDAMI.

DISSERTATIO ANATOMICA INAUGURALIS

42

CEREBRI ET MEDULLAE SPINALIS
SYSTEMATE VASORUM CAPILLARIUM
IN STATU SANO ET MORBOSO.

MDCCCXXXIII

ANNUENTE SUMMO NUMINE

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

FRANCISCI CORNELII DONDEERS

MDCCCXXXIII

REC. MDC

ACADEMIAE RHENO-TRAJECTINAE

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO

PRO GRADU DOCTORATUS

SUMMISQUE IN

MEDICINA HONORIBUS ET PRIVILEGIIS

IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA

RITE AC LEGITIME CONSEQUENDIS

EXAMINI SUBMITTIT

EVERARDUS HENRICUS EKKER

RHENO-TRAJECTINUS

DIE XX. M. JANUARII A. MDCCCXXXIII. HORA V.

TRAJECTI AD RHENUM

EX OFFICINA TYPOGRAPHICAE GIBBERI ET DUMONT

MDCCCXXXIII

DISSERTATIO ANATOMICA INAUGURALIS

DE

CEREBRI ET MEDULLAE SPINALIS
SYSTEMATE VASORUM CAPILLARI
IN STATU SANO ET MORBOSO,

QUAM

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

FRANCISCI CORNELII DONDERS,

MED. DOCT. ET PROF. EXTRAORD.,

NEC NON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU

ET

NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

PRO GRADU DOCTORATUS,

SUMMISQUE IN

MEDICINA HONORIBUS ET PRIVILEGIIS

IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA,

RITE AC LEGITIME CONSEQUENDIS,

ERUDITORUM EXAMINI SUBMITTIT

EVERARDUS HENRICUS EKKER,

RHENO-TRAJECTINUS.

DIE XX M. JANUARIJ A. MDCCCLIII, HORA V.

TRAJECTI AD RHENUM,

EX OFFICINA TYPOGRAPHICA GIEBEN ET DUMONT.

MDCCCLIII.

DISSERTATIO ANATOMICA IN VASCULIS

CEREBRI ET MEDULLAE SPINALIS

SYSTEMATE VASORUM CAPILLARUM

IN STATU SAÑO ET MORBOSO.

AVIAE

ANNO DOMINI MDCCCXXXIII

MDCCCXXXIII

FRANCISCI CORNELLII BONDERS,

MDCCCXXXIII

MDCCCXXXIII

PARENTIBUS OPTIMIS CARISSIMIS

MDCCCXXXIII

AGGREGATAE FACULTATIS MEDICAE DEGRINGAE

PRO GRADU DOCTORATUS,

MDCCCXXXIII

MEDICINA HONORIBUS ET PRIVILEGIIS

IN ACADEMIA HENNO-TRALLECTINA,

MDCCCXXXIII

HAEC STUDIORUM SUORUM PRIMITIIS

FRANCISCI CORNELLII BONDERS,

MDCCCXXXIII

MDCCCXXXIII

AUCTOR

TRABEIT AD HENNING

EX OFFICINA TYPOGRAPHICAE CLIMEN ET HENNING

MDCCCXXXIII

PARENTIBUS OPTIMIS CARISSIMIS

PRÆFATIO.

HASCE STUDIORUM SUORUM PRIMITIAS

PIO GRATOQUE ANIMO

D. D. D.

AUCTOR.

PARENTIBUS OPTIME CARISSIMIS

PRAEFATIO

Dubitanti mihi, quamnam speciemis, quo summo in Medicina honores petere, conscribendi eligere materiam, Promotor aestimatus mox persuasit, ut argumentum anatomicum, quod plurimum examine dignissima offereat ipsi videretur, subtiliorum systematis vasorum capillaris cerebri ac medullae rachideae et stratum tractarem. Quam autem re ipsa anatomicè exploranda jam occupatus essem, suadente Promotore, pars argumenti huius etiam pathologicae, quantum non retractanda, at leviter tamen adumbranda videbatur. Nec propterea exiguae meae vires in Expositis

PRAEFATIO.

Dubitanti mihi, quamnam speciminis, quo summos in Medicina honores peterem, conscribendi eligerem materiam, Promotor aestu- matissimus mox persuasit, ut argumentum anatomicum, quod plura examine dignissima offerre ipsi videretur, *subtiliorem syste- matis vasorum capillaris cerebri ac medullae indolem et struc- turam*, tractarem. Quum autem re ipsa anatomice exploranda jam occupatus essem, suadente Promotore, pars argumenti huius etiam pathologica, quamquam non pertractanda, at leviter tamen adum- branda videbatur. Nec profecto exiguas meas vires in exposi-

tione tam gravis materiae experiri ausus fuisset, nisi Clar. Promotor, Viro de anatomia atque histiologia ipse optime meritis, argumentum illud prae aliis mihi commendasset, suisque consiliis vires meas, ubi deficerent, sustentaturum se esset professus.

Vobis autem, Parentes dilectissimi, has studiorum meorum primitias, qualescunque tandem, dicendas esse statui. Neque enim Vobis ingratum fore persuasum mihi habui, si specimen hocce debita pietate Vobis dicarem, nec melius gratum animum erga Vos palam profiteri me posse censeo pro innumeris amoris caritatisque testimoniis, proque tantis beneficiis, quantis ab infantia tenerrima ad hunc usque diem semper me prosecuti estis. Utinam Deus O. M. diu posthac vitam Vestram mihi carissimam incolumem servet, ut magis magisque tot beneficiis me haud indignum fuisse Vobis probare mihi liceat!

Te imprimis, optime Pater, studiis academicis peractis, publice hic compellare me juvat, qui non tantum a prima inde pueritia

fidelissimus vitae dux mihi exististi, sed etiam meis litterarum studiis una cum Collegis tuis, Viris Doctissimis, quorum egregias institutionibus frui mihi licuit, praefuisti, neque postquam aliis doctrinis studium meum dare coepi, consiliis Tuis paternis mihi prodesse desiisti. Per multos in posterum etiam annos vitae meae dux et comes permanes, ex imo pectore filius gratus a Patre Omnipotente deprecor, ut hinc inde ad te perueniam, ut tibi in Vobis. Sed etiam Vobis, Viri Clarissimi, quoscuque Praeceptores per vitae academicae spatia salutare mihi licuit, gratias quam maximas agere hodie meum est; nam tum egregiae institutionis, tum benevolentiae Vestrae recordatio me admonet, quantum Vobis debeam! In primis Vos, Ordinis Medici Praeceptores, optime de me meriti, beneficia Vestra assidue largaque manu in me effudistis, quorum memoria gratissimum semper mihi animum conservet! Nominatim autem te compellare, Vir Clarissime SCHROEDER V. D. KOLK, dulce mihi est officium, qui Promotor aestimatissimus

alumno auxilii saepius indigenti doctrinae Tuae lucem nunquam non offerre voluisti. Eruditionis atque amicitiae Tuae documenta quam luculentissima in me redundarunt. Deus O. M. per longam etiam annorum seriem, Te, societatis et scientiae Decus, in salutem humani generis salvum servet!

Hac opportunitate liceat quoque mihi, gratias quam maximas Vobis agere, Clar. Praeceptor DONDERS, Clar. Vir WELLENBERGH Virique Doctissimi V. HASSELT, HEKMEYER et SCHUBART, qui variis nominibus benevolentiam Vestram erga me ostendistis, measque in animalibus investigationes mirum quantum adjuvistis!

Tandem Vobis valedicendum est, Amici, quotquot mihi aut in disciplinarum scholis aut in circulis privatis socii fuistis. Pergatis amicum me habere, uti ipsi mihi semper eodem amicitiae sensu vestri recordari animus est!

DISSERTATIONIS CONSPECTUS.

Inter amicos tamen liceat mihi dilectissimos illos compellare, quibuscum a remota inde pueritia arctissimis amicitiae vinculis ex quotidiana consuetudine conjunctus fui. Per decemium enim socii carissimae Societatis nostrae C. R. P. C. pulcherrimos vitae annos ad mutuum boni et decori cultum fruendos, animique et ingenii facultates etiam atque etiam exercendas et firmis principiis stabilendas curavimus. Nunquam mihi memoria delebitur inprimis posteriorum annorum, quum Almae Matris nostrae alumni, etsi variis doctrinarum scholis adscripti, consuetudine fere quotidiana juncti, vitae academicae gaudiis delectabamur, et studia nostra laeto amicitiae cultu excipiebamus! Valedicendi Vobis triste profecto mihi officium!

Quibus verbis denique Te alloquar, amicissimum HENRICUM FABIIUS, qui Medicinae campum una mecum intrasti, studiorum tuorum participem me non recusasti, ingenio et perseverantia tua vires meas toties labantes sustulisti, iisdem diebus atque ego solennes

DISSERTATIONIS CONSPECTUS

ex lege disquisitiones subiisti, imo hodie quoque mecum summos
in Medicina honores ambis! Ne putes, Te, quem ultimo loco
hic compello, ultimum inter amicos in pectore meo locum tenere;
persuasum potius sit Tibi, me quasi abhorruisse a necessitate Tibi
valēdicendi, quem per totam nostram vitam mecum victurum spe-
rassem, cuius quotidiana consuetudine nunquam carere dulcissimum
mihi somnium fuisset! Sed eheu! fata iniqua nos separari iusserunt.
Quocumque autem terrarum nos duxerit sors, amicitiae nostrae
sensus nunquam extinctum iri, ex intima animorum nostrorum
persuasione tuto statuerimus!

Valeatis Amici, meique memores vivite!

DISSERTATIONIS CONSPECTUS.

INTROITUS 1.

CAPUT I. Praecipuorum scriptorum de cerebri et medullae
systemate capillari sententiae. 3.

CAPUT II. Methodi nostrae expositio. 27.

CAPUT III. Anatomica vasorum cerebri et medullae capillarum
descriptio. 37.

 Universa descriptio 37.

 Vasorum in cortice cerebri et cerebelli descriptio. 45.

 Vasorum in corpore dentato atque olivari, in thalamo
 et corpore striato, in glandulis pituitaria et pi-
 neali descriptio. 51.

	Pag.
Vasorum in materie nigra, in ponte Varolii, in me-	
dulla oblongata atque medulla spinali descriptio.	57.
De gangliorum vasis.	62.
CAPUT IV. Observationes anatomico-pathologicae de cerebri va-	
sis sanguiferis.	65.
CAPUT V. Nonnullae animadversiones de narcoticorum in ce-	
rebrum et medullam vi.	93.

—

EX PARTE I. DE VASIS IN MATERIE NIGRA, IN PONTE VAROLII, IN MEDULLA OBLONGATA ATQUE MEDULLA SPINALI DESCRIBTI.

CAPIT. I.

DE VASIS IN MATERIE NIGRA.

§. I.

DE VASIS IN PONTE VAROLII.

§. I.

DE VASIS IN MEDULLA OBLONGATA.

§. I.

DE VASIS IN MEDULLA SPINALI.

§. I.

INTROITUS.

Nullum profecto corporis humani organon maioris momenti habendum quam systematis animalis nervi centrum, quippe quod non tantum omnium organismi humani systematum, verum etiam ingenii mentisque functionibus praeesse dici possit. Non mirum igitur, tot celeberrimos atque in re anatomica summos viros omni studio ad eius structuram subtiliorem indagandam animum intendisse, et quae haec indagatione invenerint, scriptis mandata, in posterum tempus conservanda curasse. Attamen mirandum, scrutatores illos, cum elementorum nerveorum inquisitioni maximam operam darent, studium matricis horum, systematis nempe vasculosi, fere prorsus neglexisse. Nonnulli quidem pristini nostrique saeculi scriptores vasa sanguifera cerebri magis minusve ample tractarunt, subtiliorem vero systematis vasorum capillaris tam in cerebro quam in medulla distributionem ac nexum nondum accurate exposuerunt.

Ex parte forsitan huius rei causa in difficultatibus quae-

renda, cum tali indagazione conjunctis, quia non nisi felicissima injectione rete illud microscopicum visus inquisitioni aptum se offert, quod tam raro et fere fortuna tantummodo juvante contingit.

Nunquam ergo mihi, studiorum primitias daturo, audacia fuisset argumentum tractandi, a quo vel peritissimi viri absterri visi sunt, nisi aestumatissimus meus Promotor, Vir Clar. J. L. C. SCHROEDER V. D. KOLK, aliam demonstrandi atque conservandi methodum adhibuisset, qua nobis contigit pulcherrima specimina, qualia ad hoc usque tempus nec verbis quisquam neque effigie descripsit, nancisci. Ex his igitur suadente Viro Clar. dissertationis scribendae materiem elegi.

Si autem exinde, quod cognitioni nostrae hae in re parum profuerim, pateat, vires meas tali argumento impares fuisse, at novae tamen illius methodi commoda indicasse, indeque huius partis histiologiae indagacionem faciliorem reddidisse, satis habeo.

Ante vero quam methodum illam indicemus, videamus, quaenam praecipuis tum prioris tum aevi nostri anatomiae et histiologiae scriptoribus de cerebri ac medullae systemate capillari innotuerint. Quo facto, specimina nostra illustrabimus, quorum pulchriora effigie expressa opusculo huic inseremus, quae fida manu Cl. Promotor ipse ad naturam delineavit, mihiq; usui dedit, ut tandem deductiones quasdam anatomico-pathologicas, inde factas, in medium proferamus.

C A P U T I.

PRAECIPUORUM SCRIPTORUM DE CEREBRI ET MEDULLAE SYSTEMATE CAPILLARI SENTENTIAE.

§ 1.

Non huius loci esse mihi visum est, anatomicam cerebri, medullae et truncorum, tam arteriosum sanguinem adducentium quam venosum avehentium, descriptionem praemittere, quum potius mihi propositum esset, subtiliorem vasorum capillarium in substantiis grisea albaque distributionem et nexum illustrare.

Arteriae carotides internae et vertebrales, quod nemo certe ignorat, cerebro et cerebello arteriosum sanguinem afferunt. Hac autem in re arteriae illae ab aliorum organorum vasculis discrepant, quod haec statim in ipsius organi parenchyma intrantia, ibi demum subdivisione rete capillare forment, illae vero, postquam per Piam Matrem decurrentes semper semperque in ramos et trunculos minores abiere, tandem capillaria fere factae cerebrum intrent.

Piae Matris illius, membranae vasculosae cerebri, ampla jam descriptio apud HALLERUM invenitur, qui eius utilitatem praecipuam his verbis comprehendit: »mollissimum viscus »continere, firmare, vasaque ipsi undique suppeditare, eaque »vasa ordinare et fundare" 1).

Etiam ALBINUS 2) et RUYSCHIUS variis locis de Pia Matre agunt eamque figuris illustrant. RUYSCHIO testante 3), Pia Mater telae aranearum fere instar tenuis est, atque propter tenuitatem praesertim ad omnia illa vasa continenda, ne loco suo excedant, inservire ipsi videtur. In eodem thesauro 4) specimen describit, quo etiam apparet, quam profunde Pia Mater variis locis inter sulcos cerebri sese insinuet. Porro, ubi BOHLII sententiam refutat 5), haec affert: »Num vero »Pia Mater continua sit cum cortice cerebri, uti dicis, hoc »potius arteriis Piae Matris adscriberem, quam ipsi Piae »Matri ceu membranae. Equidem sustineo hanc hypothesin, »quod Pia Mater mollissima membrana existens, mire copiosius arteriis constet, ut per repletionem Pia Mater videatur nil esse, nisi vasa; sed copia haec vasorum mihi non »videtur Piae Matri ceu subtilissimae membranulae data, ut »eam nutriat, vel ad calorem eius aliquid tribuat, sed quod »destinata sit, ut ipsum conficiat corticem."

1) Elem. physiol. Lausannae 1762, Tomus IV, pag. 20.

2) Annot. Acad. Lugd. Bat. 1754, Liber I, Caput XII.

3) Thesaurus anatomicus X, pag. 7. Amstelod. 1744.

4) Ibidem pag. 9.

5) Responsio ad J. C. BOHLIUM, pag. 10.

BOERHAAVIUS Piam Matrem membranam esse negat, sed primo strato arteriarum corticis constare putat 1).

Recentiores nostrique aevi scriptores hanc universe sententiam de Pia Matre profitentur: membranam esse teneram, ex tela conjunctiva conformatam, qua connectitur rete illud subtilissimum vasculorum, quo Pia Mater ubivis cum cerebri substantiis cohaeret.

Modum, quo arteriae per Piam Meningem diffundantur, in minores ramos trunculosque minimos abeant, anastomosi multifariam inter se cohaereant, ac tandem capillaria factae cerebrum intrent, inter alios BURDACH 2), TODD et BOWMAN 3), LONGET 4), ut et HENLE 5) dilucide explicant. Cum periosteo meningem vasculosam HENLE comparat 6).

Pia Mater, uti notum, non solum externe cerebrum medullamque convestit, verum etiam per fissuras transversas cerebri et cerebelli in ventriculos penetrat, ibique (una cum Arachnoidea secundum nonnullos scriptores) ependyma constituit et plexibus choroideis conformandis partem suam confert.

Plexus hi choroidei, quorum naturam jam RUYSCHIUS sic descripsit 7): »constant ex meris vasculis sanguineis, prae-

1) Prael. Acad. editae ab Hallero. Lugd. Bat. 1758, Tom. II, pag. 273.

2) Vom Baue und Leben des Gehirns, Band II, Seite 21.

3) The physiological anat. and phys. of Man. Chapter IX, page 295.

4) Anat. et phys. du système nerveux, Tome I, page 187.

5) Allgemeine Anatomie. Leipzig 1841, Seite 372.

6) Ibidem pag. 679.

7) Responsio ad M. E. ETTMULLERUM, pag. 21.

»sertim arteriosis, motu serpentino repentibus, glandulasque
»mentientibus propter gyrulos anfractuosos et Piaë Matris
»portione cohaerentibus,” quos etiam HALLERUS accurate in-
dagavit ¹⁾, ab hodiernis anatomicis tanquam processus Piaë
Matris definiuntur, qui variis modis plicati multisque vasculis
contortis praediti in ventriculos irrepunt, ubi inter se per
foramen Monroi et aquaeductum Sylvii cohaerent.

HENLE ²⁾ plexus choroideos cum ossium medulla comparat
eosque ³⁾ »compacte Gefässknäuel” nuncupat. Porro haec
addit: »die Plexus liegen nicht frei in den Hirnhöhlen, wie
»man so oft behaupten hört, sondern schicken zahlreiche
»Blutgefäße in die Gehirnsubstanz.”

Hoc confirmatur a plurimis recentiorum scriptorum; sic
apud FR. ARNOLD ⁴⁾ legimus: »die Gefäss- oder Adergeflechte
»liegen mehr oder weniger frei im Innern der Hirnkammern,
»enthalten zahlreiche und vielfach gewundene Gefäße mit
»Schlingen an der Oberfläche, geben an die Hirnsubstanz,
»die die Höhlen begrenzt, Arterien ab und empfangen wieder
»aus ihr Venen.”

H. GUYOT de vasculis his haec refert ⁵⁾: »dans les
»ventricules, quels qu'ils soient, il n'y a pas une seule

1) Op. I. pag. 46.

2) Op. I. Seite 679.

3) Ibidem pag. 372.

4) Handbueh der Anatomie des Menschen, Band II, Abth. II. Frei-
burg 1851, Seite 679.

5) Essai sur les vaisseaux sanguins du cerveau: Journal de Phys. exp.
et path. par MAGENDIE, T. IX, p. 43.

»artère à la surface; tous les vaisseaux qui les tapissent
»sont des veines très-nombreuses. Les artères s'arrêtent aux
»fentes et servent à les fermer, en pénétrant à ces endroits
»dans les organes et pas au-delà." Auctor hic etiam dubia
affert 1) contra sententiam, ventriculorum superficiem inter-
nam membrana illa, quae ependyma audit, convestiri; potius
crediderit, lamellam materiei albae ipsius vel substantiae
saltem ipsi quod ad naturam proximae, injectione vasculorum
subjacentium tolli itaque membranam mentiri.

§ 2.

Videamus porro, quid cognitum sit de vasculorum in ipsa
cerebri substantia habitu et nexu.

Saeculi praecedentis initio celeberrimus anatomiae Profes-
sor Amstelodamensis RUYSCHUS, quum substantiae corticalis
cerebri naturam indagabat, primus methodum indicavit in-
ficiendi eius vasa capillaria, qua in re summa industria ela-
boravit. Methodum hanc praeparandi, quam jam anno 1698
invenerat, accurate his verbis enarrat 2): »scilicet, per
»vasorum sanguineorum artificiosam repletionem ceracea ma-
»teria rubra; quo facto, particula corticalis substantiae au-
»ferenda et a capillo suspendenda in liquore conveniente; postea
»capillus digitis arripiendus, et sic sursum deorsumque mo-
»venda particula corticalis cerebri substantiae, quae a motu

1) Ibidem pag. 42.

2) Thes. Anat. VI, pag. 39.

»in liquore sese explicat in infinitos ramusculos, tomenti
»instar tenues, attamen molles.” Hanc methodum secutus,
RUYSCHUS ad opinionem ducebatur, materiem griseam meris
vasculis constare, effata MALPIGHI, VIEUSSENI aliorumque,
corticem nempe agglomeratione exiguarum glandularum for-
mari, prorsus rejiciens. Variis locis sententiam hanc pro-
fert 1), et magna cum jactatione, inter omnia nova, quae
intra 40 annos invenerit, hanc suam inventionem (scil. sub-
stantiam cerebri corticalem non esse glandulosam, sed plane
vasculosam) eminere gloriatur 2).

Plurimi autem ex eius aequalibus jam negant, saltem du-
bitant talem substantiae corticalis structuram; HALLERUS enim
quaestionem, an cortex cerebri vasculis constet, ample tra-
ctat 3), et his verbis concludit 4): »Certum ergo videtur,
»ex arteriolis, venulis et tenerrima cellulosa tela maximam
»partem corticis cerebri constare; valde demum probabile,
»eandem telam id efficere, quod non repletur et in suspen-
»dendo cortice perit: etsi utique non pari cum evidentia sen-
»suumve aequo firmo testimonio, totum absque ulla exce-
»ptione corticem vasculis fieri pronuciare licet.”

ALBINUS quoque dubia affert 5), quae ex sequentibus vi-
dere licet: »Corticem totum ex vasculis constare id quidem
»non ita manifestum. Etenim, quantumcunque impleta sint,

1) Resp. ad ETMULL., pag. 18. PRODRONUS, Thea. VI, pag. 10.

2) Ibidem pag. 8.

3) Op. laud. pag. 26 et seqq.

4) Ibidem pag. 29.

5) Op. l. pag. 51.

»est aliquid inter ea, quod non impletum; imo vero est
»multum: idque excutitur, perditurque, quum impleta quae-
»dam particula in humore idoneo sursum deorsumque, laxan-
»derum solvendorumque eorum causa, ex praecepto RUYSCHII
»movetur: perditur quoque laxatione, qua utor subtiliori.”

Tandem BOERHAAVIUS RUYSCHII praeparationis modum his
verbis reprobat 1): »Neque tamen demonstrabat veram cor-
»ticis naturam, cum de cortice paucissima vasa conserventur,
»pars vero maxima destruatur.” Fatetur quidem BOERHAA-
»VIUS 2) evidens esse fieri corticem vasis continuis cum vasis
»Piae Matris, sed prorsus negat, vasa illa sanguifera esse;
»addit enim: »sed quae pellucidum liquorem vehant et quo-
»rum distributionem nemo definiverit.”

Paullo post certius adhuc sententiam illam enunciat, ubi
de substantia cinericia haec leguntur 3): »et si videtur con-
»tinere sanguinem, habet ab adhaerentis Piae Matris vascu-
»lis, cum circulatio liquidorum rubrorum vere supra corticem,
»non per corticem fiat.”

Ne autem credamus, tantummodo RUYSCHIIUM capillarium
cerebri injecta specimina fecisse; nam, etsi fortasse metho-
»dum ab illo demum viro, hac de re optime merito, cogno-
»verant, et HALLERUS 4) et ALBINUS 5) uterque de suis expe-
»rimentis loquuntur.

1) Op. I. pag. 275.

2) Ibidem pag. 276.

3) Ibidem pag. 278.

4) Op. I. pag. 23.

5) Op. I. pag. 45.

De substantiae medullaris cerebri vasculis jam illi Anatomici mentionem quoque faciunt.

Sic ALBINUS ¹⁾: »trunculi ad medullam tendunt, interser-
»taque iis lanugo, jam inde a Pia Matre ad medullam usque.”
Paullo post ²⁾: »Quam dixi lanuginem, ea ad medullam non
»modo pertinet, sed multis etiam ramulis veluti infixis, ei
»ad postremum inhaeret: et non solum subtilissimis, sed
»etiam crassioribus. Quin sunt trunculi inter eos, quos ad
»medullam tendere dixi, qui manifeste penetrant in eam:
»video certe multos, inter eosque maiores, qui penetrant.”

Huc pertinet figura, qua expressum voluit, quemadmodum
vascula ad medullam pertineant, eique infixi inhaereant, pe-
netrentque trunculi. Rem difficillimam sibi fuisse contendit, sic
implere corticem, ac deinde solvere et laxare, nec medullam
tamen perdere.

BOERHAAVIUS haec ³⁾: »licet medulla vasis rubris non de-
»stituatur, sed ea recto tantum ductu medullam perforant,
»neque ramosa sunt.”

HALLERUS, ubi medullam cerebri tractat, haec refert ⁴⁾:
»unice passim ab arteriis venisque rubris longe perforata est,
»quae per medullam quasi canaliculos faciunt et dissectae
»sanguinem stillant, uti monuimus. Sed ea vasa recta, cy-
»lindrica, ad distantes medullae partes eunt, neque ex or-

1) Ibidem.

2) Ibidem pag. 44.

3) Op. 1. pag. 275.

4) Op. 1. pag. 30.

»dine ramos in eam cerebri partem diffundunt. Porro in
»medullam vasa tenerrima corticis cerebri ita se immittunt,
»ut numerosa sint ea, cumque medulla vere continuentur.»

Alias quoque sententias illis temporibus de medullaris sub-
stantiae capillaribus vixisse, exinde patet, quod HALLERUS
testatur 1), se non intelligere vasa reticulata rubra, quae
medullam componerent, ut et ALBINUS sententiam eorum im-
pugnat 2), qui ex canaliculis, per quas e sanguine in cor-
tice secretus humor in corpus duceretur, medullam consistere
profiterentur.

Perspicue igitur ex hisce patet, illustres saeculi praece-
dentis viros jam in hac materia quae maximi momenti essent,
praeuisse, atque eo magis mirandum videtur, plurimos nostri
aevi anatomiae et histiologiae scriptores passim quasi de ce-
rebri capillaribus mentionem facere, et de subtiliori eorum
nexu sententias inter se prorsus oppositas efferre. Omnibus
enim fere in anatomicis libris tantummodo refertur, centrum
systematis nervosi animalis ad organa, quae sanguinis insigni
copia gaudent, pertinere, eiusque substantiam griscam multo
plura vascula accipere quam substantiam medullarem seu al-
bam, unde profundior illius color. De modo vero, quo arte-
riolae per cerebri substantias ipsas diffundantur, et de quae-
stione, num capillaria corticalis sive griseae materiae cum
medullaris substantiae vasculis anastomoses ineant, cohaere-
antque, nonnulli tantum scriptores agunt, inter quos E. H.
WEBER principem nobis se offert.

1) Ibidem pag. 31.

2) Op. I. pag. 47.

Specimina LIEBERKÜHNIANA, Berolini servata, ille quam accuratissime indagavit, luminaque subtilissimorum vasculorum micrometri ope mensus est ¹⁾. De vasorum distributione sequentia affert ²⁾: »die Pulsadern dringen in die graue Substanz von aussen als unzählige kleine Stämme senkrecht ein, ihre Zweige gehen aber nicht bis in die weisse Marksubstanz über, und sind daher nicht länger als die graue Rindensubstanz dick ist. In die weisse Marksubstanz des Gehirns dagegen dringen andere Blutgefässe von den Höhlen des Gehirns aus ein, und verlaufen von innen nach aussen in der Richtung der Fasern des Gehirns, und diese gelangen umgekehrt auch nicht in die graue Rindensubstanz, wenigstens hingen beide Classen von Gefässen in einem LIEBERKÜHNSCHEN Praeparate, das ich in Berlin in dieser Hinsicht genau untersuchte, nur durch sehr einzelne und durch sehr kleine Gefässe zusammen.»

De sanguinis copia, quae cerebro adducitur, E. H. WEBER ample loquitur ³⁾. Organi sanguinis abundantiam tantummodo lumine et numero arteriarum, quae illud adeunt, definiri non posse contendit, sed alia quoque momenta animadvertenda, scil. in quot ramos ramulosque diffundantur et quam longa sit via, quam isti transeant, ut organon, voluminis ratione habita, constitui possit sanguinis dives aut inops esse. Ad

1) E. H. WEBER, Anatomie von HILDEBRANDT. Braunschweig 1830—32. Band I, Seite 270.

2) Ibidem pag. 271.

3) Op. laud. Band I, Seite 270. Band III, Seite 425.

haec animadvertens eiusmodi statuit: »in der Gehirnsubstanz
»scheiden die Blutgefäße schnell in die kleinsten Zweige
»und in die Venen über zu gehen, wovon eine Folge ist,
»dass ein und dasselbe Blut nicht lange in Canälen durch
»die Gehirnsubstanz umhergeleitet wird, sondern bald wieder
»aus dem Gehirne herausfließt. Diese Einrichtung kann den
»Nutzen haben, dass zur Ernährung des Gehirns immer
»frisches Blut angewendet wird, was vielleicht dazu nöthig
»ist, weil das Blut schnell der wenigen nährenden Theile
»beraubt wird, die für das Gehirn brauchbar sind. Durch
»das Gehirn fließt also in 24 Stunden viel mehr Blut als
»durch irgend einen anderen Theil des menschlichen Kör-
»pers, aber in jedem Momente enthält es nicht sehr viel
»Blut.“

Tandem ex eo, quod cortex et medulla cerebri per vias
sibi cuique proprias vascula requirant atque haec vascu-
la revera anastomosi cohaerere dici nequeant, significatio-
nem utriusque materiae propriam tribuit, uti ex his verbis li-
quet 1): »diese Zuführung von Blut auf besonderen Wegen
»zur grauen Lage der Windungen und zur übrigen Substanz
»des Gehirns, macht es wahrscheinlich, dass jede von die-
»sen zwei Abtheilungen des Gehirns in gewissem Grade
»unabhängig von der andern entstehe und ernährt werde,
»und dass folglich, wie nahe auch diese zwei Abtheilungen
»an einander liegen, sie doch für zwei Organe von einer
»sehr verschiedenen Thätigkeit gehalten werden müssen.“

1) Band III, Seite 425.

Eiusmodi sententiam a GUYOT etiam relatam inveni, qui diligenter et in foetu et in neonato cerebri systema vasculosum indagasse videtur, ubi dicit 1): »En n'isolant pas les deux substances (la grise et la blanche) et surtout en oubliant tous les rapports anatomiques de l'une (la grise) avec le système artériel et toutes les influences qui doivent en résulter, on s'est habitué à unir, à regarder comme formant un tout organique, c'est-à-dire agissant, indivisible, l'ensemble de certaines parties, dans lesquelles rien que le rapport différent avec les artères nous fait soupçonner deux usages différens.

»L'une des deux matières est artérialisée, incessamment excitée; en adoptant ce mot, elle est activée par l'influence du système circulatoire; l'autre ne l'est pas.

»Une loi générale se répète ici: partout où il y a une artère, il y a une action, un organe produisant; je limite donc à la substance grise tout acte déterminé par un mouvement circulatoire; quel est l'usage de la substance blanche? Je suis fondé à la regarder comme uniquement passive."

Haec statuit GUYOT, quum observasset, arterias tam in cortice quam in centro cerebri materiam griseam semper adire ibique terminari, uti ex his videre licet 2): »A la surface du cerveau, sans préparation bien délicate, de même qu'aux endroits, que l'on nomme origine des nerfs, ce fait est facile à constater; dans l'intérieur de la masse, avec un

1) Op. I. pag. 33.

2) Ibidem pag. 31.

»peu de patience, on suit aisément les rameaux jusqu'à la
»substance grise. Que l'on emploie pour cette recherche la
»macération, ou qu'à l'aide d'un pinceau on isole les vais-
»seaux avec délicatesse, le résultat est toujours le même:
»on arrive à la substance grise, qui est le point, où ces
»vaisseaux se perdent et qui est interposée entre eux et la
»substance blanche."

Videmus igitur, et WEBER et GUYOT griseae albaeque ce-
rebri substantiis suum cuique proprium systema vasculare
tribuere, neque inter se anastomosi conjuncta illa systemata
credere. His etiam BOCK assentitur, haec dicens 1): »Die-
»jenigen Arterienzweige, welche an der Oberfläche in den
»Windungen hinlaufen, schicken ihre Aestchen nur zur
»grauen Substanz und dringen nicht bis zur weissen; dage-
»gen reichen die von den Höhlen aus in der weissen Sub-
»stanz verbreiteten Arterien nicht zur grauen, so dass also
»die beiden Gehirnsubstanzen ganz unabhängig von einander
»ernährt werden."

KRAUSE quoque anastomosin fieri negat, quum haec de re
haec 2) referat: »die Wurzeln der Venae cerebrales ent-
»stehen aus den nicht mit einander zusammenhängenden Ca-
»pillar-gefässen der grauen und der Marksubstanz."

Sic etiam GÜNTHER effiatur, ubi de Piaie Matris vasculis
dicit 3): »welche von ihr aus senkrecht in die graue Masse

1) Handbuch der Anat. des Menschen. Leipzig 1843, B. II, S. 53.

2) Handbuch der menschl. Anat. Hannover 1842, B. I, Th. II, S. 914.

3) Lehrbuch der allg. Physiol. Leipzig 1845, pag. 360.

»des Gehirns eindringen, an der Grenze dieser Masse aber
»umkehren.“

Tandem de anastomoseos quaestione ARNOLD haec affert 1):
»Die Gefässe dringen aus der Rindensubstanz nicht tiefer in
»die darunter liegende Marksubstanz ein, sondern es em-
»pfangt diese, so wie die Kernsubstanz im Innern des Hirns,
»ihre Gefässe theils von den Gefässgeflechten, theils von der
»Hirnbasis her.“

M. J. WEBER contra anastomosin omnino fieri putat,
uti videre licet ex argumentis, quibus E. H. WEBER refutat,
qui contenderat 2); arteriam corporis callosi perperam ita
audire, quum potius materiae corticali gyrorum lobii anteriori
inserviat, arteriam vero profundam praecipue ad medullarem
substantiam pertinere; quae argumenta sic se habent 3):
»Ich kann durchaus diese scharfe Scheidung der Arterien
»für die verschiedenen Hirnsubstanzen nicht wahrnehmen. Wo
»soll sich denn die Art. Fossae Sylvii, wovon hier gar keine
»Erwähnung geschieht, da sie doch offenbar der grösste
»Stamm der Gehirnschlagadern ist, verbreiten? Gehört diese
»auch allein der Rindensubstanz an, da die Arteria profunda
»die wichtigste Arterie für die Marksubstanz des grossen
»Gehirns sein soll? Ich habe mich oft überzeugt, dass zum
»Balken unzählige kleine Zweige von den Balkenschlagadern
»verlaufen, welche auch noch tiefer dringen; ebenso lassen

1) Op. laud. pag. 772.

2) Anat. von HILDEBRANDT, Band III, S. 202.

3) Handbuch der Anatomie, Leipzig 1845, Band II, S. 114.

»sich diese Arterien in die Marksubstanz des grossen Ge-
»hirns verfolgen, so wie auch Anastomosen der Gefässe in
»der Rinden- und Marksubstanz statt finden.“

BURDACH quoque anastomosin admittit, uti ex his patet ¹⁾:
»Wenn die Gefässe aus der Rinde in das Mark treten, hört
»die netzartige Querverbindung auf, und die höchst zarten
»Haargefässe laufen nun, ohne Seitenzweige ab zu geben,
»in leichter Schwingung gerade fort, den Markfasern im
»Ganzen folgend.“

Tandem verba, quae de his BÉCLARD ²⁾ refert, hic enun-
ciare liceat: »les vaisseaux sanguins du système nerveux se
»ramifient d'abord beaucoup dans la pie-mère; ils pénètrent
»ensuite dans la substance grise, où ils sont extrêmement
»abondans; ils pénètrent enfin dans la substance blanche,
»où ils sont beaucoup plus fins et moins nombreux.“ Satis
ex hisce patet, anastomosin vasorum materiae corticalis cum
materiae medullaris vasculis ab aliis confirmari, ab aliis ne-
gari; haec igitur quaestio, ne dubium ullum in posterum
remaneat, indagacionem accuratam adhuc requirit.

TRODD et BOWMAN figura nobis modum illustrent, quo
arteriae materiem corticalem intrent ibique in capillaria abeant.
De eorum natura, in substantiis grisea atque alba diversa,
tantummodo haec referunt ³⁾: »the arteries break up into

1) Vom Bane und Leben des Gehirns. B. II, S. 21.

2) Elémens d'Anat. générale, page 587.

3) The phys. anat. and phys. of man. Chapter X, p. 295. NB. Priorem
scriptorem materiem hanc in opere suo gravissimo, cui titulus: Encyclo-

»a solid plexus of capillaries in the stratum of vesicular matter. The capillary plexus of the fibrous or white matter has similar characters, only its meshes are much wider. Talia etiam nobis referunt HENLE 1) dicens: »die Gefässe des Gehirns bilden dichte Netze in der grauen Substanz, in der weissen sind sie sparsam vertheilt, et KÖLLIKER 2), ubi sequentia affert: »die graue Substanz ist ohne Ausnahme bedeutend gefässreicher als die weisse, »mit engeren Maschen und etwas engeren Gefässen und »verdankt diesem Verhältnisse zum Theil ihre Farbe. An einer GERLACHSchen Injection des Schafhirnes (cuius injectionis figuram KÖLLIKER ibi inseruit) war in der grauen Substanz die Weite der Maschen 3—4mal enger als in der weissen.

GERLACH ipse quoque specimen injectionis capillarum corticis, ubi cum medulla hic cohaeret, depinxit ac breviter nobis his verbis demonstravit 3): »die Gefässe treten aus der Pia Mater in das Gehirn und Rückenmark; verhalten sich aber daselbst in der weissen und grauen Substanz verschieden. In der ersteren bilden dieselben mehr längliche und weitere Maschen, in der grauen Substanz dagegen sind die Gefässmaschen viel enger und unregelmäßig.

paedia of anatomy and physiology, multo amplius tractaturam expectaveram, sed fallebar; nam prorsus eadem ibi quoque hac de re reddita inveni.

1) Opere I. pag. 638.

2) Handbuch der medicin. Anat. Halle 1819. S. 679.

3) Band III. Specielle Gewebelehre, S. 499.

4) Handbuch der allg. und speciellen Gewebelehre. Mainz 1850. S. 404.

»mässiger. Dieses Verhalten gränzt sich an den Stellen,
»wo die weisse und graue Substanz neben einander liegen,
»ziemlich scharf ab.«

Tandem apud ARNOLD de retibus capillarum in substantiis
grisea albaque diversis, haec inveniuntur 1): »in der grauen
»Substanz sind die Netze weit dichter, zahlreicher und enger
»als in der weissen, in der sie mehr einzeln in strahliger
»und in gestreckter Richtung zwischen den Blättern und
»Bündeln der Primitivfasern verlaufen.«

Quae hoc loco ab ARNOLD de vasculorum per materiam
medullarem decursu referuntur, plures etiam alii scriptores
testantur. Paulo supra jam vidimus, quae hac de re BUR-
NACH dixit, scilicet: »die höchst zarten Haargefässe laufen nun,
»ohne Seitenzweige ab zu geben, in leichter Schwingung
»gerade fort, den Markfasern im Ganzen folgend.«

Sie inter alios MECKEL 2): »die Gefässe verändern ihre
»Richtung in der Marksubstanz, wo sie in der Richtung
»der Fasern verlaufen, ohne fernere Zweige ab zu geben,«
et E. H. WEBER 3): von den Wänden des Seitenventrikels
»aus dringen unzählige Aeste in die Marksubstanz des Ge-
»hirns, die der Richtung der Markfasern folgen,« referunt.

Denique LAUTH quoque, ubi materiae medullaris capillaria
describit, haec 4) addit: »ces vaisseaux rampent presque tous
»parallèlement aux fibres.«

1) Opere I. pag. 638.

2) Handbuch der menschl. Anat. Halle und Berlin 1815, Band I, S. 302.

3) Band III, S. 202.

4) Manuel de l'Anatomiste. Bruxelles 1837, page 84.

§ 3.

Haec de arterioso cerebri systemate praecipua cognitio; subtiliori vero de systemate venoso in ipsa cerebri substantia ad hoc usque tempus nulla fere innotuisse, plurimi scriptores profitentur. Liceat enim referre, quae hac de re E. H. WEBER ¹⁾ enunciat: »Ueber die Art, wie sich die »kleinen Venenzweige im Gehirne verzweigen, fehlt es noch »an Beobachtungen." Haec BOCK affirmat, dicens ²⁾: »Ven- »nen hat man im Innern der Hirnsubstanz noch nicht mit »Bestimmtheit nachweisen können.

His etiam BURDACH assentitur, uti ex sequentibus patebit ³⁾: »es scheint, dass die Haargefäße, welche von der Ober- »fläche in die Marksubstanz eingedrungen sind, durch diese »hindurch zu einem andern Punkte der Oberfläche verlaufen, »und erst bei diesem Zurücktreten an die Gefäßhaut in »Venen sich verwandeln. Das Gehirn selbst ist also rein »arteriös; nur in seinen Hüllen treten Venen sichtbar her- »vor. So sind auch die Venenäste mehr nach aussen ver- »wiesen, an die Faserhaut des Gehirns geheftet und den »Schädelknochen genähert, indess die Arterienäste mehr »an das Gehirn sich anschliessen und an der Gefäßhaut »bleiben."

Quamquam igitur vera ratio, qua venulae istae se habent,

1) Band I, S. 271.

2) Op. I. Band II, S. 54.

3) Op. I. eodem loco.

adhuc latet, eas in ipsa cerebri substantia certe adesse, jam veteres scriptores enunciarunt; imo RUYSCHIVS variis locis 1) de istis loquitur. Etiam ALBINUS 2) ut et HALLERUS 3) de venulis in cerebro mentionem faciunt.

Ante paucos autem annos v. GHERT 4), ex injectione felicissima cerebri arteriarum et venarum, quam Clar. SCHROEDER v. D. KOLK perficere licuerat, venularum per medullam cerebri decursum magnopere illustravit. Venam enim magnam plexus choroidei lateralis (quae etsi maxima tantum e glomere oritur, quamque inde scriptor venam glomeris dicendam contendit) ante quam in venam Galeni transeat, plures a corpore calloso et corporibus striatis venulas accipere, luculenter sibi patuisse refert. Venae illius glomeris decursum pulcherrima icone inserta depinxit. Porro demonstravit, venulas eas ex interna medullari cerebri parte, pluribus ramulis longis, tenuissimis oriri, ita ut medulla cerebri dissecta multis punctis coeruleis atque rubris esset notata, quae puncta prosequendo venulas longas plurimum parallelas in venis corporis striati terminatas esse patuit.

Haec de cerebri systemate capillari attulisse sufficiat; satis jam nobis patuisse videtur, universe quidem nonnulla de illo cognita esse, subtiliorem vero eius habitum in diversis ce-

1) Thes. Anat. I, pag. 30. Thes. Anat. VI, pag. 41.

2) Acad. Annot. Lib. I, Cap. XII, pag. 51.

3) Elem. phys. Tomus IV, pag. 24.

4) J. M. E. v. GHERT, Diss. de plexibus choroideis. Traj. ad Rh. 1837, pag. 38 et Nota.

rebrī substantiis partibusque diversum nondum dilucide expositum fuisse.

Restat, breviter etiam videamus de medullae spinalis vasculis.

§ 4.

Medulla spinalis, uti cognitum est, Pia Matre quoque, membrana sua vasculosa, convestitur. Haec tamen a cerebri Pia Meninge nonnullis nominibus differt. Non solum enim crassior hac quod ad texturam, sed etiam arctius cum viscere contento cohaeret, quum processus in medullam immitat, qui centrum petunt.

Ample haec exposuit KEUFFEL 1), qui ex fibrillis longitudinalibus spinalem Piam Meningem componi perspicue ostendit, ut et modum illustravit, quo ab interna eius superficie numerosae fibrae abeant, medullamque intrent, quibus, nempe cum a viscere abstrahitur, dilaceratis superficies illa ad speciem villosa redditur.

Haec E. H. WEBER confirmat, dicens 2): »diese sehr gefässreiche Haut hängt durch Gefässe und durch kleine, häutige, an vielen Stellen in das Rückenmark eindringende Verlängerungen an dem Rückenmarke sehr fest.»

Vasa, quae medullam spinalem adeunt, sunt: arteriae spinales anteriores in ramum unum confluentes, arteriae spi-

1) Ueber das Rückenmark: REILS Archiv für Phys. Band X, S. 138 u. s. w.

2) Band III, S. 370.

nales posteriores et rami spinales, qui cum illis anastomosi varia cohaerent. Horum vasorum partem per medullae fissuram vasculoso Piae Matris processu cinereum medullae nucleum adire, partem aliis locis medullam perforare, jam HALLERUS 1) nobis enarrat.

Quum hic unum tantummodo eumque anticum Piae Matris processum admittat, E. H. WEBER, BOCK alique scriptores de processibus antico et postico mentionem faciunt. E. H. WEBER 2) enim haec enuntiat: »Ein dickerer vorderer und ein dünnerer hinterer Fortsatz der Pia Mater dringen in die vordere und hintere Rückenmarkspalte.»

Sic etiam BOCK 3): »aus der Pia Mater und aus ihren Verlängerungen, besonders in der vordern Spalte, dringen die Gefäße in das Innere des Rückenmarks und verbreiten sich hier netzartig.»

Alii contra scriptores haec ita se habere fortiter negant, inter quos ARNOLD et SÖMMERING occurrunt, qui uterque processum Piae Matris posticum abesse contendunt, saltem secundum omnem medullae spinalis longitudinem. Nam apud priorem haec leguntur 4): »ausser diesem vorderen Fortsatz gibt es keinen anderen, der sich durch die ganze Länge des Rückenmarks erstreckt. Dagegen trifft man an der Lendenanschwellung in der ganzen Länge der

1) El. phys. Tom. IV, p. 83.

2) Band III, S. 370.

3) Band II, op. I. S. 64.

4) Op. I. pag. 678.

»selben auch einen hinteren feinen Gefässhautfortsatz, „et paulo post 1): »am verlängerten Mark verhält sich die Gefässhaut wie am Rückenmark; nur mit dem Unterschied, »dass sie am verlängerten Mark auch von der hinteren »Fläche aus einen Gefässfortsatz in's Innere sendet.“

Apud alterum eadem his verbis inveniuntur 2): »die Pia Mater bildet an dem grössten Theile des Rückenmarks in »der vordern Mittellinie eine Längenfalte, diese fehlt aber »einem sehr grossen Theile der hinteren Mittellinie, da sie »sich hier nur oben und unten findet.“ KEUFFEL 3) quoque anticum tantummodo Piae Matris processum admittit, eumque multa quidem vascula ad medullae spinalis griseam materiem adducere, sed praeterea fibrillas illi immittere atque inde maiorem adeo significationem accipere contendit. Arteriae ad externam Piae Meningis superficiem decurrunt et in ramos trunculosque abeunt, qui illam perforantes medullam petunt.

Secundum BOCK 4) imprimis iis locis, quibus intumescit medulla, capillarium retia densiora inveniuntur.

De medullae spinalis arteriis paulo fusius ARNOLD 5) agit, sequentia afferens 5): »von der innern Fläche der Pia Mater »medullae begeben sich zahlreiche feine und gröbere Gefäss-

1) Ibidem pag. 679.

2) Vom Baue des menschl. Körpers, Band IV, von VALENTIN un-
gearbeitet. Leipzig 1841, Seite 161.

3) Opusc. I. pag. 168 et sqq.

4) Op. I. Band II, S. 19.

5) Op. I. pag. 677.

»chen in die Substanz des Rückenmarks, welche grössten-
»theils in convergirender Richtung gegen die Hörner der
»grauen Substanz verlaufen und in dieser sich feiner ver-
»zweigen und mit einander netzartig verflechten. Der Ein-
»tritt dieser Gefässchen hat am ganzen Umfang des Rücken-
»marks in ziemlich regelmässigen Längsreihen statt, die
»ansehnlichsten Gefässe treten an den hinteren Seitenfurchen,
»wo die hinteren Wurzeln der Rückenmarksnerven liegen,
»ein. An der vordern Fläche des Rückenmarks sendet die
»Gefässhaut in die vordere Längsspalte einen ansehnlichen
»und vom oberen bis zum unteren Ende ununterbrochenen
»Fortsatz bis in die Tiefe dieser Spalte, wo er durch zwei
»Reihen von Oeffnungen, eine rechte und eine linke, zahl-
»reiche Gefässe in's Innere der grauen Substanz sendet,
»welche mit jenen an der äusseren Oberfläche eindringenden
»sich verbinden und ein reiches, dichtes Netz von Haarge-
»fässen bilden.“

Sic etiam nuperrime J. LOCKHART CLARKE, quum medul-
lae spinalis structuram indagabat, vasorum per illam decur-
sum quodammodo illustravit, uti videre licet in figuris in-
sertis, quibus haec addit 1): »Bloodvessels of the spinal
»Chord. — These enter through the anterior and posterior
»median fissures, through the smaller fissures in the white
»columns, and at the roots of the nerves. After giving off
»numerous branches to the white columns, they proceed

1) Researches into the structure of the spinal Chord! Philos. trans-
actions. London 1851, Part. II, page 615.

»inwards to the grey substance, along the whole periphery
»of which they form a remarkably beautiful network of loops,
»intermixed with nerve-tubes and some of the processes of
»the vesicles. Within the grey substance they form an
»extremely minute network. Some of the vessels, which
»enter at the anterior and posterior fissures and at the pos-
»terior white columns, anastomose with each other around
»the spinal canal; while others branch off, right and left,
»between the bundles of the transverse commissure, into
»the anterior and posterior cornua, where they follow the
»course of the transverse fibres and running to the peri-
»phery of the grey substance, assist in forming there the
»loops already described. A series of loops is also found
»to exist near the extremity of the posterior cornua, along
»the border of the spongy substance.»

Medullae spinalis venae retia densissima conformant, quae
potissimum extra Duram Matrem inveniuntur. BRESCHET
tabulis suis pulcherrimis 1) sinus venosos longitudinales an-
teriores et posteriores cum ramis anastomotieis, quibus inter
se aliisque cum venis cohaerentes plexus ita dictos spinales
efficiunt, accurate ac perspicue depinxit.

Ex iis, quae de cerebri et medullae systemate vasculoso
capillari referuntur, haec praecipua commemoranda nobis
visa sunt.

1) Recherches anatomiques, physiologiques et pathologiques sur le système
veineux. Paris 1829.

— 26 —

CAPUT II.

METHODI NOSTRAE EXPOSITIO.

Quum scriptorum opiniones de cerebri vasis capillaribus prorsus sibi oppositae totque dubiae de iis adhuc supersint (uti ex praecedenti capite satis patere mihi visum), valde gavisus fui, insignem nobis, tam varietate quam pulchritudine praestantem, speciminum esse copiam, quorum indagatio fortasse aliquid ad illustrandas res parum cognitae conferre poterit. Antea tamen methodus mihi exponenda est, quam Clar. Promotor in praeparandis illis speciminibus secutus fuit.

Specialem systematis capillaris in diversis cerebri partibus indolem hucusque penitus fere latuisse, non est quod miremur, si ad organi ipsius naturam attendamus. Difficultates enim quam maximae in cerebri ac medullae vasorum exploratione sese offerunt. Ipsa nempe substantia cerebri non tanta pelluciditate gaudet, ut in lamella crassiori, micro-

scopio supposita, subtiliora vascula quod ad nexum et decursum perspicui possint, quia ipsa, quam perreptant, substantia retia illa minutissima obscurantur. Sin autem, huius rei ratione habita, tantae tenuitatis lamellam dissecare vellemus, ut de obfuscatione ista sermo amplius esse nequiret, haud magis propositum nostrum consequeremur. Nam ex una parte materiae cerebri recentis mollities impedimentum foret, quominus absque dilaceratione tam substantiae nerveae quam ipsi intertextorum vasculorum, tenuis lamella talis abscederetur, ex altera vero parte plurimi vasculorum trunculi, locis saltem ubi multifariam serpentinoque cursu substantiam perrepunt, dissecarentur atque inde eorum distributio et nexus non melius quam antea nobis paterent.

RUYSCHUM jam has difficultates expertum fuisse, methodus ipsa, quam ille invenit ac secutus est, nos docet; at vero pulchrae illae injectiones artificiales, quibus celeberrimum haec in re nomen suum reddidit, parum sane cognoscendae speciali in diversis cerebri partibus vasculorum distributioni profuere, quum, uti antea vidimus, motu in liquore protracto, ipsam cerebri substantiam a vasculorum retibus absolveret.

Accedit, quod cerebri capillarum injectiones artificiales, quae hucusque institui solebant ut retia minutiora perspicua redderentur, ad difficillimas res pertinere experientia docuerit; ita ut tantummodo a viris in arte injiciendi quam maxime versatis rite et felici cum eventu perficiantur. Quin peritissimi huius rei viri lubenter fassi sunt, subtiliores injectiones sibi saepius male cecidisse, licet et praeparandae et

impellendae materiae summam curam habuissent; unde nullam fere artem magis fortunae vicissitudini obnoxiam esse profitebantur.

Gravissima haec momenta praecipue in causa fuisse nobis videntur, quare histiologiae huius partis investigatio adeo imperfectas hucusque notiones, quales etiam nunc de cerebri atque medullae systemate subtiliori vasculoso vigent, produxerit.

Ad haecce animadvertens Clar. SCHROEDER V. D. KOLK modum excogitavit, quo substantiae cerebri pelluciditas tantopere auctum iri videretur, ut vel minutissima illam perreptantia vascula distincte perspicere liceret. Experimenta igitur hunc in finem instituit.

Primo ex immaturi vituli cerebro, cuius vasa sanguifera materia artificiali ante impleverat, partem exsecuit atque exsiccauit. Siccati deinde frustuli illius lamellas millimetrum circiter crassas sibi comparavit, quas balsamo Canadensi obvolvitur atque examini microscopico submit.

Exploratio haec cerebri substantiam adeo pellucidam infactam docuit, ut vasa quidem universe injectione felici satis impleta fuisse, subtilissima vero vascula minime intrasse materiem perspicue pateret. Tam in his speciminibus, quam in illis, quae ex injecto deinceps canis et hominis cerebro eodem modo confecerat, capillaria ista tenerrima materia quidem in pluribus partibus carere, at vero sanguine illa tam egregie impleta invenit, ut distributio eorumque decursus quam luculentissime microscopicae investigationi sese offerrent.

Magnopere Viro Clar. impletio illa sanguinis placuit, quia nunquam ante retia ea minutissima ita distincte perspexerat, sibi que mox persuasum habuit, perscrutationi cerebri capillarum simpliciore in futurum viam aperiendam. Dummodo enim ille sanguis vasculis minimis inhaerens intra horum parietes retineri et servari posset, maxima in cerebri capillarum indagazione difficultas, injectionis nempe artificialis, sublata esset.

Ut hoc inquireret, quoties cerebrum vel animalium vel hominum dissecaret, Vir Clariss. lamellas exemit laminaeque vitreae imposuit, ut cito leniter calefactae exsiccarentur. Has autem lamellas cerebro adimebat priusquam in aquam sive spiritum imponebatur, ne sanguis aut dilueretur aut extraheretur liquoribus istis. Etsi in speciminibus ex his lamellis eodem semper modo paratis, non prouti in prioribus, artificiali materiae injectione sanguis in subtiliora vascula repulsus fuerat, haec tamen in plurimis sanguine satis repleta occurrebant. Ubi vero cuiusdam partis substantiae cerebrealis color levis rosaceus, uti in grisea materie saepius observatur, congestionem forsitan ibi praegressam indicaret, vascula maiorem quam normae conveniat copiam sanguinis continebant, retiaque ditissima sub Microscopio observabantur.

Omnia haec edoctus experientia, Vir Clar. eandem simplicem methodum in praeparatione pulcherrimorum nostrorum speciminum secutus est, sequenti modo procedens: cerebro, durante dissectione, lamellas ad millimetri crassitudinem abscidit et singulas laminae vitreae imposuit, ut subito exsiccarentur. Deinde post aliquot dies omnino exsiccatas,

quum talem casei fere instar acquisivissent naturam, ut sine dilacerationis periculo cultro acuto dissecari possent, superficie magis minusve inaequali abscissa, lamellas explanavit. At simul tamen crassitudinem lamellarum talem retinendam curavit, ut vasorum decursus et nexus rite servarentur. Universe, lamellarum teneritatem dimidii millimetri modum absque damno excedere non posse, experientia nos docuit, licet maiori teneritudine pelluciditas magnopere augeatur, ita ut laminae tenuiores aliae ad dimidii millimetri crassitudinem magis proficiant. Tandem balsamo Canadensi specimina obtexit et intra duas laminas vitreas clausit.

3. LOCKHART CLARKE ad indagandam medullae spinalis indolem, methodum secutus est, quae nostrae methodo quodammodo appropinquat, quare mihi hic commemoranda videbatur. His verbis illam enarrat. 1): «According to the second method, the section is first macerated for an hour or two in the mixture of acetic acid and spirit. It is then removed into pure spirit and allowed to remain there for about the same space of time. From the spirit it is transferred to oil of turpentine, which expels the spirit in the form of opaque globules, and shortly (sometimes immediately) renders the section perfectly transparent. The preparation is then put up in Canada balsam and covered with thin glass. By this means the nerve-fibrils and vesicles become so beautifully distinct, that they may be clearly

1) Researches into the structure of the spinal Chord: Philos. Transactions of the royal society. London 1851, Part. II, page 608.

» seen with the highest powers of the microscope. If the
» section be removed from the turpentine, when it is only
» semi-transparent, we sometimes obtain a good view of the
» arrangement of the blood-vessels.

Libenter crediderimus, interdum tantummodo vasculorum
decursum visu perspicuum remansisse, quum maceratione ista
in spiritu cum acido acetico admixto et deinde in spiritu
mero sanguis plerumque extractus fuerit, saltem colorem
suum amiserit. Exsiccationis simplicis ope vasa semper fere
perspicua servari, CLARKE penitus ignorasse videtur.

Cautiones tamen quasdam breviter nobis hic enuntiare li-
ceat, quas in adhibenda simplicissima nostra methodo, mo-
nente experientia, observari oportet.

Si animalium cerebrum exploraturi sumus, semper quam
maxime nostra interesse persuasum habeamus, sanguinem
quantum possit cerebro adduci atque in minimis vasculis
retineri. In necandis igitur animalibus istis, propositi huius
ratione habita, unusquisque statim intellexerit, mortem as-
phycticam seu strangulatione seu alia via inductam, prae
aliis se commendare, quum ita non tantum omnis sanguinis
jactura evitetur, sed etiam hyperaemia cerebrum afficiatur.

Si hominis cerebrum quoad capillaria indagare nobis pro-
positum est, prudenter ex cavo cranii illud extrahamus, quum
a priori statuere nobis non liceat, utrum vascula sponte
sanguine satis impleta inveniantur, necne. Nam si conge-
stionem, ut ita dicam, artificialem injiciendis truncis maioribus

producere opus foret, (quod plerisque tamen in casibus minime requiretur) ovasis cuiusdam insignis ex imprudenti extractione laesio injectionem irritam redderet.

Omnis contactus aquae, spiritus aliusve liquoris ejusvis, qui sanguinem aut diluere aut extrahere valeret, quam maxime arceatur. Lamellae igitur statim exsiccationi tradantur.

Lamellas autem ipsas non ultra millimetri crassitudinem secandas esse, ideo monendum, quod spissiorum frustulorum exsiccatio ipsa lentius progredi, atque inde crystallorum margarini, retia vasorum obfuscantium, depositio oriri videatur, uti nobis ipsis in nonnullis speciminibus observare licuit. Exsiccatio igitur ut quam maxime cita fiat, curandum est.

Siccata denique specimina continuo balsamo Canadensi obvolvamus, minime vero atmosphaerae exposita serventur. Experientia enim nos quoque docuit, in nonnullis speciminibus siccatis, quae balsamo Canadensi imbuere neglexeramus, lapsu temporum paulatim sanguinis colorem rubrum expalluisse, inque fuscum aut flavum colorem fuisse mutatum, ita ut vascula, antea valde perspicua, magis magisque oculis subducerentur.

Multis praeterea nominibus enarrata methodus prae injectione artificiali sese commendat. Jam eius simplicitas magni momenti ducenda, quum omni medico, etsi artis subtiliorum injectionum imperito, quavis occasione data, durante ipsa cerebri sectione, specimina investigationi futurae microscopi-

cae destinata semper sibi comparare liceat. Hoc potissimum illius interest, ut dijudicet, num congestione, inflammatione, morbosa vasorum dilatatione similive affectione durante vita cerebrum laboraverit. Dubia enim plerumque adhuc de praesentia vel absentia congestionis, atque inflammationis in cerebro judicia a medicis proferri solebant. Nam pro diagnostico signo, puncta illa magis minusve rubescentia et numerosa, quae in dissecto cerebro apparerent, habere coacti erant; et quum fallax istud iudicii argumentum, perspicua expansione truncorum multisque locis rosacco substantiae colore oculo nudo observatis, confirmabatur, ad certam diagnosis se accessisse credebant.

Methodo vero nostra nulla abhinc vel minimorum vasulorum affectio illos latebit.

Praeter simplicitatem illam, aliis etiam nominibus non minoris momenti, artificiali injectioni est praeferenda. Uti facile intellectu, licet materies prudentissima quantumque id fieri possit aequabili semper pressione (ut in minima usque retia penetret) impellatur, non solum extravasatio, inprimis ubi pars emolitione corrupta fuerit, sed etiam expansio truncorumque maiorum dilatatio abnormalis, ex vi mechanica necessarie adhibenda, saepius orientur. Inde denuo sequitur, impletiones artificiales, quibus ut in homine saltem vasa cerebri aequabiliter ubivis turgeant perraro accidet, nullam omnino vim habere ad illustrandum pathologicum statum. Nam anceps iudicium erit, ubi v. c. post impletionem talem capillarum expansio praeter normam inventa fuerit, utrum revera de inflammatione seu saltem hyperaemia, quas morbosa

vasorum dilatatio comitari solet, an potius de mechanica, ex injectae materiae vi repetenda, expansione cogitandum sit a).

Nostra e contrario methodus vasa cerebri illa conditione servat atque examini offert, qua durante vita aut ipsa morte exstiterint, ita ut de diametri ratione truncos ramulosque inter, de lumine vasculorum in diversis cerebri partibus diverso, de dilatatione normali morbosave, de effectu diversorum remediorum ad congestionem cerebri producendam tuto iudicium ferre, quin micrometri ope lumina vasorum lamellae morbosae cum sanae eiusmodi vasis comparare nobis liceat, uti postea luculenter patebit, ubi plura de his afferentur b).

Tandem sanguinis color, cautionibus quas enumeravimus

a) Licet igitur recentiori tempore Clar. GERLACH egregia et admirabili profecto ratione cerebri vascula subtilissima materiae rubre coloratae (carminii) solutione impleverit, tamen haec methodus non paucis difficultatibus laborat. Nam vel in illis speciminibus materiae impulsio vascula expandisse et a naturali tramite paullulum dimovisse nobis videtur, uti postea videbimus; praeterea vero tum propter magnum huius coloris pretium, tum propter dexteritatem, quae ad implenda vascula tantae teneritudinis absque ruptura requiritur, raro illa methodus adhereri et certe nunquam in cerebro humano paullulum emollito commendari potest.

b) Fatemur quidem etiam nostra methodo adhibita exsiccatione vasorum lumina magis minusve coarctari; quum vero hoc de omnibus vasis aequae valeat, et potius maioris momenti sit rationem inter truncos et ramulos in diversis cerebri partibus distinguere, vix dubium exinde recludere potest.

recte observatis, lapsu temporum minime evanescere, sed eandem omnino claritatem servare videtur; omnia enim nostra specimina per aliquot deinceps menses luculentiae suae nihil amisere.

III
Quum universae res in et medullam spinalem...
systema vasculosum capillare atque spectans, dabitur
que, ut magis aucta, ~~quae~~ vasculosum, quae
in nervi animalis centrum eorum, an pulsatilis
quae in ipsa illius substantia vasculis continetur. Certe
cum truncorum arteriarum sanguinem advehunt, non
solum in materia corticali, tanta exsistit, in toto
licet, cerebrum et medullam ad organa, quae maxime
sunt capillarum copia sectant, pertinent.
Postquam autem arteriarum trunci, per Prim Martem
curantes in ramos semperque plures ramos et ramulos
generant, donec arteriae capillares factae sint, magis
haec has capillares arterias ad peripheriam usque
truncum, quae sunt in hac arteria, et per ramos
truncum, et per ramos, et per ramos, et per ramos

CAPUT III.

ANATOMICA VASORUM CEREBRI ET MEDULLAE CAPILLARIUM DESCRIPTIO.

§ 1.

Quum universe cerebrum et medullam spinalem quod ad systema vasculosum capillare attinet spectamus, dubitaverimus, utra magis miranda, copia vasculorum, quae systematis nervosi animalis centrum adeunt, an pulchritudo retium, quae in ipsa illius substantia vasculis conformantur. Copia enim trunculorum arteriosum sanguinem advehentium, potissimum in materia corticali, tanta existit, ut tuto statuere liceat, cerebrum et medullam ad organa, quae maxima vasorum capillarium copia scatent, pertinere.

Postquam autem arteriarum trunci, per Piam Matrem decurrentes in minores semperque plures ramos et ramulos ibi abierunt, donec arteriolae capillaria fere factae sint, innumeras has cerebri corticem ad perpendicularum undique intrare videmus, quod quam luculentissime patet, si quando a cerebro, cuius vasa artificiali materia impleta fuere, Piam Ma-

trem avellimus. Tunc enim arteriolas, imprimis si materia idonea injecta fuerit, una cum Meningis avulsione e cortice paullulum extrahimus, donec vi nimia dilacerantur trunculique abrupti a vasculosa membrana dependent.

Ita innumerae quoque arteriolae e plexibus choroideis in ventriculis cerebrum penetrant, atque sic cum ipsa cerebri substantia plexus connectunt. Sententia enim a GUYOT¹⁾ relata, scilicet in ventriculorum superficie nullam arteriam sed venas tantummodo inveniri, injectionibus factis, falsa nobis visa est. Tam externam quam internam cerebri superficiem arteriae omnino perforant atque intrant. At vero decursus vasorum externe perforantium a distributione interne penetrantium differt.

Arteriae enim, quae corticem cerebri adeunt, jam recto magis decursu perreptantes jam contortae multifariam ramisque anastomoticeis conjunctae, retia illa pulcherrima ac densissima componunt, quae ubivis in materia corticali oculo sese offerunt. Quae vero in ventriculis cerebrum penetrant arteriolae, partim quidem griseae materiae contra, uti thalamum nervorum opticorum et corpus striatum, vasculis muniunt, at partim tamen haec perforant centrumque semiovale Vieussenii ut plurimum fibrillis nerveis parallelae percurrunt. Arteriae hae sub microscopio facile deteguntur; sunt trunci illi maiores, qui corpus striatum imprimis perforantes rectaque via, nonnullis tantum ramulis lateralibus inter se connexi, procedentes conspiciuntur. Inde medulla cerebri, quum transscin-

1) Vid. caput I, pag. 6.

ditur, rubra illa puncta ex arteriis istis transverse dissectis offert. Jam vero vascula haec, longo per medullam decursu paulatim divisione tenuiora facta, corticem petunt, quem tamen non intrant. Nam obvii istis procedunt arteriarum ramuli, qui extrinsecus corticem inierunt. Cum his ad marginem materiae corticalis, medullae vascula varia anastomosi cohaerent. Revera enim anastomosis existit inter vasa capillaria griseae atque albae substantiae. In omnibus nostris speciminibus hanc sententiam confirmatam invenimus a). Fatendum quidem est, materiae corticalis retia, tum quod ad typum attinet, a substantiae medullaris retibus tantopere differre, ut locis, ubi utraque materia sibi vicina et contigua occurrit, primo obtutu quis forsitan differenti vasorum distributione deceptus, singulas materias suum cuique proprium systema capillarium habere suspicaretur; accuratiori vero microscopica investigatione mox sibi persuasum habebit, systemata ista plurimis locis anastomosi cohaerere et minime prorsus separata, cuique substantiae propria, habenda esse. Sententia autem eorum, qui anastomosin fieri negant, inde potissimum orta nobis videtur, quod Pia Mater a gyris tam facile detrahatur, quum vascula, uti E. H. WEBER dicit 1), unius duarumve linearum lon-

1) HILDEBRANDT'S Anatomie, Band III, Seite 407.

a) LONGET (Anat. et Phys. du système nerveux, tome I, pl. IV, fig. 3, l. v.) arteriolam centram per medullam cerebri ad eius corticem transeuntem delineavit; quicunque vero vascula haec in natura viderit, facile conspiciet, ramificationem in effigie ista fictam esse prorsusque a norma naturae discedere. Ramuli enim, uti postea fusius videbimus, magis parallelo cursu a trunco proficiscuntur.

gitudine, ingenti numero e materia corticali extrahantur et Piaë Matri adhaereant, ut vix quisquam crederet, haec vascula a profundioribus abrupta fuisse; quibus differens omnino capillarium copia accedit, in grisea materie adeo superior. Hinc nonnulli, sicut GÜNTHER 1), opinati fuerunt, vascula, postquam corticem perforaverint, gyro facto venarum forma ad Piaë Meningem redire. Haec autem opinio falsa est. Nam si lamellae verticales tenues cerebri, vasis sanguine rite impletis, sub microscopio conspiciantur, anastomosin ubique adesse apparet; vascula enim materiae corticalis non solum subtilissima cum materiae medullaris capillaribus cohaerent, verum etiam pluribus locis trunculi maiores e cortice in medullam transeunt atque ibi disperguntur.

Decursus vero vasorum in utraque substantia magnopere inter se differt. Alba enim in materia vascula non tantum maiora magis linea recta decurrunt, (confer. fig. I litt. e. e.) sed capillaria quoque minima frequenter angulo recto a trunculis discedunt et rete fere quadrangulare conformant vasculorum tenerrimorum, quae saepe ad angulum acutum dividuntur, in genere vero magis minusve parallelo decursu distinguuntur (Fig. I litt. e. d.). Retia haec in materie alba multo sunt rariora, id est: vascula minima inter se intervalla relinquunt longe maiora intervallis retium in grisea substantia conspicuis, quae quinquies, sexies vel etiam decies ab istis superantur. Grisea enim in materia retia (Fig. I litt. a. b.) vasorum capillarium copiosissima inveniuntur, ita ut,

1) Vid. caput I, pag. 15.

si penitus sanguine impleta occurrant, vix manu fideli delineari possint. Insignis haec vasculorum quantitas ubivis in grisea materie oculo sese offert, at diversis tamen locis (uti postea illustrabimus) typus differt, ut alius vasorum decursus observetur in cortice cerebri, alius in corpore striato, in thalamo atque in corpore dentato et olivari v. c. occurrat. At vero omnibus his in partibus retia quam maxime conferta et densa inveniuntur, unde primo intuitu semper facile est distinctu, utrum materiem griseam an albam sub microscopio conspiciamus.

Libenter igitur cum cuvor facimus 1), materiam griseam tam in cortice quam in centro cerebri per excellentiam sanguinem arteriosum accipere, sed minime illi assentimur, arterias ibi terminari neque cum medullae vasculis anastomoses inire. Nonnullis in speciminibus, ubi encephalitis durante vita extiterat, materies grisea tam insigni vasculorum copia gaudet, ut maxima pro parte meris fere ex vasis illam constare, facile quispiam ea conspiciatus existimaret.

Venae decursu et amplitudine in cerebro ab arteriis magnopere differunt. Occasio nobis defuit, ut ipsi quoque subtiliorem venarum per cerebrum distributionem investigaremus. Artificialis enim harum venarum impletio plurimas et singulares cautelas postulat, uti Clar. Promotor mecum communicavit. Inde paulo perfectior venarum istarum injectio raro tantum contingit. Ante aliquot annos tamen Promotor illam instituit injiciendis venis magnis Galeni et venis plexus choroidei. Quae ex felicissima hac

1) Videatur caput I, pag. 14.

impletione patuerint, in dissertatione de plexibus choroideis a v. GHERT relata, supra citavimus ¹⁾.

Secundum opinionem Clar. Viri SCHROEDER v. D. KOLK, venulae, quae per centrum semiovale Vieussenii decurrunt et corpus striatum perforantes in plexuum choroideorum venas transeunt, probabiliter arteriolas centrales longas e corporis striati arteriis ortas comitantur. Ex his venosum sanguinem recipiunt reducuntque. Num autem communicatio inter venas materiae corticalis venasque has centrales existat, probabile quidem habendum est, nondum vero satis constat. In uno ex speciminibus venam vidimus e medullari materia pluribus ramulis capillaribus ortam, qui ex reti communi originem ducebant, ad centimetri fere distantiam a corticali materiae, quam venae truncus adibat. Ex reti capillari, e quo haec vena proficiscebatur, eodem fere loco altera vena oriri videbatur, cuius vero truncus opposita directione vergebat; sed in lamella tenui dissectam istam non ulterius prosequi potuimus. Certe fuit vas centrale, quod cum vena corticali retis capillaris ope cohaerebat. Quod ad structuram et distributionem venarum attinet, nonnullos tamen observationes instituire nobis etiam licuit. Siccatis enim nostris in speciminibus saepius venas venulasque capillares distinguere potuimus, quae ab arteriolis tum decursu recto magis regulari, tum minori ramificatione, tum diametro duplo maiori, tum denique (quod imprimis notandum) peculiari adpectu, quam plurimum differunt. Plerumque venae longe minus san-

¹⁾ Vid. caput I, pag. 21.

guine impletæ occurrunt quam arteriæ; minores autem venæ hic illic plus sanguinis continent.

Maiores venæ ab arteriis potissimum distinguuntur striis longitudinalibus, parallelis, de quibus diu dubitavimus, num fortasse contractioni et corrugationi tunicarum durante exsiccatione adscribendæ essent, an revera fibris longitudinalibus constituerentur (confer. fig. XIII litt. c.). Tandem in corpore striato hominis venam maiorem, pro parte sanguine carentem offendimus, in qua fibræ longitudinales parallelæ quam manifestissime apparent. In minoribus venis, saltem in homine, rarius conspiciuntur; in cane et equo tamen minoribus quoque in ramis venosis manifestius sese offerunt.

Inprimis hæc venæ in materia corticali, ubi in venas Piae Meningis transeunt, inveniuntur. In vicinâ substantia medullari striatæ tales venas maiores rarius percipimus. Per materiem vero albam corporis striati venam perforantem maximam atque egregie longitudinaliter striatam invenimus.

§ 2.

Res hucusque fere prorsus incognita a), scilicet typus in de-

a) Jam vero J. F. H. ALBERS diversum illum typum quidem suspicatus esse videtur, sed nondum indagavit istum neque descripsit. Nam hæc de re (Microscopische Varicen in der grauen Substanz des Gehirnes der Irren: FROBIEP'S Tagesberichte, 1852, n.º. 557) sequentia verba enunciat: »Solche microscopische Varicen kommen beim chronischen Gehirnleiden gar nicht selten vor; doch ist ihr Vorkommen bei Irren noch wenig erforscht. Um sie aber genau und sorgfältig beobachten zu können, ist es unerlässlich, die normale Verbreitung der Gefäße im Gehirne zu

cursu vasorum singulis cerebri et medullae spinalis partibus proprius, magni momenti esse nobis videbatur; quam ob rem quoties cerebrum hominis vel animalium dissecaremus, semper curabamus ex diversis istis partibus specimina nobis comparanda, ut typum illum, si revera adesset, indagare et comparatione partium hominis tam inter se quam cum animalium similibus forsitan detegere possemus. Per aliquot deinceps menses eo modo procedentes, satis magnam speciminum copiam ex diversis cerebri medullaeque regionibus nacti sumus, quibus accurate investigatis revera, uti jam supra breviter monui, diversum in vasorum decursu typum pro variis partibus invenimus. Hunc typum in animalium cerebris, quae investigare nobis contigit, similem fere vidimus, ita ut distributio capillarium in singulis partibus ex cerebro et medulla equi, vaccae et canis cum similibus in homine habitu conveniat. In cerebro cuniculi atque avium vascula non satis sanguine impleta offendimus, ut rite de minutiori capillarium distributione judicari posset; typum tamen eundem in corticali materie cerebri cuniculi ex impletione artificiali carminii ope a Cl. THIERSCH confecta invenimus.

»kennen. Diese ist aber nicht so leicht zu bemerken und zu fassen, da »viele Stellen des Gehirnes eine von einander abweichende Gefäßverbrei- »tung besitzen. Die Natur hat eine so verschiedene Verbreitung der »kleinsten Gefäße in den verschiedenen Geweben durchgängig zur Ent- »wickelung gelangen lassen, dass sie so ziemlich die Verschiedenheit zei- »gen, welche dem Gewebstypus entspricht. Anders ist die Verbreitung »in der pia mater, anders in der grauen Substanz, anders in der glan- »dula pinealis und anders in dem Ependyma der Ventrikel.«

Liceat igitur nobis breviter partium praecipuarum typum tractare.

VASORUM IN CORTICE CEREBRI ET CEREBELLI

DESCRIPTIO.

Vasorum decursus in materie corticali cerebri differt, tum si attendamus ad truncos ramosque maiores, tum si ad vasorum capillarium distributionem animadvertamus. E Pia enim Meninge vasa sanguifera materiem corticalem fere verticaliter perforant, rectumque in genere ductum materiem albam versus servant, in quam nonnulli eorum transeunt et in rete capillare disperguntur. Ubi vero Pia Mater gyrorum flexuras subit, ubivis etiam ramulos maiores emittit, transverse griseam materiem perforantes; ad fundum igitur gyri vasa illa pulcherrime radiatim quasi e centro disperguntur, magis minusve griseam partem verticaliter perforantia.

Vasorum capillarium decursus in materia corticali pro vario loco differt. Rete prope Piam Meningem est confertissimum atque hic ramuli subtilissimi magis parallelum decursum tenent, innumerisque anastomosibus confluent. Paulo profundius prope marginem materiae griseae albaeque, alia fit vasculorum distributio. Hic enim potius gyratim decurrunt minusque rectam sed magis flexuosam viam sequuntur vascula, ubique anastomosi cohaerentia, intervallis tamen maioribus (Confer. fig. I, litt. a. b). Laquei hi vasculorum jamjam longiores fiunt et intervalla semper maiora, donec

in substantiam albam (fig. I, litt. c. d.) transgressi ramuli rariores sunt, aliaque denuo distributione gaudent. Talem partem griseae materiae cum alba contigua, ex ovis cerebro, cuius vasa GERLACH impleverat materia artificiali, KÖLLIKER delineavit 1), in qua delineatione sinuosus capillarium decursus rite expressus est. At vascula tamen hic paulo magis flexuose decurrunt, quam in genere nos observavimus. Benevolentia autem Clar. Viri VROLIK specimen tale elegantissimum, a Clar. V. GERLACH confectum, conspiciere nobis licuit, quod Promotor aestumatissimus mihi ostendit. In hoc specimen, licet rarae sane elegantiae, vasorum tamen decursus etiam paulo magis flexuosus occurrit quam in nostris, in quibus vascula non materiae quadam expansa sunt sed simpliciter sanguine a natura impleta siccata fuere. Suspicamur igitur vasorum expansione, impulsa materiae, in specimenibus GERLACHIANIS decursum istum arcuatum fuisse adauctum, cuius distributionis figura a KÖLLIKER data imaginem refert.

Differt autem, uti vidimus, hoc loco a distributione propriae Meningem. In materia vero alba, sicut supra descripsimus, vascula magis longitudinalem ductum sequuntur, cerebri centrum versus, unde decursus longe differt a vasorum in grisea substantia decursu (Vid. fig. I, litt. d.). Ad marginem materiae griseae capillaria substantiae albae recto decursu, ab hac deflecti illamque ingredi solent (Fig. I, litt. c.). Distributio capillarium aliquo modo differre videtur, prout Vgyrus aut transverse aut ad longitudinem secetur. Si prius

1) Allg. Anatomie. Spec. Gewebe, Seite 499.

obtinet, materies alba inter laterales griseae materiae partes
tenetur, ita ut gyri centrum constituat. Tunc apparet, vasa
albae materiae longitudinalem decursum sequi, in propinqui-
tate vero materiae griseae ad latera deflecti inque hanc sub-
stantiam transire. Si ad longitudinem dissectus fuerit gy-
rus, vascula maiora, quae ex Pia Matre oriuntur, recta fere
linea materiem corticalem perforare atque ita in medullarem
transire videmus, ubi cum vasis centralibus ante descriptis
confluunt. His ergo vasculis in centro gyri positissimum
fit communicatio inter vasa Piae Meningis et profunda
centrum semiovale Vieussenii perforantia, licet etiam ad la-
tera gyri, uti vidimus, frequens sit communicatio.

Hanc vasorum distributionem in homine, equo, cane, p-
vacca et in cuniculo eandem observavimus; quin etiam in
omnibus animalibus, in quibus materia corticalis distinctius
ab alba separatur, similis esse videtur.

Venarum decursus, quod ad truncos saltem attinet, ab
arteriarum decursu parumper modo differre videtur. Prope
Piam Meningem in grisea materie non semper arterias co-
mitantur, sed alia ratione proserpunt. Ingressuntur deinde
medullam cerebri, ubi imprimis recto suo decursu amploque
lumine distinguendae sunt, ita ut puncta rubra, quae dissecta
in materie alba occurrunt, magna saltem pro parte e disse-
ctis venis oriri videantur. Arteriarum enim ramuli sunt tenuiores.
Venae igitur corticis cum venis centralibus corporis striati
cohaerere quoque videntur. Perro magni momenti est his ad-
dere, communicationem inter arterias venasque in ipsa Pia
Matre existere; ita nempe Promotor, si cerebrum cum Dura

Meninge annexa omnibusque vasis quantum possit servatis e cranio eximeret, jamque tubulum in arteriam vertebralem prope basilarem, altera vertebrali carotidibusque ligatis, imponeret, ut arterias materia rubra impleret, — posthac vero, tubulo in sinum longitudinalem Durae Matris imposito, venis coeruleam materiem injiceret, hanc facillime per capillaria Piae Meningis in arterias transire rubramque antea immissam materiem repellere saepius observavit: tandem vero rubra materia in arterias iterum propulsa, coeruleam substantiam ex arteriis in venas denuo reduci, quod nudis oculis facile conspici poterat atque elegantissimum sane offerebat spectaculum.

Ex aliis injectionibus artificialibus saepius quoque Promotor expertus est, materiae coloratae ex arteriis in venas Piae Meningis transitum admodum facilem esse, quam ob rem profecto difficile fit, solas arterias implere.

Ex hisce concludere possumus, si congestio gravior ad cerebrum accedat, multum sanguinis per arterias allati in venas Piae Matris congestione dilatatas transire posse, quare non opus foret, ut sanguis omnis cerebrum ipsum permearet, qua singulari cura multae laesiones, ex compresso cerebro propter vasa nimis dilatata ceteroquin oriundae, averti possunt. Si denique ad innumeras anastomoses attendimus, quibus vasa capillaria profunda cum corticalibus cohaerent, mox apparet, hac ratione aequalem per totum cerebrum sanguinis decursum et pressionem promoveri ac congestiones locales, quae graviter nocerent, quam plurimum averti. Hinc ex generali sanguinis congestione noxae difficilior oriuntur, nisi

localis accedat irritatio quaedam, qua sanguis ad locum circumscriptum fortius allicitur.

Si lamellam e cerebello descissam, in qua arboris vitae ramusculi bene conspiciuntur vasaque sanguine rite impleta occurrunt, post exsiccationem addito balsamo Canadensi microscopice indagemus, primo obtutu vasorum decursus a distributione in gyris cerebri obvia valde differre videtur. In gyris enim cerebri, uti vidimus, Pia Mater inter gyrorum anfractus et recessus inflectitur; in cerebello autem hoc minime locum habet. Quum vero attentius cerebelli fabricam conspiciamus, dispositio griseae materiae in cerebro et cerebello vix differt. Nam in cerebello alba materies in truncos, ramos et ramulos magis subdividitur, unde arboris vitae nomen; singulae autem albae substantiae ramificationes obteguntur lamina tenui materiae griseae, quae ab uno ramulo arcu facto ad alterum vicinum continuato decursu migrat, sic dicta foliola vel gyros constituens. Pia Meninx autem hos materiae griseae inflexus non subit, verum vasorum trunci semper has laminas tegunt; hinc igitur, quum singulae laminae griseae quasi ex duplicata lamella constent, ubi trunci illi griseae partis centrum tenent, pariter atque in cerebro vasa maiora sulcum inter gyros vicinos ortum ingrediuntur; vasa vero ista centralia materiae griseae cerebelli nuda esse videntur, ut Pia Matre non obvestiantur, sicut in sulcis cerebri obtinet. Haec vasa centrum materiae huius griseae seu arboris vitae folioli ita tenent, ut, ubi vicinum foliolium aut lamella

grisea contigua discedat, etiam e vasis illis centralibus rami laterales has lamellas intrent, ibique denuo medium teneant. Centralia haec vasa, arcu facto, terminantur, ubi grisea materies in centro desinit, truncum versus vel ramos arboris vitae materia alba constitutae, uti delineavimus in fig. II, lit. a. Porro ex his vasis centralibus, magis minusve sinuose decurrentibus, innumera vascula capillaria recto fere angulo radiatim proveniunt, quorum ramificatio pulcherrimum spectaculum offert. Quamvis in genere parallelo decursu margines versus griseae materiae proserpant, anastomosibus tamen pluribus, uti in fig. citata videre licet, connectantur. Hinc capillarum distributio in materiae griseae cerebelli universe convenit cum ea, quam modo in cerebro descripsimus, ubi quoque ex fundo sulci gyris interpositi vascula maiora radiatim per griseam substantiam dimittuntur. Sed in cerebello hoc etiam de capillaribus valet, quae in cerebri grisea materia magis flexuosum ductum sequuntur; at generalis tamen vasorum distributio eadem dici potest. Ubi capillaria haec ad margines materiae griseae accesserunt, in rete sinuosum confertissimum abeunt, cuius ramuli longe alio modo decurrunt (Conf. fig. II, litt. b. b.). Rete hoc ubique ad limites griseae materiae proserpit, illamque ab alba substantia contigua acute separat. Tale rete ad marginem internum corticalis materiae in cerebro desideratur, ubi separatio utriusque substantiae minus acuta obtinet magisque gradatim perficitur, quum hic retia pedetentim rariora fiant, quod non ita in cerebello. Nonnulli rami maiores ex vasis centralibus orti hoc rete perforant atque in albam materiem penetrant, uti patet ex fig. II, lit. c. Saepe vero arcu facto ad griseam sub-

stantiam redeunt; nonnulla vasa, licet rara occurrant, alium decursum tenent, quae vasa venas esse suspicati fuimus (Vid. fig. II, litt. d. a.).

Multiplex anastomosis existit inter vascula retis descripti, quod materiem griseam membranae instar obvestit, et capillaria materiae albae (Confer. fit. cit. litt. d. d.). In hac substantia vascula iterum rariora, pluribus locis (litt. e. e.) transverse decurrentia, inveniuntur, quae mox in trunculos longitudinales (lit. f.) convertuntur, qui maiori minorive numero tramite parallelo materiae albae tractum ramosque inter foliola sequuntur et sic ad centrum prope ventriculum quartum procedere videntur. Ubi ad corpus dentatum cerebelli accedunt, prorsus aliam eamque elegantissimam ramificationem vascula acquirunt.

§ 3.

VASORUM IN CORPORE DENTATO ATQUE OLIVARI, IN THALAMO ET CORPORE STRIATO, IN GLANDULIS PITUITARIA ET PINEALI DESCRIPTIO.

Corpus dentatum, quod nudo oculo conspectum tanquam lineam griseam gyratim in irregularem oblongum annulum ductam sese offert, oculo armato admirabile densissimumque vasculorum rete exhibet. Quod enim nudo oculo linea arcuata dimidii fere millimetri diametro videbatur, sub microscopio conspectam nil aliud fere monstrat nisi vascula, quae per om-

nem lineae longitudinem transverse decurrunt innumeraque anastomosi conjunguntur, uti ex fig. III, litt. a. a. patet, qua corporis dentati exigua modo pars delineata est. In centro corporis dentati trunci maiores adsunt, e quibus plurimi rami profecti in rete densissimum istud terminantur (Conf. fig. III, litt. b. c.). Nonnulli alii rami ipsum corpus dentatum perforant et cum iis, qui extrinsecus intrant, cohaerent; exinde igitur stria illa grisea serpentina, vasisque ditissima, sanguinem suum e truncis externis atque internis simul accipit. Praeterea vasa capillaria centro corporis dentati inclusa, quod ad decursum pluribus certe locis a vasis capillaribus externis differunt. Minime eiusmodi longitudinalem ductum sequuntur, sed arcus formant, angulo tamen acuto ut plurimum e trunculis abeuntes (Vid. fig. III, lit. e.); dum materies medullaris extra corpus dentatum eundem longitudinalem decursum servat, qualis in reliquis medullae cerebelli partibus conspicitur (Fig. III, lit. f.). Magis autem centrum versus capillaria iterum rariora sunt typumque denuo in materia alba externa obvium accipiunt. In ipso centro non tantum arteriae maiores sed etiam venae inveniuntur. Cum hac singulari vasorum distributione ab omni parte capillarium in corpore olivari decursus convenit, et ipsorum multitudine et transverso per griseum lineam ductu. Hic quoque trunci externi et interni anastomosi frequentissima sua rete istud densissimum, quod in corpore dentato demonstravimus, conformant.

Insignis igitur harum partium vasorum copia et typus peculiaris non modo indicant, plures in his lamellis griseis perfici actiones, verum etiam ex perfecta similitudine in vasculorum utriusque or-

gani distributione, functionis quoque similitudinem suspicari licet.

Arcus aut gyri in corpore olivari tantum paulo acutiores esse videntur.

Quod ad vasculorum copiam et subtilitatem centra grisea in basi cerebri cum cetera materie grisea in genere conveniunt; vasorum vero decursus in singulis partibus quodammodo proprius est ac specialis, unde ex eorum distributione oculus exercitatus statim fere dignoscere potest, ad quodnam centrum griseum particula conspecta pertineat. Quum lamellam e thalamis opticis verticaliter sectam adque longitudinem ductam nobis comparamus, plurima eius vasa cum maioribus tamen minoribus singulari ductu parallelo distinguuntur, eiusmodi tamen ut magna pro parte verticaliter decurrant, ab inferiori parte sursum et a superiori ventriculari parte deorsum (Confer. fig. IV, litt. a. a. a.). Vascula vero haec parallela minime ubivis fibrillarum nervearum ductum sequuntur. Nonnullis locis eorum decursus magis minusve a parallelo isto tractu discedit. Capillarum in thalamis habitus imprimis flexu arcuato distinguitur atque anastomosi multiplici illa cohaerent, ita ut parallela vasa maiora, emissis undique ramulis in rete arcuatum confluentibus, inter se connectantur (Vid. fig. cit. litt. b. b.).

Ab hoc decursu differt omnino vasorum distributio in corporibus striatis. Per corpora striata trunci plures tum ex arteriis choroideis e circulo Willisii extrinsecus ortum ex arteriis plexuum choroideorum perforant atque in materiam medullarem centrum semiovale Vicussenii constituentem penetrant et ratione supra descripta magis minusve

cum corticis vasis confluent. Praeter hos truncos in ipsis corporibus striatis insignis adest capillarium minimorum copia, quorum ramificatio ab omni alia griseae materiae capillarium decursu potissimum angulis acutis distinguitur, quibus ramuli a se invicem discedunt; ita ut rete magis angulosum, minus flexuosum, quam in thalamis aliisque partibus griseis obtinet, oriatur. (Vid. fig. V, litt. a. a. a.).

Haec vasculorum minimorum multitudo in grisea corporum striatorum parte tanta invenitur, ut fere in nulla alia cerebri grisea parte aequalem capillarium numerum observare liceat. Accedit etiam, quod in corpore striato longe plures trunci maiores quam in ceteris regionibus occurrant, quare ex omnibus cerebri partibus organon vasis ditissimum dici potest, exceptis vero, quae mox videbimus, glandula pituitaria et infundibulo.

In alba corporis striati substantia magis minusve fasciculata, vasculorum copia minor est ac decursus parum differt a ceterae materiae medullaris typo. Hic illic tamen in primisque basin versus cerebri, ubi fibrae e corporibus pyramidalibus per pontem Varolii, crura cerebri prolongantur et in corpora striata transeunt, fibrarum medullarium fasciculi striis griseis separantur, unde nomen corporis striati. Griseae hae striae, dum albam materiem transgrediuntur, vasorum copia et maiori pelluciditate sub microscopio facile distinguuntur, ita ut vel in tenuissimis talibus striis rete capillarium densius longitudinale ex vicina albae substantiae retibus statim detegatur, quod fere eodem modo in ponte Varolii occurrit, ut postea fusius illustrabimus.

Licet glandula pituitaria a recentioribus nonnullis scripto-
ribus, uti ab A. ECKER (1); ad glandulas sanguinas referatur,
tamen infundibuli ope cum cerebro ipso arctissime cohaeret,
ita ut, utriusque etiam naturae, nihilominus appendix
cerebri dicenda sit. Haec glandula, si in segmenta tenuia
horizontalia dissecetur et post exsiccationem balsamo Canadensi
pellucida reddantur segmenta, mira profecto in istis conspi-
citur vasculorum copia. Omnes enim cerebri atque medullae
partes tum maiori vasorum diametro tum ingenti numero
longe superat, quare jure potius ad glandulas sanguiferas
quam ad cerebri quandam partem referenda videtur. Decursus
et anastomosis multiplex horum capillarum omnino peculiares
sunt. (Videatur fig. VI). Vasa ex infundibulo potissimum
glandulam ingrediuntur, ubique ex media parte magis latera
versus in utrumque lobum migrant. Alia vasa centralia ad
anterioriorem partem decurrunt ut plurimum peripheriam versus
tendentia. Vascula deinde in rete confertissimum eiusmodi
abunt, ut singula vascula serpentinum decursum teneant
atque ubi vis hac oratione contorto illo tramite imaginem offe-
rant quasi fere ex dilatationibus sibi proximis constarent. Rete
illud maioribus vasis (Fig. cit. lit. a) inter quae tenuiora (lit.
b) occurrunt pauciora, conformatur. In primis autem notandum
est, singulare hoc rete minime in ipsa glandula circumscri-
ptum esse, verum jam in cerebri infundibulo incipere. Hic
enim ad latera interna tractus optici pone decussationem

1) WAGNER's Handwörterbuch der Physiologie. Braunschweig 1849.
Liefer. 23. Seite 160 und f.

maiora Piaie Meningis vasa decurrunt, in plures crassiores ramos abeuntia, quae infundibulum versus procedunt ut plurimum parallelo ducta atque ramulos plures minores serpentinios fere emittunt. Nonnullorum maiorum truncorum lumen aequabat 0,0092 Poll. Angl. = 0,234 Millim. Venae prope infundibulum diameter erat 0,0122 P. A. = 0,31 Millim. Capillarium infundibuli lumen aequabat 0,0015 P. A. = 0,038 Mm. In ipsa glandula pituitaria vascula tenuissima etsi rara tamen adsunt, quibus diameter 0,00005 P. A. = 0,0013 Mm. Plurimorum vero capillarium lumen differt a : 0,0008 P. A. = 0,0204 Mm. ad : 0,0010 P. A. = 0,0255 Mm., interspersis aliis ad : 0,0016 P. A. = 0,0405 Mm. At trunci tamen nonnulli maiores in glandula quoque inveniuntur, quorum lumen 0,0044 P. A. = 0,112 Mm. Capillaria igitur glandulae pituitariae vasa quinquies sexiesve ipsius cerebri capillaria lumine superant. Vasa ceteroquin in omnibus glandulae partibus eiusdem fere naturae esse videntur. In lobis autem ad latera paullo magis conferta sed minus tortuosa decurrunt, dum aliis locis denuo flexuose proserpunt, et anastomosium frequentia conspicua sunt, uti in fig. VI apparet. Glandula denique pituitaria etiam nonnulla vascula ex sellae Turcicae integumentis paucisque capillaribus arteriae carotidis accipere videtur.

Glandula pinealis quam plurimum a glandula pituitaria tum fabrica et compositione tum vasorum copia recedere videtur. Si glandula haec dissecta balsamo Canadensi imponatur, mirabilis corpusculorum, quae sic dictam arenulam constituunt, dispositio observatur. Ubique corpuscula ista tam maiora quam

minora papillosam quasi frambesiae superficiem monstrant. Transverse dissecta constant e nucleo segmentisque ob strata sibi imposita, magis minusve parallelis. Teguntur flexuosis vasculis capillaribus tenuibus, serpentino modo supra et inter arenulas decurrentibus, longe vero rarioribus quam in glandula pituitaria.

§ 4.

VASORUM IN MATERIE NIGRA, IN PONTE VAROLII,

MEDULLA OBLONGATA ATQUE MEDULLA SPINALI

DESCRIPTIO.

Si lamellam dissecamus e cruribus cerebri per materiem nigram, quod ad vasorum habitum attinet, materiem hanc non multum ab alia substantia grisea differre apparet. Differentia autem quod ad copiam capillarium inter hanc et alias materies griseas haec invenitur, quod nigra substantia paulo minori vasorum copia gaudere videatur. Retia vasculorum ut plurimum triangularia sunt, fere uti in corpore striato occurrunt: tantummodo rete paulo rarius est. Ubique autem tanquam pigmentum corpuscula oblonga, caudata (corpuscula gangliosa caudata) retibus interposita observantur. Hic illic trunci vasorum maiores per crura cerebri aut materiem nigram decurrunt. Materies nigra separatis locis magis congregatim occurrit. Eius capillaria magna subtilitate et teneritate gaudent.

Expositis jam praecipuis centris griseis cerebri quod ad vasa sanguifera, ad medullam oblongatam pervenimus, cuius

corpora olivaria propter fabricae similitudinem una cum corporibus dentatis supra descripsimus. Praeter haec vero in medulla oblongata, saltem in ponte Varolii, grisea materies non ita centris specialibus separata, sed cum fibris magis intermixta occurrit, quod pro parte etiam de medulla oblongata ipsa valet. At hic tamen generalis lex: griseam nempe materiem vasis sanguiferis multo ditiolem esse medullari substantia, pariter atque ubivis alibi viget, quod luculentissime in ponte Varolii observatur. Nam quum huius organi sectionem verticaliter instituimus ad longitudinem corporum pyramidalium ductam, quorum medullares fibrae in ponte fibris transversis teguntur et cum his decussationem instituunt, lamellamque eiusmodi dissectam indagamus, apparet, singulos fibrarum longitudinalium fasciculos ab alijs vicinis tenui lamella grisea separari. (Confer. fig. VII litt. a, b, c). Jam vero mirum est, quantopere vasa capillaria minima per talem striam griseam decurrentia multiplicentur, ita ut rete longitudinale confertissimum vasculorum constituent, quae minutissimis ramulis longitudinalibus inter se varia anastomosi connexis proserpunt. (Fig. VII lit. b). Striae hae griseae crassitudine differunt; quin etiam admodum tenues occurrunt (Fig. cit. lit. c). At vero omnes tum vasorum copia tum maiori pelluciditate [quod figura exprimi non potuit] sub microscopio facile distinguuntur. Fasciculi medullares, qui striis istis griseis a se invicem separantur, longe paucioribus vasculorum retibus notantur, quamvis fibrae medullares tam transversales quam e pyramidibus adscendentes, capillarium retibus densioribus gaudeant, quam in cerebri parte medul-

lari obtinet. Trunci quoque plures e pia Meninge pontem Varolii ingrediuntur, quorum nonnulli, at vero non omnes, griseas strias comitantur. Memorabilis autem in vasorum decursa differentia datur in fasciculis his medullaribus, cum vascula jam potissimum transversum (Fig. VII litt. d. e. e), jam vero vicina longitudinalem decursum monstrent (litt. f. f). Haec autem differentia ex diverso fibrarum medullarium in ponte Varolii decursu facile explicatur; nam aliae fibrae, pyramidalium continuationes, longitudinaliter procedant, inter quas aliae, transversae scilicet fibrae pontis e cerebello natae, conspiciuntur. Inde, ubi fibrae transverse dissectae sunt, hic illic striis griseis, vasis sanguiferis etiam ditioribus, interceptantur. (Vid. fig. cit. litt. g. g). Mutua haec fibrarum medullarium griseae materiae ope separatio in ponte Varolii magni sane physiologici momenti esse debet.

Adscendentes pyramidum fibras in ipsa ponte Varolii tenui stria grisea admodum vasculosa cingi, modo vidimus. Hoc quoque valet de ipsis pyramidum fibris; si enim transversa dissectio instituatur, egregie fibrarum fasciculi transverse dissecti circulisque griseis circumnexus apparent. In transverso medullae oblongatae infra corpora olivaria segmento, quod fig. VIII e vacca delineavimus, luculenter illa dispositio conspicitur. Nam ibi fasciculi observantur transverse dissecti (Fig. cit. litt. a. a. a) annulisque griseae materiae (litt. b. b. b) cincti et separati, per quas strias elegantissimum rete capillare distribuitur. Pauci tantum atque tenuissimi capillarium ramuli ipsos hos fasciculos perreptant (litt. c. c).

In medulla spinali transverse dissecta vasa ex peripheria undique centrum versus tendentia perque sulcos anti-

cum et posticum intus penetrantia conspiciuntur. Hoc jam delineavit J. L. CLARKE 1). Jam vero non valde accurate vasa ista delineasse videtur. Nam in genere e peripheria vasa, medullam ingressa, rectius minusque sinuose centrum petunt, quum paucos modo ramulos laterales ut plurimum centrali tramite decurrentes emittant. (Confer. fig. IX litt. a, a). Horum maiora in cornua griseae materiae transeunt, quorum pars conspicitur in fig. cit. litt. b. b. b a). Ipsis in cornibus ca-

1) Researches into the structure of the Spinal Chord. Phil. Transact. London 1851, Part II, pl. 6, 10, 11 and 14.

a) Etiam B. STILLING (Ueber die Textur und Function der Medulla oblongata. Erlangen 1843) tabulis suis I, II et III haec vasa recte delineavit; at vero minús juste omnia ista tanquam fibrillas nerveas descripsisse videtur, quod ex his patet (pag. 5): »äusserst feine Fortsätze grauer »Querfasern gehen aus den vorderen grauen Strängen durch die Seiten-, »Vorder- und Hinterstränge, von innen nach aussen, ohne sich an der »Peripherie zu einem Nervenstamm zu verbinden. Diese feinen Fasern »begleiten meist die Fortsätze der pia mater und die Gefässe, und scheinen als Gefässnerven, welche die Ernährung des Rückenmarks und »seiner Theile vermitteln, betrachtet werden zu müssen. Diese Fortsätze »finden sich aber vorzugsweise an den vorderen grauen Strängen; weniger oder gar nicht von den hinteren ausgehend.«

Jam TODD et KÖLLIKER haec in re STILLING fortasse errare demonstrant. Legimus enim apud TODD (the cycl. of anat. and phys. London 1847, vol. III, p. 708) de fibrillis istis: »it is much more probable, »that they may be processes of grey matter prolonged towards the surface, to which bloodvessels may pass from the pia mater, or simply »bloodvessels passing from the pia mater to the grey matter. In some »well-injected specimens, which Mr. SMEE had the goodness to shew me »lately, the bloodvessels were seen to take exactly the same direction »and course as these lines.«

pillaria rete confertum, arcuatum, sinuosum varia anastomosi cohaerens componunt. Densius nobis hoc rete in cornibus anterioribus, e quibus icon sumta est, quam in posterioribus visum est. Haec vasorum distributio per totam medullam eadem adesse videtur. Si longitudinalis fit medullae sectio, egregie apparent vasa sanguifera recto tramite transverse medullam perforantia, quae ad cornua grisea tendunt.

Trunci vasorum maiores in genere prope nervorum radices medullam ingrediuntur, ut recte jam ARNOLD et CLARKE monuerunt 1). Distributionem vasorum per medullam spinalem Promotor aestumatissimus etiam luculenter mihi in nonnullis speciminibus ostendit, quae secundum methodum, quam KEUFFEL 2) descripsit ac secutus est (scil. macerandis segmentis medullae transversis per aliquot dies in potassa caustica prudenterque deinde in aqua frigida abluendis, ut medulla solvatur et laxetur) praeparata fuerant. In his eadem conspicere mihi licuit, quae KEUFFEL figura sua 3^{ia} depinxit et his verbis illustravit 3): »ich fand so am Ende ein netzförmiges

Sic quoque KÖLLIKER (microsc. Anat. Leipzig 1850, Band II, Spec. Gewebe, Seite 427) haec refert: »Was STILLING als eigenthümliche horizontale grane Fasern, die in die weisse Substanz der Seitenstränge übergehen, bezeichnet, sind wesentlich dieselben Fasern, die ich als von den Nervenwurzeln herstammend beschrieb, vorausgesetzt, dass STILLING diese Fasern wirklich kennt und nicht mit den hier besonders entwickelten Gefässen verwechselt hat.»

1) Confer. caput I, pag. 25.

2) Ueber das Rückenmark: NEIL'S Archiv für Physiologie, Band X, Seite 163 u. f.

3) Ibidem, pag. 164.

»Gewebe der feinsten Fasern, von welchen die grössten von
»der Peripherie, also von der Pia Mater nach den Centrum,
»wo die graue Substanz gewesen war, strebten.“ Hoc pa-
renchyma reticulare ex vasis cornua griseae materiae peten-
tibus constare nobis visum est.

§ 5.
DE GANGLIORUM VASIS.

Operae pretium quoque censuimus investigare, num mate-
ries grisea globulis gangliosis constituta in nervorum gangliis
vasorum speciali ramificatione et frequentia ab ipsis tubulis
nervosis discreparet. Ilunc in finem ganglion Gasceri ut et
ganglia nervorum cervicalia ac lumbalia elegimus, quae eadem
ratione exsiccata in lamellas tenuiores dividimus, quod tamen
propter maiorem tenacitatem difficilius erat. Vidimus autem,
revera ganglia alio gaudere vasorum decursu atque ipsos ner-
vos, quod potissimum conspicerere nobis licuit in ganglio Gasce-
ri. Ibi rete offendimus satis confertum vasis conformatum
singulari modo distributis; rete scil. in genere quidem in lon-
gum protractum dici potest, at pluribus tamen ramulis trans-
versis vel etiam in omnem partem anastomoses constituentibus
intermixtum; ita ut rete irregulare nobis visum sit, cuius ra-
muli ut plurimum angulis acutis disperguntur. Si quando
lamina ex methodo nostra balsamo Canadensi pellucida facta
est, corpusculorum gangliosorum margines non amplius recte
distingui possunt, sed egregie pigmentum istis contentum ap-
paret. Pluribus locis vascula minima inter illa corpuscula non

tantum decurrere, verum etiam illa circumnectere videbantur. Vasa autem haec in genere mat. griseae in cerebro vasa lumine superant. Plurima enim aequant 0,00055 Poll. Angl. = 0,0140 Mm. Sed dantur quoque rami ad 0,0016 P. A. = 0,0405 Mm. et ramuli, qui 0,0002 P. A. = 0,0051 Mm. non superant. Eandem fere ramificationem in aliis nervorum gangliis invenimus. In ipsis tubulis nervosis vasa capillaria tenuia longitudinalem ductum servant ramis anastomaticis plerumque ad angulum acutum decurrentibus. Vasa haec ipsa etiam sunt tenuiora.

Cum his gangliis, nervi sympathici ganglia quodammodo quod ad vasa conveniunt; eo tamen differunt, quod hic vasa longe maiora et crassiora ganglion perreptent. In genere enim aequant 0,0009 — 0,0010 P. A. Vas maximum erat 0,0044 — 0,0250 — 0,0255 Mm. Tenuissimum vas erat 0,0004 P. A. = 0,0112 Mm. Eiusmodi in ganglio thoracico primo nervi sympath. etiam invenimus. Ceterum vasa multifariam decurrunt, in genere quidem longitudinaliter, aliis vero locis in omnem abeunt partem crassioribus truncis quam in gangliis spinalibus occurrunt. Distributionem hanc iterum tum in ganglio coeliaco tum in cervicali superiori offendimus. Generalis vasorum crassitudo ad vasorum e glandula pituitaria delineatorum lumen accedit, quibuscum decursu quidem hic illuc conveniunt, at vero minime retium densitate et copia. Ceterum investigatio gangliorum accuratior hanc ob rem magni momenti esse videtur, quam vix de eorum pathologia quidquam cognitum sit. Promotor autem mecum communi-

cavit, se ruborem insignem horum gangliorum aliquoties observasse, ubi in peripheria nervi inflammatio aderat, praesertim in ganglio nervi vagi secundo, quod cum aliis nervi sympathici gangliis si vasorum distributio spectatur convenire videtur, praeterquam quod vasa paulo magis longitudinaliter decurrant.

C A P U T IV.

OBSERVATIONES ANATOMICO-PATHOLOGICAE DE
CEREBRI VASIS SANGUIFERIS.

§ 1.

Quod de anatomica cerebri systematis vasculosi cognitione statuimus (notiones hucusque admodum generales tantum viguisse), non minori profecto jure de vasorum cerebri anatomia pathologica dici potest. Differentia enim inter vasa cerebri sana et morbosa parum cognita est, quod praesertim de capillarum affectionibus valet.

Ne autem hoc miremur; nam per se patet, cerebri morborum dissectionem universe pauca modo adhuc docuisse, quum microscopica capillarum investigatio ob varias difficultates saepius neglecta fuisse videatur. Hoc potissimum inde explicandum credimus, quod substantiam cerebralem pellucidam vasaque perspicua reddere non noverint; ita ut in cerebro dissecando generatim tantum attenderetur, num signa illa diagnostica hyperaemiae adessent, quae A. FÖRSTER 1) his

1) Lehrbuch der pathol. Anat. Jena 1850, Seite 400.

verbis comprehendit: »die Hyperaemie ist kenntlich an den
»zahlreichen Blutpunkten, welche auf der Schnittfläche des
»Hirns auftreten; die letztere bedeckt sich rasch mit Blut,
»zeigt eine dunklere (röthliche) Färbung. Das Hirn torgel-
»scirt etwas. Die Gefäße der Hirnhäute sind strotzend
»gefüllt.»

Facile vero unusquisque nobis assentietur, diagnosis si-
gnis istis universis nitentem vagam saepiusque fallacem fore.
In genere quidem, ubi signa illa inveniantur, cerebrum
hyperaemia laborare, non est quod negaverimus, sed certam
eius affectionis morbosae, quae causa mortis habenda sit,
exinde diagnosis fieri posse, vix credere nobis licet. Saepe
enim obtinuit, ut in cadaveribus hominum, quibus durante
vita cerebrum graviter affectum esse symptomata omnia in-
dicasse videbantur, ipsius cerebri dissectio nil doceret^{a)},
quam contra in multis aliis, qui nullam cerebri functionum
laesionem durante vita denotaverant, centrum nervosum ani-
male revera hyperaemia affectum esse apparuerit.

Microscopicam capillarum indagacionem dubiis in casibus
istis maximi fore momenti, quis dubitaret?

Utilissima igitur methodus nostra in pathologiam cerebri
habenda est, quum, uti jam in ipsa illius descriptione mo-

a) Liceat, quae haec de re BOUCHET (sur la congestion cérébrale:
Annales médico-psychologiques, Paris 1850, T. II, p. 168) dicit, re-
ferre: »on a souvent été étonné de ne pas rencontrer des altérations
»plus considérables, à la suite de symptômes, qui avaient exprimé un
»désordre de fonctions tellement étrange, qu'on ne trouvait aucune pro-
»portion entre l'état pathologique et l'état cadavérique.»

nimus, in speciminibus, secundum illam confectis, capillarium aberratio morbosa oculis nudis non perspicienda microscopicae investigationi facile sese offerat.

Artificiales enim vasorum impletiones ad conclusiones pathologicas falsas facillime perducere, jam in capite secundo satis demonstrasse nobis videmur.

§ 2.

Facile vero monstratur nobis diagnosin si quis istis universis nihilentem vasorum sacciforme lumen forte in genere quidem, ubi signa illa inveniantur, cerebrum

At vero recentiori tempore nonnulli histiologi de microscopis observationibus, quod ad vasorum cerebri pathologiam attinet, mentionem facere coeperunt. Sic inter alios

A. KÖLLIKER ¹⁾ de dilatationibus minimorum vasorum cerebri loquitur, quas *varicositates* nuncupandas censet. Hae dilatationes, illo testante, in capillaribus, quibus lumen erat

0,004—0,006 Millim., ut et in venis tenuissimis inveniebantur. Ex mechanicis causis has oriri magisque ad apoplexiam capillarem quam ad encephalitidem referendas esse putat.

Praeter has dilatationes se quoque aneurysmata spuria arteriolarum cerebri observasse enarrat, quae in capillaribus paulo maioribus (0,009—0,5 Millim.) post rupturam tuni-

carum intimae et mediae orici sanguinisque inter tunicas mediam et adventitiam effusionem producere videntur, unde sublata illa adventitia dilatationes sacciformes nascuntur,

quae magnopere, quod ad formam certe, cum dilatationibus

¹⁾ Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie. Leipzig 1849, Band I, S. 260 u. f.

istis conveniunt, quas Clar. Praeceptor. HARTING¹⁾ in ovario degenerato observavit atque effigibus illustravit. Leone enim inserta ipse KÖLLIKER aneurysmata illa spuria delineavit, quae prodromos et comites apoplexiae habendas putat, uti ex his verbis liquet²⁾: »die so gebildeten, oft bedeutend grossen und den Durchmesser der Gefässe, an denen sie sitzen, um die Hälfte bis um das Vier- und Sechsfache übertreffenden Erweiterungen bleiben in manchen Fällen länger bestehen, oder sie zerreißen bald nach ihrem Entstehen; im letztern Falle führen sie, je nachdem grössere oder kleinere, viele oder wenige Gefässe betroffen sind, zu grossen oder kleinen, selbst zu sogenannten capillären Apoplexien.“ Aneurysmata haec spuria H. PESTALOZZI³⁾ accurate indagavit. In quinque casibus apoplexiae, quibus aegri citius tardiusve diversisque cum symptomatibus concomitantibus decesserant, variis locis (in cortice, in corpore striato, in thalamo et ponte Varolii) ista invenit atque examini microscopico submitit. Nudo oculo conspecta, parva sanguinis coagula videbantur; haec vero coagula, microscopice investigata, omnino aneurysmata talia esse apparuit, qualia KÖLLIKER delineaverat. Quum autem PESTALOZZI saepius observasset, una cum aneurysmatica hac cerebri affectione rubram sic dictam emollitionem etiam inveniri, hanc ex illa

1) Over varikeuze haarvaten: Nederl. Lancet, 2^e Serie, 4^e jaargang, 1848—1849, blad. 65 enz.

2) Opi. land. pag. 264.

3) Ueber Aneurysmata spuria der kleinen Gehirnarterien und ihren Zusammenhang mit Apoplexie. Inaugural-Abhandlung. Würzburg. 1849.

facile oriri posse putat. Nutritionem enim substantiae cereb-
bralis haec aneurysmata eicientis, ex degeneratione et ob-
structione arteriolarum pessumdari, sanguisque inter tunicas
effusi deinde decompositione atque infiltratione, rubram eam
emollitionem interdum nasci, crediderit. Plerumque vero
causa apoplexiae capillaris in degeneratione hac aneurysmatica
haerere ipsi visa est.

Nuperrime J. F. H. ALBERS¹⁾ quoque maniaci materiem
corticalem, quam praeter normam profunde coloratam offen-
derat, microscopii ope indagavit, quaeque ibi invenit, his
verbis nobiscum communicat: „als ich die so veränderte
Hirnmasse unter dem Microscop betrachtete, fand ich die
Gefässe an der Stelle, wo sie sich in die Hirnsubstanz
zwischen die Fasern einsenken, sehr weit, so dass sie eine
Art breiter Schläuche darstellten, von denen die kleineren,
welche ungefähr $\frac{1}{2}$ der Grösse des Muttereschlauches hatten,
wie die Finger von einem Handschuh abgingen. Diese
kleineren Gefässe waren mit Blut ziemlich gefüllt, während
der Muttereschlauch fast leer war. Durch ihre Anfüllung
mit Blut konnte man sie bis zum Rande der grauen Hirn-
substanz verfolgen, und sehen, wie sie diese Ausdehnung
auch noch bis zu einer geringen Erstreckung in die weisse
Substanz beibehielten. Diese Verbreitung und Ausdehnung
der Hirngefässe war an der Oberfläche ziemlich allgemein,

1) Microscopische Varicen in der grauen Substanz des Gehirnes der
Arron: FRONIER'S Tagesberichte 1852, No. 557. — Repert. van v. HAS-
SELT en HEKMEYER, Jaarg. 1852, bl. 257.

» auch an der Basis vorhanden. Die Gefässentwicklung
» hatte die Hirnfasern und die sparsamen Hirnganglien ver-
» hältnissmässig auf einen geringeren Raum beschränkt, in-
» dem sie im Verhältniss zu der Markmasse des Gehirns
» ungefähr $\frac{5}{8}$ betragen mochten. Bei Vergleichung der Ge-
» fässentwicklung der grauen Hirnsubstanz eines an Geistes-
» krankheit nicht leidenden Mannes fand ich zwar eine äh-
» nliche Gefässverbreitung, aber keineswegs eine ähnliche Er-
» weiterung derselben.

In eodem maniaco, qui melancholia cum haemorrhoidum molestiis laboraverat, in ipsa Pia Meninge vascula praeter normam distributa, atque univse dilatata ALBERS invenit, ita ut nudo oculo usque in subtilissimas ramifications ista distinguere posset. Haec observatio valde iis appropinquat, quas de longitudinali dilatatione (*varicositeit*) ventularum Piae Matris, J. N. RAMAER 1) fecit nobisque enarravit. Ubi haec dilatatio majori gradu adesset, distributio et divisio vasculorum in Pia Meninge adeo inde erant modificatae, ut ipsius membranae conspectus penitus abnormalis et peculiaris fieret. Vascula haec longitudinaliter dilatata variis modis rotata contortaque occurrebant.

RAMAER mentionem quoque hic facit de casibus, ubi vasculorum dilatatio minime ad membranas tantum pertineret, verum etiam ipsius cerebri capillaria expansa viderentur; quae vero expansio nunquam longitudinalis sed semper transversae

1) Observations on the Functions of the Brain: Philadelphia 1817.

1) Tijdschrift der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst; 1850, bl. 274 enz.

diametri observabatur. Praesertim autem notandum enunciat, se apud plerosque homines, qui talem venularum in membrana cerebri vasculosa dilatationem offerrent, simul cordis vitia gravia, qualia insufficientiam afferre soleant, detexisse; quam ob rem magna cum probabilitate vitium istud, mechanice sanguinis venosi regressum impediens, tali venularum expansioni ansam praebere posse contendit. Etsi igitur aegri eiusmodi, durante vita, ex symptomatum syndrome chronica congestione ad cerebrum laborare viderentur, RAMAER tamen credit, nulla ratione de activa congestione hic cogitandum esse, sed potius de passiva ex mechanicis circulationis impedimentis orta, quod in primis casu quodam confirmatum invenerat, ubi una cum cordis dextri ventriculo dilatato valvularumque tricuspidalium atrophiam, systema venosum in genere admodum sanguine impletum, Piae Meningis vero venas illo adeo turgentibus conspiceret, ut fere coerulea materie artificiali impletas has credidisset.

Observationes quasdam de dilatatis cerebri vasculis etiam E. HOME ¹⁾ descripsit, breviterque historiis morborum illustravit. Enarrat enim, hominis ex insolatione mortui cerebrum exploratum generalem Piae Matris vasculorum expansionem una cum emollitione substantiae ipsius cerebri visui obtulisse. Deinde loquitur de puella, quae doloribus capitis, potissimum si lecto decumberet, ita gravibus affecta

¹⁾ Observations on the Functions of the Brain: Philos. Transact. London 1814, Section III, page 477. — MECHELS Archiv für die Physiologie. Halle und Berlin 1817, Band III, Seite 111.

fuerat, ut subinde delirium consequeretur; «after death, ut
»ipsis illius verbis utar, the veins in the medullary and
»cortical substance of the brain were found considerably
»enlarged.”
Deliria cum insecutis apoplexiae insultibus et hemiplegia
in homine observavit, in cuius cerebro «the smaller arteries
»were preternaturally enlarged.”
Eiusmodi morbosas affectiones, quales ab illis scriptoribus
relatas hic inserui, microscopice investigare ipsis nobis con-
tigit. Benevolentia enim Clar. PROMOTORIS plurimum mania-
corum, encephalitide cum emolitione, apoplexia et talibus
morbis acutis mortuorum, cerebra indagare nobis licuit; qui
etiam Clar. Praeceptor DONDERS, Virique DSS. VAN HASSELT
et HEKMEYER optime de me meriti sunt, quum opportunita-
tem mihi dederint eosdem hos morbos in equo et cane ob-
servare illisque in animalibus experimenta instituere, de qui-
bus postea fusius agemus.

Liceat igitur, quae indagatio ista nos docuerit, breviter
afferre.

Omnium sane affectionum, quibus cerebrum corripitur,
congestio frequentissime occurrit. Nam in nonnullis praeser-
tim plethoricis individuis ex leviori quovis stimulo sanguinis
ad cerebrum affluxus oritur, ita ut ad hyperaemiam apud

eos organon illud praedispositum esse fere dixeris. Feliciter vero plerisque in casibus leviori gradu existit et mox evanescit absque ullis nocivis sequelis. Hoc explicatur iis, quae de cerebri irritabilitate Clar. SCHROEDER V. D. KOLK. 1) dixit, ubi haec refert: »de hersenen, hoe gewichtig dit orgaan ook zijn moge, zijn niet zeer prikkelbaar, dat is: de hersenen kunnen wel door een' geringen prikkel worden aangedaan, maar zij gaan niet zoo spoedig in ontsteking over. Wel kunnen in acute gevallen hevige hersenontstekingen ontstaan, en deze neiging tot ontsteking is in het meer prikkelbaar gestel van een kind veel grooter, maar in den volwassen leeftijd is het dikwijls verwonderlijk, welke prikkels de hersenen kunnen verdragen, zonder dat zich eene ontsteking vertoont, die hier zoo ligt onherstelbare gevolgen nakaat, en indien nu al eene ontsteking ontstaat, zoo vertoont zij zich het eerst en het meest in de hersenvliezen en heeft eene bijzondere neiging tot een langzaam (chronisch) verloop. In de massa der hersenen ontstaat eene primaire ontsteking veel zeldzamer en blijft dan gemeenlijk plaatselijk a).»

1) Tijdschrift der Nederl. Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde; derde Jaargang. Febr. 1852, bl. 66.

a) Licet non huius loci sit fusa agere de cerebri ad congestionem dispositione, verbo tantum in memoriam revocare volumus, congestionem cerebri in pluribus casibus, quibus sanguinis circulatio acceleratur, averti, quum cranium cavitatem ab omni parte clausam formet, quo fit, ut ad congestionem provocandam sanguis maiorem pressionem superare debeat. Carotis autem facialis, ut et arteriae thyreoideae superior et inferior

Ubi autem quam frequentissime congestio obtinet ac diutius, quam par sit, perdurat, vel localis quaedam irritatio accedit, facile in gravem morbum converti potest; ita ut dilatationes capillarum magis continuas et perdurantes oriantur, unde stimulo levissimo, tunicis capillarum tenuissimis relaxatis et dilatatis, congestio increseat necesse est.

Congestionem ipsam de industria nos tractare non opus est; quia anatomiam pathologicam hic tantum spectamus. Potius igitur quaestio, quid offerant dissectio atque investigatio cerebri congestione correpti, nobis elucidanda videtur. Supra jam citavimus, quae in recentissimo de anatomia pathologica compendio hyperaemiae signa diagnostica relata sunt. His BOUCHET 1) in commentatione sua pulcherrima de congestione cerebri haec addit: »la simple injection des vaisseaux plus ou moins dilatés, ou bien des teintes variables en couleur et disposées sous forme de marbrures; parfois ces injections et ces teintes sont bornées aux parties grises centrales, d'autres fois elles s'étendent dans les par-

(*) Cfr. SCHROEDER v. d. KOLK esdem observavit, qui refert in pluribus casibus generalis circulationis incitatio sanguinem copiosius propellat ad faciem et glandulam thyroideam, congestio vero ad cerebrum medullamque avertatur. Hinc rubor faciei non semper congestionem cerebri indicat. Si autem oritur, saepius post aliquod tempus tollitur, quia sanguis copiosius fluit vasa versus externa, in quibus pressio minor est. Si quidem sanguis ad cerebrum et medullam copiosius affluit, venae spinales, latae illae et copiosae, maiori liquoris spinalis pressionem cedere debent et comprimuntur, quo spatium sanguini affluentiori datur.

1) Annales médico-psychologiques, Paris 1850, tome II, page 167.

»ties blanches et quelquefois elles se montrent aussi dans le
»cervelet.»

»Uti nobis videtur, revera in congestione (graviori saltem)
»cerebri vascula dilatantur. Ilac autem in rei ab inflamma-
»tione congestio differt, quod ibi dilatatio et maiori gradu et
»locis magis circumscriptis, in congestione vero magis universe
»atque aequabiliter obtinere videtur. Quum hyperaemia affe-
»ctum cerebrum dissecatur, non solum puncta illa rubra tan-
»topere laudata apparent, sed etiam, sicut recte monuit BOU-
»CHER, superficies dissecta substantiae ipsius cerebri, postquam
»in aqua abluta fuit, varie colorata, quasi marmoris imaginem
»referat, conspicitur. Variis locis haec coloris substantiae
»cerebralis differentia occurrit a).

»In medulla vero cerebri et melius distingui potest et saepius
»obtinere videtur, praesertim, quod Promotor pluries se observasse
»mihi narravit, ubi respiratione impedita congestio fuerat orta.

»Microscopice investigata puncta rubra vascula maiora esse

a) Clar. SCHROEDER v. D. KOLK eadem observavit, uti refert in hi-
»storia melancholiae his verbis: »duidelijk hing hiermede samen een ver-
»schil in kleur van de grijze stof der hersenkronkelingen, die vooral
»na afspoeling met water zich zeer duidelijl vertoonden; de voorste lobi
»cerebri, namelijk, aan beide hemisferen vertoonden de zeer ligt ro-
»zenroode kleur, zooals deze in gezonde hersenen na afbrekking der Pia
»Mening als normaal voorkomt; op het boven-achterste gedeelte der
»hemisferen waren integendeel de gyri veel bleeker van kleur; wate-
»riger, zooals men gewoon is deze in dementia aan te treffen.» (Waar-
»neming betreffende eene melancholie met neiging tot suidicium: Nederl.
»Lancet, Derde Serie, eerste jaargang, 1851, bl. 39).

transverse dissecta statim patet, e quorum absentia vel praesentia non multum tamen concludere nobis licet. Nam in dissectionis adeo cerebris, quae a norma naturae abscedere minime videntur, puncta ista quoque occurrunt; quin etiam nobis persuasum habemus, in omni cerebri medulla ista inventum iri, quum ex vasis maioribus iis oriuntur, quorum decursum per centrum semiovale Vieusseni in capite III descripsimus. Haec autem vasa, uti ex mentionibus nobis patuit, in genere maiori lumine gaudent quam plurimi in cortice trunci, ita ut rubra ista puncta satis magna ex sanguine stillato, sano quoque in cerebro occurrant. At fateamur tamen ex numero insigni punctorum ubique inventorum, hyperaemiae statum valde probabilem fieri; sed magis semper ad numerum quam ad lumen eorum attendendum esse, ut inde pathologicae deductiones fiant, nihilominus putamus.

Puncta haec figuris illustravit J. HOPE 1) in quibus cerebri sanum (fig. 241) dissectum cum cerebris hyperaemia affectis (figs. 242, 243 et 244), ut inter se comparari possent, juxta positum occurrit. His verba sequentia (page 284) addit: »the veins on the surface are preternaturally »turgid, and their minute ramifications become unusually »distinct. The interior exhibits an exaggerated degree of »the natural red dotting, especially in the grey substance »of the convolutions, the colour not being so bright a red »as that from inflammation.» In hac autem, uti (page 285) effatur: »the substance of the brain, when sliced, presents

1) Principles and illustrations of morbid anatomy. London 1834.

na preternatural degree of scarlet dotting, which has been compared by Mr. LALLEMAND to a white surface, sprinkled over with red sand (injection sablée).”

Pulcherrime puncta haec quoque in apoplexiae capillaris casibus CRUVEILLIER ¹⁾ depinxit, tam in cerebro quam in cerebello obviae.

Quod ad substantiae cerebri ipsius marmoreum colorem attinet, de quo supra sermo fuit, ex microscopicis investigationibus patuit, hunc potissimum oriri, ubi vascula subtilissima in cerebri medulla magis sanguine repleantur ^{a)}.

¹⁾ Anatomie pathol. du corps humain: livr. XX, planche 3; livr. XXXIII, pl. 2; livr. XXXVI, pl. 1; livr. XXXVII, pl. 5.

^{a)} J. HOPE marmoreum hunc colorem non solum capillarum sanguine impletioni, verum etiam huius per vasorum parietes transsudationi tribuere videtur. Legimus enim apud illum (op. 1. pag. 284): »in some instances, more especially those in which the circulation has been greatly retarded, the brain is marbled with a purple cloudiness, occasioned perhaps by a faint transsudation through the gorged vessels. In cases of great and old congestion it is not uncommon for the vessels of the medullary substance, to be so charged with dark blood as to impart a uniform dingy grey tinge to this substance;” quibus (page 285) addit: »uniform redness may vary in depth from a light rose-colour to a deep mahogany-hue. It is never general, being found only in patches in different parts.”

Talem colorem variegatum rosaceum in medulla cerebri saepissime se observasse Promotor mecum communicavit. Si vero adsit meningitis cum inflammatione materiae corticalis, frequenter color talis rosaceus inaequalis in medulla cerebri occurrit.

Tunc tamen exinde nondum concludere licet ad medullaris huius partis inflammationem: propter irritabilitatem cerebri exiguam, qua tarde ad-

Facile enim intellectu est, sanguinem, durante ipsa congestione, maiori vi a tergo propulsam, aut in venis et venulis retentum, tenerrima quoque ista vascula repleturum, quae alioquin sanguine carent. Nam in medulla capillaria tantae tenuitatis (0,0005—0,001 Mm.) reperimus, ut corpuscula sanguinea vix continere posse viderentur; ita ut cum HENLE¹⁾ faceremus, ubi haec effatur: »das einzige Factum, welches mir für die Existenz der serösen Gefässe zu sprechen scheint, ist Folgendes: in der Substanz des Gehirnes sind die feinsten Capillargefässe röhrlige Cylinder mit ovalen Körnchen (Zellenkernen) besetzt. Von diesen und als Aeste derselben gehen Fäden ab, welche selbst bei 300 maliger Vergrößerung von kaum messbarer Dicke und in regelmäßigen Abständen mit denselben ovalen Zellenkernen besetzt sind, so dass sie nur wie Verbindungsfäden derselben erscheinen. Der Zusammenhang dieser Fäden mit den Blutgefässen macht es wahrscheinlich, dass sie Flüssigkeit führen; Blutkörperchen würden sie in keinem Falle aufnehmen im Stande sein.“

His addendum, si capillaria minima illa medullae cerebri, tam copiosa, omnia sanguine rubro semper essent impleta, vix materies medullaris album colorem servare posset. Videtur autem unum alterumve sanguinis corpusculum sano

modum inflammatio per cerebrum dispergitur, in centro vulgo tantum congestio obtinet, dum in ambitu in gyris sub Pia Meninge inflammatio chronica adesse potest, uti in maniacis et dementibus frequenter occurrit.

1) Allgemeine Anatomic. Leipzig 1841, S. 477.

statu tamen per plurima transire; congestione vero pluribus corpusculis implentur, unde tunc rosaceus medullae color a).

Sed non solum tenerrima ista vascula in congestione sanguine turgent, verum etiam capillaria et vasa maiora ubique illa, magna sanguinis contenti copia gaudent, ita ut retia vasorum expansorum densa ac pulcherrima fere omnibus in partibus occurrant.

Ubi vero ad inflammationem congestio transierit, retia quam confertissima sunt, dilatatio vasorum, uti videbimus, magis inaequalis locis circumscriptis et maiori gradu frequenter conspicitur, quod ex encephalitis specimenibus nostris illustrare nobis liceat.

Contigit nobis specimina encephalitis colligere, diverso omnino inflammationis gradu. In uno casu canis per duos dies aegrotans encephalide comatosa, cuius causa incognita erat et qua apoplectice mortuus est, exquisitum acutae encephalitis specimen observavimus. Alterum encephalitis specimen est ex equo, qui laboraverat exostosi interna crami, quum ipsum cerebrum inflammatione etiam satis intensa

a) Hinc color leviter rosaceus non inflammationis praesentiam demonstrat, quam primo adspectu adesse facile quis suspicaretur. Hoc colore antea etiam Praeceptor mihi confessus est, se deceptum fuisse, uti patet ex dissertatione Doctissimi HOMOET (de dementia, Traj. ad Rhenum 1842, pag. 49), quo tempore opinabatur, colorem istum explicandum esse ex exsudato sero subrubro, quia vasculorum subtilitas ipsi adhuc erat incognita. Exinde apparet, quanti sit momenti ad dijudicandam cerebri pathologiam, vascula capillaria juxta nostram methodum microscopice investigare.

esset correptum. Haec autem inflammatio minus acuta erat quam in casu canis modo memorato. Denique tres casus meningitidis chronicae post maniam idiopathicam, apoplexia capillari terminatos, investigare nobis licuit. In his congestio et dilatatio diverso quoque adsunt gradu. In uno ex his plures accessus apoplectici dies aliquot mortem praegressi fuerunt atque maximam vasorum cerebralium oppletionem apud hunc maniacum invenimus. Videamus igitur prius de encephalite acuta.

Huius plura egregia specimina cerebrum canis memorati obtulit. In nullo alio cerebro tales tantasque vidimus vasorum dilatationes; inprimis in materie corticali. Sub Pia Meninge hic illic sanguinis effusiones invenimus, etiam ubi Piae Matris duplicatura inter gyros cerebrum intrat. Vasa ipsa plurima quam maxime sunt dilatata, hic illic sanguine exsudato cineta. Venae etiam impletae sanguine et hic magna quidem copia visibiles occurrunt, quales ceterum in sano cerebro non spectantur.

Vasa non tantum capillaria sed etiam alia magnopere dilatata videntur, ut pluribus locis in materie corticali rete vasorum crassiorum irregulare occurrat, quale in nullo alio cerebro neque canis alius offendimus. Ob rei momentum partem materiae corticalis, vasis maioribus notatam, in figura XIII Promotor delineavit nobisque usui dedit. Vasa omni directione ducta hic apparent, quam plurimum dilatata (fig. cit. litt. a. a. a.), quorum maximi trunci diameter inter a et b 0,250 Millim. aequat. At aliis tamen locis vasa invenimus, quorum lumen aequabat 0,470 Millim. His truncis intermixta sunt plura vasa capillaria (litt.

b. L.). Delineavimus simul partem venae summopere (0,380 Millim.) dilatatae (litt. c), striis longitudinalibus notatae, uti antea descripsimus. Haec vasa cum aliis materiae corticalis in cane comparavimus. Vas, quod omnibus in specimenibus ex 5 canibus desumptis amplissimum invenire potuimus, partim indicatur lit. *d* (0,158 Millim.), unde dilatatio morbosa insignis vasorum appareret. In pluribus aliis autem cerebri sani locis ne trunci quidem talis crassitiei, qualem vas lit. *d* notatum offert, occurrebant, ita ut, omnibus rite comparatis, tuto concludere nobis liceat, pluribus locis vasorum in materia corticali huius canis diametrum quinques, sexies quin etiam octies adauctam fuisse. Hinc talia loca nudo oculo conspecta sanguinem effusum mentiuntur, quae tamen fere unice ex vasis vehementer dilatatis constant.

Inter haec vasa occurrunt plura, quae locales monstrant dilatationes; aliquando inde vasculi eiusmodi diameter diversis locis admodum differt, quin etiam localis ista expansio interdum fit tanta, ut locis dilatatis vasculi diameter aliquoties diametrum normalem superet. Ita v. e. ex capillari 0,0005 P. A. = 0,0126 Millim. aequante ad dimidii millimetri distantiam dilatatio fiebat ad 0,0028 P. A. = 0,071 Mm. Nos quoque expansionem talem in fig. XI depinximus, ubi tamen luminis differentia non tanta conspicitur.

Aliis locis dilatationes breviores magis aneurysmaticas in ipsis etiam capillaribus invenimus, locis potissimum, ubi maximus fuerit sanguinis affluxus, quales e materia corticali delineavimus figura nostra XII. Vulgo hae aneurysmaticae dilatationes inter se subsequuntur; in capillaribus etiam minutissimis, quibus lumen 0,0003 P. A. = 0,0076 Millim., deteguntur.

In cerebro canis sani quoque similes dilatationes subinde reperimus, longe vero minori numero, neque expansiones erant tantae.

Si jam ad enormem talem vasorum dilatationem attendamus, nullum dubium superesse potest, quin nervorum tubuli tanta vasorum contentorum expansione haud minus comprimi debeant quam si effusio ipsius adesset sanguinis.

Aliis locis vasa et magis contorta sunt et sinuosum decursum sequuntur; quod probat, talia vasa expansione fuisse extensa et hinc contorta. Tale vas delineavimus fig. XI, lit. b, qualia etiam vidit et descripsit K. B. REICHERT ¹⁾ ex ganglio Gasceri leporis. Contortus autem ille decursus dilatationes aliquando simulare potest.

In materie medullari eiusdem canis encephalitide mortui, vasorum tum maiorum tum capillarium rete ubivis egregie occurrebat; tam inter maiora quam inter minora plura quoque magis minusve erant contorta; locales vero in trunculis et capillaribus dilatationes rarius quam in materie corticali occurrebant. Vasorum copia hic magis miranda erat, quam ceteroquin in medulla cerebri sani vasa capillaria sanguifera vix aut prorsus non conspiciantur, ita ut statu sano haec vascula potius serum quam sanguinem rubrum vehere videntur, unde color leviter rosaceus medullae, post congestiones graves vel potissimum post encephalitidem conspicuus, explicatur, de quo colore antea (pag. 77) locuti fuimus.

1) Zur Controverse über die Erweiterung der feineren Blutgefäße bei Entzündungen: MÜLLER'S Archiv. für die Physiologie. Berlin 1847. Seite 480 u. s. w. Tafel XV, fig. 4 und 5.

In corpore striato huius canis vasa quam maxime dilatata et magno numero sanguine egregie impleta invenimus. Plures hic aderant locales dilatationes insignes, aliquando sacciformes, eaeque maiori copia quam in materie corticali occurrerant. Etiam venae nonnullae hic illic localiter dilatatae esse videbantur. In striis quoque medullaribus corporis striati vasorum copia erat insignis.

In cerebello eiusdem canis non modo trunci vasorum in media parte folioli grisei erant dilatati, verum etiam pluribus locis sanguinis effusiones conspiciebantur, quod universe in cerebello frequentius locum habere videtur. Vasa foliolorum capillaria, qualia delineavimus fig. II, nonnullis locis erant subtilissima, aliis non conspicua, fortasse propter vasorum centralium effusiones. In medulla cerebelli minutissimum aderat rete capillare cum vasis hic illic, licet rarius, etiam dilatatis. Mirum sane, systema capillare in materia alba cerebelli huius canis longe magis impletum esse quam materiae griseae vasa capillaria.

In altero specimine, equi encephalite mortui, cerebrum elegantissimum quoque vasorum rete exhibuit; imo materies corticalis pluribus etiam capillaribus gaudere videbatur quam in cane memorato. Capillaria magis aequalia erant; vasorum dilatationes non invenimus, licet diversis locis vasa contorta essent. Ad Piaë Matris inter gyros plicaturas effusiones sanguinis plures hic illic etiam in cerebro obviae, inveniebantur. Nonnullis locis arteriae tum etiam venae minores dilatatae videbantur, ut rete occurreret fere analogum reti, quod fig. XIII depinximus. Materia medullaris quoque pluribus vasculis capillaribus gaudebat.

Corpus striatum et truncorum et capillarium rete admirabilis elegantiae offerebat; sed etiam hic vasorum dilatationes deficiebant.

In cerebello equi eiusdem ubivis fere effusiones ad vasa centralia conspiciebantur. Lateralia autem materiae griseae capillaria adeo perfecte sanguine impleta erant, ut vix quidquam elegantius spectari possit. Pars cerebelli medullaris ubique etiam vasis conspicuis praedita erat.

§ 4.

Denique investigavimus cerebri vasa capillaria in tribus maniae casibus, in quibus meningitis chronica praegressa fuerat, quae maiorem minoremve imbecillitatem et dementiam produxerat. Primus aeger fuit vir septuaginta fere annorum, jam per plures annos demens; antea mania satis acuta affectus fuit, semper congestione cerebri laboravit; tandem gangraena ex decubitu orta penitus exhaustus mortuus est. In huius cerebro meningitidem exsudativam invenimus, ut inter Arachnoideam et Piam Meningem stratum albuminosum sublactei coloris, quale in casibus eiusmodi non deesse solet, membranam vasculosam tegetet. Vasa capillaria tam materiae corticalis quam medullaris elegantissime erant impleta et trunci maiores dilatati, quorum maximum (0,175 Mm.) fig. nostra X delineavit Clar. Promotor. Vasa quoque inaequaliter erant expansa, pluraque contorta. Effusiones vero non aderant. Potissimum corticis sub Pia Meninge superficies insigni capillarum copia notata erat. Ipsa autem capillaria non adeo dilatata videbantur.

Eadem erat vasorum conditio in thalamis et corporibus striatis. Retia quam confertissima capillarum tum etiam trunci arteriarum venarumque pulcherrime impleti occurrebant. Locales dilatationes dubiae; effusiones hic quoque non adesse videbantur.

In altero maniaco praegressa meningitis acuta ad demenciam et summam imbecillitatem cum symptomatibus subparalyticis duxit, ita ut et cursus vacillans et loquela difficilis esset. Ultimo tempore evacuationes involuntariae et postremis duobus mensibus saepius rediit insultus apoplecticus cum insigni congestione, e quibus tamen ad priorem statum resurrexit. Tandem vero accessit vehementissimus apoplexiae insultus, ut morti proximus esse videretur. Venaesectionibus tamen et cucurbitis aegri conditio paullisper emendari videbatur; at vero congestio, licet paullulum diminuta, perdurabat donec post quatuor dies mortuus est.

In hoc cerebro cum meningitidis tum exsudationis Piae Meningis (sic dictae arachnoididis) vehementissima indicia invenimus. Tam Durae quam Piae Meningis vasa sanguinea quam maxime erant referta. Specimina microscopica nobis non modo capillaria numerosissima et corticis et medullae monstrarunt, verum etiam omnia dilatata esse, ut, quod ex mensuris, quas postea dabimus, patebit, capillaria etiam subtilissima multo latiora et crassiora essent, quam in ullo alio casu. Trunci quoque erant dilatati. Differentia autem maior conspiciebatur in aucta diametro capillarum quam truncorum. Effusiones sanguinis in materie corticali vix occurrebant.

Eandem vasorum expansionem in corporibus striatis et thalamis offendimus. Capillarum rete in his speciminibus

adeo impletum erat, ut ad elegantissima, quae vidimus, pertineant; tam lumine quam numero, imprimis etiam in parte medullari, longe superabant vasa capillaria priori casu in iisdem partibus conspicua. Sed trunci hic quoque multo latiores quam in casu priori. Paucae dilatationes locales; nonnulla vasa contorta; paucis locis sanguinis effusiones observavimus. Venae etiam dilatatae videbantur.

In ponte Varolii eadem vasorum capillarium ubertas et turgor, tantaque elegantia, ut haec specimina ad figuram nostram VII exhibendam elegerimus. Hic illic locales vasorum dilatationes. Paucis locis, praesertim circa venas, exsudationes ad truncos aderant.

Non minori elegantia cerebelli vasa capillaria tam materiae griseae quam albae excellabant. Vasa centralia hic quoque effusiones, quas tam frequenter in cerebello observavimus, monstrabant; modicas tamen nec tam copiosas quam in cerebello equi supra descripti.

In tertio casu maniacus per plures annos jam demens fuerat, etsi leviori gradu, magis alienatus, garrulus, vividior. Ultimo tempore ex inopinato insultus apoplecticus cum congestionem accessit, e quo tamen prorsus reconvaluit sine ulla sequela. Post quatuor fere hebdomades novus apoplexiae insultus ortus est, quo succubuit.

In huius cerebro manifesta exsudationis vestigia ex meningitide in hemisphaeriorum superficie aderant. Vasa capillaria etiam quam plurima tam in cortice quam in medulla, at vero non adeo dilatata. Quam plurimis autem locis suffusiones

sanguineae circa trunculos et in grisea et in medullari materie, ac si ipse sanguis exsudatus esset, obviae erant. Hae effusiones oriri debuerunt ultimo accessu apoplectico, quem probabiliter lethalem reddiderunt.

Eundem eventum nobis cerebelli conspectus monstravit. Truncos multo ampliores hic invenimus quam in ullo alio cerebello. In aliis cerebelli locis pluribus vasa centralia materiae griseae integra videbantur sine ulla effusione, qualia loca in prioribus speciminibus rara aderant. Capillaria egregie impleta at vero minus expansa conspiciebantur quam in casu priori.

Si hos tres casus comparamus, apparet, priori casu vasa capillaria et truncos fuisse dilatatos, unde cerebri oppressione tandem exhaustus est aeger sed non apoplectice obiit et sine sanguinis effusione. In secundo maniaco insultus apoplectici fortiores et congestio vehementior fuerunt, quod cum dilatatione vasorum longe maiori convenit. In corpore striato et cerebello effusiones recentes circa truncos mortem promovisse videntur. Hoc probabilius fit comparatione cum tertii aegri cerebro, vehementissimo insultu mortui, in quo sanguinis effusiones multo frequentiores vasaque in cerebello magnopere dilatata erant. Capillarum expansio, qualem in secundo aegro invenimus, stupiditatem insignem explicare nobis videtur, quae in hoc maniaco longe maiori gradu quam in ceteris observabatur. Nam in ultimo aegro stupiditas et imbecillitas non ita adfuerunt. Satis erat vividus, quod respondet naturali capillarum dimensionibus. Suffusiones autem sanguinis, quales hic occurrebant, circa microscopica vasa, oculo nudo non distinguendae, tantummodo recognosci possunt nostra me-

thodo adhibita. Ex omnibus igitur huius methodi praestantia in dignoscendis morbis cerebri patet, tum etiam comparatione diversarum cerebri partium effici potest, quatenus pars durante vita plurimum fuerit affecta. — Operae pretium fore putavimus, speciminum e cerebris maniacorum atque animalium encephalite mortuorum tum truncos tum capillaria dimetiri, quum dilataciones vasorum insignes in his adesse viderentur, uti jam in ipsa eorum descriptione universe monuimus. Mentionibus faciendis, ut inde comparationes institui possent, has dilataciones illustrare nostrum esse credidimus. Uti per se patet, non semper eundem vasorum numerum metiri nobis licuit, quia neque ex omnibus individuis eandem speciminum copiam nobis comparare potuimus neque ipsa specimina truncorum et capillarium eundem numerum offerebant. At vero quantum id fieri posset, ut ratio rite servaretur, in eligendis vasis metiendis, tam ad magnitudinem quam ad numerum attendimus (in genere 8—12 cuiusque partis vasorum mentiones instituimus), mentionumque minimam, maximam et intermediam indicavimus, quo typus et gradus dilatationum magis conspicui fierent.

Corticem cerebri, cerebellum et corpus striatum gravissimas mensuris vasorum partes fore censuimus. Cortex enim cerebri, imprimis in maniacis, frequentissime affectionum focus fieri videtur; cerebellum addidimus, ut comparatio inter cerebrum et hoc organon institui posset; corpus striatum tandem ob magnum vasorum lumen et ingentem copiam ex centris griseis praecipuum habuimus. Licet igitur tabulae forma mentiones has inserere.

Ex hac tabula apparet, vasa sanguifera, et trunculos et capillaria, in tribus maniacis encephalitide chronica affectis, ex dilatatione maiora esse quam in homine sano. Inprimis in maniacis, potissimum b. et c. in materie cerebri corticali truncos longe maiores (0,275 Mm., 0,310 Mm. ad 0,452 Mm. in sano homine) invenimus, capillaria praesertim in maniaco b. (0,0093 Mm.) maiora, dum in aliis copia quidem, minus vero diametro excellabant. In cerebello trunci etiam maiores quam in cerebri cortice occurrunt, potissimum autem in maniacis hi erant dilatati (0,265 Mm., 0,390 Mm. et 0,380 Mm. ad 0,164 Mm. in sano homine). Capillaria in cerebello omnium maniacorum, inprimis a. et b. dilatata erant.

Maximi vasorum trunci in corpore striato occurrunt, quae in maniacis quoque insignis erant amplitudinis. Capillaria paulo quidem latiora, sed magis numero in his ingenti distinguebantur.

Ex his liquet, in encephalitide systematis capillaris praecipue trunculos dilatari. Vascula tenerrima quod ad diametrum minus a statu normali discedere, licet paullulum etiam dilatari videantur. Potissimum vero haec truncorum in inflammatione cerebri dilatatio in speciminibus apparet encephalitidis magis acutae, quorum exempla in cane et equo addidimus. Quam plurimum hoc valet de cane, qui intra duorum dierum spatium comatosus mortuus est. Eius cerebrum ruberrimum erat, truncique plures adeo dilatati, ut operae pretium iudicaverit Promotor eorum delineationem (fig. XIII) addere, cuius descriptionem jam dedimus pag. 80. Ex hac autem figura, vasis cum trunco (lit. d.) maximo, quem in cane sano inve-

nire potuimus, comparatis, apparet, quantopere in encephalide acuta trunculi dilatari et expandi possint, dum vasa capillaria innumera quantitate, non vero diametro adeo maiori conspicua sint.

In equo trunci in genere maiores, non tam dilatati tamen occurrebant quam in cane, quod inflammationi hoc in casu magis chronicae respondet. Notandum etiam, in cortice cerebri tum equi tum canis trunculos nos invenisse maiores quam in cerebello, dum in homine, praecipue vero in maniacis b. et c. cerebelli vasis longe superabantur trunci e materie cerebri corticali. Sic quoque trunci in corpore striato longe maiores occurrunt, tum in sano homine tum in maniacis, quam in cortice. In equo vero et potissimum in cane contrarium obtinebat.

Facile intellectu est, tanta trunculorum expansione tenerri-
mam cerebri structuram laedi fibrillasque cerebrales magnopere
comprimi necesse esse, ut exinde effectus iidem oriri debeant,
ac si cerebrum sanguinis effusione compressum fuerit. Quamvis
enim trunculi enumerati per se modo exigui sint, tantus
tamen eorum numerus in cerebro datur, ut omnium dilatatio,
adacta ad duplex quin ad triplex lumen normale, insignem
cerebri compressionem afferre debeat.

Maximi autem momenti est differentiam his addere, quam
in tribus maniacis invenimus. Maniacus a. senex, exhaustus
et paralyticus obiit. Reliqui vero cum symptomatibus apo-
plexiae decesserant. In horum autem cerebris pluribus locis
trunculos vasorum strato rubro sanguinis exsudati cinctos in-
venimus, quales exsudationes neque in homine neque in ma-

niaco a. occurrebant. Non improbabile ergo videtur, talem effusionem capillarem multum contribuere, nisi praecipua sit causa, symptomatum, quae apoplexiam capillarem comitantur, quod pluribus tamen observationibus confirmari amplius debet.

Nihil enim obstat, quominus admittamus, sanguinem tot locis cum ipsa cerebri materie grisea et medullari in contactu directo positum, stimulum nocivum producere, cui hic symptomatum concursus originem debet. Sanguis enim ille extra vasa positus non amplius oxydatione renovatur sanguisque venosi effectus cerebro nocivi satis sunt cogniti.

Haec confirmantur observatione canis encephalotide acuta mortui, in cuius cortice plures tales effusiones occurrebant. In equo vero encephalotide affecto sed trucidato tales effusiones in cerebro ipso non invenimus. Memorabile autem est, tales effusiones in cerebello admodum vulgares esse, scilicet circa vasa centralia, quae in griseae materiae media parte decurrunt. Quum vero hae effusiones in sanis quoque cerebellis occurrant, non confundendae sunt cum exsudationibus modo memoratis. Vasa enim hic contorta, quum dissecantur, sanguinem effundere itaque istis ansam praebere possunt.

Maximi momenti in posterum erit, tum ad exsudationes hasce tum ad vasorum dilatationes morbosas sedulo attendere atque inquirere, num occurrant locales affectiones in hac aliave cerebri parte, quae determinatis symptomatibus respondeant, e quibus quantopere et cerebri physiologia et pathologia illustrari possint, vix est quod moneamus.

CAPUT V.

NONNULLAE ANIMADVERSIONES DE NARCOTICORUM IN CEREBRUM ET MEDULLAM VI.

§ 1.

Jam ab initio inde conati fuimus, vasa cerebri quantum posset ea potissimum conditione investigare, qua durante vita sanguine impleta sint, ut recte de normali eorum habitu atque inde comparatione facta de morboſo ſtatu judicare poſſemus. Hunc in finem putavimus, citiſſime ſine ſanguinis jaectura animal necando, congeſtionem averti poſſe, quae ex impedita reſpiratione in agone mortis neceſſario oritur. Hanc ob cauſam, invitante Promotore, Doct. V. HASSELT plura animalia narcoticis diverſis efficaciſſimis necavit ac benevolenter nobis cerebra iſtorum tradidit. In primis ac. hydrocyanico, oepate radja, woorara, nicotino atque opio uſus eſt.

Maxime autem admirati fuimus, in omnibus hiſ cerebris ſingularem anaemiam occurrere; ita quidem, ut in nonnullis vaſa Piae Meningiſ modice quidem impleta eſſent, vaſa vero ipſius cerebri adeo ſanguine orbata, ut capillaria in ſegmentis exſiccatis nullo fere loco conſpici poſſent. Materiae gri-

scæ ubivis color flavus, æqualis tam in cerebro quam in cerebello occurrebat. Hic illic tantum aliquot trunculi se offerebant, ut sane difficile fuerit dimensiones instituere, quibus comparatio cum aliis cerebris fieri posset. Maximi enim momenti nobis visum est, effectus investigare, quos in cerebro producerent narcotica, utrum congestio ex iis adhibitis generalis, an potius in quibusdam cerebri partibus excitaretur, quum auctores recentissimi diversa ratione narcoticorum in vasa cerebri reactionem dijudicent, jam congestionem adesse jam deficere testantes.

Sic ORFILA 1) læsiones in cerebro narcoticorum opè productas his verbis enunciat: «le cerveau et les méninges offrent souvent des engorgemens dans les vaisseaux veineux, qui rampent à leur surface ou qui se distribuent dans leur tissu.»

Eiusmodi verbis V. HASSELT 2) quoque narcoticorum effectum descripsit, ubi refert: «wij beschouwen de ontwikkelde narcosis als aderlijke bloedsophooping in den schedel, die weldra stijgen kan tot den graad van hersendrukking.»

Hanc autem hyperaemiam in cranio magis ad sinus venosos vasaque meningum quam ad cerebri ipsius capillaria referendam esse putat, uti liquet ex iis, quæ de autopsia cerebri hominum vel animalium ex narcoticis mortuorum affert his verbis 3): «belangrijke bloedsophooping in de hersen-

1) Traité de toxicologie. Paris 1843, Tome II, page 185.

2) Handleiding der Vergiftleer. Utrecht 1850, bl. 157.

3) Ibidem, pag. 164.

»vliezen en vooral in de aderboezems van den schedel, met
»oogenschijnlijk normaal voorkomen der hersenzelfstandigheid
»zelve." Quibus paulo post haec addit 1): »het is juist na
»narcosis een zeer gewoon verschijnsel, de liersenmassa zelve
»oogenschijnlijk normaal gesteld te vinden, veel meer althans
»dan na eenig idiopathisch hersenlijden van anderen aard."

Alii quoque toxicologiam tractantes dubitant de
»liis, quae vulgo in autopsiis de cerebri statu post mortem
»ex narcotico administrato referuntur. Sic CHRISTISON 2): »many
»of the statements, inquit, to be found in authors on the
»morbid appearances caused by narcotics are far from being
»accurate. The morbid appearances, they leave in the dead
»body, are commonly insignificant. In the brain, where
»chiefly the physician is led from the symptoms to expect
»unnatural appearances, the organs are in general quite healthy.
»Sometimes however the veins are gorged with blood, and
»the ventricles and membranes contain serosity."

Confidentius etiam eadem enunciat FLANDIN sequenti modo 3):
»aussi les poisons végétaux, à l'exception de ceux, qui sont
»véritablement acides ou irritants, ne laissent-ils sur les cada-
»vres aucune lésion d'organes, qui leur soit propre. On a
»parlé d'injections vasculaires dans le cerveau etc., mais ces
»altérations n'ont rien de constant. Tout au contraire, la
»coïncidence des symptômes cérébraux pendant la vie avec

1) Ibidem, pag. 167. (1) Traité de toxicologie. Paris 1843. Tome II.

2) Treatise on poisons, 4^e ed. Edinburg 1845. p. 662; narcotic poisons.

3) Traité des poisons; des poisons en général. Par. 1846. page 242.

» l'absence de lésions cadavériques, peut devenir une présomp-
» tion d'empoisonnement par une plante narcotique ou par l'un
» de ses produits immédiats. »

Quum igitur cerebra canum opio, nicotino, ac. hydrocy-
anico, opate radja et woorara necatorum talem statum anaem-
icum referrent, qualem in sani adeo cerebri normali condi-
tione non expectasses, ita ut ob colorem pallidiorem nudo
oculo ex speciminibus distingui possent, propter singularem
huius rei eventum nostra interesse censuimus, de industria
hanc rem inquirere, atque experimentis repetitis narcoticorum
effectum, quod ad cerebri systema sanguiferum attinet, quan-
tum potuimus, illustrare.

Quum vero duorum canum opio necatorum cerebra eundem
statum anaemicum referrent, quem cerebra aliis narcoticis
interfactorum (id quod admodum virtuti opii circulationem ex-
citanti repugnare videbatur), inprimis opii in cerebrum effec-
tum amplius indagare nobis in animo erat.

Uni autem horum canum 3 grana extracti opii in aquae
drachmis VI soluta in venam jugularem injecta fuerunt, isque
sub tenesmis vehementibus multas faeces deposuit et in cursu
posteriorum crurum vacillantes motus ostendit, donec humi
prostratus cum incitata paululum circulatione et suppressa sensi-
bilitate 24 fere horas in statu comatoso degit, postridie vero
prorsus reffectus surrexit adque normalem statum rediit. Triduo
post eadem symptomata, maiora vero gradu, referebat, quum
8 grana extr. opii in aquae uncia una soluta ipsi denuo in
venam jugularem injiciebantur. Statim fere post injectionem
sub tenesmis vehementissimis alvum deposuit et mox humi

prolapsus est, profunde comatosus et anaesthesia laborans, qui status usque ad diei sequentis vesperam perdurabat, quum mortuus est.

Hicce tamen canis, licet, uti ex profundo comate patet, quam maxime opii narcosi affectus fuisset, in cerebro non solum nulla congestionis signa, verum e contrario anaemiam tantam exhibebat, ut corticalis adeo materies pallidissima trunculique rarissimi, nulla vero capillaria conspicerentur (Confer. tab. II).

ORFILA quoque duos casus ¹⁾ refert, ubi canibus robustis opium solutum in venas injectum fuerat. Alter, cui in venam jugularem opium (40 centigrammes) solutum in aqua (12 grammes) immissum fuit, eadem symptomata referebat, quae modo citavimus. At pulsatio vero cordis post injectam solutionem non frequentior sed post horae tertiam partem perspicue tardior fiebat. Sequenti die incessus satis bonus erat et status comatosus evanuerat, sed constanter nutrimenta assumere animal recusabat, atque in statu subcomatoso 8 etiam dies degebat, donec mortuus est. Horis 5 post mortem, cadaveris autopsia quod ad cerebrum haec docuit: »la portion supérieure de la pie-mère, correspondant aux extrémités antérieure et postérieure du lobe droit du cerveau, était fortement injectée en rouge dans une étendue circulaire, dont le diamètre était d'environ un centimètre: elle paraissait noire. Le ventricule droit contenait un peu de sérosité roussâtre, et les vaisseaux, qui le par-

1) Op. laud. pag. 216.

»courent intérieurement, étaient d'un rouge vif et assez
»fortement injectés. Il n'y avait point de lésion dans l'hé-
»misphère gauche.»

Altero in cane (25 centigrammes d'extrait), qui 5 diebus
post experimentum institutum obierat, cadaveris sectio do-
cuit 1): »que le cerveau n'offrait aucune lésion apparente.»

Fortasse quisquam contenderit, hisce in casibus de opii
in systema cerebri vasculosum mero effectu sermonem esse
non posse, quum plures etiam dies eius administrationi su-
pervixerint canes omnemque cibum assumere recusaverint.
Liceat igitur nobis his casum alterius nostri canis opio ne-
cati opponere, cui in ipsa narcosi cavitas abdominalis fere
absque ulla haemorrhagia aperiebatur, quum durante adhuc
narcosi mortuus est. At huius tamen canis cerebrum ean-
dem prae se ferebat anaemiam, quae in altero cane, cuius
casum paulo supra enarravimus, aderat.

Sic, ubi v. HASSELT 2) nobiscum communicat, se in cane,
gallo gallinaceo et cuniculo, quos nicotino necaverat, in ce-
rebri hemisphaerio opposito lateri, in quod animalia delapsa
erant, effusionis vestigia invenisse, addit: »het verschijnsel
»sprak niet duidelijk genoeg. Ten slotte moet omtrent dit
»punt wel worden overwogen, dat hier vooral sprake is
»van dierproeven; althans in het visum repertum van G.
»FOUGNIES (Affaire BOCARMÉ) leest men woordelijk: le cer-
»veau était tout-à-fait sain; il n'y avait aucune trace d'épan-

1) Ibidem, pag. 217.

2) Bijzondere vergifleer, Utrecht 1852, bladz. 473.

»chément cérébral. Men hechte dus in de toepassing geene
»te hooge waarde daaraan. Ook FRESCHI deed in een kri-
»tisch overzicht onlangs opmerken, dat men hier eigenlijk
»weinig sprekende lijkverschijnselen bezit.”

In canibus et galla nicotino necatis differentiam quandam
congestionis vel effusionem in alterutro latere nos invenire
non potuimus, licet etiam haec animalia in unum latus sem-
per prolapsa essent ante mortem.

Anaemiam vero, quam nos in cerebris animalium opio,
ac. hydrocyanico, nicotino, oepate radja et woorara necato-
rum invencramus, jam ab aliis quoque subinde observatam
fuisse v. HASSELT nos docet. Ubi enim cavi cranii post
veneficium ac. hydrocyanico conditionem sequenti modo de-
scripsit 1): »Vrij algemeen wordt sterke aderlijke hyperaemie
»van de hersenvliezen, van de hersen- en ruggemergshoezems,
»soms ook van het cerebrum en de medulla zelve, eene en-
»kele maal slechts met bloedextravasaat aangetroffen,” haec
addidit 2): »alleen cōZE ontkent dit lijkverschijnsel. Hij wil
»integendeel anaemia cerebri gevonden hebben, zooals hem
»door direkte gewigtsbepaling en uit het lager specifiek ge-
»wigt der hersenmassa bij zijne dierproeven zoude geble-
»ken zijn.”

1) Ibidem, pag. 372.

2) Ibidem, pag. 373.

§ 2.

Difficillimum profecto est dijudicatu, ex quam causa talem anaemiam explicare debeamus. Monendum vero, omnibus in his canibus, tam in integumentis capitis externis quam in ipso cranio et Dura Meninge, vasa quam plurimum sanguine fuisse impleta, ut non tantum ipsum cranium pluribus locis rubesceret sinusque venosi sanguine impleti essent, verum etiam Piae Matris venae satis turgent, quod quam maxime ipsi cerebri substantiae anaemicae et pallidae oppositum erat. Quum vero vasa cerebralialia, praesertim medullaris partis, tanta gaudeant contractilitate, ut sanguinem exprimant itaque puncta rubra in dissecto cerebro vulgo oriuntur, quaestio nascitur, num in his animalibus opio necatis propter vasorum horum diu perdurantem contractilitatem sanguis e cerebro expelli potuerit; praecipue, quum sanguis cerebrialis in genere lentius coaguletur, quae coagulatio, uti observavimus, opio injecto etiam diminuitur. Tale quid, si admitti posset, illustraret, cur in casu inflammationis sanguis magis plasticus ex his vasculis minus exprimi potuerit, ut ibi status naturalis vel congestio adeo magis remaneant. Quidquid est, Promotor aliam viam ingrediendam esse iudicavit, qua sanguis forsitan ea conditione, qua in ipsa narcosi lethali versatur, retineri posset in cerebro. Cum igitur constet, aëris in venas inflatu circulationem citissime impediri, cordis contractionibus in aërem ventriculis contentum inertibus redditis, tali in conditione vix sanguis aut expelli aut excipi potest. Hac igitur ratione Promotor sperabat, fore ut congestionem cerebri averteret, quae ceterum ex impe-

dita respiratione in agone mortis sequitur. Atqui ergo opinatus est circulantis sanguinis stagnationem produci posse eo effectu, ut sanguis in cerebro praesens melius retineretur. Varia igitur hunc in finem experimenta instituimus.

Clar. Praeceptor DONDERS, quum forte canem necare sibi proposuisset, nobis benevolus in illum tale experimentum instituit. In venam nempe jugularem sinistram huius canis solutionis extracti opii aquosi duae drachmae injiciebantur, quibus immissis primo quidem erethismus cum incitata circulatione motibusque convulsivis oriebatur, postea vero nulla fere oppressionis signa ex sopore vel comate cum retardata admodum circulatione conspicua subsequabantur, ita ut post horam dimidiam canem ad statum normalem rediisse fere dixisses. Huius rei causa jam alteri venae jugulari duae etiam drachmae vini opii fortioris immittebantur, quo mox comatosus procumbebat canis, etsi reflexio inprimis palpebrarum diu adhuc sese manifestabat. Tunc etiam apparuit, extremitates anteriores paralyticas factas esse. Hora fere post priorem injectionem aër inflatus est in jugularem dextram, quum sub convulsionibus momento citius animal decessit. Peculiaris strepitus, quem aëris in venas introitu oriri aiunt, hocce in casu distincte percipiebatur.

Sequenti die huius canis cerebrum dissecuimus. Hic quoque uti etiam in prioribus observatum fuerat, vasa externa tum cranii tum meningum magna congestionem affecta esse patuit, quin etiam superficies ipsius cerebri eiusque substantia satis vasis sanguine rite impletis gaudere nobis videbantur. At canis tamen durante experimento sanguinis dr. iß fere jacturam expertus fuerat.

Etiam ex hoc cerebro diversa specimina solita ratione praeparavimus; quorum comparatione instituta apparuit, cerebri vascula sanguine contento hic illic eleganter esse conspicua; capillaria quoque potissimum in medullari parte satis magno numero adesse. In grisea parte capillaria mirae erant tenuitatis, ut vix metienda essent; nonnulla loca etiam anaemica. Ergo satis magna differentia hoc cerebrum diversum erat a cerebro canis opio sine inflatu occisi. Haec differentia tam in cerebro quam in cerebello erat conspicua. In priori enim cane solo opio necato cerebelli vasorum typus, qualem delineavimus fig. II, discerni nulla ratione poterat. In cane opio et inflatu necato nonnullis locis cerebelli vasa rite erant impleta. Maxime vero vasorum rete in corpore striato huius canis eleganter conspiciebatur. Insigne autem aderat discrimen inter hoc et canis encephalide mortui cerebrum, in quo non solum omnia capillaria longe elegantius impleta erant, sed in quo etiam vasorum trunculi longe magis erant expansi; et ita quidem, ut revera dubitari posset, num in statu sano minor sanguinis copia per cerebri vasa transeat, quam invenimus in cerebro canis opio et inflatione necati; quod si admittere deberemus, etiam statuendum esset, partem medullarem cerebri sanguinem rubrum non vehere, atque inde capillarum minorum sanguine impletorum in medulla cerebri praesentiam signum esse debere congestionis, quod tamen statuere nondum audemus. Sufficiat igitur indicasse in hoc cerebro vix congestionem adfuisse.

Simile experimentum in equa quoque instituere benevolentia Viri Clar. WELLENBERGH nobis contigit, quod experimentum

tamen, licet minus feliciter successerit, propter singulares opii effectus observatos reticere nolumus. Equae, etsi olim stirpis nobilis Anglicanae, decrepitae in venam jugularem dr. 5 extr. opii aquosi injiciebantur. Statim fere post injectionem anxietatis atque agitationis signa sese manifestabant, peculiari in anteriorem partem procedendi nisu, motibus musculorum tremulis et spasticis, pulsu multo frequentiori, respiratione celeri conspicua, quae symptomata post horae quadrantem ad summum gradum pervenerunt. Postquam per breve tempus cucurrerat (incessus autem parumper abnormalis erat, extremitates enim posteriores quodammodo subinde vacillare videbantur) ictus cordis ad 184 quavis horae sexagesima parte adaucti erant, dum ante experimentum 46 eodem temporis spatio fuerant. Pupilla erat dilatata, visus tamen non obnubilatus, nam impedimenta in cursu, ut arbores, sepimenta taliave optime distinguebat atque evitabat. Ab illo tempore numerus ictuum cordis (pulsus enim non amplius percipiendus erat et irregularis) denuo decrescere incepit; semper agitatum atque in motus primum videbatur animal; nulla vero oppressionis et status soporosi indicia observabantur, quare conclusimus, in eadem equa postea dosin etiam maiorem adhibendam esse, ut narcosis rite sequeretur. Post tres fere horas frequentissima orta fuit micturatio, ut intra horam sexagies quater mingeret. Antea haematuria laboraverat. Per totum diem sequentem anxietatis et agitationis tantae fuisse videntur molestiae, ut ex perpetua in stabulo mobilitate sine ullo somno, pectus, collum et nasum sibi excoriasset.

Post diem et diei dimidium, per quos alvum liquidam sed parcam deposuerat, etsi emaciata et debilitata, fere ad pristinum normalem statum reducta videbatur. Postridie eidem equae opii uncia integra in aquae unciis duabus soluta in venam jugularem immittebatur. Ante experimentum institutum, quavis horae sexagesima parte, 74 ictus cordis enumerabantur. Paulo post injectam solutionem contractiones musculorum lumbalium et costalium oriebantur; post decimam horae partem ictus cordis ad 120 increverant et tremor universalis conspiciebatur. Caudam, quod etiam post dosin priorem observatum fuerat, in altum sublatam habebat semperque progredi conabatur. Post sextam horae partem 144 ictus cordis, cursus vacillans et interdum soporis incipientis indicia sese manifestabant. At vero subito post continua mobilitas et agitatio redierunt; ita ut post cursum paulo incitatio-rem ad 154 increveret cordis ictuum numerus. Concutiebat terram pedibus peculiaremque procedendi nisum nunc quoque manifestabat. Organa generationis irritata esse exinde apparebat, quod, quoties equus adveheretur, toties hinnitus auctaque agitatione illum adiret adque coitum allicere conaretur. Sudor frequens sed partialis, inprimis ad collum oriebatur. Post tres quartas horae partes cordis ictuum frequentia ad 118 diminuta erat, ut et pupilla fortiter dilatata.

Quum vero inflatio instituebatur in venam jugularem propter agitationem equi tanta oriebatur haemorrhagia, ut de maiori minorive cerebri congestionem judicari non posset, quam ob causam autopsiam negleximus. Hinc experimentum idem in alio equo repetere nobis benevolentia Viri Clar. WELLENBERGH licuit.

Paucis diebus post equo arthrocaee genu affecto et decrepito, opii dr. fere 7 in aqua rite solutae et percolatae venis injiciebantur. Prorsus alium effectum in huncce equum statim opium manifestabat. Imo, quum pars tantum adhuc solutionis immissa fuerat, fere post quartam minutae partem jam tremores et summa mobilitas observabantur; ut paulo molestius fieret, alteram solutionis partem administrare. Tribus minutis post injectionem equus humi prolapsus est cum respiratione anhelosa (28 inspirationis atque expirationis vices quavis horae sexagesima parte) pupillaque summopere dilatata. Ante experimentum 34 observati fuerant ictus cordis; jamjam ad 138 increverant. Post 5 minutas motus fortes convulsivi ut et bulborum stagnus manifestus oriebantur. Paulo post, cum respirationis vices ad 38 auctae erant, sudor universalis copiosus erupit.

Mucosae narium stomatisque pallescabant. Post 10 minutas 124 cordis ictus et 36 respirationes observabantur. Bulbi oculorum vehementer introrsum spastice regrediebantur. Sudor semper guttatim omni loco e corpore secernebatur, cuius odor tamen non abnormalis perceptu erat. Post quartam horae partem 88 ictus cordis et 32 respirationis vices observabantur. Respiratio ipsa semper quidem laboriosa erat, simul vero minori intensitate gaudebat. Collum, quod funis ope erectum tenebatur, ne haemorrhagia e vulnere oriretur, jam contractione tetanica musculi sterno-mastoidei eadem incurvata et erecta positione rigidum mansit, ita ut lente et pedetentim tandem extenso iterum musculo caput in humum declinaret; sic quoque alter pedum anteriorum rigide

extensus videbatur. Post 20 minutas 40 respirationis vices et 100 ictus cordis. Sopor et anaesthesia summa oriebantur. Conjunctiva bulbi parum rubescebat.

Dimidia fere hora post injectionem altera aperiebatur vena, ut aër inflaretur. Sanguis, qui exigua copia inde effluxit, ater et spissus erat. Magna copia aëris inflabatur, quam inflationem subito convulsiones sequebantur; non vero statim, uti expectabamus, sed demum post 3 minutas sub magnis respirationis conaminibus mors insecuta est. Sanguis spumans ex aëre contento e vena regurgitabat. Prima inflatione hic quoque peculiaris sonus inducti aëris bullarum percipiebatur.

Aliquamdiu post mortem etiam palpebrarum reflexio urinaeque excretio observatae sunt. Narium et labiorum mucosae pallidissimae erant. Cadaver immotum ad sequentem diem servatum est, ne sanguis e capite deflueret.

Sequenti die sectio instituta fuit. Jam apparuit, venas capitis superficiales insigniter sanguine turgere. Plura incipientis decompositionis signa jam sese manifestabant, licet mensis Decembris temperatura moderata esset. Sanguis fluidus, necdum coagulatus erat, nigri coloris; pluribus locis inter fibras musculares sugillationes erant atque effusiones sanguinis; potissimum in postica corporis parte multum aëris in tela cellulosa aderat. In cavitate pectoris et abdominis magna quantitas seri sanguinolenti erat effusa. Pulmones admodum expansi multum sanguinis continebant. Pericardium sero sanguinolento impletum erat. Cor ipsum valde sanguine atro fluido expansum erat. Circa medullam spinalem quoque serum rubescens erat effusum. Citissime cadaver in putre-

dinem abiit. Cerebri Pia Mater satis rubescebat venaeque sanguinem adhuc continebant. Sub dissectione cerebri in eius medulla plura puncta nigra ex sanguine stillato apparuere; grisea materies satis erat colorata.

Speciminibus huius cerebri solita ratione confectis, patuit, vasa capillaria in materie corticali admodum esse impleta, ut diversis locis elegantissimum et confertissimum rete sese offerret. Etiam materies medullaris pluribus locis vasa capillaria bene impleta monstrabat. Aliis locis in materie grisea color profundior, aequalis aderat; sub microscopio autem apparuit, nulla fere hic adesse vascula; aequabilem vero hunc colorem diffusum esse, ac si dissolutus sanguis magis minusve ibi esset exsudatus. In materia medullari plura loca pallida, anaemica observabantur. Sedula autem investigatio docuit, talia loca potissimum reddi anaemica, postquam de segmento exsiccato plaga superficialis tenuis, pluribus punctis sanguineis notata, fuerat descissa; quod argumento erat, anaemiam istam potius sequelam esse sanguinis contractilitate vasorum e tenui segmento expressi quam conditionis naturalis. Plures etiam vidimus vasorum trunculos tenui strato sanguineo cinctos, sequelam forsan sanguinis dissolutionis. In cerebello vasa capillaria elegantissime erant impleta, ut minima retia et in grisea et in medullari parte egregie apparent. Effusiones autem multo rariores quam in cerebro equi encephalitide affecti. In sinistro cerebelli hemisphaerio jam statu recenti sub ipsa dissectione locum pallidum anaemicum observavimus, in quo post exsiccationem vasa quoque non apparebant, dum in locis vicinis elegantissima retia erant

conspicua. Hoc igitur loco anaemia non orta fuit expulsionem sanguinis. In corpore striato pluribus locis vasa capillaria etiam pulchre erant impleta, longe minori tamen gradu quam in encephalide. Medullares eius partes hic illic anaemicae apparebant.

§ 3.

Propter rei momentum medullam quoque spinalem huius equi investigavimus, cuius Dura et Pia Meninx potissimum imbibitione insigniter rubescebant. Plures instituimus sectiones transversas diversis medullae locis, unde apparuit, medullam loco plexus brachialis insigniter esse emollitam, ut vix segmenta satis tenuia descindi possent. Ex segmentis exsiccatis et rite praeparatis patuit, in medulla cervicali sub Ponte Varolii hic illic vasa adesse, tum etiam ad secundum et quartum nervum cervicalem. Ad locum vero, ubi plexus brachialis oritur, vasa vix ulla conspiciebantur neque in materie grisea neque medullari. Sanguis hic imbibitione per tunicas magis diffusus esse videbatur. In medulla vero dorsali vasa iterum erant conspicua; inprimis ad intumescentiam lumbarem vasa sanguifera egregie erant impleta et in nonnullis segmentis videbantur dilatata.

Comparavimus haec segmenta cum aliis equi sine opio mortui, inter quae hanc vidimus differentiam, quod vasa in parte lumbari equi opio et inflatu interfecti longe magis essent impleta; in parte dorsali vasorum copia in utroque equo fere convenire videbatur; partem cervicalem comparare non potuimus.

Promotor autem judicavit, quum tanta esset differentia inter cerebra animalium opio et inflatione necatorum et illorum, quae solo opio erant mortua, maximi esse momenti, ut investigaremus, quid sola aëris in venas jugulares inflatio efficere posset ad congestionem in cerebro moderandam. Hanc ob causam, oblata nobis occasione benevolentia Clar. Viri WELLENBERGH, equum sola inflatione interficiendum curavimus, quod experimentum paucis diebus post institutum fuit. Erat equus similis fere constitutionis et aetatis ac prior ille opio et inflatu mortuus. Equus primo humi prosternebatur eadem ratione, uti priori in casu inflatio fuerat instituta. Multum aëris inflari debuit, qui aër solito susurru venam jugularem intravit. Post unam duasve minutas respiratio fiebat difficilior, frequentior; pulsus non rite percipi poterat. Ceterum per primas 4 minutas vix symptomata oriebantur. Sanguis quoque spumans redibat, at non tam niger quam in casu opii. Narium labiorumque mucosa etiam hic expalluit. Oculorum contorsiones minus fortes non vero deficientes, sursumque magis oculi movebantur quam in priori casu. Hic quoque pupillae dilatabantur. Venae capitis externae quam plurimum turgabant. Tandem ad sextam fere minutam convulsiones generales oriebantur, quum paullo ante septimam minutam equus demum mortuus est. Etiam hoc cadaver eadem positione relictum est ad diem sequentem.

Cadaveris sectione apparuit venas hic quoque magnopere sanguine turgere; intestina aëre quam maxime expansa esse; suffusiones vero sanguinis inter musculos deficiebant. Subito cadaver in putredinem quoque abiit; non vero tanto

gradu, quanto in priori casu fuerat observatum. Investigavimus modo eius cerebrum et medullam oblongatam, cuius hic fuit eventus.

Segmentorum solita ratione e cerebro praeparatorum comparatione sedula cum prioribus instituta, admirati fuimus, non maiorem differentiam conspici. Vasa capillaria in materie medullari griseaque eadem fere ratione erant impleta. In utroque casu loca brunnea et pellucida in grisea substantia occurrerant, in quibus sanguis erat diffusus, ita ut nullo modo vasa conspicua essent, quum sanguinem ibi non continerent. In locis, ubi vasa materiae griseae maxime distinguere liceret, in casu opii haec paulo perfectius impleta esse fere crederes. Sed alia loca in cerebro equi solo inflatu mortui iudicium fere vacillans reddebant, universe tamen in materie grisea paulo maior videbatur congestio, licet vix distinguenda. At vero trunci per medullarem praesertim partem decurrentes in casu solius inflationis maiores aderant quam in casu opii atque inflatus. In corpore striato, in thalamis et ponte Varolii equi opio necati elegantius rete videbatur quam huius equi. Insigne vero discrimen in cerebello aderat, cuius vasa in casu opii perfectissime erant impleta, dum in casu solius inflationis retia capillarium distingui non poterant.

Quid igitur ex hisce concludendum? In partibus inferioribus, corpore striato, thalamo, ponte Varolii et cerebello congestio gravior esse videbatur in casu opii cum inflatione: in materie corticali cerebri vix discrimen adesse dici poterat. Quomodo autem explicandum truncos, uti ex tabula II annexa apparet, in casu solius inflationis magis esse dilatatos? Num

forsan inde explicari posset, quod trunci opii infectione irritati in agone mortis et post mortem fortius contracti sanguinem contentum pro parte expulerint? Quod si admittere liceret, uti suspicatur Promotor, ratio fortasse inventa esset, cur in casibus, ubi narcotica data fuerint sanguisque in cerebro retentus non fuerit, quod in casibus inflatus locum habuit, tanto gradu anaemia conspiceretur. At haec tamen res, ut ad liquidum perducatur, investigationibus futuris relinquenda est. Vix enim admitti posset de minimis capillaribus, quae adeo contrahi non videntur, imprimis, quum in cerebris omnibus canum diversis his narcoticis absque inflatu necatorum, quibus unum galli gallinacei exemplum et duo cuniculorum addere possemus, totum cerebrum intus fuerit anaemicum, id quod dubium videtur an contractioni soli vasorum post mortem adscribendum sit. Fortasse vero hisce in casibus contractio illa jam durante vita sanguinem expulerit. Praeterea ad sanguinis ipsius conditionem attendendum, qui post opium administratum certe tardius minusque coit ac facilius post mortem per vasulorum minimorum tunicas imbibi et diffundi videtur.

In genere igitur ex omnibus, quae in experimentis enarratis vidimus, de opii in venas immissi effectu concludere licet, magna etiam dosi datum primo satis irritare systema circulationis, uti observavimus ex insigni pulsuum augmento in equis et canibus 1). Haec autem opii irritatio mirum

1) Assentiri non possumus Doctissimo Viro J. L. V. PRAAG, ubi refert: »is de hoeveelheid opium onmatig groot, dan wordt de eerste werking (namelijk de opwekking) niet waargenomen en er volgt dadelijk verlamming van alle deelen, welke onder den invloed der cerebro-

quantum differt pro vario individuo, ut in primo equo, cuius autopsiam propter experimenti eventum minus felicem negleximus, post doses satis magnas irritatio magno gradu eaque per longum temporis spatium sese manifestaret, quam verone vestigium quidem depressionis et verae narcoseos subsequutum fuit: dum in equo post opii administrationem inflatione aëris necato, licet dosis paulo minor esset, post breve irritationis stadium mox vera depressio orta fuerit.

Cordis irritabilitas ex opio tanta facta erat, ut, postquam ictuum numerus primo acceleratus admodum fuerat diminutus, levis corporis motus sufficeret ad adaugendum illum quadraginta vel quinquaginta ictuum numero. Difficilis, anhelans et laboriosa denique fit respiratio cum insigni thoracis motu perfecta, quae cum ictibus cordis non semper pari passu progrediebatur, quod probabiliter pro parte saltem effectui opii in medullam oblongatam et nervum vagum adscribi posse videtur. Organa uropoietica et generationis opio incitari manifeste observavimus. Perspirationem immaniter auctam vidimus; mirum vero in primo equo insignes opii doses potius diarrhoeam quam alvum strictam produxisse. Difficile dictum est, num congestio ad caput venarumque capitis externarum turgor circulationi per pulmones impeditae adscribi debeant, quod tamen probabile. Ipse enim aër inflatus in venam regurgitabat.

»spinaalzenuwen staan.” (Proeve eener historisch-kritische beschouwing der narcotica. Tiel 1852, bl. 26). Semper enim, post doses etiam maximas, irritationem depressioni antecedere observavimus.

Quod ad opii in cerebrum effectum attinet, ex nostris observationibus minime licet concludere ad omnis congestionis absentiam. Modo vidimus, quam caute in his procedendum sit. Videtur autem vasorum cerebralium irritatione opio producta sanguis post mortem exprimi posse, unde forsitan optime explicanda sunt phaenomena contraria, quae diversae autopsiae, uti supra vidimus, docuerunt, modo congestionis, modo anaemiae. Sed narcotica symptomata minime ex sola congestione explicari possunt, quae congestio in narcosi certe nunquam ad talem vasorum impletionem et dilatationem procedit, qualem in chronica inflammatione observavimus, praeterea ipsa etiam congestio pro vario individuo differre videtur.

In genere observationes nostrae egregie confirmant, quae de effectu narcotico Ds. v. HASSELT 1) conscripsit, ubi effatur: »Het narcotisch ziekteproces, hoedanig dan ook zijne eerste wording te verklaren zij, schijnt ons volgenderwijze te kunnen worden voorgesteld:

»1°. Stoornis in de stofwisseling der zenuw-middelpunten, vooral hersenen en verlengd merg; bij eerst voortdurende normale, of misschien zelfs verhoogde innervatie van het hart, eene reeds spoedig verminderende innervatie van den ademhalingstoestel (dynamisch moment).

»2°. Ongelijke bloedsverdeeling; bij gewonen welligt versterkten bloedsaandrang naar het hoofd, belemmerde afvoer van het aderlijke bloed naar de borstorganen (mechanisch moment).

1) Handleiding der Vergiftleer, Utrecht 1850, bl. 157.

»3°. Ontwikkeling eener veneuse bloederasis, welke de reeds
»bestaande onderdrukking in de verrigtingen der zenuw-mid-
»delpunten enz. onderhoudt en die al meer en meer doet toe-
»nemen (Chemisch moment).

»Dien ten gevolge beschouwen wij de ontwikkelde narcosis
»als aderlijke bloedsophooping in den schedel, die weldra
»stijgen kan tot den graad van drukking (*compressio cerebri*)
»en die, krachtens de hier in het spel zijnde momenten, veel
»lichter geneigd is tot overgang in hersenverlamming (*paralysis*
»*cerebri*), dan in bloedsuitstorting (*haemorrhagia cerebri*). Deze
»beschouwingswijze komt met de bestaande verschijnselen en
»de gevondene lijkveranderingen nog het meest overeen.”

F. W. HEADLAND ¹⁾ nuperrime opii narcoticum effectum his
»verbis comprehendit: »in excessive dose it produces a marked
»sedativ effect; causing an imperceptible or irregular pulse
»and very slow breathing, with contraction of the pupil of
»the eye. It may kill by apnoea; i. e. by stopping the re-
»spiration.”

Licet laesa respiratio multum ad mortem provocandam con-
ferre videatur, tamen unicum momentum illam habendam esse
vix crediderimus. Memorabilis admodum est magna anaemia,
quae conspiciebatur in casu canis, ubi mors duobus diebus post
opium datum secuta fuit, uti etiam, etsi gradu minori, in
casu, quo mox mortuum est animal nec minus in casibus

1) An essay of the action of medicines in the system; (being the
prize essay, to which the medical society of London awarded the Fother-
gillian Gold Medal for 1852), p. 227.

mortis subitae post ac. hydrocyanicum, nicotinum, oepas radja et wooraram observatis. Eventus hi profecto plura etiam experimenta instituenda desiderant.

Ex hisce quoque speciminibus vasorum lumina dimensimus, quae in tabula hac inserta conspicua sunt.

Ad haec vero monendum: trunculorum diametrum in diversis his canibus satis differre, quum non iidem trunculi comparari potuerint; ita v. e. in cane nicotino necato maximi aderant trunculi, licet ceteroquin anaemia observaretur, atque inde paucos modo trunculos dimetiri poteramus eosque maximos. Comparatio igitur inprimis valet de iis casibus, ubi plura vasa conferri poterant, uti in tribus ultimis seriebus tabulae, quas si comparemus cum dimensionibus tabula I indicatis, continuo patet, arteriolarum trunculos in cortice et corpore striato canis encephalitide mortui multum superare vasa in cane opio et inflatione necato. In cerebello minor est differentia. In equo encephalitide mortuo magis etiam conspicua est dilatatio, potissimum in materie grisea (albam comparare non bene potuimus). Tum etiam vasa corporis striati et cerebelli atque universe vasa capillaria in encephalitide longe ampliora esse apparet. Venae rariores aderant, quam ut rite comparari possent.

§ 4.

Experimentum denique nucis vomicae factum hisce addere nobis liceat, cuius comparationis instituendae occasionem magna benevolentia Ds. HEKMEYER nobis obtulit, qui cerebrum canis nucis vomicae necatae nobis misit, in qua cane haec observaverat.

Granum integrum extracti nucis vomicae alcoholici in aquae uncia et dimidia solutum cani annum fere natae, etsi emaciatae, veloci tamen et hilari, datum est. Viginti minutis post mus-

colorum faciei quaedam oriuntur convulsiones; oculi saepius ocluduntur, sed mox denuo aperiuntur. Pupilla paullulum coaretatur et subinde conquassationes observantur. Mox symptomata haec exacerbantur; canis jacens surgere conatur, quod difficulter atque irregularibus motibus perficit; anteriores et posteriores extremitates longe inter se distantes tenet. Frequentior fit conquassatio, quae in insultus vere tetanicos transit. Artus rigide extenduntur, pedum articuli longo inter se spatio separantur; unguis vehementer incurvantur atque ubivis musculorum inprimis extremitatum convulsivi motus conspiciuntur. Sedere conatur, at vero statim rursus tanta conquassatione sursum salit, ut antica corporis pars tollatur canisque aliquamdiu in posterioribus stet pedibus. Jam procumbit (hora dimidia post assumptum venenum) artibus rigide extensis, caput et collum fortiter in posteriorem partem declinantur. Trismus sese manifestat osque spuma tectum est; urina sponte effluit; pulsus, qui ante institutum experimentum 80 ictus referebat, quam maxime acceleratus et pupilla valde dilatata est. Venae superficiales admodum turgent. Minimus motus convulsiones tetanicas provocare videtur; anaesthesiam non adesse exinde patet, quod reflexio ad stimulos allatos remansit, quae reflexio tetanicas denuo conquassationes suscitatur.

Paucis minutis post respiratio maximopere augetur, fortibusque costarum abdominisque motibus perficitur; musculi relaxantur et 40 minutis post ingestum venenum nihil abnorme monstrat animal, excepta respirationis celeritate. Surgere nititur et quum adjuta stat, nonnullos passus progreditur, quibus mox vehementissimus accessus tetanicus oritur, per aliquot

deinceps minutas perdurans, in quo respiratio est laboriosissima. Relaxantur deinde contracti musculi, respiratio sensim diminuitur, donec tribus quartis fere horae partibus post dosin. adhibitam moritur canis.

Cadaveris sectio horae quarta parte post mortem locum habuit. In cavitate pectoris trunci maiores venosi ut etiam venae intercostales et cordis ventriculus dexter sanguine fluido atro referta inveniuntur. Cerebrum et medulla spinalis extus nihil abnorme monstrant. Venae Piae Matris sanguine impletae occurrunt. In cavitate abdominis venae meseraicae quam plurimum atro sanguine fluido impletae sunt; ventriculus et primae viae magnam mucii copiam continent. Venae superficiales etiam universe atro sanguine turgent; musculi extensores colli sunt rigidissimi, ipsumque collum deflecti fere non potest. Cetera organa normalia videntur.

Cerebrum accepimus cum tota medulla spinali annexa. In ipso cerebro invenimus quidem vasorum retia capillarum hic illic pulchra, sed ipsa vasa subtilissima, pallida erant, pluribusque locis difficulter distinguenda. Comparatione instituta cum cerebro canis opio et aëris inflatione necati, patuit, ubique in hoc cane vasa cerebralia, potissimum vero in corpore striato, melius esse impleta. In ponte Varolii quoque in casu opii capillaria magis erant conspicua. In tota vero medulla spinali canis nuce vomica necatae vasa erant pulcherrima, inprimis ubi plexus brachialis et lumbaris oriuntur, trunci occurrebant, insignes (ad 0,102 Mm.) fere adaequantes illis, quae in longe crassiori medulla equi observavimus. In partis lumbaris ipsa materie grisea pluribus locis effusiones e capillari-

bus aderant, quae in ipsa materie grisea positae erant, non vero in superficie segmenti sectione productae, quod diligenter indagavimus. Ex his igitur pateret, congestionem in medulla spinali post nucem vomicam datam longe maiorem oriri quam in cerebro; imo retia in hac medulla spinali, omnibus locis conspicua, analogae dici potuissent retibus in cerebro canis encephalide mortui, tam quod ad eorum densitatem quam quod ad vasorum lumen attinet.

Ecce, benevole Lector, indagacionis nostrae fructus exiguos. Quae hocce opusculo relata sunt tanquam primos passus in campo parum adhuc cognito habeas, velim, et quae in hisce parum consummata visa sint virium mearum exiguitati meaeque imperitiae tribuas, etiam atque etiam rogo.

TANTUM.

ICONUM EXPLICATIO.

Fig. I. Materies corticalis equi encephalotide mortui.

a, b. Materies grisea, in qua vasorum capillarum retia confertissima et flexuosa.

b, c. Margo inter hanc albamque materiem.

c, d, e, e, f. Vasa materiae albae longitudinalia, quae ramulos minores fere recto sub angulo griseam materiem versus emittunt.

f. Vasculum ex alba materie in griseam transiens.

Fig. II. Foliolum arboris vitae ex eiusdem equi cerebello.

a. Vasa centralia e pia meninge orta, quae centrum materiae griseae tenent, e quibus vasa capillaria radiatim emittuntur.

b, b, d, d. Rete sinuosum confertissimum, quod materiem griseam ab alba acute separat.

c. Vas sanguiferum e centralibus ortum inque materiem albam penetrans.

d, d. Anastomosis inter vasa materiae griseae atque albae.

e, e. Vascula tenerrima transversa, quae cum longitudinali mat. albae *f* cohaerent.

Fig. III. Pars corporis dentati ex homine.

a, a. Rete densissimum per striam griseam transversim decurrens.

- b, c; b, e.* Trunci centrales sive interni, inter quae rete mat.
medullaris capillare internum.
d. Prolongatio vasis interni *c*, cuius nexus hic dissectus est.
f. Rete medullare externum longitudinale, minus confertum
quam rete inter *c, e*.
-

Fig. IV. Sectio verticalis e thalamo nervorum opticorum hominis.

- a, a, a.* Vasa parallela et verticaliter decurrentia.
b, b. Rete intermedium subtilissimum et arcuatum.
-

Fig. V. Sectio verticalis corporis striati ex homine.

- a, a, a.* Rete vasorum maiorum cum intermixtis capillaribus,
ut plurimum acutis angulis subdivisis.
-

Fig. VI. Segmentum horizontale glandulae pituitariae hominis.

- a.* Vas maius, in plures ramos tortuosos mutuo connexos
abiens.
b. Vascula minora eiusdem retis.
-

Fig. VII. Verticalis sectio e ponte Varolii hominis.

- a, b, c.* Striae griseae, vasculorum maiori copia notatae.
d, e. Fibrarum medullarium fasciculi, transversim dissecti,
rarioribus vasculis cincti, inter strias griseas positi.
f, f. Fasciculi medullares longitudinaliter decurrentes cum
capillaribus concomitantibus, a transversis *e, e* stria
grisea *c* separati.
g, g. Striae griseae vasculosae transversae, quae strias lon-
gitudinales *a, b* connectunt.
-

Fig. VIII. Sectio transversa medullae oblongatae infra corpora
olivaria e vacca.

- a, a, a.* Fasciculi medullares transverse dissecti.

b, b, b. Materies grisea vasculosa, fibrarum fasciculos cingens.
c, c, c. Pauca vascula tenerrima per fasciculos albos penetrantia.

Fig. IX. Medullae spinalis transverse dissectae pars ex eadem vacca.

a, a. Vasa e peripheria ut plurimum parallelo ductu ad materiem griseam tendentia.

b, b, b. Rete vasorum capillarium e cornu materiae griseae anteriori.

Fig. X. Truncus e materia corticali maniaci primi, inflammatione dilatatus et inaequaliter expansus.

Fig. XI. Vasa inaequaliter dilatata et contorta e maniaco tertio.

Fig. XII. Vas capillare pluribus locis aneurysmatice expansum e cane encephalite mortuo.

Fig. XIII. Pars materiae corticalis inflammatae ex eodem cane, ubi maxima conspiciebatur vasorum dilatatio.

a, a, a. Trunci quam maxime expansi, inter quos minores alii et capillaria tenerrima decurrunt, *b, b.*

c. Venae magnae pars striis longitudinalibus notata.

d. Diameter maximi ex omnibus ceterorum canum specimenibus trunci, juxta posita, ut insignis vasorum in encephalite expansio conspicua fieret.

[The page contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is too light to transcribe accurately.]

Fig. I.




Fig. II.




Fig. V.




Fig. III.



Fig. IV.




Fig. VI.




Fig. VIII.




Fig. VIII.




Fig IX.




Fig. X.




Fig. XII.



Fig. XI.



Fig. XIII.



THESES.

I.

Sententiam hanc a BICHAT relatum: »les injections ne sont
»avantageuses que pour les gros vaisseaux, où le sang cir-
»cule en masse sous l'influence du cœur; dans les capillaires
»jamais elles ne sauraient atteindre le point précis, qui existe
»dans la nature,» ad cerebri saltem vasa omni jure referen-
dam, contendimus.

II.

Typum in distributione capillarum cuius cerebri regioni
propriam, quem jam ALBERS suspicatus fuit, revera non tan-
tum adesse, verum etiam vasorum copiam partium diversarum
functionibus diversis eorumque decursum fibrarum cerebralium
directioni variae respondere, statuimus.

III.

Narcotica symptomata minime ex congestione sola cerebri explicanda, sed potius narcotici assumpti specificis stimulis tribuenda nobis videntur.

IV.

Capillarum cerebri irritatio multum conferre videtur ad sanguinis in cerebro copiam magis minusve moderandam.

V.

Musices in cura nonnullorum morborum psychica non exiguum momentum esse, credimus.

IX.

VI.

Homo moralis partim pendet ex organisuro, organismus partim pendet ex homine morali.

XII.

VII.

In morbis inflammatoriis et mentalibus opium non semper contraindicatum est, sed e contrario magnae subinde utilitatis esse potest.

XIII.

VIII.

Diaeta in morbi sanatione sufficiente, a Therapeutica abstinentum est.

IX.

Er blijft geen billijke twijfel over, of ook zelfs het matig gebruik van sterken drank is nadeelig voor de spijsvertering, voor de zuivering des bloeds bij de ademhaling, voor de versterking der spierwerking, nadeelig zoowel in hitte als koude.

J. L. C. SCHROEDER V. D. KOLK.

X.

Crisis sanguinis, qualem statuit ROKITANSKY ad tuberculorum pulmonalium originem explicandam, admittere non possumus.

XI.

Methodus medendi syphilidi, cui nomen *syphilisatio*, quam maxime reprobanda nobis videtur.

XII.

Vis externa herniae intestinalis exortus causa tantum occasionalis habenda est.

XIII.

Conjunctivitidem blennorrhoeicam non metastasi vel consensu, sed oculorum infectione, aut ex directo secreti blennorrhoeici contactu, aut eius per aërem translatione, oriri credimus.

XIV.

Funiculo praevio, partus, si rerum conditio favet, artis
praesidio quam ocissime solvendus est.

XV. AAN MIJN VRIEND

Het speculum uteri is een onmisbaar instrument, zonder
hetwelk het in vele gevallen onmogelijk is eene juiste dia-
gnose te maken. L. C. V. GOUDOEVER.

XVI.

Medico abortum provocare licet.

XVII.

Docimasia pulmonalis sola non sufficit ad dijudicandum
an foetus respiraverit necne.

XVIII.

Politia medica magis scholarum curam haberet, optandum
esset.

XIV

AAN MIJNEN VRIEND

E. H. EKKER,

BIJ ONZE BEVORDERING.

XV

Medico sportum provocare licet

Geen onverdeelde vreugde is hier op aard te smaken,
 Het allerblijdst' genot is nog met smart vermengd;
 Zoo doet ook ons de dag een bittere klagte slaken,
 Die ons en ons gezin de zoetste blijdschap brengt!

XVI

De dag die U bekroont en tevens mij bevordert,
 Die op denzelfden stond hetzelfde heil ons biedt,
 Is ons een bron van smart. Mijn Vriend! het noodlot vordert
 De scheiding van uw' vriend, nu hij U Doctor ziet.

Wij innig steeds vereend, helaas! wij moeten scheiden;
 Door vriendschaps zachten band zoo naauw aan een gesnoerd,
 Wordt 't uur van beider vreugde een uur van smart voor beiden,
 Daar 't van elkaar ons rukt en mij uit Utrecht voert.

Die dag, zoo lang gewenscht en toch verbeid met heven,
Hij is genaderd thans en loont uw' noeste vlijt:
Moog' hij der Maatschappij een ruime dankstof geven
Als Gij, mijn kundig Vriend! haar hulpe en redder zijt.

Hij schenke U voorspoed steeds, geen reden ooit tot klagen,
En scheidt hij ons voor lang, 't zij niet voor eeuwig, Vriend!
Behoef bij weêrzien nooit ons hart met angst te vragen:
Heb ik zijn' vriendschap wel ten volle nog verdiend?

H. FABIUS.

Die dag, zoo lang gewenscht en tocht verbeid met bezen
Hij is gewaerd thans en loont uw noeste vijf
Mooi, hij der Maatschappij een ruime dankstol geven
Als Gij, mijn kundig Vriend! haar hulpe en redder zijt

Hij schenke U voorspoed steeds, geen reden ooit tot klagen
En scheidt hij ons voor lang, 't zij niet voor eenwig Vriend
Behoef hij weeten nooit ons hart niet angst te vresen
Heb ik zijn vriendschap wel ten volle nog verbeid?

H. FABRIZI

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Second block of faint, illegible text.

BRILLIANT JEWELRY

BRILLIANT JEWELRY

ORGANIZATION

THE ALBUM, THE FINEST ILLUSTRATIONS