



# Dissertatio medica inauguralis de spirometro ejusque usu, observationibus cum aliorum, tum propriis illustrato

<https://hdl.handle.net/1874/319002>

SPECIMEN MEDICUM

DE

SPIROMETRO EJUSQUE USU

OBSERVATIONIBUS

CUM ALIORUM, TUM PROPRIIS ILLUSTRATO.

DISSESSATIO MEDICA INVENIRE

DE

SPIROMETRO ET USE USU  
OBSERVATIONIBUS

CUM ALIORVM TUM PROPRIS ILLUSTRAVTO.

GUAN,

ANNUNCIATE SINOQO NUNNIE,

EX AUTORITATIBVS MOTIVIS MEDICALIBVS

FRANCISI CORNELII DONDESSI,

MDC. MDCCCLX. TA. P. D. EX LIBRIS.

LIB. NO. 10

APLICISSIMI ESENTIAZ ACYDENCHI CONSENSI

11

MORBISISSIMA FACULTATIS MEDICAE DECRIPTO,

PRO GRADU DOCTORATIS,

SCIENTIAS IN MEDICINA HONORIBVS AC PRIVILEGIIS,

IN ACADEMIA RHINO-TRAIFFELINA,

RIBE ET LECTURAE QUADRANGULARIBVS,

EXAMINUM EXAMINI SUBMITTIT

HENRICUS KERKELIUS,

AMSTERDAMENSIS.

AD DIEN XX IANUARII A. MDCCCLX. HORA VI.

AMSTERDAMI,

WMD. L. H. ET G. VAN HETTEREN

AMBO-CITRI.

DISSERTATIO MEDICA INAUGURALIS

DE

SPIROMETRO EJUSQUE USU  
OBSERVATIONIBUS

CUM ALIORUM, TUM PROPRIIS ILLUSTRATO.

QUAM,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI

FRANCISCI CORNELII DONDERS,

MED. DOCT. ET PROF. EXTRAORD.,

NEC NON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU,

ET

NORILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

PRO GRADU DOCTORATUS,

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS,

IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA,

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS,

ERUDITORUM EXAMINI SUBMITTIT

HENRICUS FABIUS,

AMSTELODAMENSIS.

AD DIEM XX JANUARII A. MDCCCLIII, HORA VI.



AMSTELODAMI,

APUD J. H. ET G. VAN HETEREN.

MDCCCLIII.

СИБИРСКИЕ ПОДАЧИ ИЗ СИБИРИ

—

## ВЕЛИКАЯ СИБИРЬ

СИБИРСКАЯ ГЛАВА

СИБИРСКАЯ ГЛАВА И ЕЕ МИЛОСЕДЫ

—

СИБИРСКАЯ ГЛАВА И ЕЕ МИЛОСЕДЫ

СИБИРСКАЯ ГЛАВА И ЕЕ МИЛОСЕДЫ

## СИБИРСКАЯ ГЛАВА И ЕЕ МИЛОСЕДЫ

---

EX OFFICINA TYPOGRAPHICA C. A. SPIN ET FILII.

—

FRATRIBUS ET SORORIBUS

OPTIMIS, CARISSIMIS,

genuis meos curas puerasque  
HOC QUALE CUNQUE STUDIORUM SPECIMEN,  
sum motu mecum fugient, et benutas etiam sentire,  
dum impensis presentibus pecu obscurans haberecesserat:  
SUMMO AMORE  
Optimo illi Patre, dum a primis unde preciosis intercedipili  
eurote mea hanc videre iustitiae, et cui si noscias ad runc  
redire gressu in sicut servantes fuisse, et nunc uno  
separo pro numeris, dñe IIII depeo, penitentia blanca  
muse exsuum, numerus: cum tunc Curiosus Matis,  
cum nos vixit et edificavit, et totum suum sicut nos  
conuictis ripens, nostram sustinet nunc sum  
dium recuperat.

Quod tamen videlicet sine dubio, bellicote mali  
nos fecit! pueri paucos menses uno illi causissima  
capita mortis noscuntur etebat! In recente enim pecten  
AUCTOR.  
D. D. D.

Studiorum meorum istas primitias Vobis dicare cupio,  
Carissimi Fratres et Sorores! qui et optimorum Parentum  
mortem mecum lugetis, et penitus etiam sentitis,  
quam lubenter Parentibus hoc opusculum dedicasset:  
Optimo illi Patri, qui a prima inde pueritia incredibili  
amore me duxit atque instituit, et cui, si nobis ad hunc  
usque diem in vivis servatus fuisset, ex intimo animi  
sensu pro innumeris, quae Illi debeo, beneficiis grates  
nunc egissem maximas; tum etiam Carissimae Matri,  
quae mirifico erga liberos amore flagrans, indefessa  
cura nos aluit et educavit, et totam suam vitam nostris  
commodis tribuens, nostram salutem unicum suum gau-  
dium habebat.

Quod tamen ardentissime cupiveram, perficere mihi  
non licuit! Intra paucos menses ambo illa carissima  
capita morte nobis sunt erepta! In recenti enim luctu  
de optima Matre nobis ademta adhuc jacentes, ad di-

lectissimi Patris moribundi lectum mox denuo convoca-  
bamur, et vulnus gravissimum ex Illius morte animis  
nostris inflictum, Hujus decessu vehementius recrudes-  
cebat! Sic intra unius anni spatium ex felicissima fa-  
milia orbi utroque Parente facti — jam et Patre cäre-  
mus, qui nobis gloriari solebat, nec gaudemus Matre,  
quae nostra laetitia exsultabat. Qui ut in filiis denuo  
Medicum haberent — luctu prorsus affligor haec scripto  
mandans — artis medicae studia equidem inchoabam. O  
me temerarium! Videbam Eos lacrymantes ob desiderium  
**EVERARDI** sui, sibi tam cari, quemque jure Pater deli-  
cias suas vocabat. De quo sibi crepto quum eos lugentes  
videbam, si fieri posset, illud desiderium lenire mihi in  
animo erat, sed, eheu! quo tempore paratus eram ad  
animos Eorum hoc solatio demulcendos, crudelissima  
mors omnia mea consilia intercepit. Quis vero, quid  
homini in hac vita prosit, satis noverit? — Nonne fieri

possit ut morte sua impedianter, ne magnum fortasse intervallum consipient, quo inferior sum illo fratre, quem imitari quidem studui, sed quem aequiparare me non posse, multo magis nunc sentio, quam quinto decimo etatis anno, quo medicae arti me dicare statuebam!

Jam vero vitae stationem, ad quam me paravi, aditurus, vobis quidem reddor, quibuscum amore conjunctam mihi vitam fore spero, sed simul iis valedicere cogor, quibuscum et esse et vivere voluptas mihi erat. Academiam relinquere debo, in qua tot bona et didici et percepi. Valedicendum amicis mihi dilectissimis, Praeceptoribus meis optime de me meritis. Quod a me penitus sentiri fateor, si praecepta memini, mihi a Viris Clarissimis et peritissimis VAN REES, MULDER, HARTING et BUYS BALLOT data, in commodis discipulorum suorum promovendis aequa indefessis, Quibus quatuor viris nostis sane et quantopere ut vires praebantur optem ad

\*

Academiam Rheno-Trajectinam diu etiam illustrandam  
quamque gratus sim pro amore, quo me amplexi sum,  
pro amicitia, qua mihi frui licuit, quamque mihi honori  
esse duo. Nee mihi praetermittere licet, quanti mo-  
menti mihi in hoc opusculo conscribendo auxilium fuerit  
Viri Clarissimi BUYS BALLOT, et viam mihi indicauit ad  
certos meorum experimentorum conficiendos eventus, et  
lucem mihi e tenebris aperientis. Quos viros si mihi  
relinquendos doleo, quanto majore cum dolore Kiris  
Clarissimis SUERMAN, SCHROEDER VAN DER KOLK, LONQ.  
DONDERS et VAN GOUDOEVER valedico! Quorum quidem  
etsi nunquam obliviscar, non amplius tamen, ut sole-  
bam, eos quotidie adibo, nec qualibet diei hora vel  
auxilium vel consilia ab iis petere licebit, as quibus  
semper benevole, semper amice exceptus, nunquam nisi  
doctior discedebam, quos officiosos et praestantes viros  
non tantum praeceptores meos, sed paternos audeo amicos

vocare non vereor, quippe quorum et doctrina semper  
ad instituendum me parata et domus ad excipendum  
comiter apertae essent. Monimenta epistolas, ad Paren-  
tes nostros et ad vos toties scriptas, nunquam non lati-  
dibus meorum Praeceptorum abundantes! quas legens  
quanto per Pater carissimus gaudebat! quanto per dilec-  
tabatur, quoniam Promotor meus aestimatissimus LONQ,  
cui tot nominibus Qanta debo, quanta vix enumerare  
possim, mili dissertationis argumentum NUTCHINSONI  
Spirometrum commendaret! quo argumento quanto per  
captus esset, vel proximo ante mortem die manifesta-  
bat, de illa materie cum animi ardore rerumque cogni-  
tione confabulans! Sed eheu! votum suum haud ex-  
pletum vidit, nec ei natu minimum filium Medicinæ  
Doctorem salutare licuit! Kaledicam igitur amicis meis Trajectinis; valedicam  
Viro Doctissimo A. G. M. VAN HASSELT, neque ejus con-

suetudine amplius fruar, a quo bona quaeque percepit; qui mihi, auxilium quaerenti, amice semper, semperque benevolē praestabat, cuius et sermones recondita doctrina abundabant, et amicitia ad omne quod pulchrum et bonum est adhortabatur, qui animi nobilitatem cum summa peritia, amabilem modestiam cum excellenti ingenio junctam habet, hunc praestantissimum Virum non amplius quotidie visam! Credite, me a tot amicissimis discedentem, graviter affligi! ab iis, quibuscum in eundem incumbebam disciplinam, et cum quibus adeo vivebam, sed ab illo potissimum, quem studiorum semper socium habebam, qui eodem mecum die Medicinae Candidatus pronuntiatus, eodem die ad summos honores admittebatur, ab illo, qui me amicitia sua complectebatur, quam et in posterum mihi magni pretii fore profiteor! Nostis sane, quam carus mihi sit ingenuus fidusque amicus E. H. EKKER.

*Amicos si relinquam et ad vos redibo, nunquam tam  
en eorum oblivio me capiet, haud magis quam a vobis  
remotus, vestri immemor eram. Amstelodami aequa gra-  
tus Trajectinis meis Praeceptoribus degam atque Tra-  
jecti grato animo Viros Clarissimos BOSSCHA et MIQUEL  
colui, qui mihi in Athenaeo Illustri Amstelodamensi  
aestumatissimi Praeceptores fuerunt, quorumque pree-  
ceptis multum me debere sentio.*

*Vobis, Carissimi Fratres et Sorores, primitiae istae  
studiorum meorum dicatae sunt; sed utinam meliores eas  
et praestantiores vobis offerre potuissem! Vos tamen  
optime novistis, me tot tristibus rebus toties a specimine  
meo conscribendo abstractum fuisse, ut vix opportunitas  
assidue laborandi et indefesse mihi daretur! Neque  
etiam, si laetiora tempora nobis fuissent, vestrum mei  
desiderium, quo ad summos honores quam primum pe-  
tendos incitabar, me diutius opusculo meo inhaerere*

## C O N S P E C T U S

fortasse sisisset! Qualemque igitur meum opusculum  
est, ipsam dedicationem magni mei in vos amoris doc-  
umentum habebitis! Qui amor immutatus maneat ne-  
carissimorum Parentum, qui arctissimo nos vinculo con-  
strictos tenebant, decessu diminuatur! Concordia vires  
nostras ad luctum vel gravissimum aequo animo seren-  
dum confirmet.

Accipite igitur hujus Speciminis dedicationem cum  
flagrantis mei amoris significatione conjunctam.

Scribebam Traj. ad Rhen. m. Aug. a. MDCCCLII.

## CONSPECTUS.

INTROITUS.....	Pag. xvii.
CAPUT I. DESCRIPTIO SPIROMETRI DEQUE USU IPSIUS ANNOTATIO HISTORICA.....	
CAPUT II. OBSERVATIONES SPIROMETRI OPE A JANO HUTCHINSON, JULIO VOGEL, GUSTAVO SIMON, HERIBERTO DAVIES, JOH. FRID. HERMANNO ALBERS, KÜCHENMEISTERO, ALIIS FACTAE.	
§ 1. <i>Observationes de pulmonum capitate, ante spiro-</i> <i>metri inventionem a nonnullis Physiologis factae.</i> .....	16.
§ 2. <i>Observationes spirometri ope a JANO HUTCHINSON</i> <i>factae.</i> .....	27.
§ 3. <i>Observationes spirometri ope a JULIO VOGEL et GUS-</i> <i>TAVO SIMON factae.</i> .....	52.
§ 4. <i>Observationes spirometri ope ab HERIBERTO DAVIES,</i> <i>JOH. FRID. HERMANNO ALBERS, KÜCHENMEISTERO, aliis</i> <i>factae.</i> .....	62.
CAPUT III. OBSERVATIONES SPIROMETRI OPE AB AUCTORE HUJUS DISSERTATIONIS FACTAE.	

§ 1. De methodo capacitatis pulmonum vitalis ex cor-	
poris dimensionibus definiendae .....	Pag. 73.
§ 2. Experimenta spirometri ope ab auctore facta.....	88.
§ 3. Nonnullas conclusiones continens ex observatio-	
nibus, spirometri ope factis, deductas.....	95.
CAPUT IV. DE VALORE SPIROMETRI CONCLUSIO.....	102.

## INTROITUS.

Tempus, in quo vivimus, prodigum est inventorum.  
Quod cum universe verum sit, ita multa instrumenta,  
morborum diagnosi inservientia, ultimis annis nobis  
data esse, quis est, qui neget?

Est autem homo ad novas res propensus, id quod  
optimus Pater meus ingeniose monuit<sup>4</sup>, sequentibus  
verbis: "Gelijk vele nieuwe modes in huissieraden en  
kleederdragt daarom alleen behagen, dewijl zij naar den  
laatsten smaak zijn; zoo vinden ook, om diezelfde re-  
den, nieuwe stelsels van wijsbegeerte of godgeleerdheid,  
nieuwe uitvindingen, ondernemingen en gebruiken ter-

<sup>4</sup> Conf. Doct. I. C. FABIUS: "De vraag: welke tijden beter zijn te acht-  
ten, de verledene of tegenwoordige, in hare moeijelijkhed beschouwd; ne-  
vens het schadelijke van daarover scherp te twisten." in Horreo Menstruo  
Nieuw Christelijk maandschrift voor den beschaafden stand. Vol. I, Part.  
III, pag. 149.

istond bij menigeen bijval.<sup>330</sup> Ita quoque nonnulli magno  
dum gaudio instrumentum salutaverunt, quod inventor,  
in morbis pectoris dignoscendis maximi momenti fore  
contendit. *Spirometrum* volo ab **HUTCHINSONIO** inven-  
tum  
Genuis  
medicis deinceps spissibus posse morbos  
9

<sup>330</sup> Videatur dissertatione, cui titulus: *On the capacity of the lungs, and  
on the respiratory functions, with a view of establishing a precise and  
easy method of detecting disease by the spirometer.* By JOHN HUTCHINSON,  
Surgeon. *Medico-Chirurgical transactions*, 1846. T. XXIX, pag. 137  
caet. *Hujus disquisitionis extractum legimus in diario, quod inscri-  
bitur: Archives générales de Médecine, Febr. 1847.* Hutchinsoni  
dissertatio translata est et interpretata a doctissimo SAROSCENI  
quam Germanicam, edita a VIEWEG et fil. anno 1849 Brunsvici. Hujus  
versionis, titulus est "Von der Capacität der Lungen und von den  
Atmungs-Functionen, mit Hinblick auf die Begründung einer genauen und  
leichten Methode, Krankheiten der Lungen durch das Spirometer zu ent-  
decken von JOHN HUTCHINSON." Hujus translationis accuratissimum ex-  
tractum, annotationibus laude dignissimis locupletatum, adductis  
simo E. ALI COHEN insertum est Horro Menstruo Nieuw praktisch  
schrift voor de geneeskunde in al haren omvang, 29ste Jaargang, 1850,  
p. 393 caet. Videatur etiam diarium, quod inscribitur: Neue medici-  
nisch-chirurgische Zeitung, herausgegeben von G. LUDWICH DITTERICH,  
Zweiter Band. Neuer Folge, fünfter Jahrgang, 1847. 28 April, p. 119.  
*Über ein neues diagnostisches Hilfsmittel zur frühzeitigen Entdeckung der  
Brustkrankheiten von J. HUTCHINSON.* Conf. Clar. J. F. H. ALBERS, de her-  
kenning van ziekten door Auskultatie, Percussie, Spirometrie en andere  
physische hulpmiddelen, naar het Hoogduitsch, Amsterdam M. COSTER. J. z.  
1851, et *The Spirometer, the Stethoscope et Scale-Balance; their use in  
discriminating diseases of the chest and their value in life offices; with*

quumque pulmonum capacitatem in homine definiri possit, atque ita decerni posse, num capacitas normalis abnormis sit, id est, num pulmones prospera an adversa valetudine tantur.

Quamquam medicum decet subsidiis bonae morborum diagnosi inservientibus uti; attamen necesse est, ea ne adhibeat, priusquam certius redditum sit, ea, quae hominum instrumentorum inventores policeantur, non tantum proposita inania, sed revera momenti habenda esse. Alioquin enim facile falsis conclusionibus ductus ibi magnos errores rueret. Idcirco vires meas exiguae adhibui ad inquirendum, num HUTCHINSON spirometro dederit, quod promiserat. Quem in finem tot experimenta institui, quot potuerim, neque ullam occasionem hominum explorandorum praetermissi. Attamen numerus observationum non magnus est. Ne autem illis hoc impatem, qui benevolentes in indagationi obtulerint, et ita gratissimum mihi fecerint.

Antequam meas referam, observationes spirometri operab aliis factas minique cognitas commemorabo. Descriptionem autem instrumenti HUTCHINSON posteriorumque his anteponere mihi animus est. Concludam respondendo

*Remarks on the selection of Lives for life Assurance companies, by JOHN HUTCHINSON, Assistant Physician to the Brompton Hospital for Consumption and Diseases of the Chest, Physician to the Britannia Life Office etc. London JOHN CHURCHILL, Prince's Street Soho 1852.*

ad quaestionem: deditne HUTCHINSON spirometro magnum therapiæ donum?

““Equis tamen tam fandi potens orator vel fuit umquam vel in sequentibus oriturus est saeculis, qui tam diversa flagitantibus satisficerit auditoribus. Quare quod mortalium nemini datum nec nobis jure postulemus, ut omnibus placeamus” magnus olim dicebat D'ORVILLE; quid vero proferet tiro ad benevolentiam Lectoris exprecandam?” rogabat aestumatissimus Frater meus, in fine introitus dissertationi<sup>1</sup> de somniis tractanti praeserti; cuius verba mea facio, ubi ad illam quaestionem respondens “sciat,” inquit, “hasce esse primitias, confessas ad gradum Doctoralem acquirendum, et rationem Lector habeat virium tenuitatis et juvenilis aetatis auctoris. Haud vero nullius prorsus momenti dissertationem nostram habemus, utpote cui magni in arte viri suum haud denegaverint auxilium, quaeque multas observationes, ducibus Clarr. LONCQ et VAN GOUDOEVER factas contineat. Simul autem nobis persuasum est, alia, re censenda quae erant, esse omissa, alia vero nimis extensa, perperam expressa alia, quibus ut ignoscere velit Lector Benevolus, etiam atque etiam rogamus.”

<sup>1</sup> E. FABIUS, *Specimen psychologico-medicum de somniis*. Amstelodami, apud J. MÜLLER et socium. 1836.

---

## C A P U T I.

---

### DESCRIPTIO SPIROMETRI DEQUE USU IPSIUS ANNOTATIO HISTORICA.

---

Methodus capacitatis pulmonum in homine determinandae consistit in permetienda maxima aëris quantitate, quam pulmones continere possunt. Multi ad hunc finem apparatus inventi sunt<sup>1</sup>. Aptissimum JANUS HUTCHINSON Anno 1846 d. 28 m. Aprilis collegio medicorum Lon-

<sup>1</sup> Celeberrimi ANDRAL et GAVARRET quantitatem acidi carbonici humano pulmone exhalatam determinare conati sunt, quem in finem apparatu usi sunt, cuius descriptionem legimus in opere, cui titulus: *Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, etc.* Tom. XVI, p. 113. Paris, BACHELIER, Imprimeur-Libraire, Anno 1843. Multis modis antea jam tentaverant capacitatem pulmonum definire. BORELLI hoc jam fecerat anno 1679, MAYOW, BOERHAAVE, KEIL, alii hoc etiam nixi erant. Vid HUTCH., o. l., p. 141, et edit. Germ., p. 5, et RICHERAND, *Nouveaux Élémens de Physiologie*. Septième édition, Paris 1817. Tom. I, p. 410.

dinemus obtulit, cui nomen *spirometri* dedit<sup>1</sup>. Hoc, quodammodo simplicius redditum, in tabula prima hinc dissertationi adnexa, fig. 1 proponitur<sup>2</sup>. A cylindrus est tenuissimus e ferro stannato confectus, aëri recipiendo adaptatus, qui superne nullam aperturam habet praeter illam, quam epistomium a claudit, inferne plane apertus positus est in vase B, ex eodem metallo confeeto, aquam continentem. Cylindri A diameter est 16 centim. Neerl., capacitas 6000 centim. cub. Neerl. Aëre repletus in aquam non descendit. Totum nonus autem aërem non comprimit, quia fere prorsus in aequilibrio tenetur ponderibus dd, cum cylindro conjunctis filo.

<sup>1</sup> RICHERAND, ut mihi videtur, primus in cogitationem venit instrumenti, ut illud HUTCHINSONI. Conf. lib. cit., p. 410. "On peut cependant s'assurer que cette évaluation [du professeur GRÉGOIRE] est inexacte . . . en faisant rejeter l'air attiré dans les poumons par une forte inspiration, sous une cloche de l'appareil pneumato-chimique."

<sup>2</sup> HUTCHINSONI spirometrum delineatum est op. laud., p. 234. Haec effigies et ejus explicatio non pulcherrima pars operis est. Neutra scilicet est clara. Conf. opusc. laud.: "The Spirometer, the Stethoscope case," p. 19 et p. 21, ubi videmus, iconem spirometri modificatione fere, ut meum, et p. 22, alius, cuius descriptionem non dabo, quia HUTCHINSON, ipse de illo dicit: "This is also of Japanned zinc, or Spanish mahogany constructed of a form more pleasing; but not more correct for admeasurement, than that described by fig. 4, therefore the difference between the two Spirometers merely consists in the appearance. It is simply a spirometer as above accommodated to the shape of a case."

rum sericorum ee ope, quae in trochleis b et c moventur. Attamen non semper cum i ponderibus acquilibrium tenet, quia totus in aqua positus levior fit, gravior vero, quum majori aëris copia repletus ex aqua emersit, secundum legem physicam, quae nos docet<sup>1</sup>, corpora liquoris submersa tanto leviora fieri, quanti ponderis est pars liquoris, quam dimoverint. In vase B tabus f positus est, cuius extremitas superior eademque interior g supra aquae superficiem hh hiat. Tubus ille extrorsum producitur ejusque extremitati alteri, id est, exteriori tubus ex gummi elasticō confectus conjunctus est, eburneo siphunculo adnexus, per quem aërem inflari curamus, quem in cylindro permetiri volumus. Tubus fff clauditur epistomio C.

Aëre per tubum iii in cylindrum A inflato, hic adscendit in proportione aëris quantitatis in eum ducatae; quae copia acu k indicatur in scala FFF, tam accurate divisa, ut exacte referat numerum centim. cub. Neerl. aëris receptaculo contentorum.

Haec de apparatu. Experiundi modus hic est.

Quum explorare velis, qualē aëris quantitatem pulmones alicujus continere possint, eum prope instru-

<sup>1</sup> Vid. opus, cui titulus: POUILLET-MÜLLER's Lehrbuch der Physik und Meteorologie, Braunschweig 1845. Tom. I, pag. 79, ubi legimus: Wenn ein Körper in eine Flüssigkeit eingetaucht ist, so wird ein Theil seines Gewichtes von der Flüssigkeit getragen, welcher dem Gewichte der aus der Stelle getriebenen Flüssigkeit gleich ist.

mentum ponas. Tubum *i i* altera in manu teneat, ita quidem ut, orificium *i* ori propinquum sit, quippe quod, simulacrum quam profundissime inspiraverit, continuo labiis probe amplecti debeat. Jam, nares altera manu claudens, flare incipiat. Epistomio C cito nunc aperto, cylindrus, cuius acus *k* numerum 0 notabat, surgit. Quum flator omnem, quem possit, aërem efflaverit, epistomium C celeriter claudi debet, ne aér evadat. Nunc numerum legens, quem acus in scala designat, quantitatem cognoveris centim. cub. Neerl. aëris, exspiratione protracta in cylindrum A inflatam, quae capacitate pulmonum in homine examinato respondet.

Accidit saepe, ut, durante observatione, persona, quae exploratur, inspiret, quod ut statim detegatur, tubo *fol* tubulus reflexus vitreus *k* duobus cum bulbis *l* et *m* adjunctus est, qui veluti delatoris partes agat. Bulbi *l* et *m* (partim) liquore colorato replentur. Liquor ille acu numerum 0 notante, ambobus in bulbis eandem altitudinem tenet, sed descendit in *l* et adscendit in *m*, durante experimento, cui spirometrum inservit, liquor in *l* majori tum pressioni quam illo in *m* subjecto. Simulacrum flare cessamus, ut inspiremus, neque amplius igitur pressio major est quam atmosphaerica statim liquor et in bulbo *l* et in *m* eandem denuo altitudinem obtinet, quod examinator obsermare debet, ut subito epistomium C claudere possit. Magna est hujus delatoris utilitas in exploratione eorum, qui pro alio militare vel

stipendii causa vitae longaevae verisimilitudinem demonstrare cupiunt. Isti enim, bonam sanitatem probare studentes, quominus integrum pectoris valetudinem simulant, hac ratione impediuntur.

Quum liquor inspiratione e bulbo *t* suctus in tubum *ff* intraverit, ille, epistomio *D* aperto, removeatur. Praesentia humoris in tubo detegitur strepitū, durante exspiratione, orto, quae exspiratio, liquore tubum obstruente, molesta redditur. Epistomium *E* adductum est, ut vas facile depleri posset, quum per aliquod tempus spirometro uti nolimus.

En B. L<sup>1</sup>. descriptionem explicationemque instrumenti, quo expertus sum pulmonum capacitatem multorum hominum, circa quam argumentum mei speciminis versatur. Confectum est ab expertissimo WENCKEBACH modico prelio viginti florenorum. Instrumentum meum non valde a spirometro HUTCHINSONI differt. Delator autem non ejusdem formae est. Etenim conatus sum etiam ad aliud finem uti. Jam in initio descriptionis dixi, Receptaculum *A* non semper aequilibrium tenere cum ponderibus, quia in aqua levior sit. Ita aer ponderosiore cylindro comprimitur et minus volumen habet, dum contra majus spatium occupat, quam pondera graviora sunt. Hanc ob rem, cum numerus centimetrorum non semper exacte notaretur, metum esse putavi hunc errorum emendare, quod per delatorem feci. Nam liquor, aere in cylindro compresso, ex globulo *t* in *m*

ducitur et, aere in A minori pressui exposito, in  $l$  sūgitur. Itaque numerus centimetrorum non notandus est, nisi liquor in globulis  $l$  et  $m$  eadem altitudinem teneat, id est, nisi aer in cylindro hujus pressione careat, quod, parvā quidem aeris copia in eo contenta, efficiens pondus cylindri gravando, magnā vero, levando, donec pondera et cylindrus aequilibria sint. Talimodo hunc errorem tollere tentavi et correctionem adhucisse credo.

In examine etiam ad temperaturam attendendum est. HUTCHINSON nobis in opere suo nuper edito viam monstravit ad accommodandam datam capacitatem ad temperaturam  $60^{\circ}$  F. Liceat mihi ipsis ejus verbis uti: "The bulk of air changes  $\frac{1}{500}$  for every degree F. of variation of temperature: if a man breathe in winter 295 cubic inches of air into the spirometer when at  $55^{\circ}$ , or 5 degrees below  $60^{\circ}$ , then  $\frac{5}{500}$  must be added to the 295 cubic inches, thus:  $\frac{5}{500} = \frac{1}{100}$   $295 \times 1 = 295 \div 100 = 2.95$  cubic inches added to 259 = 297.95, or in round numbers 298 cubic inches. On the other hand, if the vital capacity be determined as 215 cubic inches when the thermometer stands at  $72^{\circ}$ , which is 12 degrees above  $60^{\circ}$ ,  $\frac{12}{500}$  must be deducted, thus:  $\frac{12}{500} = \frac{1}{42}$ .  $215 \times 1 = 215 \div 42 = 5$  cubic inches to be subtracted, making the corrected observation as 210, instead

<sup>1</sup> Op. laud., p. 16, § 32.

of 215 cubic inches." Omnia corpora enim calore expanduntur et ita quoque aér in receptaculo, ergo pro diversa temperatura majus minusve volumen ejusdem aëris copiae erit. Evidem omnes observationes in temperatura 60° Fahr. feci, et ita omnis aér in receptaculum meum inflatus eidem caloris differentiae expositus fuit, et eidem refrigerationi aqua, per quam vehebatur.

Artis periti, HUTCHINSONII inventione cognita, magno cum gudio spirometrum salutaverunt idque simplicius reddere conati sunt. GUSTAVUS SIMON, specimen academicum inaugurale conscripturus, argumentum dissertationis spirometrum sumvit et ad hunc finem, clarissimo JULIO VOGELIO duce, experimenta hujus instrumenti ope fecit<sup>1</sup>. Apparatus, quo usus est, a VOGELIO, ut scripsit, simplicior redditus, ut mihi tamen videtur, non valde emendatus est. Optimo jure instrumentum cum gasometro comparat. Receptaculum uno pondere pro duobus in aequilibrio tenetur et delatore caret. Unam attulit correctionem, thermometro nempe applicando, cuius bulbus in cylindrum penetrat, dum tubulus cum

<sup>1</sup> Vid. Ueber die Menge der ausgeathmeten Luft bei verschiedenen Menschen und ihre Messung durch das Spirometer, ein Beitrag zur medicinischen Diagnostik. Eine der medicinischen Facultät der Universität zu Giessen zur Erlangung der Doctorwürde vorgelegte Inauguralabhandlung, verfasssi von GUSTAV SIMON aus Darmstadt, unter der Leitung und mit einem Vorwort vom Professor Dr. JULIUS VOGEL. Giessen 1848. J. RICKERSCHE Buchhandlung.

scala extra eum versatur.<sup>10</sup> Examinator enim temperatu-  
ram aëris exspirati observare debet, si non omnia ex-  
perimentaliter in eadem temperaturâ instituit. Scire namque  
oportet, quantum aëris ille calore expansus sit, ut iam  
supra demonstravi.<sup>11</sup> Secundum meam opinionem autem  
VOGELI thermometrum applicuit loco maxime inepio,  
bulbum enim posuit supra aperturam tubi, per quem  
animatur, quo sit, ut magnae refrigerationi ab aëre  
inflato expositus sit. Attamen correctio dicenda est,  
quod dulcemente patet, quoniam apud eum legimus, quan-  
titatem ex. gr. 3640 centim. cubi expandi ad 3694 C.<sup>o</sup>  
temperatura aucta à 12° R. (60° F.) ad 15° R. (66° F.)  
ad Haec SIMONIS scrupulositas sane me stupefecit, nam  
scripsérat in pagina superiori: "Das vom Professor VOGEL  
vereinfachte Spirometer kostet nur 28 fl. und es liesse  
sich noch um einige Gulden wohlfeiler erhalten, wenn  
die am kleinen Cylinder angebrachte Scala nicht mit  
der Genauigkeit, wie an obigem Instrumente graduirt  
würde, was für die Untersuchungen mit dem Spirometer  
auch ganz unöklig ist."<sup>12</sup> Parva incuria autem in scalæ  
divisione majoribus erroribus, at mili certe videtur,  
ansam præbet, quam temperaturæ differentia, idque  
præsertim in SIMONIS scala, quæ tantummodo cylindri  
altitudinem notat, ut ea multiplicetur cum numero  
217.3 planitem cylindri designante.

<sup>1</sup> Conf. ep. laud., p. 16.

Atque haec quidem de SIMONIS spirometre. ~~etiam aliis~~  
 Ab aliis postea etiam alia instrumenta inventa sunt,  
 minori pretio obtainenda et certe non binutilia. Doct.  
 STELLWAG apparatum simplicem a Doct. PHOEbus exogi-  
 tatum sequentibus verbis descripsit <sup>1</sup>. "Er (scil. PHOE-  
 bus) ersetzte sogleich den theuren Spirometer HUTCHIN-  
 son's und VOGEL's durch ein grosses cylindrisches, durch  
 eine seitlich angebrachte Scala nach cubik-Centimetern  
 abgetheiltes Glas von der Grösse eines Standgefäßes,  
 wie man es zum Aufbewahren anatomischer Präparate  
 gebraucht. Dieses Glas wird mit Wasser ganz angefüllt,  
 und dann in einer mit derselben Flüssigkeit erfüllten  
 Wanne umgestürzt, so dass es ganz voll bleibt. Nun  
 wird unter den Rand des Glases ein elastisches Rohr  
 geführt, dessen anderes Ende der Kranke in den Mund  
 nimmt. Der Apparat wird so hoch gestellt, dass der  
 Kranke, wenn er das Rohr in den Mund hält, davor  
 ganz bequem in einer das Einathmen begünstigenden  
 militärischen Haltung stehen kann. Hierauf macht der  
 Patient bei ziemlich weit geöffneten Lippen eine mög-  
 lichst tiefe Inspiration, schliesst sodann den Mund fest  
 um diess Rohr und mittelst Fingerdruckes die Nasen-  
 öffnungen, und athmet möglichst langsam und vollständig.

<sup>1</sup> Conf. Oesterreichische medicinische Wochenschrift, 1848, vierthes Quartal, N°. 50, pag. 1581. Ueber Pneumometrie als diagnostisches Hülfsmittel, et Med. Centralzeitung, 1848, N°. 32 et 33, et Neue Med. Chir. Zeit. 1848, N°. 34.

dig aus, wo die Luft durch die Röhre in das Glas dringt. Das Glas wird nun so gehoben, dass sein Rand so wenig tief wie möglich unter Wasser steht, damit der hydrostatische Druck auf die Luft im Glase den Druck einer Atmosphäre möglichst wenig übersteige, und man liest an der Scala die Anzahl der im Glase enthaltenen Cubikcentimeter Luft ab.” Instrumentum a Doct. PHOBUS excoxitatum est fere simile instrumento jam anno 1814 ab EDMUNDO KENTISHIO descripto<sup>1</sup>, de quo tum libro, tum instrumento nullam HUTCHINSON mentionem fecit, quamquam observationes ab HERBSTIO factas cognoscebat<sup>2</sup> et quamquam HERBST instrumentum KENTISHIANUM descrepsit<sup>3</sup> sequentibus verbis: “Es besteht das Instrument in einer Glasmutter, die KENTISH nach ganzen und halben Pinten graduirt hatte. Oben ist dieselbe mit einer Fassung versehen, woran sich ein Hahn befindet, um nach Gefallen die Glocke oben öffnen oder verschliessen zu können. In die Fassung ist eine gläserne gebogene Röhre eingepasst.

<sup>1</sup> Conf. *An Account of Baths and of a Medcira-House at Bristol, with a Drawing and a Description of a Pulmometer: and Cases shewing its utility in ascertaining the State of the Lungs in Diseases of the Chest.* By EDMUND KENTISH, M. D., p. 117, London 1814.

<sup>2</sup> Vide diss. laud., p. 148, et p. 12 libri a doct. SAMOSCZI translati.

<sup>3</sup> Vide *Archiv für Anatomie und Physiologie*, herausgegeben von JOHANN FRIEDRICH NECKEL. Jahrgang 1828, Leipzig. Verlag von LEOPOLD VOSS, Ueber die Capacität der Lungen für Luft, im gesunden und kranken Zustande, von Dr. v. F. GUST. HERBST, in Göttingen, p. 93.

"Wenn nun diese Glocke in eine Schale mit Wasser gesetzt, und der Hahn geöffnet ist.... caet." HERBST hoc instrumentum paululum modificavit. Idea spirometri sive pulmometri ita EDMUNDO KENTISH est tribuenda. HERBST et ille instrumento etiam usi sunt ad copiam aëris inspirati permettiendam, nam, cylindro aëre replete, fortissima exspiratione per tubum inspiraverant. HERBST hujus pulmometri ope observationes laude dignissimas fecit, de quibus infra.

Unus e fratribus meis effigiem PHOEBIANI spirometri dedit in Tab. II huic dissertationi adnexa fig. 2.

Equidem pro lagena cylindrum vitreum praferrem inferne plane apertum, superne autem aperturam habentem, obturamento subereo accurate claudendam, quod, ut mihi videtur, facilius esset ad aquam infundendam et effundendam. Tales cylindri parvo pretio sunt venales. Multis in laboratoriis chemicis enim magnis lagenis utuntur, quarum fundi saepe calore nimis forti prompte dehiscunt quaeque tunc chemico inutiles, marginibus scabris politis, apti elibani sunt. PHOEBI apparatus omnino laude dignus est, nec tamen, ut HUTCHINSONIANUS, accuratus et facilis. Pretium minus revera est, sed lagena vitrea cito frangi potest, quod in receptaculum ferreum HUTCHINSONII non valet, ut igitur HUTCHINSONII spirometrum Phoebiano praferendum videatur.

Commune autem spirometrorum, de quibus hactenus sermo fuit, vitium est magnus eorum ambitus. Non,

ut stethoscopium, speculum uteri et alia instrumenta morborum diagnosi inservientia, Medicus illud secum ferre posset.

Hoc vitium correctum est. Spirometrum est instrumentum, parvum spatiū occupans et aptum ad capacitatem pulmonum denotandam, quod fig. 3, Tab. II, proponitur. Inventoris nomen mihi incognitum est.

Liceat mihi instrumentum describere. Spirometrum illud consistit in vesica A e gummi elasticō vulcanisato (*caoutchouc vulcantse*) confecta, cui tubus b ejusdem materiae junctus est, per quem aërem inflamus, quem in vesica permetiri volumus. Saccus, qui ante examen vacuus esse debet, durante exploratione, intumescit in proportionē quantitatis aëris intrantis. Flatore a flando desistente, tubus continuo et celeriter occludi debet, ne aër clam evadat. Ad intumescentiae quantitatēm permetiendam inventor in medio c sacci scalam i i posuit, quae, vesica turgescente, surgit et, ne cadat, tenetur ansa cuprea semicirculata d e f g h k cum apertura g, per quam scala movetur, indicans numerum CC aëris in vesica contentae. Ansa illa cochleis d e f h k l detortis, in quinque partes dividi potest (cochlea l, sacco tumescente obducta, in icode videri nequit). Ansae fines d et k junguntur laminis cupreis duabus se invicem extcipientibus, quibus vesica est affixa. Totum apparatus parva in capsula servare et nobiscum ducere possumus.

<sup>4</sup> Instrumentum cum capsula 1. forl mihi modico pretio 10 flor.

Multi errores, ut mihi videtur, corrigendi huic apparatus adhaerent.

1º. Vesica, aëre intrante, plicatur (rugae in ico*n*e literis *m m m* indicantur). Hae plicae non semper, credo, ejusdem sunt amplitudinis. Scala sacci dilatationem denotat in una tantum directione; at, cum pro rugarum densitate diversa differat aëris copia in sacco contenti, diversae ejusdem quantitates in scala eodem numero notari possunt. Quod observavi saccum; pluries eadem aëris quantitate, ejusdem temperaturae, antliae pressoriae ope, opprens. In scala scilicet numquam eodem, sed semper alio numero notabatur. Numerorum differentia non magna quidem est, attamen si apparatus bonus esset, nullum discriminem inter numeros adfuisset. Hoc vitium de mea quidem opinione corrigi posset lamina cornea, flexili, tenui, circum vesicam affixa in qua*n n n*, quae impediret, quominus saccus plicaretur et in hanc directionem turgeret. Non obstante hoc vixio, instrumentum tamen utile est. Multorum nempe pulmonum capacitatem et hoc apparatu et HUTCHINSONIO spirometro examinavi et utriusque instrumenti scalae eundem numerum exigua cum differentia notabant.

2º. Tubus *b* eburneo vel succineo orificio caret, qui renorum praebuit. Ille procurator Gallorum VARNOUT et GALANTE, qui multa instrumenta et apparatus chirurgicos Doctissimo GARIEL duce e gatini elasticò vulcanisato conficiunt, Hagae Comitum habitat in platea, cui nomen Veenestraat, N°. 149.

defectus immunditiae causa personis examinandis displiceret. Caret etiam epistomio ad tubum occludendum, simulac a flatu desistat examinandus, apprime necessario. Ut igitur examinerator digitorum ope tubum comprimere debeat. At haec compressio nunquam tam firma est, ut non aliqua aëris copia evadat.

3º. Longum et difficile est aërem e vesica educere; apertura enim tubi, per quam expelli debet, augusta est. Quamobrem horum instrumentorum fabricatori suasi, aperturam facere in c, obturamento subereo.<sup>1</sup> claudendam, cui scala affigenda esset. Lente autem aër expellendus est, ne aliqua vesicae pars nimis se expandat et elasticitatem perdat.

Vesica e gummi elasticō vulcanisato, quod vocant, confecta frigore non induratur, ut instrumenta e gummi elasticō non vulcanisato facta. "Le caoutchouc vulcanisé," sic legitur in libello nuper edito "conserve sa souplesse et toutes ses propriétés sous l'influence des températures les plus opposées. Il peut être exporté dans tous les pays, traverser la ligne ou les mers du Nord sans éprouver la moindre altération"<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Etiam alia instrumenta chirurgica e gummi elasticō confecta talimodo accurate clauduntur.

<sup>2</sup> CAOUTCHOUC VULCANISÉ, *Appareils et instruments de Médecine et de Chirurgie*. Paris, Imprimerie administrative de PAUL DUPONT, 1851, pag. 4. Conf. etiam *Geneeskundige Courant* anni 1852, d. 5 m. Septembr.

En B. L. descriptionem spirometrorum mihi cognitorum. HUTCHINSONI instrumentum, ut meum, modificatum, cui thermometrum vocelli, sed alio loco, affixum est, omnium mihi aptissimum et accuratissimum videtur. Etiam apparatus a ROLLIO mihi venditus omni laude dignus est et ad usum perquam idoneus.

## C A P U T . II.

### OBSERVATIONES SPIROMETRI OPE

A J A N O H U C H I N S O N , J U L I O V O G E L , G U S T A V O S I M O N , H E R I B E R T O  
D A V I E S , J O H N F R I D , H E R M A N N O A L B E R S , K U C H E N M E I S T E R ,  
A L I I S F A C T A E .

### § 1.

*Observationes de pulmonum capacitate, ante spirometri inventionem a nonnullis Physiologis factae.*

Antequam observationes, spirometri ope a nonnullis viris doctissimis factas, numero, liceat mihi paucis verbis tradere, quantopere Physiologi, HUTCHINSONI instrumento nondum invento, de capacitate pulmonum in homine dissentirent; quo spectant GREGORII verba.  
"Diu multumque inter Medicos disputatum fuit, quantum sub inspirationem ampliaretur thorax, vel quanta mensura externi aëris in pulmonem singulis inspi-

<sup>1</sup> *Conspiclus Medicinae Theoreticae ad usum academicum. Auctore JACOBO GREGORY, M. D. Editio nova, prioribus emendatior. Edinburgi 1832. p. 159. § DLV.*

tionibus descenderet; neque hactenus de his rebus prorsus composita lis est." Omnes fere diversam quantitatem aëris adspirati, exhalati, post exspirationem fortissimam in pulmonibus relictii referunt. J. ALPHONSUS BORELLUS<sup>1</sup>, ut ait HUTCHINSON, primus physiologus fuit, (anno 1679) qui conatus est quantitatem aëris, una inspiratione in pulmones recepti, permetiri. Qui BORELLI indagandi modus a JACOBO JURIN<sup>2</sup> est emendatus. Eo tempore etiam JACOBUS KEILII<sup>3</sup> copiam aëris una exspiratione e pulmonibus educti permensus est. "Omnes (scil. SWAMMERDAM<sup>4</sup>, PITCARNE<sup>5</sup>, BOHN<sup>6</sup>, MOLINETT, BOREL-

<sup>1</sup> JOH. ALPHONSI BORELLI, *Neapolitanus, Math. Prof De Motu animalium.* Pars secunda. Editio altera correctior et emendatior. Lugduni in Batavis 1685, p. 118, prop. LXXXI.

<sup>2</sup> Conf. HALLER, *Elementa Physiologiae corporis humani.* Tom III, Sectio 3, § 8, Lib. VIII, p. 198. Lausannae 1761.

<sup>3</sup> JACOBUS KEILII, Med. Dr., *Tentamina Medico-Physica ad quasdam quaestiones quae oeconomiam animalem spectant, accommodata.* Editio novissima, prioribus accurrior, indiceque rerum auctior. Lugduni Batavorum 1725. Prop. XI, p. 56 sqq.

<sup>4</sup> JOHANN SWAMMERDAMI, Amstel. Med. Doct., *Tractatus Physico-Anatomico-Medicus de Respiratione usque pulmonum.* Lugduni Batavorum, Anno 1679, p. 38, § 3: "Unde etiam fit propter aëris praesentiam, ut aquis impositi pulmones nunquam fundum petant, postquam semel tantum animal inspiraverit."

<sup>5</sup> ARCHIBALDI PITCARNI, *Opera omnia medica.* Editio novissima. Lugduni Batavorum 1737, p. 235: "Et hoc adeo evidens est, ut postquam aer semel fuerit per tracheam in pulmonem ductus, nunquam postea totus reddatur; sed, vesiculis pulmonis, praesertim ultimis,

LUS<sup>4</sup>, THUSTON<sup>2</sup> et alii<sup>3</sup>) affirmant, Cumque aërem  
semel respiratum ex pulmone omnem expelli<sup>3</sup>, sed inde  
quantitate dissidenti physiologi<sup>2</sup> 1671, 1674, 1677  
et alii<sup>4</sup> et PEPPYS pulmones viri fortis post mortem<sup>1771</sup>

C.C. aëris continere computaverunt<sup>4</sup>. aëris 1670 C.C. esse  
quantitatem aëris post exspirationem quam  
profundissimam in pulmonibus contenti<sup>5</sup> 1771 C.C. esse  
censuit<sup>5</sup>.

GOODWIN<sup>6</sup> tres observationes in suspensi fecit, quorum

partem aliquam relinquat, vasibus praeterlabentibus non absor-  
bendum; pulmonesque postea semper inflationes et leviores, quam  
fuerant in foetu, demonstrant, nec tantillo aëri in vasa pulmonum  
sanguifera patere effugium.<sup>6</sup>

D. JON. BOHN<sup>7</sup>, *Circulus anatomico Physiologicus et cæt.* Lipsiae 1710,  
p. 88: "Non omnis aëris in exspiratione semper ejicitur." In part.  
1686, p. 95: "In exspiratione non evanescunt pulmones omnino, sed semper in eis remanet non exigua moles  
aëris."<sup>8</sup> Op. cit., prop. XCIX, p. 133: "In exspiratione non evanescunt  
pulmones omnino, sed semper in eis remanet non exigua moles

aëris."<sup>9</sup> MALACHIA THUSTON<sup>10</sup>, *De Respirationis usu primario diatriba*, Lügd.  
Batav. 1671, p. 87: "Aëris, vel semel haustus atque per tracheam  
omnissimas propagines (ex quibus in vesiculos jacto dicta) patet  
aditus in vesiculos admissus, non illinc, omnino, in exspirationis  
avolat."<sup>11</sup>

<sup>5</sup> HERMANNI BOERHAAVE, *Praelectiones Academicæ Tom. V*, Pars I,  
1758, Lugduni Batavorum, pag. 26 (1). <sup>12</sup> M. q. 1. op. 1. HUTCH.,  
H. Phil. Trans. 1809, Vol. XCIX, p. 412. *Deutsches Archiv für die  
Physiologie*. Herausgegeben von W. F. MECKEL, 1817, Dritt. B., p. 239.  
<sup>5</sup> *Chem. and Philosoph. Researches*, p. 410. HUTCH., op. 1, p. 146.

pulmones 1787 C.C. pro medio numero continuo trahit<sup>1</sup>; dum pulmones quatuor hominum morte naturali mortuorum 1476, 1673, 1968 et 2050 C.C. continebant<sup>2</sup>.

KITE dicit, pulmonibus post normalem exspirationem 1640 C.C. aeris inesse<sup>3</sup>. C.C. scilicet continuo compatis combinari possunt, si 1968 aestimatur<sup>4</sup>.

BOSTOCK refert, doct. MENZIES hunc numerum 2935 C.C. habere<sup>5</sup>.

JURINE notat numerum 3608 C.C., FONTANA 656, CU-  
VIER a 1640 ad 984, MECKEL a 852—656<sup>6</sup>, HERBST  
1476—1968<sup>7</sup>. GREGORY dicit: "Non desunt multae ob-  
servationes et experimenta a variis auctoribus instituta,  
quae verisimile faciunt [apud] hominem adultum solitae  
magnitudinis (nam multum hic valet ipsius thoracis ampli-  
tudo) post validissimam exspirationem vix quinquaginta

<sup>1</sup> J. BOSTOCK, *Versuch über das Athemholen*. Erfurt 1817, p. 26.

<sup>2</sup> Handwörterbuch der Physiologie, von Dr. K. WAGNER, Zwölfta Lieferung, p. 830, Art. *Respiration* a Doct. K. VIERORDT.

<sup>3</sup> Essays and observations, Physiol. and Med., 1795, p. 8; HUTCH., op. I., p. 147.

<sup>4</sup> Elem. of Physiol., 3rd. ed., p. 318. HUTCH., op. I., p. 147.

<sup>5</sup> BOSTOCK, *Versuch eact.*, p. 35.

<sup>6</sup> HUTCH., op. I., p. 147.

<sup>7</sup> Dr. A. F. GÜNTHER, *Lehrbuch der Physiol. des Menschen*, Th. II,

Pars I, Leipzig 1848, p. 219. — MECKEL, *Archiv*, N°. 243, 1828,

pag. 104.

pollices cubicos [820 C.C.] aëris in pulmonibus manere<sup>1.</sup> HERBERT credit, exiguum aeris copiam post validissimam expirationem in pulmonibus manere<sup>2.</sup> URE antliae pneumaticae ope 1722 C.C. aëris ex pulmonibus aquâ submersi suxit<sup>3.</sup>

Ex quibus omnibus dilucide patet, rem viris doctis non claram esse, et ita omni jure, credo, GREGORII verba mea facio dicentis: "non de his rebus prorsus composita lis est." HUTCHINSONI instrumentum enim his nebris lucem non affundit.

Quantum physiologi dissentiant circa quantitatem aëris, quo homines utuntur ad ordinariam, i. e. placidam respirationem [*the breathing air*, HUTCH.], appareat ex tabula sequente<sup>4.</sup> quae nos docet, observationes differre a poll. cub. Angl. 3 ad 100:

ABILDGAARD aërem istum aestimat	DAVY.....	13 et 17.
maavit <sup>3</sup> 3 poll. cub.	ALLEN et PEPYS.....	16.5.
ANERNETHY.....	HERBST.....	16 ad 25.
KEUTSCH.....	JURIN.....	20.
GOODWIN.....	BORELLI.....	a 15 ad 40.
LAVOISIER et SEGUIN.....	HERDOLDT.....	a 25 ad 29.
WÜNZER et LAMETHERIE 8 vel 10.	DALTON.....	30.
KITE.....	FONTANA.....	35.

<sup>1</sup> GREGORY, op. I., p. 159.

<sup>2</sup> BOSTOCK, op. cit., p. 316, et *Archiv Gén. de Méd.*, Tom. XXI, p. 412 et seq. HUTCH., op. I., p. 147.

<sup>3</sup> BURDACH (K. F.), *Die Physiologie als Erfahrungs Wissenschaft*, T. VI. Leipzig 1840, p. 431.

<sup>4</sup> HUTCH., op. I., § 19, p. 148.

RICHERAND, ROLAND, GORDON et CAVALLO.....	a 30 ad 40.	CHARTAL, BELL, MONRO et BLUMENBACH.....	40.
HALES, JURIN, SAUVAGES, HAL- LER, ELLIS, SOMMERING, THOM- SON, SPRENGEL, BOSTOCK,		MENZIES.....	a 42 ad 46.
		REIL .....	a 42 ad 100.

Ut de quantitate aëris post maximam exspirationem in pectore relictum, sic etiam de copia ejusdem post profundissimam inspirationem in pulmonibus contenti physiologi pugnaverunt, cui pugnae HUTCHINSON spirometro finem imposuit. Litem adfuisse de pulmonum capacitate, liquet ex differentia numerorum capacitatem designantium, quos varii physiologi notaverunt.

JURIN enim computat, ut HALES, in homine capacitatem pulmonum esse 3608 C.C., i. e., per fortissimam inspirationem hominum pulmones 3608 C.C. aëris intrare posse.<sup>1</sup>

H. DAVY experimenta in semet ipse fecit et narrat, se per fortissimam exspirationem 3132 C.C. aëris e pulmonibus expulisse.<sup>2</sup> BOSTOCK 2788 C.C., JURIN 4356<sup>3</sup>, THOMSON 3056 C.C.<sup>4</sup> aëris exspirare poterant.

THOMSON in 12 adolescentibus et juvenibus ab anno aetatis 14<sup>mo</sup> ad annum 33<sup>um</sup> experimenta fecit. Illorum capacitas a 1640 ad 4100 C.C. distabat.

<sup>1</sup> HALES, *Statistical Essays containing vegetable staticks*, London 1738. Vol. I, p. 239.

<sup>2</sup> Op. cit., p. 410.

<sup>3</sup> Doct. VIERORDT, op. cit., p. 830.

<sup>4</sup> THOMSON's *Anim. Chem.*, 1843, p. 610 et seq. — HUTCH., p. 149.

Secundum HUTCHINSONIUM<sup>1</sup>, GOODWYN<sup>2</sup> dicit: "By a full inspiration, after a careful expiration, a man will frequently take into his lungs upwards of 200 cubic inches of air at a single effort."

KITE existimat, personam mediocriter longam per fortissimam inspirationem post fortissimam exspirationem

4920 C.C. aëris in pulmones inducere posse<sup>3</sup>.

Numerus centimetrorum cubicorum aëris, hocce modo in pulmones ducendi, superat saepe, secundum doct. MENZIES 3280<sup>4</sup>. BOSTOCK<sup>5</sup> et DUNGLISON<sup>6</sup> hunc numerum 3444 esse censerent.

THACKRAH<sup>7</sup>, novendecim experimentis, in militibus institutis, pro medio numero 3558 C.C. inventit. Maximus, scilicet 4838 C.C., erat in vexillario, juvene gracili. Media capacitas nonnullorum sutorum secundum illius experimenta erat 2984 C.C.

Apud GREGORIUM legimus<sup>8</sup>: "Non desunt autem multae observationes et experimenta, a variis auctoribus instituta, quae verisimile faciunt, [apud] hominem adul-

<sup>1</sup> Hutch. op. laud., § 20, p. 149.

<sup>2</sup> Op. cit., p. 32, note.

<sup>3</sup> Op. cit., p. 48.

<sup>4</sup> MAYO's *Outlines of Physiol.*, p. 76. Hutch., p. 149.

<sup>5</sup> Op. cit., p. 321.

<sup>6</sup> Op. cit., Vol. II, p. 91.

<sup>7</sup> THACKRAH, *On the Effects of Arts, Trades, etc. on Health*, p. 21.

et seqq. Hutch., p. 149.

<sup>8</sup> Op. laud., p. 159.

tum, solitae magnitudinis, (nam nullum hic valet ipsius thoracis amplitudo) per fortissimam inspirationem, ducentos et quinquaginta fortasse pollices cubicos [4000 C.C.] aëris in iis [scil. pulmonibus] includi: et demum, per fortissimam expirationem post talem inspirationem, ducentos fere pollices cubicos [3280 C.C.] aëris e pulmonibus expelli."

Secundum BURDACHIUM<sup>1</sup> PROUT putat, capacitatem pulmonum in homine 4592 C.C. esse.

HERBST et NAVY credunt, ut idem BURDACHIUS notavit, pulmonum capacitem in viro 3608—4264, quin etiam 4592 C.C. esse.

VALENTIN<sup>2</sup> in 6 personis capacitem medium invenit 2773 C.C., Minima erat 1936, maxima 3651 C.C.

Secundum BUDGII<sup>3</sup> vir adultus omni inspiratione, quae sine intentione fit, circiter 286,4—429,6 C.C. aëris in pulmones dicit. Per fortiorum seu profundissimam inspirationem haec copia ab octupla ad decemplicem augeri potest.

Indicatis numeris capacitem pulmonum in homine designantibus, HUTCHINSONI verba referam dicentis<sup>4</sup>:

"It may be possible that some of the foregoing details

<sup>1</sup> Op. laud., p. 431.

<sup>2</sup> VIERORDT, Dissert. laud., in WAGNERS Handwörterbuch, p. 830.

<sup>3</sup> Prof. JULIUS BUDGE's Kort begrip der bijzondere natuurkunde van den Mensch, in het Nederduitsch bewerkt onder toezigt van Dr. A. COHEN. Groningen 1850, § 24, p. 52.

<sup>4</sup> Hutch., op. laud., pag. 149.

are incorrectly classified; but the subject of respiration is oftentimes so ambiguously treated, that it is very difficult to arrive at the true meaning of authors.” At-tamen certum est, observatores dissentire. HUTCHINSON credit, hoc factum esse, quia non notaverint, num viros an mulieres, num pueros an adultos examinaverint. Nil apud eos legimus de atmosphaerae temperatura, durante exploratione, nil de altitudine, de pondere, de aetate hominum examinatorum, quamquam haec omnia sunt causae discriminis, ut BURDACH hoc anno 1840 docuit, dicens<sup>1</sup> “Die Verscheidenheiten der Leibesgrösse, der Geräumigkeit der Brust, der Muskelkraft, der gewohnten Lebensweise, der Willensanstrengung und des zum Behufe des Versuchs gebrauchten Apparats bestimmen vorzüglich diese Differenzen.” Quod etiam legimus apud RICHERANDUM<sup>2</sup> in opere laudato “Toutes ces différences dans l'estimation de la quantité d'air inspiré prouvent combien il est difficile d'approcher de l'exactitude. Au reste elle est très peu nécessaire, et les différences de taille, de sexe, d'âge ainsi qu'une foule d'autres circonstances, doivent faire varier les résultats.” Etiam ANDRAL et GAVARRET illud observaverunt, quum experimenta ficerent de quantitate acidi carbonici pulmonibus exhalati. Legimus nempe apud eos:

<sup>1</sup> BURDACH, op. cit., p. 430, Tom. VI.

<sup>2</sup> RICHERAND, op. laud., p. 411.

La quantité d'acide carbonique exhalé par le poumon dans un temps donné, varie en raison de l'âge du sexe et de la constitution des sujets<sup>4</sup>. Alias idem observationes fecerunt maximi momenti et iver omni laude dignas, quae pad sequentes conclusiones duxere: similez solubus in m. pectos au multoletis.

Chez l'homme comme chez la femme cette quantité se modifie suivant les âges indépendamment du poids des individus mis en expérience.

Dans toutes les périodes de leur vie comprises entre 8 ans et la vieillesse la plus avancée, l'homme et la femme se distinguent par la différence de quantité d'acide carbonique qui est exhalé par leurs poumons dans un temps donné. Toutes choses étant égales d'ailleurs, l'homme en exhale toujours une quantité plus considérable que la femme; cette différence est surtout très-marquée entre 16 et 40 ans, époque pendant laquelle l'homme fournit par le poumon presque deux fois tant d'acide carbonique que la femme.

Chez l'homme, la quantité d'acide carbonique échiqué va sans cesse croissant de 8 à 30 ans, et cet accroissement contenu devient subitement très grand à l'époque de la puberté. A partir de 30 ans, l'exhalation d'acide carbonique commence à décroître, et ce décrois-

<sup>4</sup> Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'académie des sciences. Tom. XVI. Paris 1843, p. 118.

sement a lieu par degrés, d'autant plus marqués que l'homme s'approche davantage de l'extrême vieillesse, à tel point qu'à la dernière limite de la vie, l'exhalation d'acide carbonique par le poumon peut redevenir ce qu'elle était vers l'âge de 10 ans.

"5°. Chez la femme, l'exhalation d'acide carbonique augmente, suivant les mêmes lois que chez l'homme pendant toute la durée de la seconde enfance; mais au moment de la puberté, en même temps que la menstruation apparaît, cette exhalation, contrairement à ce qui arrive chez l'homme, s'arrête tout à coup dans son accroissement et reste stationnaire (à peu près ce qu'elle était dans l'enfance), tant que les époques menstruelles se conservent dans leur état d'intégrité. Au moment de la suppression des règles l'exhalation d'acide carbonique par le poumon augmente d'une manière très notable; puis elle décroît comme chez l'homme à mesure que la femme avance vers l'extrême vieillesse."

"6°. Dans les deux sexes et à tous les âges la quantité d'acide carbonique exhalé par le poumon est d'autant plus grande que la constitution est plus forte et le système musculaire est plus développé."

*Verum quidem est, ex quantitate acidi carbonici exhalati de capacitate pulmonum judicari non posse, attamen observationes ab ANDRALLIO et GAVARETTIO factas retuli, quia magna pro parte convenient cum experimentis spirometri ope ab HUTCHINSONIO et aliis factis.*

## § 2.

*Observationes spirometri ope a JANO HUTCHINSONIO*

*factae.*

HUTCHINSON, cum hominum pulmones examinaret, ad omnia ea, quae secundum BURDACHIUM causae discriminis sunt, attendit. Omnes nimirum, quorum pulmonum capacitatem examinavit, sequenti explorationi subjicit.

Primo capacitatem vitalem [the vital capacity]<sup>1</sup>, id est, numerum quaequivit C.C. aëris, fortissima exspiratione post similem inspirationem, pulmonibus expulsi in instrumentum, capite primo hujus speciminis descriptum.

Attendit porro in vim muscularum inspirationi inseruentium; in vim muscularum, quibus exspiratio perficitur; in circumferentiam pectoris supra papillas; in totius corporis longitudinem et pondus; in pulsum, dum sedebant examinari; in numerum respirationum quaque sexagesima horae parte, in eadem corporis positione;

<sup>1</sup> Vid. *The Spirometer, the Stethoscope caet.*, p. 2, ubi legimus: "According to physiological nomenclature, perhaps the term *vital capacity* may be objectionable; but we adopt it for want of a better term, it being the largest volume of air which can be displaced by any movement of the living body and may therefore be termed *vital volume* or the *vital capacity*."

in aetatem; in temperaturam aëris in spirometrum inflati; denique in professionem et habitum externum.

Antequam vero experimenta ab HUTCHINSONIO facta referam, liceat mihi observationes HERBSTI<sup>1</sup> communicare.

HERBST nempe primus fuit, qui bona experimenta de pulmonum capacitate fecit, quod luculente patet ex dissertatione collectaneis MECKELII inserta. Plures homines pulmometri ope, de quo instrumento jam locutus sum, examinavit et pulmonum capacitatem modificari reperit.

1°. longitudine corporis, 4°. aetate, 2°. pondere, 5°. morbo, 3°. muscularum vi, 6°. sexū, 7°. pectoris circuitu.

Secundum HERSTIUM, personae minoris longitudinis minorem aëris copiam, quam homines longiores exspirant (p. 98). Homines obesi, etiam si pectus magnum habet circumutum, eodem auctore, nonnunquam anhelant; capacitas enim pulmonum in iis saepissime minor est, quam normalis (p. 101). Multi homines longiores majorem aëris copiam inspirare possunt, at capaeitas non tantum totius corporis longitudine modificatur, sed præsertim pectoris circumferentiā et etiam muscularum vi

<sup>1</sup> Op. laud., p. 83.

(p. 102). Ut thoracis ambitus, sic etiam pulmonum capacitas infantum minor est quam adulorum (p. 102). Pulmonum capacitas in feminis minor est quam in viris (p. 103). Facile intelligere possumus, sunt verba ejusdem HERBSTI, differentiam pulmonum capacitatis in aegris majorem quam in hominibus bene valentibus esse. Tantum adducam, quanto nostris in experimentis pulmonum capacitas aegrorum minor fuerit, caet. (p. 105).

Haec omnia jam anno 1828 ab HERSTIO vulgata sunt. Bis mille centum et triginta personas HUTCHINSON examinavit. Horum unusquisque ter continue in spirometrum flavit, quia, saepe timoris vel imperitiae vi, prima observatio ad accuratam conclusionem ducere non poterat<sup>1</sup>. Quantitas aëris inflati, pluribus experimentis continue factis, propter lassitudinem flatoris diminuebatur<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> PNOEBUS dicit in dissertatione laudata: "Bei dem ersten Versuche zeigen sich die Leute gewöhnlich etwas ungeschickt, man übe sie also erstlich, und nehme aus drei Versuchen die Mittelzahl." Melius dixisset, ut mihi quidem videtur; et maximus horum numerorum capacitatatem designat; nam maxima quantitas in spirometrum inflata pulmonibus contenta fuit et ita probat, pulmones talem copiam cipere posse.

<sup>2</sup> Conf. Wiener Medizinische Wochenschrift. Zweiter Jahrgang 1852. Sonnabend den 25 Sept. Ueber einige nothwendige Correctionen bei Anwendung des Spirometers, von Prof. J. P. H. ALBERS, in Bonn. Ubi legimus: "Nach jeder Anstrengung ist das Maass der eingeaathmete Luft ein geringeres, als im ruhigen gesunden Zustand."

Facultas fortiter exspirandi, adeoque copia aëris exhalati, secundum HUTCHINSONUM tam immutabilis est, ut quamquam sexcenties in instrumentum flaverit, plus aëris inflare quam quinque annis ante non potuerit.

Capacitas vitalis, in pari conditione constans habenda, quatuor causis modificatur, nempe

1°. longitudine corporis, 3°. aetate,

2°. pondere,

4°. morbo<sup>1</sup>.

1°. *De longitudinis vi.* Primum momentum, nempe longitudo corporis, maxime valet idque tanti habendum est, ut HUTCHINSON dicere audeat, capacitatem pulmonum in sano homine notam esse, dummodo longitudo cognita sit<sup>2</sup>.

HUTCHINSON hac de re observationes fecit in 4400 hominibus bene valentibus et diversae professionis, ex quibus experimentis sequentem tabulam deduxit, “die, ut SIMONIS verba mea faciam, “an und für sich so verständlich ist, dass sie keiner Erklärung bedarf”<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Vid. HUTCHINSON, *The Spir.*, pag. 3: “The measure of this volume (vital capacity volume) is modified by height, by attitude, by weight, by age, and by disease.”

<sup>2</sup> Doctiss. ALI COHEN dicit, p. 397, dissertationis laudatae: “Meer dan eens heb ik zelf reeds waargenomen, hoe men bij het bekend stellen der grootte van een goed gevormd gezond individu de capaciteit zijner longen *a priori* met treffende nauwkeurigheid kan bepalen.”

<sup>3</sup> Conf. SIMONIS diss. laud., p. 3.

TABULA I.  
CAPACITAS VITALIS (TEMP. 60° R.) PULMONUM 4400 VIRORUM  
BENE VALENTIUM IN POSITIONE ERECTA.

LONGITUDO. GALLIA.	MENSURA METR.	AB ANNO AETATIS AB ANNO AETATIS 16 <sup>o</sup> /o SUB MEDIO.		
		55 AD 65.	65 AD 75.	75 AD 85.
5.0 ad 5.1	1.524 ad 1.5404	174. = 2853.2	163. = 28673.2	161. = 28640.4
5.1 " 5.2	1.6494 " 1.5748	182. = 2984.6	173. = 2837.2	168. = 2755.2
5.2 " 5.3	1.5748 " 1.6002	190. = 3116	181. = 2720.8	176. = 2870.
5.3 " 5.4	1.6002 " 1.6256	198. = 3247.2	188. = 3083.2	182. = 2984.8
5.4 " 5.5	1.6256 " 1.651	206. = 3378.4	196. = 3214.4	190. = 3116.
5.5 " 5.6	1.651 " 1.6764	214. = 3509.6	203. = 3329.2	197. = 3198.
5.6 " 5.7	1.6764 " 1.7018	222. = 3640.8	211. = 3460.4	204. = 3342.8
5.7 " 5.8	1.7018 " 1.7272	230. = 3772	219. = 3591.6	212. = 3444.
5.8 " 5.9	1.7272 " 1.7526	238. = 3903.2	226. = 3706.4	219. = 3501.6
5.9 " 5.10	1.7526 " 1.778	246. = 4034.4	234. = 3837.6	226. = 3706.4
5.10 " 5.11	1.778 " 1.8034	254. = 4165.6	242. = 3968.8	234. = 3837.6
5.11 " 5.12	1.8034 " 1.8288	262. = 4296.8	249. = 4083.6	241. = 3952.4
				220. = 3608.

<sup>1</sup> Conf. nutch., the spirometer, p. 4.

Haec tabula nos docet, capacitatem pulmonum, corporis longitudine crescente, augeri et quidem pro quoque pollice Anglicano (25.3997 millim.), a longitudine quinque pedum (1.524 metr.), usque ad longitudinem sex pedum Angl. (1.8288 metr.), numerum pollicum cuborum Anglicorum (poll. cub. Ang. = 16.4 centim. cub. Gall.), pulmonum capacitatem designantem, octo, id est, 131.2 C.C. augeri <sup>1</sup>.

Hac de re dicit praceptor aestumatissimus Clariss. J. L. C. SCHROEDER VAN DER KOLK: "Wel hebben, volgens de waarnemingen van HUTCHINSON, lange menschen in het algemeen eene ruimere capaciteit der longen, maar, naar mijne meening, niet zoo zeer om hunne lengte, als wel omdat voor een langer ligchaam zwaardere spieren noodig zijn, om de langere hefboomen te bewegen. De spieren bezitten het meeste bloed, en de capaciteit der aderen staat, zoo als injecties mij geleerd hebben, in een direct verband tot de spierontwikkeling. Zij bezitten dus eene grootere hoeveelheid bloed, en naar evenredigheid hiervan, grotere longen, waardoor dit bloed vloeijen moet. Die een' habitus phthisicus bezitten, zijn niet langer, maar ranker, dat is

<sup>1</sup> Conf. HUTCHINSON *the Spirometer*, p. 3, ubi legimus: "That in the erect position for every inch of stature from 5 ft to 6 ft eight additional cubic inches of air, at 60° F, are given out in one volume, by the deepest expiration, immediately following the deepest inspiration."

smaller en tengerder; zij zijn minder zwaar gevoed, minder gespierd".<sup>4</sup>

Quam HUTCHINSON observasset, pulmonum capacitatatem maxima pro parte a corporis longitudine dependere, inquisivit, an relatio longitudinem inter et pectoris capacitem adesset. Quem in finem in viginti cadaveribus (6 feminini, 14 masculini generis), pulmonibus cordeque amotis, sulphas calcis pectori infudit, postquam corporis longitudinem et pondus, nec non mortis causam definit. Gypso indurato, illud e pectore exemit, veram referens thoracis capaeitatis imaginem. Haec experimenta relationem pectoris capacitatem inter et corporis longitudinem non adesse docuere. Pulmonum quippe capacitem pectoris amplitudine non modificari, HUTCHINSON reperit, quemadmodum etiam observavit, non trunci, sed totius corporis longitudine aëris quantitatem, post fortissimam inspirationem exhalandi, definiri.

#### *De vi ponderis in capacitatem vitalem.*

Ponderis vis in capacitatem vitalem nec tam insignis nec tam regularis est, quam longitudinis. Nihilominus ad illud attendendum est. HUTCHINSON enormitatem tantum ponderis vim habere reperit. Difficile est, cum pondus saepe cum longitudine augeatur, vim unius ab alterius separare. Ex observationibus hac de re in mille

<sup>4</sup> Conf. Over den oorsprong en de vorming van tubercula pulmonum, door J. T. C. SCHROEDER VAN DER KOLK, Ned. Lancet, 3de Serie 2de Jaarg., No. I en II, 1852.

ducentis et septuaginta sex hominibus ab HUTCHINSONIO factis patet, vim ponderis in capacitatem vitalem irregularē esse.

Horum experimentorum eventus proponuntur in sequenti

TABULA II.

QUAE VIM PONDERIS TOTIUS CORPORIS IN CAPACITATEM  
PULMONUM VITALEM INDICAT.

PONDUS IN LIBRIS ANGL. <sup>1.</sup>	KILOGR.	POLL. CUB. ANG. C.C.	POLL. CUB. ANG. C.C.	DIFFERENTIA.
100 libr.	= 45.3595	{ 176 = 2886.4		
110 "	= 49.89545		{ 181 = 2968.4 + 18 = + 295. <sup>2</sup>	
110 "	= 49.89545	{ 186 = 3050.4		
120 "	= 54.4314			
120 "	= 54.4314	{ 196 = 3214.4		
130 "	= 58.96735		{ 199 = 3263.6 + 24 = + 393. <sup>6</sup>	
130 "	= 58.96735	{ 203 = 3329.2		
140 "	= 63.5033			
140 "	= 63.5033	{ 219 = 3591.6		
150 "	= 68.03925		{ 223 = 3657.2 - 5 = - 82	
150 "	= 68.03925	{ 228 = 3739.2		
160 "	= 72.5752			
160 "	= 72.5752	{ 217 = 3558.8		
170 "	= 77.11115		{ 218 = 3575.2 + 5 = + 82	
170 "	= 77.11115	{ 219 = 3591.6		
180 "	= 81.6471			
180 "	= 81.6471	{ 226 = 3706.4		
190 "	= 86.18305		{ 223 = 3657.2	
190 "	= 86.18305	{ 221 = 3624.4		
200 "	= 90.719			

<sup>1</sup> Liber Anglicus (*Avoir du Pois*) = 0.4536 kilogr.

Quum hominis pondus cum ipsius longitudine augeatur, relatio pondus inter et capacitatem vitalem, longitudine crescente, differre debet. Nondum constabat de ratione ponderis et longitudinis. Hanc HUTCHINSON multis experimentis invenire conatus est, quod quanti momenti sit, facile intelligitur. Nam, cum pondus normale datae longitudinis cognoscimus, ponderis vim in capacitatem vitalem, secundum HUTCHINSONIUM, definire facile possumus.

Ex observationibus ab illo in 2648 viris factis patet, pondus 5.43 lib. Angl. [2.461048 kilogr.] crescere pro unoquoque pollice Angl., quo longitudo augeatur<sup>1</sup>. Quod tabula sequens nos docet.

---

<sup>1</sup> Notandum est, HUTCHINSONIUM homines vestitos libravisse. Ille hac de re dicit: "M. QUETELET says, the average weight of the clothes at different ages is one eighteenth of the total weight of the male body, and one twenty fourth part of the total weight of the female." — QUETELET sur l'homme, etc.

## TABULA III.

DE PONDERIS DIFFERENTIA IN PROPORTIONE  
LONGITUDINIS 2648 VIRORUM.

LONGITUDO.			PONDUS.		DIFFERENTIA.	
PES. ANG.POLL.	POLL.	MÈTR.	LIBR. ANG.	KILOGR.	LIBR. ANG.	KILOGR.
5. 1.	61.	1.5494	120.	54 4314	+ 6.2	2 81232
5. 2.	62.	1.5748	126.	57.153	+ 6.8	3.08448
5. 3.	63.	1.6002	133.	60.3282	+ 5.7	2.58552
5. 4.	64.	1.6256	139.	63.0497	+ 3.5	1.5876
5. 5.	65.	1.651	142.	64.4105	+ 2.5	1.134
5. 6.	66.	1.6764	145.	65.7713	+ 3.8	1.72368
5. 7.	67.	1.7018	148.	67.1321	+ 6.8	3.08448
5. 8.	68.	1.7272	155.	70.3073	+ 6.9	3.12984
5. 9.	69.	1.7526	162.	73.4824	+ 6.5	3.9484
5. 10.	70.	1.778	169.	76.6576	+ 5.6	2.54016
5. 11.	71.	1.8034	174.	78.9256		

HUTCHINSON, ut legimus in prima ejus de hoc argumento dissertatione, capacitatem vitalem, cum pondus hos limites (vid. Tab. III) transgreditur, conspicue, et quidem in progressione geometrica, diminui credit, quia corpulentia thoracis mobilitati obest. Scilicet, ut refert in novissimo opusculo (pag. 9), quum pondus ad 7% supra medium (103 kil. Ang. 46.7203 kil.) increverit, tum pro quaque libra Angl. (0.4536 kil.) e 35

(15.87583 kilogr.) excessum illum superantibus capacitas vitalis uno pollice cubico (16.386176 C. C.) decrescit. Supra 35 capacitas vitalis verosimiliter in progressione geometrica diminuitur. Pondus phthisicorum manifeste minus est quam illud hominum bene valentium.

*Aetatis vis in capacitatem vitalem.*

Aetas, ut facile intellectu est, ad capacitatem vitalem valet. Temporis enim cursu primum vires adsumit homo, deinde debilitatur. Ab anno aetatis 15° ad 35<sup>um</sup> pulmonum capacitas augetur, et a 35° ad 65<sup>um</sup> diminuitur. Aetatis vis attamen non tanta est, quanta longitudinis vel ponderis, quod e Tab. IV liquet. HUTCHINSON hanc ob rem 1775 homines bene valentes examinavit. Experimenta facta eum docuerunt, capacitatem vitalem increscere ad annum 30<sup>um</sup>; ab anno vero 30° ad 60<sup>um</sup> 43 poll. cub. Ang. (704.6 C. C.) diminui, id est, unoquoque anno circiter 1.43 poll. cub. Engl. (23.4 C. C.), quinque annis 7 poll. cub. Ang. (114.7 C. C.).

## TABULA IV.

AETATIS VIS IN CAPACITATEM VITALEM.

AETAS.	CAPACITAS VITALIS.	PECTORIS		CAPACITAS VITALIS.	DIFFERENTIA.
		CUB. ANG.	C. C.		
A. 15°	vitae anno ad 20um	Poll. Cnb. 220.	C. C. 3605.	283.	Poll. Ang. 34. Centim. 86.3. .... 220.
" 20°	" " 25um	220.	3605.	491.	34. 86.3. ....
" 25°	" " 30um	222.	3638.	347.	34. 86.3. ....
" 30°	" " 35um	228.	3736.	242.	35. 88.8. ....
" 35°	" " 40um	212.	3474.	171.	34. 86.3. ....
" 40°	" " 45um	201.	3293.	93.	35. 88.8. ....
" 45°	" " 50um	197.	3228.	55.	35. 88.8. ....
" 50°	" " 55um	193.	3163.	37.	36. 91.4. ....
" 55°	" " 60um	182.	2982.	30.	36. 91.4. ....
" 60°	" " 65um	183.	2999.	26.	35. 88.8. ....
					2982.

HUTCHINSON huic enumerationi in opere suo posteriore (p. 10) addit: "Ossification of the cartilages of the ribs has no influence in diminishing the powers of breathing."

*De corporis positionis vi in capacitatem vitalem.*

Etiam corporis positio capacitatem vitalem modificat<sup>1</sup>. In positione erecta maximam aëris copiam, minorem sedentes inspirare possumus. Supini etiam minorem aëris quantitatem in spirometrum inflare possumus, quam proni.

In positione erecta 260 Poll. Cub. Ang. sive 4250 C.C.

sedentes	255	"	"	"	4178	"
cubantes supini	230	"	"	"	3768	"
cubantes proni	220	"	"	"	3604	"

exspiramus post fortissimam inspirationem. Corporis positio itaque 40 Poll. Ang. Cub. (655.4 C. C.) capacitem vitalem modificare potest. Grave est, quod HUTCHINSON de cuniculariorum positione in fodinis dicit, sed licet mihi ipsius verba afferre: "Hence position modifies the permeability of the lungs 40 cubic inches; and if we had sat with the body doubled up, like miners in the low gallery of a mine, the vital capacity would be diminished more than 100 cubic inches (1638.6 C. C.)."

<sup>1</sup> Experimenta hac de re a Clar. ALBERSIO in Clinico medico Bonensi facta hoc quoque docuere. Conf. op. laud. De herkenning van ziekten, caet. p. 60.

*De pectoris circuitus vi in capacitatem vitalem.*

Veteres credebant, capacitatem vitalem maxime pectoris circuitu modificari. HUTCHINSON hanc opinionem falsam esse reperit Quia saepissime homines graciles, macri, angusto thorace majorem aëris copiam exhala-  
bant, quam personae lato pectore gaudentes, etiam in longitudinem attendit, quod huc usque, 200 individuos examinans, non fecerat, quare conclusio ex his experi-  
mentis facta ei non placuit. Observationes de thoracis ambitu factae ad mirabiles eventus ducebant; exempli gratia: 11 personae longitudine quinque pedum et octo pollicum (172.71688 cent.), quorum pectoris circuitus 35 poll. (88.89839 cent.) erat, 235 poll. cub. Ang. (3850.7 C. C.) exhalabant; et 10 homines, eadem lon-  
gitudine, quorum thoracis ambitus 3 poll. (7.61986 C.) major erat, minorem aëris quantitatem exspirabant,  
nempe 226 poll. cub. (3703.2 C. C.) i. e. cum 9 poll.  
cub. (147.4. C. C.) diminutione. HUTCHINSON in 994 personis observationes fecit, quorum capacitas vitalis et pectoris circuitus tabula sequenti traduntur. Hi homi-  
nes examinati longitudine  $66\frac{1}{2}$  poll. (168.9 C.) erant.

TABULA V.

PECTORIS CIRCUITUS IN RELATIONE AD CAPACITATEM

VITALEM.

FOLL. PECTORIS AMBITUS.	GENIT. PECTORIS AMBITUS.	M E D I U M.			D I F F E R E N T I A I N S I G M O I D I A		
		FOLL.	CUB.	ANG.	C.	G.	C.
30.	ad 30 $\frac{1}{2}$ .	76. 19.	ad 77. 46.	200.	3277.	14.	- 13.
	" 31.	77. 46.	" 78. 73.	187.	3064.	20.	+ 18.
31.	n 31 $\frac{1}{2}$ .	78. 73.	n 80. 00.	206.	3375.	21.	- 10.
	n 32.	80. 00.	n 81. 27.	196.	3211.	35.	+ 1.
32.	n 32 $\frac{1}{2}$ .	81. 27.	n 82. 54.	197.	3228.	32.	- 7.
	n 33.	82. 54.	n 83. 81.	204.	3342.	50.	- 2.
33.	n 33 $\frac{1}{2}$ .	83. 81.	n 85. 08.	202.	3310.	44.	+ 0.
	n 34.	85. 08.	n 86. 35.	202.	3310.	63.	+ 11.
34.	n 34 $\frac{1}{2}$ .	86. 35.	n 87. 62.	213.	3490.	70.	+ 4.
	n 35.	87. 62.	n 88. 89.	217.	3555.	78.	- 2.
34 $\frac{1}{2}$ .	n 35.	88. 89.	n 90. 16.	215.	3523.	71.	+ 14.
	n 35 $\frac{1}{2}$ .	88. 89.	n 90. 16.	229.	3752.	74.	- 10.
35 $\frac{1}{2}$ .	n 36.	90. 16.	n 91. 43.	219.	3588.	59.	+ 2.
	n 36 $\frac{1}{2}$ .	91. 43.	n 92. 70.	221.	3621.	97.	+ 18.
36 $\frac{1}{2}$ .	n 37.	92. 70.	n 93. 97.	239.	3916.	69.	- 4.
	n 37 $\frac{1}{2}$ .	93. 97.	n 95. 24.	235.	3850.	57.	- 13.
37 $\frac{1}{2}$ .	n 38.	95. 24.	n 96. 51.	222.	3637.	41.	+ 8.
	n 38 $\frac{1}{2}$ .	96. 51.	n 97. 78.	230.	3768.	40.	- 6.
38.	n 39.	97. 78.	n 99. 05.	224.	3670.	18.	+ 2.
	n 39 $\frac{1}{2}$ .	99. 05.	n 100. 32.	228.	3736.	37.	- 11.
39 $\frac{1}{2}$ .	n 40.	100. 32.	n 101. 59.	217.	3555.	14.	—
	n 40 $\frac{1}{2}$ .	101. 59.	n 102. 86.				

Optimo jure hac de re SIMON: "Bei dieser Bemühung," inquit, "den Einfluss des Brustumfangs auf die Respirationsgrösse zu bestimmen, kommt HUTCHINSON offenbar zu ganz falschen Resultaten, und zwar desshalb, weil er Dinge als gleichwerthig ansieht, welche einen gerade entgegengesetzten Einfluss auf die Respirationsgrösse ausüben. Insofern eine Vergrösserung des Brustumfangs mit einer stärkern Entwicklung der Brusthöhle Hand in Hand geht, wird dadurch, krankhafte Vergrösserungen durch Lungenemphysem, *Pneumothorax*, etc. ausgenommen, die Respirationsgrösse erhöht, wie meine später mitzutheilenden Untersuchungen ergeben. Wenn dagegen die Vergrösserung des Brustumfangs von Fettablagerung herrührt, so wird dadurch die Respirationsgrösse, wie durch übermässige Korpulenz überhaupt, verringert"<sup>1</sup>. Experimenta ab HUTCHINSONIO facta ad sequentem conclusionem eum duxere: pectoris circuitum non certum esse stabilemque modum pulmonum capacitatis aestimandae, vel ideo, quandoquidem adeps circa pectus circuitum auget et capacitatem vitalem diminuit. Attamen certis in casibus thoracis circumferentia vim habet in capacitatem vitalem. Quum exempli gratia haec circumferentia  $10\frac{1}{2}$  cm. est et mobilitas pectoris  $7\frac{1}{2}$  cm., tum capacitas major erit quam in eadem mobilitate cum minori circuitu.

---

<sup>1</sup> Vid. SIMON, op. laud., p. 8.

De hac re et de methodo pectoris circumferentiae metienda legimus in opere HUTCHINSONII ultimo (pag. 5, § 13): "As the volume of expired air is relative to the measurement of the wals of the chest, we may, in the absence of the spirometer, roughly measure this mobility by the common tape measure; thus, we may pass the tape measure round the chest (standing in front of the patient) over the nipples, and then request the patient to *inspire deeply*, and note the number of inches on the measure, this the maximum circumference; then without moving the tape, we should request him to expire to his utmost, here again noting the minimum circumference, and the difference will be the mobility of the chest; for instance, if the maximum circumference be 36 inches and the minimum 33 inches, the difference is 3 inches, and 3 inches is the mobility of the chest." Experimenta ab auctore facta eum docuere, thoracis mobilitatem hominum bene valentium differre a 3 poll. Ang. (7, 61. C.) ad 5 poll. Ang. (12, 69, C.). Mobilitas 5 poll. perrara est.

Liceat mihi huic narrationi observationum ab HUTCHINSONIO factarum adjungere ea, quae de vi adhaesiorum pleuram pulmonalem inter et costalem, in pulmonum mobilitatem dicit, quibus quippe observationes, nuper ab aestumatissimo praceptore, viro clarissimo DONDERS<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Conf. *Beweging van longen en hart bij de ademhaling*, door F. C. DONDERS, *Ned. Lancet*, 3de Serie, 1ste Jaarg., N°. 11 en 12, 1852, p. 650.

factae, oppositae sunt. Apud HUTCHINSONIUM legimus<sup>1</sup>: "I may here introduce the statement of a curious circumstance, in connection with this last case, which will be found to militate against a generally-received opinion.

"It will be recollect that the vital capacity is obtained by a maximum movement of the boundaries of the chest, and it is believed that this thoracic movement is impeded by adhesions between the pleurae. In this case I can affirm, that though the mobility of his chest exceeded the whole space or cubic contents of that cavity, there was not one square inch of the pleurae but what was *firmly united*. His lungs in other respects were healthy in structure, and his vital capacity scarcely diminished." Cui observationi SAMOSCH<sup>2</sup> addit: "Ueber einstimmend hiermit aussert sich ANDRAL<sup>3</sup>: 'Les adhérances de la plèvre peuvent exister en grand nombre sans donner lieu à aucun phénomène morbide,'" und: "Quand aux adhérances celluleuses de la plèvre, leur innocuité est si connue, qu'il nous semble inutile de nous arrêter davantage sur ce point." Dass aber unter "adhérances celluleuses," die innigen Verwachsungen zwischen Pulmonar- und Costalpleura verstanden werden geht, aus folgender Stelle hervor: "Molles, facilement déchirables et d'aspect albumineux, tant qu'elles

<sup>1</sup> Vid. HUTCH., op. I., p. 177, § 80.

<sup>2</sup> HUTCH., op. I., transl. a SAMOSCH, p. 44.

<sup>3</sup> Clinique médicale, Tom. II, p. 573.

sont récentes, les adhérences tendent à se transformer tôt ou tard en un véritable tissu cellulaire, qui établit une union intime entre les deux surfaces de la plèvre<sup>1</sup>.” HUTCHINSON pergit et ad sequentem conclusionem venit: “From this it would appear that adhesions of the pleurae do *not* prevent the freedom of the respiratory movement, and I think we may here generalise from a single case. I believe the movement of the ribs in respiration is *so* closely followed by the lungs, that a perfect union between the two does not interfere with this function<sup>2</sup>.” Clarissimus DONDERS autem: “Pleura dia-phragmatica,” inquit: “en pleura costalis liggen onmid-delijk tegen elkander; ten gevolge hiervan dalen de longen niet lager dan tot aan de 6<sup>de</sup> of 7<sup>de</sup> rib, maar bij de diepst mogelijke inademing verlaat het middelrif den borstwand en kunnen de longen zelfs tot de 11<sup>de</sup> rib dalen. Bij elke diepe inademing schuiven de voorste randen der longen voor het geheele hartzakje heen en blijven slechts door de platen van het mediastinum van elkaar gescheiden, terwijl bij diepe uitademing het door de lamina mediastini bekleede hartzakje met het daar tegen aan sluitende hart voor een groot deel met den borstwand in aanraking is. Het eerste gevolg van vergroeiing van de bekleedende pleura der longen

<sup>1</sup> Clinique médicale, Tom. II, p. 573.

<sup>2</sup> Hutch., op. 1., p. 178, § 81.

met aangrenzende vlakten is belemmerde verschuiving bij diepe inademing. Hierdoor nu kan de ademhaling minder diep worden voortgezet en verminderde vitale capaciteit der longen is hiervan het noodzakelijke gevolg.<sup>1.</sup>

*Capacitas vitalis morbo modificatur.*

Capacitatem vitalem etiam morbis et praesertim valitudine pectoris adversa modificari, facile intelligimus. Et "this" inquit HUTCHINSON (in dissertatione nuper edita, p. 10, § 26): "this marks the value of the spirometer- the broad difference between the healthy volume of expired air and the limited volume caused by disease generally, and particularly by thoracic diseases." Omnes morbi abdominales et pectorales capacitati vitali damnum afferunt, ut tumores, inflammatio acuta, vel infiltratio materiae fluidae vel praesentia materiae solidae in organis respirationis vel prope partes cavitatem thoracis includentes (*bordering upon the parts comprising the thoracic cavities*). Etiam morbi partium duriorum cavitatem pectoralem circumdantium, capacitati pulmonum vitali obsunt, ut morbi columnae vertebrarum, costarum, aut curvatio aetate vel professione producta. Omnia, quae libero aëris introitui in pulmones nocent, ut asthma, emphysema, bronchitis et phthisis pulmonalis, spirometri ope detegere possumus. In nosocomio phthisicorum Londinensi medici ad morbi diagnosin

---

<sup>1</sup> DONDERS, op. 1.

spirometro utuntur et in relatione de hoc nosocomio (*rapport*, p. 26) differentiam valetudinem inter et morbum, quoad capacitatem vitalem, 33% esse, legimus, cui declarationi hujus relationis auctores addunt: "That the spirometer gives distinct indications, at an early period of the malady, and that these indications become more obvious, in proportion to the progress of the disease." Phthisis pulmonalis praesertim capacitatem pulmonum vitalem imminuit. Haec autem diminutio non tantum de materiae tuberculosa depositione dependet; nam illa in minima quantitate adesse et tamen capacitatii vitali maxime nocere potest, de qua re SAMOSCH<sup>1</sup>, omni jure<sup>2</sup> dicit: "Dass die Tuberkelablagerung in den Lungen solcher Individuen, deren Athemvermögen beim Leben in hohem Grade beeinträchtigt war, oft überraschend gering sei, ist eine dem Pathologen keineswegs selten vorkommende Erscheinung, allein es darf hierbei auch der Umstand nicht unberücksichtigt gelassen werden, dass in Fällen der Art fast immer im Umkreise der Tuberkeln grössere oder geringere Blutcongestion stattfindet, oder Hindernisse anderer Art die Permeabilität der Lungen mehr oder weniger gleichzeitig beeinträchtigen. ANDRAL<sup>3</sup> äussert sich in dieser Beziehung folgendermassen: "Mais dans les cas même ou le

<sup>1</sup> Vid. HUTCH., op. I., transl. SAMOSCH, p. 97, § 183.

<sup>2</sup> Vid. ALI COHEN, diss. laud., p. 409.

<sup>3</sup> Op. laud., Tom. II, p. 86.

poumon contenait quelques tubercules, est ce bien parce qu'ils interceptaient l'air dans les points qu'ils occupaient, qu'ils causaient de la dyspnée, ou plutôt n'est ce pas parce qu'ils étaient l'occasion d'une congestion sanguine autour d'eux? Cette dernière opinion nous semble la plus probable." Und CANSTATT<sup>1</sup>: "es ist nicht blos die Ablagerung von Tuberkelstoff oder die Gegenwart von Tuberkelhöhlen, wodurch die Dyspnöe veranlasst wird; die Unwegsamkeit der Lungenzellen wird überdies vermehrt durch die begleitende Blutanschöppung des Gewebes, durch die gleichzeitige Anschwellung der Bronchialschleimhaut und die Verstopfung der Bronchialröhren mit stockendem Schleim, Eiter, durch den zuweilen stattfindenden Erguss in der Pleurahöhle, durch die Veränderungen im Kehlkopf und nicht selten durch die Entartung der zwerchfells- oder pneumogastrischen Nerven, durch Druck auf dieselben."

Etiam HUTCHINSONI instrumenti ope morbi progressus observari potest, nam in diversis phthiseos stadiis minusve aëris in pulmones introitus impeditur. Ad probandum, quantum phthisi pulmonali capacitas vitalis recessatur, HUTCHINSON nonnullos morbi casus narrat. Inter alios sequentes. FREEMAN, gigas Americanus, anno 1842 ab HUTCHINSONO, spirometri ope, examinabatur; quem examen docebat capacitatem vitalem 434 Poll, cub. Ang.

<sup>1</sup> Conf. Handbuch der medicin. Klinik, 2te Aufl. Bd. III, S. 385.

(7111.6 C.C.) esse, longitudinem 6 ped. 11 $\frac{1}{4}$  poll. (211,5 cm.), pondus 271 lb (122.934 kilogr.) pectoris circuitum 47 poll. (119,37 cm.). Mense Novembri, anni 1844, sanitate adversa, Londinum venit. HUTCHINSON examen instituit, et capacitas vitalis secundum 20 observationes 344 poll. cub. Ang. (5636,8 C. C.) erat, itaque 20 % minus, pondus 28 lb (12,7 kilogr.) minus. Neque auscultatio nec percussio aliquid morbos indicabant. Sequenti anno, mense Octobri, PAUL, in Nosocomio Vitoniensi Chirurgus, sequentia de FREEMANNO referebat: Debilis, octavo die mensis Octobris, in nosocomium receptus, emaciatus, tussiens, et sputa purulenta expectorans. Percussio anterioris pectoris partis sub claviculis in latere dextro, sonum obtusum producebat; in latere sinistro sonum clariorrem, attamen obtusiorem, quam in statu sano. Auscultatio fieri non poterat, costae nempe tam longe una ab altera separatae et spatia intercostalia, emaciationis causa, ita collapsa erant, ut stethoscopium applicari non posset, quia infima hujus instrumenti superficies pectus non stricte tangere posset.

Magna gigantis debilitas et diagnosis aliis auxiliis clara experimenti spirometri ope repetitionem supervacaneam reddidere.

Post mortem FREEMAN 6 ped. 7 $\frac{1}{2}$  poll. (202.927 cm.) longus et 141 lb (63.956 kilogr.) ponderis erat. Pulmones ambo, thorace aperto, superiori parti pectoris pleurae accreti et tuberculis oppleti. Tubercula non

tanta copia pulmoni dextro quam pulmoni sinistro inerant, pulmones ambo in basi sere non affecti, materies tuberculosa gradatim superiora versus aucta et amborum pulmonum apices magnas vomicas, partim pure impletas, continebant. Hae vomicae duas vel tres puris uncias continere poterant. Cor perparvum. Cetera intestina sana. In hoc casu spirometrum magnae utilitatis fuit; nam initium morbi, qui causa mortis fuit, ostendit, et quidem antequam cetera auxilia diagnostica hoc facere possent.

Chirurgus, integra, ut credebat, valetudine gaudens, HUTCHINSONIUM visitavit. HUTCHINSON eum spirometri ope examinavit et.... capacitas vitalis 100 poll. cub. Ang. (1638 C. C.) minor quam normalis!!... Hujus viri facies tam sana erat, ut HUTCHINSON de pretio instrumenti sui dubitare inciperet, at Chirurgus quatuor mensibus post aegrescit et auscultatio morbum phthisin esse docet.

Vir corporis dispositionis ita debilis, ut HUTCHINSON eum verum phthiseos exemplar exquisivisset, spirometri ope examinabatur, sed capacitas vitalis major quam normalis erat!! octo mensibus post, sanitati restitutus erat et ad laborem regressus.

HUTCHINSON etiam alios casus refert, sed hi sufficient! Ceteri pagina 221 ipsius operis legi possunt.

HUTCHINSON 400 phthisicos spirometri ope exploravit, quorum capacitatem vitalem tabulae forma enumerat et cum capacitatem vitali normali comparat.

## TABULA VI.

COMPARATIO CAPACITATEN VITAE EN NORMALEM INTER ET ABORMEN 400 PHthisicorum.

LONGITUDO.			CAPACITAS VITALIS NORMALIS.			PHthisis pulmonalis.					
PES. POL.	PES. POL.	Cm.	POL. CUB. ANG.	C. C.	P. C. A.	STADIUM I. 33 %.	G. C.	P. C. A.	STADIUM II. 53 %.	C. C.	MEDIUM. 43 %.
5. 0. ad 5. 1.	152.39.	ad 154.93.	174.	2850.19.	117.	1917.18.	82.	1343.66.	99.	1622.23.	
5. 1. "	5. 2.	154.93. "	157.47.	2952.28.	122.	1999.11.	86.	1409.21.	102.	1671.38.	
5. 2. "	5. 3.	157.47. "	160.01.	3113.37.	127.	2081.04.	89.	1458.36.	108.	1769.70.	
5. 3. "	5. 4.	160.01. "	162.55.	3244.46.	133.	2170.35.	93.	1523.91.	113.	1851.63.	
5. 4. "	5. 5.	162.55. "	165.00.	3375.55.	138.	2261.28.	97.	1589.45.	117.	1917.18.	
5. 5. "	5. 6.	165.09. "	167.63.	3506.63.	143.	2343.21.	100.	1638.61.	122.	1699.11.	
5. 6. "	5. 7.	167.63. "	170.17.	3637.72.	149.	2441.53.	104.	1704.16.	127.	2081.04.	
5. 7. "	5. 8.	170.17. "	172.71.	3768.81.	154.	2523.46.	108.	1769.70.	131.	2146.58.	
5. 8. "	5. 9.	172.71. "	175.26.	3899.90.	159.	2605.39.	122.	1835.24.	136.	2228.51.	
5. 9. "	5.10.	175.26. "	177.79.	4030.99.	165.	2703.71.	116.	1900.79.	140.	2294.06.	
5.10. "	5.11.	177.79. "	180.33.	4162.08.	170.	2785.64.	119.	1949.95.	145.	2375.99.	
5.11. "	5.12.	180.33. "	182.87.	4293.17.	176.	2883.96.	123.	2015.49.	149.	2441.53.	

In opere suo ultimo HUTCHINSON dicit: "The greatest difference we have noticed in the first stage of consumption, was 80 [1310.89 C. C.] instead of 230 cubic inches [3768.81 C. C.], and in the second stage 70 [1147.03 C. C.] instead of 262 cubic inches [4293.47 C. C.]. By the first stage is meant when crude tubercles are in the lungs and by the second stage, when tubercles are softening or breaking up".<sup>4</sup>

En brevem relationem experimentorum, ab HUTCHINSONI, spirometri ope, factorum! Conatus sum momenti gravissima referre. Cape haec, benevole Lector! ut sunt non ut esse deberent. Huic autem relationi finem imponere nolim, antequam omnem HUTCHINSONIO laudem tribuerim pro maxima diligentia, quacum tot homines exploravit.

### § 3.

*Observationes, spirometri ope, a JULIO VOGEL et GUSTAVO SIMON factae.*

Etiam GUSTAVUS SIMON, Clarissimo JULIO VOGELIO duce, experimenta, spirometri ope, in 93 hominibus fecit, quorum pulmonum capacitatem vitalem cum totius corporis longitudine, pectoris circuitu et mobilitate comparavit. Illa experimenta docuerunt, eosdem homines, bene valentes, diversis temporibus, easdem acris quant-

<sup>4</sup> Conf. HUTCH., op. laud., p. 13. § 29.

titates expirare, quum nempe aliqua dexteritate gaudemant et instrumento uti sciant. Copia aëris exhalati 300 C.C. minor quam normalis sine damno esse potest. Qui vero aëris quantitatem 800 ad 1000 C.C. minorem normali exspirat, aeger habendus est. Capacitas vitalis secundum SIMONEM in sanis non vacillat, sed prope stabilis est. Homines ab eo explorati masculini generis erant, aetatis 17 ad 30 annorum, studiosi vel operarii.

SIMON in opere suo experimenta tabularum forma dispositi, quarum prima longitudinis vim in capacitatem vitalem ostendit.

### TABULA I.

#### RELATIO CAPACITATEM VITALEM INTER ET LONGITUDINEM.

CORPORIS LONGITUDO.	CAPACITAS VITALIS.	NUMERUS EXPERI- MENTORUM.	CAPACITAS MEDIA LONGITUDINE 2½ CM. AC- CRESCENTE.
156 Cm.....	2229 C. C. ....	4.	.....2410.
157 ".....	2346.....	2.	
158 ".....	2894.....	3.	
159 ".....	2743.....	3.	
160 ".....	2752.....	3.	
161 ".....	2825.....	4.	
162 ".....	2778.....	3.	
163 ".....	3158.....	2.	
164 ".....	2882.....	4.	.....3000.
165 ".....	3054.....	1.	
166 ".....	3248.....	6.	
167 ".....	3090.....	7.	.....3200.
168 ".....	3341.....	6.	
169 ".....	3259.....	3.	.....3390.
170 ".....	3552.....	6.	
171 ".....	3408.....	7.	
172 ".....	3554.....	3.	.....3430.
173 ".....	3249.....	3.	
174 ".....	3930.....	2.	.....3660.
175 ".....	3672.....	3.	
176 ".....	.....	0.	
177 ".....	3700.....	4.	.....3630.
178 ".....	3477.....	1.	
179 ".....	3911.....	1.	.....3760.
180 ".....	3756.....	2.	

Ex hac tabula discimus, capacitatem vitalem, longitudine 1 cm. crescente, irregulariter augeri. SIMON e parvo observationum numero et e minimo longitudinis augmento, nempe unius centimetri hoc explicat. Nam HUTCHINSON illud pro omnis pollicis anglicani =  $2\frac{1}{2}$  (2,53995) cm. augmentatione computavit. Quodsi SIMON capacitatis augmentationem pro  $2\frac{1}{2}$  cm. longitudinis incremento inquisivisset, ad easdem conclusiones atque HUTCHINSON venisset, quod e tabula liquet. Homines a SIMONE explorati minorem aëris copiam exspirabant, quam illi ab HUTCHINSONIO examinati. At SIMON in studiis, viris non fortibus, HUTCHINSON vero in hominibus robustis, musculosis, junioribus (ut in 694 nautis, 321 militibus, 24 pugilibus, 370 operariis) experimenta fecit; et haec secundum SIMONEM causa discriminis. SIMON plane sibi persuasum habet, observationes ab HUTCHINSONIO factas veras esse.

*De thoracis circuitu* SIMON in 28 hominibus, sine magna adipis copia in musculis pectoralibus, experientia fecit. Videatur sequens.

## TABULA II.

VIM CIRCUMFERENTIAE PECTORIS IN CAPACITATEM

PULMONUM VITALEM INDICANS.

PECTORIS CIRCUMFERENTIA. (BIMENSA INFRA SCAPULAS PER LINEAM A MEDIA SPINA DORSI PER MAMMARUM PAPILLAS AD MEDIUM STERNUM PRODUC- TAM).	CAPACITAS VITALIS,	NUMERUS OBSERVATIONUM	CAPACIT. VITAL.	
			PECTORIS CIRCUMFEREN- TIA $2\frac{1}{2}$ CM. ACCRESCENTE.	
71 Cm.	2525 C.C.	6.		2590.
72 "	2487 "	2.		
73 "	2923 "	5.		
74 "	3222 "	4.		3030.
75 "	2887 "	5.		
76 "	2880 "	4.		3070.
77 "	3186 "	6.		
78 "	3187 "	8.		
79 "	3395 "	9.		3370.
80 "	3429 "	5.		
81 "	3399 "	5.		3280.
82 "	3028 "	1.		
83 "	3477 "	3.		
84 "	3660 "	1.		3510.
85 "	3386 "	5.		
86 "	3529 "	2.		
87 "	2851 "	1.		3360.
88 "	4018 "	2.		
89 "	4147 "	1.		3930.
90 "	3690 "	6.		

Capacitatem vitalem, thoraci circuitu  $2\frac{1}{2}$  cm. augente, 191 C.C. increscere, haec tabula docet. SIMON, ut ad conclusiones accuratiores veniret, capacitatis vitalis incrementum, pectoris circumferentia augente,

pro eadem longitudine inquisivit et acris copiam ab hominibus exspirandam 93 C.C. augeri, cum pectoris circumferentia 24 cm. increscat, observavit. De observationibus hac de re ab HUTCHINSONI factis omni jure dicit SIMON: "Hiernach ist der Einfluss des Brustumfangs für Leute von nicht auffallender Dicke unzweifelhaft dargethan, und wenn HUTCHINSON auch Beispiele, die das Gegentheil hiervon beweisen sollen, hervorhebt, in welchen von einer Anzahl Individuen die einen mit geringerem Brustumfange eine grössere Respirationsgrösse besassen, und umgekehrt, so berücksichtigte er bei einigen Beispielen nicht die relative Dicke zur Körpergrösse, und wo er die Körpergrösse berücksichtigte, stellte er, wie ich bestimmt glaube, aus seinen außergewöhnlich vielen Untersuchungen Abnormitäten auf, wie sie seinem Zwecke entsprachen, und es wäre ihm gewiss ein Leichtes gewesen, ganz das Gegentheil beweisende Fälle aufzufinden, wie ich sie auch aus meinen Beobachtungen aufstellen könnte."

*De mobilitatis pectoris vi in capacitatatem vitalem.*  
 Hujus loci est, ut mihi videtur, experimenta a VALENTINO de pectoris mobilitate facta communicare. In hominibus junioribus examen instituit et pectoris circumferentiam pro  $\frac{7}{12}$  parte ad  $\frac{11}{12}$ , id est, in medio pro  $\frac{11}{12}$  parte ad  $\frac{1}{6}$  per fortissimam inspirationem post validissimam expirationem augeri reperit. Corporis eorum longitudo 153 ad 174 cm. erat. Circumferentia VALENTINI

Pectoris e. g. 80 cm. post validissimam inspirationem et  
 71 post fortissimam expirationem est. Differentia 9 Cm.  
 ergo id est,  $\frac{1}{4}$  ad  $\frac{1}{4}$  totius circuitus.

Mobilitate thoracis praesertim, secundum SIMONEM,  
 capacitas vitalis modificatur; ita ut homines longiores  
 minorem aëris copiam expirant quam breviores, sicut  
 illi majori thoracis mobilitate et majori pectoris  
 circumferentia gaudeant; quod luculenter ex sequenti  
 tabula patet.

### PABULA III. RESPIRATIONIS

PEI ERIGENDU BERTICULAU HIC ET DIE LESIUS DICE DE MOBILITATE PECTORIS IN VI CAPACITATE VITALEM.

CORP. RIS.	THORACIS CIRCUITUS.		CAPACITAS VITALIS.
	POST VALIDISSIMAM EXPIRATIONEM ANTE INSPIRATIONEM.	POST FORTISSIMAM INSPIRATIONEM ANTE EXPIRATIONEM.	
167 LONGITUD.	77 Cm.	81 Cm.	2930 C.C.
"	" 85 "	" 75 "	3770
167	80	74	3260
169	89	80	3710
169	80	80	3230
170	78	80	3400
170	84	75	"

Ad probandum, quanti momenti pectoris mobilitas  
 in modicanda capacitate vitali, SIMON sequentes  
 hemiplectus, brachium sinistrum et sinistram thoracis  
 morborum casus nobis narrat. Caementarius, 45 annos  
 natus, longitudinis 166 centimetrorum, post apoplexiā  
 mortuus.

partem movere fere non poterat. Totius pectoris mobilitas perparva, nempe 2 cm. et capacitas vitalis 2046 C.C. erat (capacitas vitalis normalis viri longitudinis 166 centim. est 3200 cm.), attamen pulmo, ut auscultatio et percussio docebant, sanus. [Fortasse etiam nervus vagus apoplexia affectus et pulmonis sinistri paresis erat?]. — Capacitas vitalis duorum emphysematicorum ad 840 et 860 C.C. diminuta, quorum thoracis mobilitas 2 ad 3 cm. erat. Optimo jure dicit SIMON: "Wenn man ferner einen tuberkulösen Habitus zur Tuberkulose geneigt fand, so beruht diess wohl weniger auf dem geringen Umfange der Brust, denn die Lungen können ja sehr weit nach unten gehen, sondern auf der gerin- gen Beweglichkeit der Thoraxmuskeln, die eine der Hauptveranlassungen zu jener Krankheit ist; und die erbliche Anlage, die durch den tuberkulösen Habitus repräsentirt wird, ist mehr in der schwächlichen Aus- bildung der Muskeln, die durch allzufrühe geistige Beschäftigung, oder eine beständig sitzende Lebensart (Schneider) noch vermehrt wurde, als in einer bestim- mten Blutkrase zu suchen." Vide hac de re dissertationem optimi praceptoris J. I. C. SCHROEDER VAN DER KOLK, cui titulus: Over den oorsprong en de vorming van tu- bercula pulmonum <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Ned. *Lancet*, uitgegeven door DONDERS EN JANSEN. Derde Serie, 2de Jaargang. №. 1 en 2, Julij en Augustus, bl. 1, 1852.

*Capacitas vitalis morbo modificatur.*

Pectoris morbis capacitas vitalis modificatur, quia fere omnes hi morbi liberum aëris in pulmones introitum impediunt. Non tantum pseudoplasmatibus, in pulmonibus et extra eos, capacitas modificatur, sed etiam affectionibus nervosis, ut paralysi muscularum pectoralium vel vesicularum pulmonalium earumve contractione spastica. Ad hoc probandum SIMON sequentes observationes a semet ipso et a Clarissimo J. VOGEL in aegris factas tradit. In quinque tuberculosis examen instituit; quorum primus, longitudinis 159 cm. 2595 aëris C.C. in spirometrum inflabat, (copia 200 C.C. minor quam normalis).

secundus	longitud.	174.5	cm.	1309	C.C.	exspirabat,
tertius	"	181	"	2607	"	"
quartus	"	159	"	1194	"	"
quintus	"	167	"	2838	"	"

Vir e pleuroperipneumonia convalescens, longitudinis 171 cm., 2064 C.C. exhalare poterat.

Duorum emphysematicorum, longitudinis 164 et 167 centim., capacitas vitalis 2173 et 2345 C.C. erat.

Clarissimus VOGEL exploravit virum tuberculosi affectum, cuius capacitas vitalis 1130 C.C. minor quam normalis erat. Cadaveris sectio docebat, quantum liber aëris in pulmones introitus praepeditus fuisset. Alius eodem morbo afflicti capacitatis decrementum 1190

G.C. erat et 2640 C.C. viri, cuius pectoris pars sinistra empyemate affecta erat.

Aeger quidem longitudinis 168.5 cm. non majorem aëris copiam quam 858 C.C. in spirometrum inflare poterat. Laborabat empyemate saccato.

Sartor, 18 annos natus, longitudinis 159 cm., post validissimam inspirationem per fortissimam exspirationem 1194 C.C. in spirometrum exhalare poterat. SIMON, eum tuberculosi afflictum esse putabat. Percussio nec auscultatio aliquid docebant. Tertio die cum maxima attentione observaretur, sonum percussione editum in pectoris sinistri parte postica superiore obtusum esse patet. Refrigerio, pleuritide affectus 865 CC. inflare poterat et pectoris mobilitas, quae antea 4 cm. fuerat, nunc 2 cm. erat. Post quinque hebdomades pleuritide sublata, copia aëris ab eodem sartore exspirata est ea quae antea fuerat. Tuberculosi illum afflictum fuisseclare liquet.

SIMON etiam sequentem observationem gravissimam refert:

Vir gracilis, longitudinis 179 cm., et pectoris circumferentia 77 cm., tussiens, cum pectoris dolore premente, pungente, haemoptoicus percussione et auscultatione explorabatur, quae docebant, pulmonis parenchymatis portionem posteriorem dextram magna pro parte oppletam esse, respirationis susurrum perturbatum. Morbum tuberculosin esse credebat. Spirometri ope exploratus

4880 G.C. aëris exspirabat ergo copiam 4420 majorem quam normalem!! Thoracis mobilitas permagna 13 em. erat et pulmones profunde descendere poterant. Antea capacitas vitalis certe major fuerat. Infiltratio pulmonis dextri superficialis erat.

Experimenta a SIMONE facta ad sequentes conclusiones eum duxere:

1º. Datur relatio capacitatem vitalem inter et corporis longitudinem.

2º. Quum thoracis mobilitas minor est, capacitas vitalis etiam minor.

3º. Ex habitu tuberculoso, id est, ex pectore angusto non ad tuberculosis concludendum; spirometrum, auscultatione nec percussione aliquid docente, hoc ostendere potest.

4º. Tubercula miliaria adsunt, quum capacitas vitalis 1000 G.C. minor est quam normalis, etiam si nec percussio nec auscultatio signa praebent.

5º. In aliis pectoris morbis spirometrum, quo ad prognosin, magnae est utilitatis.

En! B. L, praecipua ex iis, quae SIMON docuit, omnem laudem merentia illa et magnam ejus industriam probantia. Errare humanum est. Secundum meam opinionem etiam ille hic et illic erravit, sed de his porro; et certe in specimine Academico inaugurali conscribendo non meum est paucos errores a collega commissos damnare.

## § 3.

*Observationes, spirometri ope, ab*

HERIBERTO DAVIES, JOH. FRID. HERMANNO ALBERS,

KÜCHENMEISTER, *aliis factae.*

Etiam HERIBERT DAVIES<sup>1</sup>, ad morbos pectoris dignoscendos, spirometro usus est. Experimenta, hujus instrumenti ope, in multis centenis hominibus aegris facta ei probavere, decrementum capacitatis pulmonum vitalis tuberculoseos signum diagnosticum grave esse, et hoc decrementum semper ante signa hujus morbi topica (*sic*) obtinere, ita quidem ut de morbi praesentia dubitari nequeat.

Ut HUTCHINSON et SAMOSCH<sup>2</sup>, ita etiam DAVIES parvam copiam materiae tuberculoseae in pulmonibus depositam liberum aëris introitum in organa respiratoria valde impedit reperit. DAVIES capacitatis vitalis diminutionem multis in tuberculoseos casibus, capacitate vitali normali antea definita, demonstravit, quod ex tabula sequenti liquet.

<sup>1</sup> Videatur HERIBERT DAVIES *Lectures*, (*Lancet* 1850) et J. F. H. ALBERS, op. laud., p. 57 seq.

<sup>2</sup> Conf. HUTCHINSON, op. 1. transl. a SAMOSCH, p. 97 et 98.

AETAS.	LONGITUDO.			CAPACITAS VITALIS IN MORBO <sup>1</sup> .		CAPACITAS VITALIS NORMALIS.			
	PED.	POLL.	Cm.	POLL.	C. A.	C.C.	POLL.	C. A.	C.C.
A. 24	5.	9.	175.25.	190.	3113.3.	3899.9.	238.		
B. 35	5.	8.	172.71.	204.	3342.7.	3768.8.	230.		
C. 21	5.	8.	172.71.	150.	2457.9.	3768.8.	230.		
D. 19	5.	10.	177.79.	230.	3768.8.	4030.9.	246.		
E. 38	5.	3.	160.01.	110.	1802.4.	3113.3.	190.		

A, B et C, procul dubio, casus phthiseos pulmonalis erant. D, vires statumque sanum recepit. E, hepatisationis chronicae partis inferioris pulmonis dextri casus erat.

Doct. H. Häser<sup>2</sup> etiam experimenta, spirometri ope, fecit, quae ad hanc conclusionem eum duxere: "Jedes nicht entschieden fettleibige erwachsene männliche Individuum, dessen absolute Respirationsgrösse um mehr als 500 Kubikcentimeter hinter der seiner Körperlänge nach zu erwartenden Respirationsgrösse zurückbleibt, erweckt den Verdacht einer krankhaften Beschaffenheit seiner Lungen, oder seiner Respirationsmuskeln. Ueber den Sitz und die Natur dieses krank-

<sup>1</sup> A. casus tuberculoseos in primo, B et C in secundo hujus morbi stadio. D. Debilitate universalis, E. peripneumonia laboravit.

<sup>2</sup> H. Häser, über den diagnostischen Werth der Spirometrie. Conf. Leistungen im Gebiete der Pathologie, zweiter Vierteljahresbericht von 1851. Von BESNARD, Neue Medicinisch-Chirurgische Zeitung, N°. 42. 19 October 1851.

haften Zustandes gibt die Spirometrie als solche keinen Aufschluss."

Medici in Nosocomio phthisicorum et aliis pectoris morbis affectorum Londinensi<sup>1</sup> in 415 phthisicos accurata experimenta spirometri ope fecere. Quantitas media aëris post validissimam inspirationem per fortissimam exspirationem ab illis aegris exhalata 129 pol. cub. Ang. (2113,8 C.C.) erat, et capacitas vitalis 415 hominum bene velentium est 222 pol. cub. Ang. (3637,7 C.C.), 241 aegri in primo morbi stadio erant, tuberculosa pondum emollita; media aëris quantitas ab iis exhalati 149 pol. cub. Ang. (2442,5 cm.) erat, 174 in emollitionis tuberculorum stadio 105 pol. cub. Ang. (1720,5 C.C.) exspirabant.

Clarissimus I. F. H. ALBERS<sup>2</sup> observationes de musculorum ad exspirationem inservientium vi in capacitatem vitalem fecit, quia plurimi pulmonum morbi, materia solida vel fluida in illorum parenchymate deposita, vim muscularum diminuunt. Experimenta in convalescentibus et in defatigatis instituit, postquam organa illorum respiratoria sana esse compererat.

<sup>1</sup> Conf. London Journal 1850, m. Jan. Schr. Jahrb. 1850, N° 5, pag. 175 seq. et Nieuw praktisch Tijdschrift voor de Geneeskunde, in al haren omvang. Negen en twintigste Jaargang, door Dr. L. ALI COHEN, 1850, Oct., pag. 631 et 632.

<sup>2</sup> Conf. Wiener Medizinische Wochenschrift, N° 39. Zweiter Jahrgang 1852. Sonnabend den 25 Sept. Ueber einige nothwendige Correctionen bei Anwendung des Spirometers von Prof. A. F. H. ALBERS in Bonn.

Examen in revalescentibus institutum eum sequentia docuit.

1<sup>o</sup>. Vir, 26 annos natus, ex ictero revalescens, primo die, quo e lecto surgebat, aeris quantitatem 200 C.C. minorem quam secundo die, tertio autem copiam 150 C.C. maiorem quam secundo die, in spirometrum inflabat. Diebus sequentibus plus aëris inflare non poterat.

2<sup>o</sup>. Vir, 30 annos natus, e febre gastrica revalescens, exhalabat fortissima exspiratione post talem inspirationem: primo die 2550 C.C; secundo 2600 C.C; tertio 2750 C.C, septimo 2900 C.C; undecimo 3200 C.C. Sequentे hebdomade copia aëris, quam e pulmonibus efflare poterat, immutabilis erat.

3<sup>o</sup>. Vir, 32 annos natus, e typho convalescens, primo die, quo e lecto surgebat, 2200 C.C., tertio 2700 C.C., octavo 2950 C.C., quinto decimo 3400 C.C., septimo decimo 3550 C.C. in spirometrum inflabat. Sanatus maiorem aëris copiam exhalare nequibat.

Auscultatio et percussio docebant, illorum pulmones, durante morbo, sanos fuisse.

Capacitas vitalis quoque in defatigatis diminuit. De lassatus ab ALBERSIO examinatus, aëris quantitatem 750 C.C. minorem quam, a lassitudine requietus, sequente die in spirometrum inflabat.

Ex quibus experimentis sequentia concludit: "Es gehört nach diesen Beobachtungen zum vollständigen Athmen nicht blos freier Raum in den Lungenzellen, um

der Luft in diese Eintritt zu gewähren, sondern auch Muskalkraft, um die Luft auszutreiben, worauf die freie Luft erst einzuströmen im Stande ist. Wo also die Capacität vermindert ist, bleibt stets die Frage zu beantworten, „wie viel dazu die beeinträchtigte Muskalkraft und wie viel die in das Lungengewebe zu Stande gekommene Ablagerung festgewordener Massen beigetragen haben.“

Durante morbo igitur, in quo musculi sine dolore contrahi nequeunt, ex gr. in pleuritide, peripneumonia, rheumate spirometrum non possumus. „Aus“ ait ipsius verba afferam, „Aus diesen Mittheilungen ergibt sich, wie viele Verhältnisse man zu berücksichtigen hat, um in der Spirometrie auch nur ein einiger Massen brauchbares Resultat für die Diagnose zu erhalten. Werden diese Verhältnisse ausser Acht gelassen, so erlangt man bei den verschiedenen spirometrischen Versuchen abweichende Zahlen, dass man an den Nützlichkeit dieser Untersuchungsmethode ganz irre wird.“

Numeri, dicit ALBERS, capacitatem vitalem in hominibus designantes, in initio tertii tuberculoseos stadii, ut scimus, fere non mutantur, quod in quinque degris observavit; sed quum lassitudo ingreditur, tunc numeri illi diminuunt. Hoc morbo affectus uno die 2200 C.C. aëris in spirometrum inflabat, duobus diebus post 1700 C.C., post hebdomadem 1500 C.C.; et quum 21 diebus post examinaretur, 1100 C.C. aëris fortissima exspira-

tione post talem inspirationem exhallare poterat.<sup>11</sup> In alio casu hic numerus a 1400 C.C. ad 700 C.C. diminutabatur.<sup>12</sup> Quae diminutio non materiae aliquis depositione in pulmonum parenchymate, sed debilitate muscularum, quibus exspiratio perficitur, orta erat.

Musculi illorum anaemias vel potius sanguinis atrophia, ut ait, debiles reddit sunt, qua ex causa exspiratio difficultima. Et ita spirometrum, quum non pulmonum capacitatem designat, muscularum dynamometrum est.

Quum magna hujus speciminis pars typis jam mandata esset, et experimenta, spirometri ope, a me facta, jam diu finivsem, secundus Clar. ALBERSII tractatus<sup>4</sup>, nonnullas correctiones in spirometri usu continens, mihi obvenit.

Ille tractatus nos docet, ALBERSIUM cum discipulis multa examina, quibus spirometrum inservit, in hominibus instituisse, quae monerent, relationem capacitem vitalem inter et hominum corporis longitudinem, ab HUTCHINSONO inventam, generaliter adesse, at non tam, quam HUTCHINSON docuit.

Differentias duobus in casibus ALBERS reperit. 1°. Hominibus curtis, in quibus pulmones sani, capacitas vitalis, corporis longitudinis ratione habita, nimis magna erat.

<sup>4</sup> Ueber einige Correctionen beim Gebrauch des Spirometers. Zweiter Artikel von Prof. I. F. H. ALBERS in Bonn. Wiener Medizinische Wochenschrift. Zweiter Jahrgang 1852. Sonnabend den 30 October No. 24/9 post zwanzigstunden 1100 C.C. eines fortissimum

29. Homines longi aëris copiam, pro longitudine, nimis parvam fortissimaq; exspiratione post talem inspirationem exhalare poterant.

-in Ex admodum accuratis explorationibus didicit, pectoris mobilitatem hominum nimis magnam aëris copiam expirantium enormem, hominum aëris copiam enim parvam exhalantium minimam esse hosque in statu morbo versari, justam certe apud eos alicujus morbi suspcionem esse. Pectoris circumferentiam et mobilitatem mensurae sartoricae ope dimensus est. Pectoris mobilitatis medium quantitatem in hominibus retulit; sed quia tantum de pollicibus locutus est, at vero non addidit quales, hoc nihil nos docuit. Utinam omnis explorator centimetris uteretur!

-in Hominibus, copiam aëris nimis magnam exspirantibus, longos truncoꝝ pro crurum longitudine esse, animadverxit idem auctor. Longitudo crurum in illis hominibus parva; illi homines statura quadratae erant, vel illorum pectus, abdominis longitudinis ratione habita (metitum a processu ensiformi ad symphysin ossium pubis) almiss longum erat.

ALBERS pectoris mobilitatem non tantam, quantum CHINSON invenit. Hic secundum illum mobilitatem 5 poll.

<sup>1</sup> Etiam de instrumento QUAINIANO et SIMSONIANO loquitur. Videatur op. laud., cui nomen De herkenning van ziekten, caet., p. 68, et Reptorium, Tijdschrift voor de Geneeskunde in al haren omvang. 4de Jaargang, blz. 170.

reperit (HUTCHINSON dixit: "The mobility of an ordinary man's chest is about 3 inches; pag. 222, § 178.)"

Ille mediare pectoris mobilitatem in hominibus a vita  
anno 20° ad 30<sup>um</sup> 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> poll. [?] invenit. Omnes homi-  
nes ab ALBERSIO explorati nimis magnam aëris copiam  
exspirantes, musculosi erant. (Vid. tractatus <sup>1</sup> eiusdem  
auctoris).

*Homines statim post coenam explorare nobis non li-  
cet; quod etiam HUTCHINSON monuit his verbis: "A full  
meal even will make a difference in the vital capacity,  
and that inversely commensurate with the capacity of  
the stomach. I have found a dinner diminish the vital  
capacity to the extent of 12 and even 20 cubic inches.  
Pag. 222, § 176."*

Homines per longum tempus in latere cubantes mi-  
norem aëris copiam secundum ALBERSIUM exhalare pos-  
sunt, quia latus pressum mobilis sua normalis ali-  
quid amisit; post quartam horae partem hic status ab-  
normis cessat.

*Morbi abdominales, ut hypertrophia hepatis, lienis,  
tumores, ascites, tympanitis, capacitatem vitalem di-  
minuant, quod etiam apud HUTCHINSONIUM legimus in  
opere ejus ultimo § 26, p. 10. In homine ascite labo-  
rante pectoris mobilitas pro tertia parte diminuta fuit.*

Tractatum tertium Clar. ALERS nobis pollicetur, sed,  
chen! mihi ad hoc specimen conscribendum illo uti  
non continget.

In feminis pulmonum capacitatem vitalem, durante gravitate, diminui, physiologi putabant. ANDRAI et GAVARRET<sup>1</sup> primi, ut credo, fuere, qui mulieres gravidas majorem acidi carbonici quantitatem exhalare statuerint, dicentes: "Au moment de la suppression des règles l'exhalation de l'acide carbonique par le poumon augmente d'une manière très notable, puis elle décroît comme chez l'homme à mesure que la femme avance vers l'extrême vieillesse. Pendant toute la durée de la grossesse, l'exhalation de l'acide carbonique par le poumon s'élève momentanément au chiffre fourni par les femmes parvenues à l'époque du retour."

Doctissimus KÜCHENMEISTER<sup>2</sup> de veritate hypothesis: "gravitate respiratio turbatur," jam diu dubitaverat, quia a celeberrimo praeceptore nostro MULDERO de oxydis proteinis relata illi hypothesi oppugnant. KÜCHENMEISTER, cum HUTCHINSON spirometrum excogitavisset, in gravidis hujus instrumenti ope, ante et post partum, experimenta sequentia fecit.

<sup>1</sup> Conf. op. I., cui nomen: *Comptes rendus*, caet.

<sup>2</sup> Conf. Eine Controverse über den Lehrsatz: In der Schwangerschaft vergrössert sich die Unterleibshöhle auf Kosten der Brusthöhle. Nach Experimenten mit HUTCHINSON's Spirometer, vor und nach der Entbindung angestellt von Dr. KÜCHENMEISTER Vierteljahrsschrift für die praktische Heilkunde, VI Jahrgang 1849. Zweiter Band oder zweiundzwanzigster Band der ganzen Folge. Prag, pag, 114 seq. Et conf. C. CANSTATT's Jahresbericht über die Fortschritte der Chir. und Geburtshülfe in allen Ländern im Jahre 1849. Redigirt von DR. EISENMANN, p. 226.

In muliere, cui nomen BÖHME, sana, forti, longitudo  
dinis mediae, examen instituit d. 17 m. Jan. anni 1849.  
Illa 2300—2400 aëris C.C. in spirometrum inflabat. D.  
15 m. Febr. pariebat. D. 24 m. Febr. et d. 1º m. Martii non majorem aëris copiam quam 2300 C.C. per fortissimam expirationem post validissimam inspirationem exhalare poterat.

Mulier, cui nomen KNOBLOCH, longa, sana, fortis,  
d. 17 m. Jan. 2600—2700 C.C. in spirometrum inflabat.  
Partus solvebatur d. 25 m. Jan. D. 26 m. Febr. 2500 C.C.  
exspirabat.

Mulier, cui nomen KULM, 32<sup>3</sup> annos nata, per octo  
menses octavo infante gravida, saepe tussiens et mucum  
expectorans, cum respirationis difficultate scalas adscen-  
dens, in qua sonus percussione editus, clarior normali,  
emphysema pulmonum denotabat, d. 28 m. Jan. 1700—  
1750 C.C. in spirometrum inflabat. D. 13 m. Febr. pariebat. Statim post partum saepius tussiebat; postea  
tussis et respirationis difficultas minor; mulier uxorem  
liberosque suos curat; transpiratio abest. D. 2 m. Martii 1500—1550 in spirometrum exhalare poterat.

Mulier D., cuius digestio graviditatis causa turbata  
est, languida, anxia, syncope saepe affecta, in gravi-  
ditatis mense septimo, d. 28 m. Jan. 1950—2000 C.C.,  
post validissimam inspirationem, fortissima exspiratione  
exhalare poterat. D. 3 m. Martii 1950—2000, semel  
2050 C.C. in spirometrum inflabat.

Mulier, cui nomen RICHTER, struma laborans, cum abdomen pendulo, ceteroquin sana,  $37\frac{1}{2}$  annos nata, foetus motus medio mense Jan. sentiebat; se gravidam inde ab initio mensis Sept. esse credit: in fine mensis Aug. ultimum fluxum menstruum habuerat. D. 30. m. Febr. 2600—2650 C.C. in spirometrum inflabat, d. 2 m. Martii 2650 C.C. exhalabat, Duae posteriores nondum pepererant.

Ex quibus experimentis tabula sequens deducenda est:

Ante partum	2300—2400	C.C.	post partum	2300	C.C.
-------------	-----------	------	-------------	------	------

2600—2700	"	2500	"		
-----------	---	------	---	--	--

" "	1700—1750	"	1500—1550	C.C.
-----	-----------	---	-----------	------

Graviditatis mensis 6<sup>i</sup> 1950—2000 C.C. finis mensis 8<sup>i</sup> 1950—2050 C.C.

Initium mensis 6<sup>i</sup> 2600—2650 " Initium mensis 7<sup>i</sup> 2650 C.C.

Atque hacc quidem praecipua sunt, mutuam ihi videtur, libris mihi notis contenta, de spirometro et ejus applicatione tractantibus. Omnia experimenta, hujus instrumenti ope, facta inventionem HUTCHINSONI utilissimam esse docuerunt.

Liceat mihi in Capite hujus speciminis tertio experimenta a me ipso facta referre.

Hanc comprehensionem jasum esse, iam scimus ex meis suis copiis, in diversum influendum, praesertim modicis stimulis.

Hanc comprehensionem jasum esse, iam scimus ex meis suis copiis, in diversum influendum, praesertim modicis stimulis.

Mylter, cui novem rictaria, stans ipsorum enim  
apparatu beatus, certidum sua, 37<sup>o</sup> annos dicit  
lectus motus medio mensu lato. Seu super se dividens  
inde ab initio mensuram suam, in fine mensuram  
**CAPUT III.**  
Aug. 3600—3600 C.C. in spirometrum respiret D. 30.  
Fep. 3600—3600 C.C. in spirometrum respiret D. 30.  
OBSERVATIONES SPIROMETRI OPE  
Marti 3600 C.C. in spirometrum respiret D. 30.  
AUCTORE HUJUS DISSERTATIONIS TACTAE.  
beberet.

Ex duplo experimentis raptae sedentes dependentia est:

### § 1.

*De methodo capacitatis pulmonum vitalis ex corporis*

*D.D. 300—180 dimensionibus definienda.*

Ut HUTCHINSON, SIMON et alii physiologi, ita meas  
quaque vires intendi ad momenta definienda, quibus  
capacitas in pulmonum vitalis in homine modificeatur.  
Quamquam omnem laudem HUTCHINSON diligentiae  
tribuere meum est; quamquam SIMON experimentis a se  
factis magnam suam industriam probavit, eorum tamen  
dissertationes non satis mihi placuerunt, quum conclu-  
siones ex illis experimentis deduxerint, quae parum  
mihi satisfacerent, nam momenta irrationalia enumera-  
verunt et in magis rationalia non attenderunt. Corporis  
nimirum longitudinem adeoque etiam longitudinem cru-  
rum aëris copiam, in spirometrum inflandam, praeser-  
tim modificare, statuunt.

Hanc conclusionem falsam esse, jam statim ex meis  
experimentis mihi patuit. Quamquam enim totius cor-

poris longitudinis vim in capacitatem vitalem intelligere  
 non possem, in omnibus tamen, spirometri ope a me  
 examinatis, siletiam totius corporis longitudinem per-  
 mensus sum. Nonnulli ex iis aëris quantitatem ab-  
 normem, secundum leges HUTCHINSONIANAS et SIMONIANAS,  
 exhalabant. Liceat mihi exemplum afferre. Studiosus,  
 24 annos natus, corporis longitudine 167,75 cm., cu-  
 jus pectoris circumferentia 89 cm., et mobilitas 8 cm.  
 erat, 4150 C.C. in spirometrum inflabat. Ejus capa-  
 citas vitalis, secundum legem HUTCHINSONIANAM 3550 C.C.  
 et secundum SIMONIANAM 3600 C.C. esse debuisset.  
 Differentia ergo magna erat. HUTCHINSON quoque et SI-  
 MON simile experimentum fecerunt. Nam HUTCHINSON  
 nobis casum narrat viri corporis dispositione ita debili,  
 ut ille eum verum phthiseos exemplar exquisivisset.  
 Spirometri ope examinabatur et..., capacitas pulmonum  
 vitalis in eo major quam normalis erat! Major in viro  
 debilissimo et, secundum ALBERSIUM, capacitas vitalis in  
 tali homine debili hanc ob rem multo minor quam nor-  
 malis esse debet. SIMON nobis casum narrat, de quo  
 jam supra mentionem feci, sed quem repetere mihi li-  
 ceat. Vir gracilis, longitudinis 179 cm., et pectoris cir-  
 cuitus 77 cm., tussiens cum pectoris dolore premente,  
 pungente, haemoptoicus, percussione et auscultatione  
 explorabatur, quae docebant, pulmonis parenchymatis  
 portionem posteriorem dextram magna pro parte opple-  
 tam esse, respirationis surrurum perturbatum. Morbum

tuberculosin esse credebat. Spirometri ope exploratus  
 4880 C.C. aëris exspirabat, ergo copiam 1120 C.C.  
 majorem quam normalem! Thoracis mobilitas permagna  
 13 cm. erat et pulmones profunde descendere poterant.  
 Haec exempla dilucide probant, neque HUTCHINSONIANAM,  
 nec SIMONIS legem magni valoris esse.

Minime autem mirandum est, vel experimenta ab illis facta ad judicia hucusque incognita duxisse. Constat enim, nos ex tot experimentis semper deductiones quasdam prolaturos esse. Quodsi ex gr. in millenis hominibus aures metiamur et relationem inquiramus longitudinem aurium inter et capacitatem pulmonum vitalem, certe ad conclusiones quasdam pervenire possumus. Sed mox quispiam haec animadvertis exclaimaverit: quo tandem modo aurium mensura quantitatem aëris pulmonibus exhalandi modificare valebit? Eodem sane jure quaestio ponitur: quamnam vim crurum longitudine in copiam aëris exspirati habeat? Huic quaestioni sequenti tantum modo respondere nobis licet. Hominibus, longis cum cruribus, longiores trunci, et quo longior truncus, eo longius pectus. Nonne igitur ratio, truncum vel potius pectus permettiendum esse, jussisset?

HUTCHINSON contra capacitatatem pulmonum vitalem totius corporis longitudine modificari statuit, neque de trunci vel pectoris longitudine ullam mentionem facit, nisi ad demonstrandum, illam in capacitatem vitalem vim

non exercere. Narrat enim casum duorum hominum truncorum aequalium, qui diversam aëris copiam in spirometrum inflabant, cum unius crura multo longiora essent, quam alterius, cuius capacitas vitalis hanc ob rem minor erat. Hoc iconem demonstrare conatus est. Ambos stantes et sedentes delineavit (p. 183 et 184), et credit, rem hoc modo sine dubio a se demonstratam esse; at contemplator attentus statim pectus illius, cuius crura curta, angustum, alterius vero thoracem amplum esse observabit; et causam minoris aëris quantitatis, quam alterius pectus continere posset, non in crurum brevitate, sed potius in thoracis angustia ponet.

HUTCHINSON, antequam experimenta institueret, non consideravat, *quid debeat, quid possit vim in capacitatem vitalem exercere?* Et haec est quaestio, quae semper ante experimenta ponenda est.

Quum igitur quaeratur, quid praesertim capacitatem vitalem modificare valeat, statim unusquisque perspiciet, pectoris capacitatatem ejusque expansionem sive mobilitatem<sup>1</sup>, quâ pectoris capacitas major fiat, maximi momenti esse.

Ex capacitatem enim pectoris, quod pulmones sanos continent, *a priori*, ad capacitatem eorundem pulmonum vitalem concludi licet. Nam certa pars totius pectoris illius Ad mobilitatem pectoris attendere debemus, quia pectus quodammodo cum folle comparari potest, qui quo magis ejus bracteae a se invicem dimoveri possunt, eo majorem aëris copiam sumere potest.

pulmonibus, corde, oesophago et vasis occupatur; quod supponere nobis liceat. Haec omnia nempe pulmones, cor, oesophagus et vasa in hominum sanorum pectoribus eodem spatio gaudentibus, eadem amplitudine erunt (Quum cor hypertrophice sive aneurysmatico extensus est, vel pulmones emphysemate affecti sunt, haec virtus auscultatione et percussione detegere possumus). Pulmones sani ejusdem magnitudinis eadem capacitate gaudent. Ergo ex pectoris capacitatem ad capacitatem pulmonum vitalem concludendum est.

Sed porro pulmones inspiratione descendunt et in latera expanduntur, nisi saltem adhaesio adsit (conf. Cl. Donders, *Lancet*). Igitur quo major capacitas pectori sit, eo major pulmonum expansio, quo major pectoris ambitus, eo magis in latera pulmones expanduntur. Quo longius pectus, eo profundius pulmones descent;

<sup>1</sup> Quum ad pectoris ambitum animum advertentes, statuimus, in pectore, cui major circumferentia, pulmones magis in latera expandi, indeque majorem aeris copiam continere posse, et haec ratione nitentes, pectora ampla cum pectoribus angustis comparamus, comparationem hanc minus rectam esse fateamur, oportet in genere enim ampliores thoraces saniores pulmones quam angustiores continebunt; quod ita cognitum est, ut fere omnes scriptores de habitu phthisico pectus angustum tanquam signum pathognomonicum phthisicos notent, quapropter una cum insigni thoracis amplitudine maiorem pulmonum sanitatem in rationem ducere debemus,

dere possunt, quo major denique mobilitas, eo major pectoris capacitas fieri potest. Itaque pectoris mobilitas, longitudo et circumferentia metiendae sunt.

Ex his omnibus, ut mihi videtur, liquet, a priori dicendum esse, capacitatem pulmonum vitalem capacitate pectoris modificari. Experimenta spirometri ope facientes, hanc thoracis capacitatem igitur considerare debemus, ut eam cum capacitate vitali comparare et inde videre possemus, an pulmones sani sint, nec ne. Sed difficilis haec consideratio est. Nobis tantum pectoris ambitum, longitudinem et mobilitatem metiri licet. Quae dimensiones omnino sufficerent, si pectus cylindrus esset; nam posito, pectus esse cylindrum, ejus capacitas esset: fundus  $\times$  altitudo; posito, ambitum esse  $= a$ , longitudinem  $= l$ : capacitas esset  $\frac{l a^2}{4 \pi}$ .

Posito praeterea, illius cylindri superficiem aquabiliter expandi, ambitumque inde fieri  $a + m$ ; sit capacitas  $\frac{l \times (a + m)^2}{4 \pi}$ . Capacitatis differentia igitur esset  $\frac{l \times (2 am + m^2)}{4 \pi}$ . Sed pectus non est cylindrus, nec aquabiliter expanditur, et hanc ob rem non illa formula uti possumus. Illa quodammodo mutari debet, et ideo scribere volumus formulam magis generalem:  $la \times (A + Bm + Cm^2) =$  pectoris capacitas. In qua A, B et C sunt numeri constantes ex experimentis definiendi, constantes, quia hominum pectora forma inter se satis similia sunt. Hanc formulam, quamcum a priori

statuerimus  $\lambda \times a$  multiplicari debere, ex nostris experimentis deduximus, sed de illa infra.

Equidem in omnia, id est, in pectoris longitudinem ( $l$ ) ambitum ( $a$ ) et mobilitatem ( $m$ ) quibus, secundum meam opinionem, capacitas pulmonum vitalis in homine praesertim modificatur, animum attendi.

Liceat mihi, antequam experimenta mea et conclusiones ex illis observationibus a me factis deductas, exponam, meum examinandi modum communicare. Postquam *capacitas vitalis* in aliquo homine ter spirometri ope examinata, fuerat, *pectus* permensus sum. Difficillimum autem est *longitudinem* pectoris metiri; quare configendum mihi visum est ad *trunci mensuram*, quam statuisse, certam trunci partem pectore occupari. In omnibus quidem truncis haec proportio cum certitudine mathematica admitti non poterit; crediderim tamen, differentiam hic illuc obviam non magni valere. Quidquid hujus rei sit, pectoris longitudine ex trunci potius quam ex totius corporis longitudine, deducta, veritati magis me accessisse credidi, quia talimodo examina instituens, majoris minorisve crurum et capitum longitudinis momenta falsa evitavi. Corporis trunci longitudinem, taeniae sericae ope accurate in centimetros divisae, a tubere occipitali magnop usque ad os coccygis permensus sum.   
Pectoris circumferentiam infra scapulas per lineam

Pectoris circumferentiam magna adipis copia majorē sieri unusquisque

a media spina dorsi per mammarum papillas ad medium sternum productam, ejusdem taeniae sericae ope, per mensus sum, quum hominis examinandi thorax in quietis stadio versabatur.

Pectus porro post profundissimam inspirationem, antequam examinandus exspiravisset, et post talem exspirationem, antequam inspiravisset, permensus sum, ut scirem, quanta *mobilitas* esset.

Etiam in hominum *aetatem* attendi. Quamquam difficile esset bonas conclusiones ex aetate deducere, quia nobis non lieuit eosdem homines in diversis vitae periodis examinare (spirometro non ita pridem invento); quod sane, ut aetatis vim recte definiremus, nobis faciendum fuisse. Minime enim inter quinquaginta senes et quinquaginta juvenes comparatio facienda est; nam illi senes intelligit, atque ita, cum hominum thoracis ambitum permetiebar, ad hoc animum attendi, nam major circumferentia ex adipe orta pectoris capacitatem non majorem reddit.

Quum viro Clarissimo BUYS BALLOT observationes meas expонerem, optimo jure animadvertebat, me melius acturum fuisse, quum homines in initio experimenti, ad capacitatem vitalem inveniendam instituti, permensus fuisse, ut rectius statuere potuissem, quam tam aeris copiam, pro certa pectoris mobilitate, aliquis exhalar posset. Nam dicebat: nunc nescimus, utrum examinatus, antequam in spirometrum inflavit, magis thoracem expanderit an vero minus, quam illo tempore, quod pectus permensus est. Hoc notare mihi animus fuit, ut physiologis observationes de capacitate vitali facere cupientibus haec animadversio utilitati esset.

reliquiae, ut ita dicam, sunt, quibus omnibus, in juventute certe, pulmones sanissimi fuerint; juvenes contra sanorum debiliumque veluti mistura sunt.

Nonnullos ex examinatis etiam libravi, quamquam difficillimum est *ponderis* in capacitatem vitalem momentum definire. Nam, quum hominem libramus, nescimus, an major calcis copia in ossibus vel aliud quidquam causa majoris ponderis sit, nec ne Tentavi quidem *dynamometri Regneriani* ope, vim muscularum definire, ut indagarem, an pondus hominis examinati, prouti gravioribus vel tenuioribus muscularis gaudeat, majus, an minus esset; sed experimentorum numerus non tantus est, ut ex iis bonas conclusiones deducere possim,

Itaque trunci modo longitudinis (*l*), pectoris et ambitus (*a*) et mobilitatis (*m*) atque etiam aetatis (*v*) vim adnotavi. Laudabile autem SIMONIS exemplum secutus, omnia experimenta mea<sup>1</sup> in fine hujus capitii retuli, "um" ut ejus verba mea faciam, "um es künftigen Bearbeitern desselben Gegenstandes möglich zu machen, meine Beobachtungen zu benützen"

<sup>1</sup> Ex his experimentis liquet, homines a me exploratos fere omnes ejusdem aetatis esse, fere omnes cives academicos; quam ob rem experimenta mea non multum de aetatis, nec de professionis vi nos docent, nec de sexu certi aliquid monent. Ne quis hoc mihi impudet! facilius enim est juvenes quam feminas in pectoris denudationem consentientes reperire, incitata observationes sed auditiva-

Quum nonnulla experimenta spirometri ope in ho-  
minibus fecissem et numeros trunci longitudinem, tho-  
racis circumferentiam et capacitatem vitalem designan-  
tes, duce Clarissimo BUYS BALLOT, inter se comparavisse,  
relationem capacitatem vitalem inter et productum ex  
multiplicatis trunci longitudine et pectoris ambitu, com-  
putavi, mihiique patuit, quae a priori statuisse re vera ita  
se habere. Hoc nonnullis exemplis probare conabor.

1º. Adolescens, 16 annos natus, longitudinis 155 cm.,  
cujus trunci longitudo 64 cm. erat, cui pectoris am-  
bitus 70 cm. et mobilitas 5 cm., 2400 C.C. in spiro-  
metrum inflabat.

2º. Alius 16 annorum, cujus totius corporis longitudo  
150.5 cm., trunci autem longitudo 64 cm. erat, cum  
pectoris ambitu 72 cm. et mobilitate 5 cm., 2450 C.C.  
in spirometrum inflabat.

3º. Faber lignarius, 18 annos natus, cui corporis lon-  
gitudine 178 cm., trunci autem longitudo 78.5 cm. erat,  
cum pectoris circumferentia 84 cm. et mobilitate 6.5  
cm. 3850 C.C. fortissima exspiratione post validissimam  
inspirationem exhalar poterat.

4º. Studiosus, 19 annos natus, cum corporis longi-  
tudine 167.75 cm., trunci longitudine 74 cm., cui  
pectoris circumferentia 74 cm. et mobilitas 7 cm. erat,  
3250 C.C. in spirometrum inflabat.

5º. Studiosus, actate 23 annorum, longitudine 176.75  
cm. cum trunci longitudine 78 cm., pectoris circumfe-

rentia 85 cm. et mobilitate 8 cm., 4200 C.C. in spirometrum inflare poterat.

Quum eorum trunci longitudinem ( $l$ ) cum pectoris ambitu ( $a$ ) multiplicamus et capacitas vitalis (C.V.) hoc producto  $l \times a$  dividitur, numerus oritur in diversis casibus non multum differens. Quod indicare mihi licet.

		$C.V.$
Nº. 1.	$l \times a = 64 \times 70 = 4480$	$\frac{l \times a}{4480} = \frac{2400}{4480} = 0.535.$
Nº. 2.	$61 \times 72 = 4392$	$\frac{2450}{4392} = 0.557.$
Nº. 3.	$78.5 \times 84 = 6594$	$\frac{3850}{6594} = 0.583.$
Nº. 4.	$74 \times 74 = 5476$	$\frac{3250}{5476} = 0.593.$
Nº. 5.	$78 \times 85 = 6630$	$\frac{4200}{6630} = 0.633.$

Hos numeros non multum differre statui, attamen differunt. Causa autem differentiae numerorum in aetatis et pectoris mobilitatis differentia haerere mihi videbatur. Nam

primus...16	annos natus erat	cum pectoris mobilitate	5 cm.
secundus...16	" " "	" " "	5 cm.
tertius...18	" " "	" " "	6.5 cm.
quartus...19	" " "	" " "	7 cm.
quintus...23	" " "	" " "	8 cm.

Hanc ob rem, cum auxilio Clarissimi BUYS BALLOT, regulam minimorum quadratorum, quae dicitur, secutus, formulam invenire conatus sum, ex casibus asterisco notatis, ubi anomaliam non suspicabar, quacum pro omni

pectoris mobilitate et vitae anno capacitas vitalis, truncī longitudine et pectoris ambitu cognitis, praefiniri posset. Centum experimentis ad eum finem usus sum. Quia autem numerus experimentorum a me factorum non tantus erat, ut de vitae aetate ( $v$ ) multa docere possent, lege HUTCHINSONIANA de aetatis vi in capacitatem vitalem usus sum, qua nempe docetur, ab anno aetatis 15<sup>a</sup> ad 35<sup>um</sup> pulmonum capacitatem vitalem augeri et a 35<sup>a</sup> ad 65<sup>um</sup> diminui<sup>1</sup>.

Eventus nostrarum enumerationum haec formula fuit:  

$$\text{Coeff.} = 502.5 + 16.447m + 0.367m^2 - 2.47(35-v)$$
  
 Quae, cum illam sequenti modo simpliciorem reddimus, satis accurata est.

$$\text{Coeff.} = 502 + 16.5m + 0.37m^2 - 2.5(35-v).$$

<sup>1</sup> Secundum Cl. RYUYS BALLOT haec capacitatē diminutio minus recte aetati tribuitur quam mobilitati pectoris majori in juventute quam postea. Non omnis extensio utilis; partim necessaria est, sed partim superflua. Hujus actione pectus extenditur, sed brevius fit, aut pectus extenditur, sed diaphragma magis superne incurvatur et hoc modo non augetur pectoris capacitas. Per se autem patet, extensionis partem superfluam non nisi in juventute inveniri; gradatim imminuitur, et evanescit. Aetate maturiori omnis extensio utilis est. Formula igitur pro homine maturioris aetatis vera est, pro juvēne nimis pollicetur; ergo pro juvēne aliquid abstrahendum, quod ultimus terminus abstractum. In senectute extensio nimis diminuta est, etiam pars utilis minor facta est et propterea capacitas diminuitur; inde secundum Cl. RYUYS BALLOT etiam pro sene ultimus terminus non videtur addendus; diminutio capacitatē satis indicatur diminuta quantitate  $m$ . Aliam formam terminum induere oportet. Primum eligimus, quia novae stabilierāe non sufficiunt experimenta.

Ne quis, in examinibus spirometri ope institutis, hac formula uti cupiens, illam pro omni exploratione subducere deberet, equidem eam pro pectoris mobilitate a 3 cm. ad 12 et pro aetate a vitae anno 14° ad 56<sup>an</sup> quae sive, quod tabulae forma huic dissertationi adnexui. (Vid. Tabula.)

Liceat mihi quinque hominum, quorum capacitatem vitalem et dimensiones supra attuli, capacitatem vitalem hujus tabulae ope enumerare:

1<sup>i</sup>:  $l \times a = 4480$ , 16 annos natus erat, et pectoris mobilitate 5 cm. gaudebat. Numerus, quo cum  $l \times a$  pro aetate 16 annorum et mobilitate 5 cm. multiplicari debet, est 0,545 (videatur Tabula).

$$(l \times a =) 4480 \times 0,545 = 2443.$$

Fortissima exspiratione post talem inspirationem 2400 C.C. in spirometrum inflavit.

2<sup>i</sup>:  $l \times a = 4392$ . Aetatis 16 erat annorum cum mobilitate pectoris 5 cm. Cum eodem numero  $l \times a$  multiplicari debet.

$$(l \times a =) 4392 \times 0,545 = 2395.$$

Capacitas vitalis hujus juvenis 2450 C.C. erat.

3<sup>i</sup>:  $l \times a = 6594$ . 18 annos natus, cui pectoris mobilitas 6,5 cm. Numerus, quo cum  $l \times a$  pro aetate 18° annorum et mobilitate 6,5 cm. multiplicari debet, est, ut Tabula indicat, 0,583:

$$(l \times a =) 6594 \times 0,583 = 3847.$$

3850 C.C. fortissima exspiratione post validissimam inspirationem exhalare poterat.

4<sup>i</sup>:  $l \times a = 5476$ . 19 annos natus, cum thoracis mobilitate 7 cm. Numerus, quocum  $l \times a$ , pro aetate 19 annorum et mobilitate 7 cm. multiplicari debet, est, secundum Tabulam, 0,596:

$$(l \times a =) 5476 \times 0.596 = 3273.$$

Capacitas pulmonum vitalis hujus studiosi erat 3250 C.C.  
5<sup>i</sup>:  $l \times a = 6630$ . 23 annos natus, cum pectoris mobilitate 8 cm. Numerus, quocum  $l \times a$  pro aetate 23 annorum et mobilitate 8 cm. multiplicari debet, est, ut Tabula docet, 0,628:  
( $l \times a =) 6630 \times 0.628 = 4163.$

Ille civis academicus aëris copiam 4200 C.C. in spirometrum inflare poterat.

Supra de juvene 24 annos nato, qui copiam abnormem, secundum legem HUTCHINSONIANAM et SIMONTANAM, in spirometrum inflabat, locutus sum. Liceat mihi etiam ejus capacitatem vitalem, tabulae ope, computare, et cum copia efflata comparare. Trunci longitudo 76.5 cm., pectoris circumferentia 89 cm. erat:  $l \times a = 6808.5$ . 24 annos natus erat cum pectoris mobilitate 8 cm. Numerus, quocum  $l \times a$  pro aetate 24 annorum et mobilitate 8 cm. multiplicari debet, est secundum Tabulam, 0,630:

$$(l \times a =) 6808 \times 0.630 = 4292$$

4150 C.C. in spirometrum inflavit, et ita copiam minime abnormem exspiravit.

Ex his exemplis dilucide patet, ut mihi videtur, re-

lationem capacitatem vitalem inter et trunci longitudinem, pectoris mobilitatem et circumferentiam, nec non vitae aetatem adesse; id est, capacitatem pulmonum vitalem capacitatem pectoris praesertim modificari. Ne quis tamen putet, numeros omnium experimentorum meorum even-  
tu aequi felici, hujus tabulae ope, inventum iri. —  
Econtra numeri centimetrorum cubicorum aëris in spirometrum inflati saepe a numeris ex formula deducendis longe differunt. Hos tamen numeros differentes omittere nolui, sed omnia experimenta mea, cum computatione secundum formulam datam, huic dissertationi inserui.

Quamquam hae differentiae adsunt, quamquam persuasum mihi est, formulam meam, novis cognitis momentis, multo accuratiorem reddi posse, tamen illam veritati propiorem quam leges HUTCHINSONIANAS et SIMONIANAS esse confido. Nemo praeterea obliviscatur, nos formulam effecisse ex casibus, quos existimaremus normales, quia normalem legem cognoscere gestiebamus; inde formulam in casu quodam abnormi, ubi valetudo minus bona adest, maiorem capacitatem poscere quam revera adest; multo minores igitur reddere possumus differentias, at simul minus veras, si scribimus.

$$\text{Coeff.} = 490 + 16.5 m + 0.37 m^2 - 2.5 (35 - \nu).$$

Errorum fontes multi erant, quorum primus imperitia multorum ex hominibus exploratis fuit. Haec illarum differentiarum maxima causa habeatur. Sed de impe-

ritia illorum tacere malim, ne quid  
qui tam benevole, ut mihi roganti satisfacerent, sese  
examini submiserint.

## § 2.

*Experimenta spirometri ope ab auctore facta  
in viris sanis.*

PROFESSIONE.	AETAS.	LONGITUDINE TOTUS CORPUS.	LONGITUDINE TRUNCI.	PECTORIS AMBITUS.	PECTORIS MOBILITAS.	PONDUS.	MUSCULORUM BRACHII VISC.	MUSCULORUM DUMBI VISC.	CARNICUS VITALIS.	VIRIS QUANTITAS SECUNDUM FORMAM EXHALANDAM.			
											kg.	kg.	
	Ann.	Cm.	Cm.	cm.	cm.	kg.	grat.	cc.	cc.	kg.	kg.	kg.	
	10	116	51	55	47	18.9	...	1250	1604	17	37.87	19	
	12	143.5	55	62.5	6.5	...	...	1650	1944	Pater phthisic	...	...	
	12	132	58.5	60	5	...	...	1800	1878	37	4.78	19	
	13	158	64	68	6	...	44	25	2200	2436	27	32.37	19
Nauta.	15	164.7	74	79.5	5.5	...	...	3050	3259	27	37.47	22	
	15	159.2	68	79	6	55.1	6½	48	2750	3035	27	...	20
	15	147.5	61	62	6	...	...	1550	2336	27	...	20	
*	15	169	69.5	85	9	...	5	61	3350	3727	27	...	20
*	15	165.5	68.5	68	7.5	48	3	25	2600	2780	27	3.07	19
*	16	164	69	75	9	...	7½	34	3500	3265	27	101	19
*	16	160	65.5	74	6	...	6	34	2900	2748	27	3.27	19
	16	166.5	70	77.5	6.5	...	8	40	2950	3151	Mater phthisic	...	...
*	16	150.5	61	72	5	...	42	34	2450	2398	27	101	19
*	16	155	64	70	5	...	5½	52½	2400	2441	27	...	19
Sartor.	17	158	66.5	76	8	45.8	6½	26	2800	3098	27	3.77	19
Studiosus.	17	177	74	81	6.5	...	9	39½	3200	3482	27	37	19
Studiosus *.	17	172.5	74	81	6.5	67.5	6	45	3300	3482	27	3.87	19
Studiosus *.	17	171	75	82	5.75	...	...	95	3300	3474	27	...	19
Studiosus *.	17	173.2	69	88	8	...	11½	71	3600	3722	27	...	19
Studiosus.	17	163	70	77	8	48.7	5	45	2950	3364	27	22.89	19
Studiosus *.	17	186	85	84	10	...	...	...	4850	4705	27	170	19
Studiosus.	18	179	80	81.5	6.75	...	...	...	3550	3853	27	3.07	19
Studiosus.	18	177.5	79	84	7	...	15	94	3850	3935	27	3.07	19
Studiosus *.	18	170.5	77.5	75.5	3	...	...	...	3050	2995	27	...	19
Studiosus *.	18	184	77.5	90.5	11	...	...	...	4800	4804	27	3.17	19
Studiosus *.	18	171	69	79	6.5	...	...	...	3250	3177	27	171	19
Studiosus *.	18	182	80	87.5	9	...	...	...	4300	4466	27	3.17	19
Lignarius *.	18	178	78.5	84	6.5	...	16	77	3350	3844	27	...	19
Studiosus *.	18	163.5	63	86.5	6.5	...	11	55	3250	3176	Tibicen.	32.87	19
Famulus *.	18	179	80	91.5	7.5	75.8	12	84	4250	4397	Gymnastics.	37.17	19
Agricola *.	18	163.5	72	83.5	8.5	...	...	...	3700	3740	27	3.07	19
Studiosus *.	18	180.2	78.5	83.5	9.5	...	...	...	3600	3891	27	...	19
Studiosus *.	19	169.25	73.5	85	4.5	...	...	...	3350	3398	27	3.07	19
Studiosus *.	19	176.5	78.25	82.5	8.5	...	...	...	3750	3965	27	...	19



PROFESSIONE.	ETATIS.	LONGITUDU TOTUS CORPORAIS.	LONGITUDU TRUNCI.	PECTORIS AMBITUS.	PECTONIS MOBILITAS.	INSECUNDUM PONDUS CESTA AETATIS.	MUSCULORUM BRACHII VIS.	MUSCULORUM LUMBI VIS.	CAPACITAS VITALIS.	AERIS QUANTITAS SECUNDUM FORMULAM EXHALANDAM.	RESPIRATORIUM TOTALE CORPORE.
Studiosus*.....	22	191.5	79	88	7	....	9 $\frac{1}{2}$	75	4500	4195	IV
Studiosus*.....	22	171	74	86	5.25	....	8	89	3500	3598	III
Studiosus*.....	22	180	75	86	6.5	....	10	72	4000	3828	II
Studiosus.....	22	169	71	79.5	6.5	....	....	88	3100	3349	III
Studiosus*.....	22	186.75	73	90	6.5	....	9	75	4200	3899	IV
Sartor*.....	22	170	72	82	8	....	....	....	3700	3693	III
Studiosus*.....	22	167.75	72	81	9	64.6	9	80	3650	3883	III
Famulus*.....	22	166	69.5	85	4.5	69.2	11	59	3150	3257	IV
Med. Doctor*....	23	176.25	78	85	8	71	16	120	4200	4163	Cantor.
Jur. Doctor*....	23	175	80.25	81.75	8.25	58.2	9	48	4000	4152	IV
Studiosus*.....	23	181	81	87	7.5	....	....	....	4000	4347	IV
Studiosus*.....	23	173.5	74	79.5	5	....	....	....	3400	3311	III
Studiosus.....	23	177.5	77	96	9	....	10 $\frac{1}{2}$	71 $\frac{1}{2}$	4300	4812	Cantor et gymasticus.
Studiosus.....	23	160.25	65	79	7.5	....	6	48	3150	3168	IV
Studiosus.....	23	174	71.5	81	9.5	63.4	11	73	3350	3834	Cantor et gymasticus.
Studiosus*.....	23	180.5	81	78	7	57.5	5	55	3650	3828	SONUS PERCUSSIONE PRODUCENS.
Chirurgus*.....	23	181	75.5	84	9	....	....	....	3750	4128	inf. ant. amborum pulmonum obliteratus. Frater haemoptoicus.
Jur. Doctor.....	24	173	73	84	6.5	....	....	....	3300	3666	IV
Studiosus.....	24	175	77.5	81.5	6.5	....	11	106	3400	3876	Cantor et gymasticus.
Studiosus*.....	24	163.75	76.5	89	8	....	....	....	4150	4292	Tibicen.
Studiosus*.....	24	168	75	84	4	....	....	....	3500	3439	IV
Studiosus*.....	24	175	76	81	5	....	....	....	3750	3478	IV
Negotiator.....	24	170	73.5	85	7.5	....	15	95	4050	3814	Cantor.
Studiosus*.....	24	166	74	86.5	8	67.7	15	100	3725	4032	Cantor.
Studiosus*.....	24	168.5	73	86	6	60.1	9	40	4000	3685	IV
Jur. Doctor*....	24	168	72	84	8	62.2	6	60	4350	3808	IV
Nauta*.....	24	181	85	90	7	....	....	....	4500	4651	IV
Med. Doctor.....	25	170.25	77	82	7	60	13	106	3500	3857	Gymnasticus.
Studiosus.....	25	177.5	80.5	84	7.5	68.5	9 $\frac{1}{2}$	63	3950	4206	IV
Jur. Doctor*....	25	179.75	78.5	85	9	....	....	....	4550	4376	IV
Phil. Doctor*....	25	184	81.75	81.5	7	69	....	....	4000	4071	IV
Studiosus*.....	25	167.5	74.5	79	5.5	....	....	....	3350	3407	IV
Studiosus*.....	25	175	77	83	7	....	....	....	4075	3904	IV
Studiosus.....	25	167.5	75	74	8	....	8	51 $\frac{1}{2}$	3300	3513	IV
Famulus*.....	25	171	72	84	6	....	8 $\frac{1}{2}$	65	3850	3568	IV
Jur. Doctor.....	25	169	....	....	....	....	6 $\frac{1}{2}$	44	3400	....	IV
Theol. Doctor.....	25	177.5	69	90	6	67.3	7	50	3350	....	IV
Studiosus*.....	25	171	76	81	6.5	61.8	10	65	4000	3700	IV
Studiosus.....	25	171.5	74	89	9.5	....	14	70	3800	4392	Gymnasticus.
Studiosus.....	25	172.5	78.5	89	5.5	....	9	69	4025	4045	IV
Studiosus.....	25	179	79.5	81.5	4.5	....	....	....	3725	3622	IV
Studiosus.....	26	184	67	79.75	5.75	58.2	8 $\frac{1}{2}$	57	2600	3136	IV
Studiosus*.....	26	185.5	78.25	98.5	8	....	....	....	5200	4894	IV
Studiosus*.....	26	172.5	70	92	5	....	....	....	3800	3670	IV

PROFESSIONE.	AETAS.	LONGITUD TOTUS CORPORIS.		LONGITUD TRUNCI.		PECTORIS AMBULAS.		PECTORIS MOBILIAS.		MUSCULORUM BRACHII VIS.		MUSCULORUM LIMBII VIS.		CAPACITAS VITALIS.		AERIS QUANTITAS SECUNDUM FORMULAM EXHALANDAM.		TOTALE AERIS TOTUS CORPORIS.		
		Ann.	Cm.	Cm.	Cm.	Cm.	Kilog.	Grad.	Grad.	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	
Lignarius*	26	171	73	86	6	7.5	10	80	3850	3716	37	6	101	102	103	104	105	106	107	
Juris Doctor*	26	165.75	68	85	4	7.5	10	80	3350	3606	37	101	102	103	104	105	106	107	108	
Fannulus	27	158	.....	88	4	7.5	10	80	3250	.....	37	101	102	103	104	105	106	107	108	
Negotiator*	27	176.75	71	90	7.5	10	105	3950	4006	Cantor	381	382	383	384	385	386	387	388	389	
Studioius	27	182	82	99	8	91.8	11	84	4300	5179	Gymnasticus	382	383	384	385	386	387	388	389	390
Juris Doctor*	27	184.5	76.5	93	9	76	14	100	4200	4652	Gymnasticus	382	383	384	385	386	387	388	389	390
Pharmacopola*	27	166	69	85.5	7.5	10	105	3500	3699	37	101	102	103	104	105	106	107	108	109	
Studioius	28	172.5	75	89	5	10	105	3700	3838	38	101	102	103	104	105	106	107	108	109	
Litt. Doctor*	28	178.5	74	82	8	60	10	49	3950	3883	38	22.075	382	383	384	385	386	387	388	389
Studioius*	28	176	75.5	83	9	65.1	11	45	4450	4155	38	101	102	103	104	105	106	107	108	
Med. Doctor*	29	175.5	74	84.5	8	56.7	5	52	3800	4020	38	101	102	103	104	105	106	107	108	
Natarius*	29	181	76	79	9	63.4	9	93	4325	3998	38	5.975	382	383	384	385	386	387	388	389
Studioius*	29	173	76.5	90	10.5	67.4	9	75	4400	4826	38	5.71	382	383	384	385	386	387	388	389
Med. Doctor	30	159.5	64.75	89	7	54.3	7	47	3275	3590	38	52.001	382	383	384	385	386	387	388	389
Caementarius*	30	179	77	90	6	.....	10	4550	4171	38	5.01	382	383	384	385	386	387	388	389	
Fannulus	30	159.75	.....	.....	60.2	151	85	3650	.....	38	5.01	382	383	384	385	386	387	388	389	
Carpentarius*	31	173	77	85	8	67.2	10	85	3950	4241	38	101	102	103	104	105	106	107	108	
Sartor	32	165.5	73	86	7	63	8	62	3550	3950	38	101	102	103	104	105	106	107	108	
Gymnasticus	32	182.5	82	98	6	85.7	23	90	4300	5077	38	101	102	103	104	105	106	107	108	
Litt. Doctor*	32	184.25	77	87	9	70.3	9½	70	4000	4508	Semper tussiens.	382	383	384	385	386	387	388	389	390
Med. Doctor*	32	190	80	93	11	.....	10	5200	5356	38	101	102	103	104	105	106	107	108	109	
Pictor	32	156	.....	.....	.....	.....	10	2500	.....	38	101	102	103	104	105	106	107	108	109	
Professor*	32	174	76.5	83	8	.....	10	4000	4127	38	101	102	103	104	105	106	107	108	109	
Litt. Doctor*	33	181	80.5	90	6	.....	10	4250	4419	38	101	102	103	104	105	106	107	108	109	
Jur. Doctor	33	173.75	.....	.....	64.1	8.5	65	3500	.....	38	101	102	103	104	105	106	107	108	109	
Med. Doctor*	37	178	77.75	96	11	.....	10	4450	5396	38	101	102	103	104	105	106	107	108	109	
Jur. Doctor*	38	180	78	81	3	63.5	8½	70	3300	3455	38	101	102	103	104	105	106	107	108	
Orator	38	172.5	.....	.....	79	7	60	3250	.....	38	101	102	103	104	105	106	107	108	109	
Doctor*	42	192.5	79	83	8	83.5	8	57	4250	.....	38	101	102	103	104	105	106	107	108	
Nauta	43	172	76.5	82	8.5	63.8	11	70	4350	4071	38	101	102	103	104	105	106	107	108	
Fannulus*	45	168.4	.....	.....	8	55	3400	.....	38	101	102	103	104	105	106	107	108	109	109	
Pistor*	49	172.75	78	86	5.2	.....	8	48	3800	3776	38	101	102	103	104	105	106	107	108	
Litt. Doctor	52	149	63	78	8	50	.....	2500	3022	38	101	102	103	104	105	106	107	108	109	
Professor	53	178.25	.....	.....	60	6½	30	3450	.....	38	101	102	103	104	105	106	107	108	109	
Professor	55	169.75	.....	.....	.....	.....	.....	3800	.....	38	101	102	103	104	105	106	107	108	109	
Negotiator	55	182.5	.....	.....	.....	.....	.....	2750	.....	38	101	102	103	104	105	106	107	108	109	
***	55	155.5	.....	.....	.....	.....	.....	2500	4051	Obesitas!!	382	383	384	385	386	387	388	389	390	
Fannulus	56	168.5	77	101	4	21	.....	2500	4051	Obesitas!!	382	383	384	385	386	387	388	389	390	
Pedellus	56	154	71	86	6.5	.....	2900	3498	38	101	102	103	104	105	106	107	108	109	109	
Lignarius	64	171	78	87	5	67.7	7½	48	2950	3442	38	101	102	103	104	105	106	107	108	
	64	167.5	75	80	5	55.3	.....	3000	3120	38	101	102	103	104	105	106	107	108	109	

*Experimenta spirometri ope in viris aegris<sup>1)</sup> facta.*

PROFESSIO.	ETIAS.	LONGITUDINE MONTIS	LONGITUDINE TRUNCI.	PECTORIS AMBITUS,	PECTORIS MOBILITAS.	PONDUS.	MUSCULORUM BRACHII VISC.	CAPACITAS VITALIS.	AERIS QUANTITAS SECUNDUM FORMULAM EXHALANDAM.	TOXOFIDIO.	CONSUMPTUS.	NOMEN MORBI.	
.....	Ann.	Cm.	Cm.	Cm.	Cm.	Kilog.	Grad.	CC.	CC.	.....	.....	.....	
.....	14	188	59	68	4	.....	3	15	1250	2089	.....	.....	
.....	14	139.5	58	65	6	.....	.....	.....	1400	2118	Anuscultatio et percussio nini ducere. Mater phthisi mortua.	Post coxarthrocaen scrofulosum satnam.	
Agricola.	16	143.5	59	73	6	.....	.....	1900	2442	.....	.....	Gonarthrocae scrupulosus.	
Opifex.	16	153.5	63	73	7.5	.....	.....	2450	2754	Ex peripneumonia convalescens.	.....	.....	
Caementarius.	16	140.5	58.5	68.5	4.5	.....	.....	900	2147	Phthisis.	Suspicio phthiseos.	.....	
.....	17	175	76	73.5	9	.....	.....	3000	3523	.....	.....	Anno 1851. haemoptoe.	
.....	17	170.5	73	83.75	7.5	.....	.....	2750	3680	Tota familia phthisi mortua.	Phthisis.	.....	
Bractearius.	17	153.5	69	70.5	5	.....	.....	1600	2665	Fratres et sorores phthisi mortui.	.....	.....	
Famulus.	18	160.5	64	71	10	44	.....	2750	3003	Tinea capitatis.	.....	.....	
Opifex.	18	156	67.5	76.75	7.75	.....	.....	2600	3151	Post pleuritidem (sine adhesione).	.....	.....	
Agricola.	18	178.5	76	82	7	.....	.....	3050	3695	Suspicio tuberculorum.	.....	.....	
Typographus.	19	165	73.5	84	6	.....	.....	3000	3550	Suspicio emphysematis.	.....	.....	
Miles.	19	168	.....	79	8	.....	.....	3000	.....	Tinea favosa.	.....	.....	
.....	19	166.5	74	67	6	.....	.....	2000	3425	Phthisis.	.....	.....	
Miles.	20	167	.....	77	6	.....	.....	2550	.....	Tinea favosa.	.....	.....	
Nauta.	20	164.5	68	82	5	.....	.....	2400	3094	Phthisis.	.....	.....	
.....	22	183	79	83	6.5	.....	.....	3000	3891	Juvenis debilissimus; parentes phthisi mortui.	Hypertrphia hepatis et lienis;	.....	
Faber ferrarius.	23	164.5	76	87	6	.....	.....	2400	3868	suspicio tuberculorum.	.....	.....	
Agricola.	23	161	66	77.5	6	.....	.....	3000	2922	Scrofulosis.	.....	.....	
.....	23	157	64.25	.....	10	.....	.....	2050	.....	Sternum fissum.	Nec percussio nec auscult. aliquid docuit.	.....	
.....	23	175	73.5	74.5	7.5	51	6	40	2750	3378	Suspicio phthiseos.	Pater et omnes paterni phthisi mortui.	.....
Pictor.	24	177	84	79	8	65	7	63	3250	4180	.....	.....	.....
Faber scrianiarius.	26	169	71	87	9	.....	.....	2400	4064	Tubercula calcaria.	.....	.....	
.....	26	169.5	68	85.5	10.5	65.5	6	69	3150	4029	Phthisis.	.....	.....
.....	26	176.5	78	87	7.5	66	.....	85	3400	4234	Phthisis.	.....	.....
Opifex.	27	170	73	89	8	.....	.....	3200	4145	Asthma spasmodicum.	.....	.....	
Pistor.	28	171	77.5	94	4	.....	.....	3700	4050	Post amputationem cruris dextri.	.....	.....	
Nauta.	30	161.5	76	93	7	66	10	50	3150	4403	Phthisis.	.....	.....
Tympanista.	31	177	79	92	6.5	.....	.....	4000	4477	Debilitas (ex masturbatione?)	.....	.....	

<sup>1)</sup> Morbi diagnosis ante examen, cui spirometer inservit, facia crat.

PROFESSIONE.	ETATE.	LONGITUDINE TOTIUS CORPORA.	LONGITUDINE TRUNCI.	PECTORIS CIRCUMFERENTIA.	PECTORIS MOBILITAS.	PONDUS.	MUSCULORUM BRACHII VIT.	MUSCULORUM LUMBI VIT.	CAPACITAS VITALIS.	AERIS QUANTITAS SECUNDUM FORMULAM EXHALANDAM.	MORBUS.
Sutor.	Ann.	Cm.	Cm.	Cm.	Cm.	Kilogr.	Grad.	CC.	CC.	CC.	
Fannulus.	31	177.25	84	83	8	.....	.....	3800	4517	Phthisis.	
Fannulus.	32	174	75	89	6	.....	.....	3200	4105	Post haemoptoem.	
Pictor.	34	158.5	65.5	.....	.....	55.1	8	65	1800	.....	Scoliosis.
Lignarius.	36	172	72	85	7	.....	.....	2700	3873	Phthisis.	
Pannulus.	36	167	75	86	8	.....	.....	3400	4224	Mater et sorores phthisi mortuae. Suspicio tuberculorum.	
Cocitor cerevisiae.	37	169	77	92.5	5	.....	.....	3350	4187	Vir de filii convalescens ex ischade.	
Nauta.	52	171	75	84	6	.....	.....	2150	3603	Asthma.	
Decorator.	54	185	80	95	5	78.5	7.5	48	3250	4142	Asthma.
	57	166.5	74	76	4	.....	.....	2450	3918	Emphysema.	

## Examina in feminis sanis spirometri ope instituta.

PROFESSIONE.	ETATE.	TOTUS CORPORA LONGITUDINE.	LONGITUDINE TRUNCI.	PECTORIS CIRCUMFERENTIA.	PECTORIS MOBILITAS.	PONDUS.	MUSCULORUM BRACHII VIT.	MUSCULORUM LUMBI VIT.	CAPACITAS VITALIS.	AERIS QUANTITAS SECUNDUM FORMULAM EXHALANDAM.	MORBUS.
Fannula.	8	123.5	44	54	4	.....	.....	1250	2376	87	....
Fannula.	21	158	58	.....	.....	.....	.....	30	2250	88	....
Fannula.	22	158	67.5	83	4	.....	.....	2000	3030	89	Revalescens ex febre catarrhalis.
Fannula.	23	161	71	83	5	.....	.....	3050	3306	90	
Textrix.	24	159	64.5	86	7.5	.....	.....	2650	3433	91	
Fannula.	24	147	64	78	4	.....	.....	2000	2725	92	
Fannula.	24	154	67.5	92	3.5	.....	.....	2200	3334	93	
Fannula.	24	165	.....	89	4	.....	.....	2600	....	94	Gravida, die 100. post partum 2550 spirometro inflavit.
Textrix.	24	159	69.5	.....	.....	.....	.....	2950	....	95	Die 90. post partum.
Fannula.	25	181	58.5	76.5	3.5	51	44	22	2200	96	
Fannula.	25	163.75	.....	.....	.....	.....	.....	1500	2416	97	
Fannula.	26	159	63.5	87	3.5	.....	.....	2300	2946	98	Hystericia.
Fannula.	26	162.25	.....	.....	.....	49.8	5	21	2200	99	

PROFESSIONE.	AETAS.	TOTIUS CORPORIS LONGITUDINE.	LONGITUDINE TRUNCI.	PECTORIS CIRCUMFERENTIA.	PECTORIS MOBILITAS.	PONDUS.	MUSCULORUM BRACHII VIS.	MUSCULORUM LUMBI VIS.	CAPACITAS VITALIS.	AERIS QUANTITAS SECUNDUM FORMICAM EXHALANDAM.
Rustica.	Ann. 29	Cm. 144	Cm. ....	Cm. ....	Kilog. ....	Grad. ....	Cc. 1700	Cc. ....	Gravida.	
Famula.	29	169	72	91	5	....	2800	3787	Die 90. post partum.	
.....	29	160.5	54	....	....	63.5	3½	45	2400	
Famula.	30	166	....	89.5	3	....	2600	....	Gravida, die 100. post partum	
Famula.	31	147.75	....	93.5	5	....	2300	....	2600 spirometro inflavit.	
Famula.	31	157	....	....	....	....	2400	....	Gravida, die 100. post partum	
Rustica.	32	152.5	....	....	....	....	2500	....	2250 spirometra inflavit.	
Femina infantes fovens.	32	171	73	89.5	6	....	3200	3965	Gravida, die duodecimo post partum	
.....	34	149.5	....	84	3	....	1850	....	1750 spirometro inflavit.	
.....	34	162.5	....	....	....	67	2	43	1950	
Famula.	35	157	66	79	4	....	2200	2932	Hernia et prolapsus uteri.	
.....	35	158	68.5	86	4.5	....	1850	3440	Post amputationem ovarii dext.	
.....	41	162.5	....	....	....	....	1750	....		
.....	47	155.5	70	92	4	....	2400	3503		
.....	55	160.25	....	....	....	57	4	19	1900	

*Observationes spirometri ope in feminis aegris factae.*

PROFESSIONE.	AETAS.	TOTIUS CORPORIS LONGITUDINE.	LONGITUDINE TRUNCI.	PECTORIS AMBITUS.	PECTORIS MOBILITAS.	PONDUS.	MUSCULORUM BRACHII VIS.	MUSCULORUM LUMBI VIS.	CAPACITAS VITALIS.	AERIS QUANTITAS SECUNDUM FORMICAM EXHALANDAM.	MORBUS.
Famula.	21	151	64	77	6	....	1400	2624	Asthma spasmodyicum. Post unius tractus lobel. infl. 1500. Ab hunc remedii usq; durante mense, abs timens 1450.		
.....	21	176	74.5	88	3	....	1250	3409	Phthisis, 14 dies post mortua.		
Famula.	24	143	55	76	6	....	1700	2453	Bronchitis chronica.		
Famula.	26	167.5	75	87	6.5	....	2600	3984	Haemoptoe ex congestione pulmonum.		
Famula.	34	151	....	....	....	....	2000	....	Phthisis.		

## § 3.

*Nonnullas conclusiones continens ex observationibus,  
spirometri ope factis, deductas.*

En experimenta mea. Nonnullas conclusiones ex iis deductas notare mihi liceat.

Homines robustos majorem aëris copiam quam debiles inspirare et exhalare posse, observationes meae docuerunt. De muscularum vi in hominibus examina *dynamometri REGNERIANI*<sup>1</sup> ope institui; quae illud, quod etiam ALBERS<sup>2</sup> observavit, confirmaverunt. Hoc jam a priori suspicabamur; nam sit pectoris capacitas magna, sine vi muscularum sanorum fortiorumque aër e pulmonibus expelli et in spirometrum inflari nequit.

Quod autem non suspicabamur, experimenta mea nihilominus ostenderunt, nempe capacitatem vitalem illo-

<sup>1</sup> Conf. Mémoire sur le dynamomètre de M. REGNIER membre honoraire du comité consultatif des arts et manufactures (Imprimerie de Madame BIZARD, née VALLAT LA CHAPELLE. Août 1817) ubi legimus pag. 2 : "Les degrés, ayant été exactement évalués par des poids connus, il en est résulté que tous les dynamomètres de ce genre sont comparables entre eux; quand même il y aurait quelque différence dans la force des ressorts, les divisions de l'arc seront plus ou moins rapprochées, mais les degrés auront toujours la même valeur, puis qu'ils ne sont que l'expression des poids qui ont servi à les former."

<sup>2</sup> Conf. WIENER, *Med. Wochenschrift*, d. 25 Sept. 1852.

rum gymnasticis exercitiis multam operam dantum, generaliter minorem quam normalem esse; quod non nullis exemplis indicare mihi liceat.

	CAPACITAS VITALIS.	AÉRIS QUANTITAS SEGUNDUM FORMULAM EXSPIRANDA.
A.	2450 C.C.	3515 C.C.
B.	3425 "	4238 "
C.	4253 "	4630 "
D.	3100 "	3772 "
E.	4200 "	5023 "
F.	4000 "	4347 "
G.	3350 "	3834 "
H.	3725 "	4032 "
I.	4000 "	3699 "
J.	4300 "	5179 "
L.	4200 "	4652 "
M.	4300 "	5077 "

Ex omnibus his gymnasticis unus tantummodo, I nempe, bona capacitatem vitali gaudet.

M. est athleta KROSSO, celebris maximo suo robore, qui in nundinis muscularum vi hominibus delectationem adfert. Ille RAPPONIS successor, etiam istum gladiatorem asthmate laborare, mihi narravit.

Corporis exercitationibus diutius et saepius iteratis,

pulmonium emphysema nonnunquam oriri, quod BICHAT docuit<sup>1</sup>, equidem credo. Homines enim fortiter inspirant, antequam omni brachii muscularum vi utuntur, quia, ut brachium musculo pectorali majori moveatur, pectus fixum esse debet. Ut per longum igitur tempus fixus maneat thorax, aëris quantitatem quam maximam inspiramus. Quum saepius tam fortiter et cito pulmones expandimus, et illi per aliquod tempus in tali expansione manent, vesiculae pulmonales partim elasticitatem perdunt, et inde emphysema oritur. Patruus et pater meus, viri muscularum robore noti, ambo asthmate laboraverunt.

Muscularum exercitationes ergo a multis nimis laudari, et illas exercitationes tam diu protractas saepe pulmonibus aliquando noxam afferre, supponere mihi licet.

Eadem ratione examina, saepissime spirometri ope in hominibus instituta, certo pulmonibus nocent.

Homines in positione *erecta* maximam aëris copiam inspirare et exspirare, et post coenam minorem aëris quantitatem pulmonibus continere posse, ego, ut HUTCHINSON et ALBERS, expertus sum.

*Obstructionibus intestinalibus* capacitas vitalis diminuitur, quia diaphragma, ut mihi videtur, colo transverso turgente, minus profunde descendere potest. Capacitas

<sup>1</sup> Conf. BURDACH, op. I., ubi legimus p. 430: "So bemerkte auch BICHAT dass bei heftiger Anstrengung ein Emphysem der Lungen entstehen kann."

vitalis famulis mei, ex. gr., post usum incl. Electuariorum levitivo 250 C.G. aufgebatur.

Capacitatem vitalem *morbis* diminui experimenta mea etiam ostendunt. Duce vaestumatisimo Promotoe, Clarissimo LONCO, nonnullos magros exploravit. Omnes pulmonum partiumque et pulmones circumdantia in morbi capacitati vitali inoxam afferunt, ut tuberculosis, emphysema, peripneumonia, asthma, bronchitis, scoliosis, hypertrophia, lienis et hepatis, caet. Explicare, quae de causa morbi illi, vias aeriferas magis minusve sive obstruentes sive coarctantes, capacitatem diminuant, ut mihi videtur, supervacaneum esset.

Examina in liberis parentum phthisi mortuorum, me instituta tristissima fuerunt. Paucis scilicet cum exceptionibus aeris quantitatem nimis parvam in spirometriam illi inflabant. Quod tabula sequens denotat.

AETAS	CAPACITAS	AERISQUANTITAS	
		SECUNDUM	FORMULAM EX HALANDA.
A.	12.	1650.	1944. Pater phthisi mortuus est.
B.	14.	1250.	2080. Mater phthisi mortua est.
C.	16.	2950.	3151. Mater phthisi mortua est.
D.	17.	2750.	3630. Tota familia phthisim mortuas est.
E.	17.	1600.	2665. Phthisis, Fratres et soror eodem morbo mortui sunt.
F.	21.	4100.	4925. Soror phthisi mortua est.
G.	22.	3000.	3891. Parentes phthisi mortui sunt.
H.	24.	3250.	4180. Pater et patrua phthisi sunt mortui.
I.	26.	3400.	4224. Suspicio phthiseos. Mater et sorores eodem morbo mortuae sunt.

Hi omnes, E et I exceptis, integra se valetudine gaude  
dare credunt, neque terribili se morbo propinquos esse  
scintunt. *Crasciatorem aliquam mox obvium est.*

Homines cum adhaesionibus pleuriticis non exploravi;  
illi certe quantitatem aëris minorem quam normalem  
exspiravissent, quia corum pulmones non tam profunde  
descendere nec tam lateraliter expandi potuissent; q[uo]d  
Ex observationibus ratiocinatione factis didicimus homines scro-  
phulosos, goharthrocace scrophulosa exigui laborantes,  
minoris capacitate vitali gauderes sis, illi mortis  
Observationem in homine, cum sternore fissione feci.

Haec experimenta mea docent Clr. ROKITANSKY erravisse scri-  
bentem: Was den tuberkulösen Habitus betrifft, so existirt unzweckbar  
ein Habitus, der sich durch zarte Construction der Weichgebilde,  
zumal durch mangelhafte Entwicklung des Muskelfleisches neben  
Vorwiegen des Gefässystems, besonders aber — was man gemeinhin  
in Specie der Lungentuberculose zum Grunde legt — durch eine  
sog. phthisische Constitution des Brustkorbes ausspricht. Bezuglich  
dieser ist es von dem grössten Belange, dass sie nicht — einer ge-  
wöhnlichen Meinung zufolge — auf Kleinheit der Lungen in einem  
bei unzureichender Untersuchung enge scheinenden Thorax basire,  
sondern dass derselben vielmehr ein sehr voluminoses Lungenorgan,  
in einem Thorax, der seine anscheinende Enge im Diameter an-  
komme, — gepaart mit einem entsprechend kleinen Bauchcavum  
mit kleinen abdominal-Eihgeweiden. Conf. Handbuch der pathologi-  
schen Anatome, von CARL ROKITANSKY, Med. Dr. et Prof. Wien. Bei  
TRAUMÜLLER & Seidek. 1846. T. I. S. 422.

Ille parvam aëris copiam exspirabat; quia, cum pectus expandere conabatur, duae sterni partes separabantur et partes molles ab atmosphaera premente imprimebantur; capacitas pectoris inde inspiratione non multo major reddebatur.

Non multa experimenta in feminis facere potui, et ideo de illarum capacitate vitali pauca notare possum. Aëris copia ab illis exspiranda e formula mea deduci non poterit; quia, cum illarum pectoris ambitum, infra scapulas, per lineam a media spina dorsi per mammarum papillas ad medium sternum productam, metimur, illa circumferentia, mammarum plenarum causa, major quam in viris erit.

In puella asthmate spasmodico laborante observationem feci, cuius mentionem facere volo. Usu nempe tincturae lobeliae inflatae capacitas pulmonum vitalis in illa major reddebatur; sed, quum ab hujus remedii usu abstineret, capacitas vitalis 450 decreverat.

Ut KÜCHENMEISTER, in gravidis, duce aestumatissimo praeeceptore, Clarissimo VAN GOUDOEVER, ante et post partum examina institui. Verum esse, quod KÜCHENMEISTER monuit, illa experimenta me docuerunt. Videatur tabula sequens.

	AETAS.	CAPACITAS VITALIS.	
		DURANTE GRAVIDITATE.	DIE 10 <sup>o</sup> POST PARTUM.
A.	Ann. 24.	C.C. 2600.	C.C. 2550.
B.	30.	2600.	2600.
C.	31.	2300.	2250.
D.	32.	2500.	2375.
E.	34.	1850.	1750.

Feminas illas debiles, et capacitatem vitalem minore muscularum vi diminutam fuisse, non credo. An fortasse infima pectoris pars, turgescente abdomen, expandetur et, diaphragmate inde planiore facto, pulmones magis expandi possent?

En B. L.! observationes meas cum nonnullis conclusionibus ex iis deductis. Utinam experimenta accuratiora et magis peremtoria, utinam deductiones graviores fuissent! Si experimenta Lectori non placeant, credit, me quod observavi dedisse; si conclusiones inanes illi videantur, rationem habeat virium tenuitatis et juvenilis aetatis auctoris.

---

deren der Spirometer *Wert*, kann abgeschöpft von der Tafel  
der entsprechenden Formulare der Anwendung des Spi-  
rometers auch bei dem weitausgefeinigten Geschlechte, dem  
besonderser Merkmale dieses letzteren vielleicht sogar  
ausgeschlossen ist.

**C A P U T IV.** *De cōsideratione utrūq; de cōfideratione mī-  
tis et cōfideratione, q̄at mī tū sū de mētropē tū sū  
de resūltatib; vñ hūtchinsoni a opere cōsideratione vñcōde  
DE VALORE SPIROMETRI CONCLUSIO.*

Gebedkenhaft en ons volkomen vertrouwene gezonde sepe-  
pen, omg'ht mī leegs boxini peppen, dat in allem ge-  
valle in de poogteken de wet den Spirometer vertrouwene  
Difficillimae quaestioni mī pro conclusione respon-  
dendum est: deditne HUTCHINSON spirometro magnum  
therapiae donum?

*De usu hujus instrumenti scriptores magnam HUT-  
CHINSONI laudem pro munere tribuunt, quod nonnulli ex  
iis cum stethoscopio comparare non dubitant.*

SIMON<sup>1</sup> dicit: "Alles zusammengefasst, kann man  
mit Recht behaupten, dass das Spirometer in seiner  
Anwendung eine sehr dankenswerthe Erfindung für die  
Pathologie genannt zu werden verdient, und dass der  
Werth desselben gewiss nicht überschätzt ist, wenn ich  
es für die Pflicht eines jeden Arztes halte, sich mit der  
Konstruktion und dem Gebrauche des Spirometers,  
ebenso gut bekannt zu machen, als mit dem Stethoskop,"

<sup>1</sup> Conf. op. i., p. 33.

dessen praktischer Werth, ganz abgesehen von der leichter zu erhaltenden Erlaubniss der Anwendung des Spirometers auch bei dem weiblichen Geschlechte, dem praktischen Werthe dieses letzteren vielleicht sogar nachzusetzen ist."

Doctissimus ALI COHEN<sup>1</sup> dicit: "Dit echter kunnen wij nu reeds verklaren, dat wij én aan de methode én aan de resultaten van HUTCHINSON's onderzoeken onze volle goedkeuring en ons volkomen vertrouwen gaarne schenken, omdat wij reeds gezien hebben, dat in allen gevallen in de hoofdzaken de met den Spirometer verkregene resultaten juist zijn en beantwoorden aan 't geen men er zich als Geneeskundige mede voorstelt; te weten, dat het is een nieuw natuurkundig diagnostisch hulpmiddel voor de ziekten bepaaldelijk der longen, van hoog belang en van gemakkelijke aanwending."

Clarissimus ALBERS<sup>2</sup> dicit: "Moge de aanwending der spirometrie ook bij de overige wijzen van onderzoek achterstaan, zoo is hare nuttigheid ter herkenning eener ziekte, die in het eerste tijdperk het meest voor geneeskundige hulp valbaar is, zoo onbetwijfbaar, dat men uitynder der spirometrie, HUTCHINSON, even dankbaar zal zijn, als den uitynder van het stethoscoop LAENNEC."

<sup>1</sup> Conf. diss. laud., p. 413.

<sup>2</sup> Conf. op. laud. De herkenning van ziekte, caet. p. 66.

Legimus de spirometri valore in diario, quod inscribitur: *Neue medicinisch-chirurgische Zeitung*<sup>1</sup>: "Wir tragen kein Bedenken der angedeuteten Entdeckung einen wichtigen Einfluss auf die Pathologie der Brustleiden zuzuschreiben<sup>2</sup>."

STELLWAG<sup>3</sup> dicit: "PHOEBUS stellt der Pneumometrie das Prognosticon einer ausgebreiteten Anwendung und Wichtigkeit, falls sie sich hinlänglich hoch entwickeln sollte."

Legimus in diario modo laudato<sup>4</sup>: "Es dürfte sich wohl an die Pneumometrie manche andere diagnostische Prüfungsweise anschliessen und so könnte HUTCHINSONS Untersuchungsweise der Ausgangspunkt einer ganz neuen Diagnostik werden<sup>5</sup>."

Doctissimus HÄSER dicit, secundum BESNARD<sup>6</sup>: "Die Spirometrie ist eine schätzenwerthe Bereicherung der physikalischen diagnostischen Hilfsmittel; aber sie ist

<sup>1</sup> Herausgegeben von G. LUDWIG DITTERICH, Zweiter Band, Neuer Folge, Fünfter Jahrgang. München 1847, p. 121.

<sup>2</sup> Conf. Arch. gén. de Méd., 1847, Févr.

<sup>3</sup> Conf. diss. laud., *Oesterreichische medicinische Wochenschrift*, 1848, pag. 1583.

<sup>4</sup> Conf. *Neue Med.-Chir. Zeitung*, Dritter Band, anno 1848, p. 236.

<sup>5</sup> Allg. Med. Centr.-Ztg., 1848, N°. 32 et 33.

<sup>6</sup> Conf. *Neue Med.-Chir. Zeitung*, anno 1851. N°. 42, pag. 658, et *Het Repertorium, Tijdschrift voor de geneeskunde in al haren omvang*, anno 1852, N°. 19, p. 147.

keineswegs geeignet, die sanguinischen Hoffnungen zu erfüllen, die sie bei ihren ersten enthusiastischen Lobrednern erregte. Nur bei der *akuten Miliartuberkulose* ist sie für die Diagnose von entscheidender Wichtigkeit."

HUTCHINSONIUM Spirometrum excogitavisse et Pulmonetra KENTISHIANA et HERBSTIANA (videatur hujus specimenis pag. 10) illi incognita fuisse, libenter credere volo, et igitur laudem quam maximam illi pro spirometri inventione tribuere meum est.

Instrumentum enim physiologiae utilissimum excogitavit, cuius ope multa didicimus antea nobis incognita, et quae, maxima cum probabilitate, certa habere possumus; cuius ope multa de potentissimis respirationi nocentibus discemus.

HUTCHINSONIUM igitur inventionem gravem fecisse, certo statuere audeo.

Quum autem rogatur, an multa certa, non etiam alio modo discenda de pectoris morbis, spirometrum hoc tempore nos doceat? *non multa*, respondere debeo.

Auscultatione enim et percussione omnes pectoris morbos, primo phthiseos stadio excepto, dignoscere possumus. At diagnosis tamen primi phthiseos stadii incerta spirometri usu certa non redditur.

Omnes nempe de spirometro scriptores, qui hujus instrumenti ope experimenta in hominibus fecerunt, notaverunt, non maxima cum accuratione aëris copiam, ab

homine secundum leges naturae deductas exspirandam, statui posse. Doctissimus SIMON exempli causa dicit: "Eine Abweichung von einigen 100 C.Cm. kann wohl bei noch ganz gesunden Lungen stattfinden" (p. 130). Ite homo sanus aeris copiam nonnullis centenis C.C. maiorem minorem ven quam quantitatem secundum formulas ab eo exspirandam exhalare potest.

Ponamus aliquem cum capacitatem vitali 3800 C.C., secundum formulam autem 3400 C.C. exhalare debentem. Tales casus saepissime nobis occurunt. Ille vir aegrescit. Examen in eo instituimus: 3100 C.C. exspirat, secundum formulam autem 3400 C.C. exhalare deberet, sed differentia 300 C.C. morbum non indicat, et igitur pulmones ejus sanos esse vel certe de morbosa ipsorum conditione non constare, declaremus oportet. At aeris tamen quantitatem 700 C.C. minorem quam in statu sano in spirometrum inflat.

Ex hoc exemplo dilucide patet, ut mihi videtur, HUTCHINSONIUM spirometro non dedisse, quod dare putabat, non excogitavisse instrumentum, cuius ope primum phthiseos stadium semper certe dignosci posset.

Spirometrum ad morborum diagnosin in hominibus ante morbum exploratis utile est; et ergo unusquisque, qui medico curam corporis committit, ab illo medico statim spirometri ope exploretur oportet, dum sanus est, ut scilicet initium morbi pulmonis, si quis postea eum corripiat, cito detegatur.

Nequaquam autem dubitamus quia formula mea, veritati propior illa quam hunc, multum re-  
petitis ilisque acerratis experimentis longe accuratior  
reddi possit. Quod si factum fuerit, primum fortasse  
etiam phthiseos stadium spirometrii ope dignosci poterit.  
inventum adeo pulmonum certe  
miges ap eo expirare ad parari, LAENNECIA 3800 C.C.,  
Poumons silvium cum expirante alijs 3800 C.C.,  
secundum formulam nostram 3400 C.C. expirante hepatis  
item. Tales casis sed **M**ULTUM seccitum. His in  
secesserit. Exsamen in eo inservit: 3100 C.C. ex-  
spirate, secundum formulam nostram 3400 C.C. expirante  
debet, sed differtur 300 C.C. morbi non impedit  
et digitur pulmones eius sensus esse vel certe de morte  
ipsorum conditione non ~~cooperante~~ decedunt obirent. At  
series summae distinguitur 200 C.C. minutum dum in serie  
sano in spironem iactat.

Ex hoc exemplo diligenter baste, in modo diligenter, in  
chirurgiam spironem non debesse, dico quia hinc per  
non excoquitavisse nisi tumultum, alias abe-  
bitus.

Spironem semper certe diligenter boste,  
ut medicis emisum corporis equum, ap portionem  
sue mortuum expositus sit; et ex quo unusquisque  
stetim spironem ab expositum obiret, quoniam certus  
est, ut scilicet initium mortis pulmonis, sicut postea  
enit contipit, cito perficitur.

## THESES.

### I.

Haud sine jure VIREY: "Les tempéramens ou les diversités individuelles résultent de l'état social et des modifications procurées par les diverses situations, habitudes et diètes de la civilisation."

### II.

"Weit entfernt, dass jene sociale Statistik blos Sache der Neugier oder unfruchtbare Wissenschaftlichkeit wäre, greift sie vielmehr direct in 's Leben ein; ja unser ganzer Standpunkt ist dadurch ein anderer geworden."

OESTERLEN.

### III.

Animi cultus sanitati utilissimus est.

### IV.

"Optima vivendi lex, propria cujusque natura."

TULPIUS.

### V.

In genere ad vim, quam vestimenta inepta in morbos suscitandos, protrahendos et augendos habere possunt, ut nobis videtur, non satis attenditur.

## VI.

*Corporis exercitationibus vehementibus, diutius et saepius iteratis, pulmonum emphysema nonnunquam oritur.*

## VII.

*Primum phthiseos stadium non semper spirometri ope dignosci potest.*

## VIII.

*Optima medicina saepe est exspectatio.*

## IX.

Recte LEBERT: "Malgré l'utilité bien constatée de l'iode dans les scrofules, nous ne possédons pas encore dans l'état actuel de la science, des règles fixes et des indications nettes et précises sur son emploi."

## X.

Recte Cl. DONDERS: "Terstond na het wijken der hevigste verschijnselen van pleuritis, mag aan de lijders diepe inademing worden aanbevolen, in zooverre deze niet al te pijnlijk is."

## XI.

Praecipua causa, cur pauci tantum asthmatici, epileptici, similibusque neurosibus affecti sanitati restituantur, posita est in ignorantia medicorum cum circa neurosum naturam, tum circa mutationem, quam diaetetica et pharmaceutica artis praesidia in systemate nervoso producere valent.

## XII.

Neinem verum chirurgum dicere possumus, quin artis medicae cognitione praeditus sit.

## XIII.

Febris hectica per se amputationem membra affecti non vetat.

## XIV.

In pseudarthrosi ad resectionem non consugiendum est, nisi aliae methodi frustra adhibitae sint.

## XV.

Methodus, contracturae et ancyloseos violenta extensio sanandae a Clar. LANGENBECK proposita, haud prorsus rejicienda est.

## XVI.

Blennorrhagia urethrae non est affectio syphilitica.

## XVII.

Cum STROMEIJERO facimus, de propagatione syphilitidis cōhibenda dicente: "de algemeene maatregelen moeten door den Staat verordend worden."

## XVIII.

Brephotrophia utilia sunt.

III

XIX.

Xerosis cornea causa in mutatione liquoris oculi alcalini posita esse potest. medicinae coagulatione praedictus sit.

XX.

Leprosis pectoris best se non  
kiet foetui vitam adimere.  
verber.

XI.

In besedentia si resectionem non contundendum est  
misi sive metapla? trans applicata sint

XII.

Mesogaeus contractio et ulcrosis violenta extensis  
sumusque a Chir. vnguis et lobosis, parvum protraelet  
ciculis est.

XIII.

Blepharoplastis metapla? non est affectio applicata.

XIV.

Cum strumento secundum de lobosis affectio applicata  
impedit dicente: "de sanguine metastoleum motuum  
gen strati aeroligand mortifer".

XV.

Blepharoplastis utris sunt.

ab illos si quis omnibus in secessu  
vult certe pugnare sic. Autem non sicut in

III.  
de hisq; 1000. 1000. 1000. 1000.  
Pellit hinc ut secessu

IV.  
de hisq; 1000. 1000. 1000. 1000.

In predictis et rationibus non videlicet  
non alio modis hinc videlicet.

Item de 1000. 1000. 1000. 1000.  
1000. 1000. 1000. 1000.

Item de 1000. 1000. 1000. 1000.  
1000. 1000. 1000. 1000.

Item de 1000. 1000. 1000. 1000.  
1000. 1000. 1000. 1000.

Item de 1000. 1000. 1000. 1000.  
1000. 1000. 1000. 1000.

Item de 1000. 1000. 1000. 1000.  
1000. 1000. 1000. 1000.

Item de 1000. 1000. 1000. 1000.  
1000. 1000. 1000. 1000.

Item de 1000. 1000. 1000. 1000.  
1000. 1000. 1000. 1000.

Item de 1000. 1000. 1000. 1000.  
1000. 1000. 1000. 1000.






T A B U L A,

QUA INDICATUR, QUOMODO, DATA LONGITUDINE TRUNCI ET PECTORIS CIRCUMFERENTIA,  
INVENIRI POSSIT CAPACITAS PULMONUM VITALIS.

a. m.	VITAE ANNI	36 a.	37 a.	38 a.	39 a.	40 a.	41 a.	42 a.	43 a.	44 a.	45 a.	46 a.	47 a.	48 a.	49 a.	50 a.	51 a.	52 a.	53 a.	54 a.	55 a.	56 a.	a. m.
	35 a.	34 a.	33 a.	32 a.	31 a.	30 a.	29 a.	28 a.	27 a.	26 a.	25 a.	24 a.	23 a.	22 a.	21 a.	20 a.	19 a.	18 a.	17 a.	16 a.	15 a.	14 a.	222.
3.	0.555	552	550	547	545	542	540	537	535	532	530	527	525	522	520	517	515	512	510	507	505	502	3.
3.5.	565	562	560	557	555	552	550	547	545	542	540	537	535	532	530	527	525	522	520	517	515	512	3.5.
4.	574	571	569	566	564	561	559	556	554	551	549	546	544	541	539	536	534	531	529	526	524	521	4.
4.5.	584	581	579	576	574	571	569	566	564	561	559	556	554	551	549	546	544	541	539	536	534	531	4.5.
5.	593	590	588	585	583	580	578	575	573	570	568	565	563	560	558	555	553	550	548	545	543	540	5.
5.5.	604	601	599	596	594	591	589	586	584	581	579	576	574	571	569	566	564	561	559	556	554	551	5.5.
6.	615	612	610	607	605	602	600	597	595	592	590	587	585	582	580	577	575	572	570	567	565	562	6.
6.5.	626	623	621	618	616	613	611	608	606	603	601	598	596	593	591	588	586	583	581	578	576	573	6.6.
7.	636	633	631	628	626	623	621	618	616	613	611	608	606	603	601	598	596	593	591	588	586	583	7.
7.5.	647	644	642	639	637	634	632	629	627	624	622	619	617	614	612	609	607	604	602	599	597	594	7.5.
8.	658	655	653	650	648	645	643	640	638	635	633	630	628	625	623	620	618	615	613	610	608	605	8.
8.5.	669	666	664	661	659	656	654	651	649	646	644	641	639	636	634	631	629	626	624	621	619	616	8.5.
9.	681	678	676	673	671	668	666	663	661	658	656	653	651	648	646	643	641	638	636	633	631	628	9.
9.5.	692	689	687	684	682	679	677	674	672	669	667	664	662	659	657	654	652	649	647	644	642	639	9.5.
10.	704	701	699	696	694	691	689	686	684	681	679	676	674	671	669	666	664	661	659	656	654	651	10.
10.5.	716	713	711	708	706	703	701	698	696	693	691	688	686	683	681	678	676	673	671	668	666	663	10.5.
11.	728	725	723	720	718	715	713	710	708	705	703	700	698	695	693	690	688	685	683	680	678	675	11.
11.5.	740	737	735	732	730	727	725	722	720	717	715	712	710	707	705	702	700	697	695	692	690	687	11.5.
12.	753	750	748	745	743	740	738	735	733	730	728	725	723	720	718	715	713	710	708	705	703	700	12.
	35 a. m.	36 a.	37 a.	38 a.	39 a.	40 a.	41 a.	42 a.	43 a.	44 a.	45 a.	46 a.	47 a.	48 a.	49 a.	50 a.	51 a.	52 a.	53 a.	54 a.	55 a.	56 a.	222.
	VITAE ANNI	34 a.	33 a.	32 a.	31 a.	30 a.	29 a.	28 a.	27 a.	26 a.	25 a.	24 a.	23 a.	22 a.	21 a.	20 a.	19 a.	18 a.	17 a.	16 a.	15 a.	14 a.	222.

fig. 1.

Tab. I.




J. Fabius. J.C.f.d.

B.T. van Lee lith.

Lith. v. Meijer & C°

*fig. 2.*

*Tab. II.*



*fig. 3.*

