



Dissertatio medica inauguralis de affectione hypochondriaca

<https://hdl.handle.net/1874/342126>

D I S P U T A T I O M E D I C A
I N A U G U R A L I S ,
D E

AFFECTIONE HYPOCHONDRIACA,

Q U A M ,

D I V I N A F A V E N T E G R A T I A ,

Ex auctoritate Magnifici D. Rectoris,

D. M. JOANNIS LUYTS,

Philosophiae Doctoris ; ejusdemque Facultatis in Inclytâ Academiâ

Ultrajectinâ Professoris Ordinarii ,

N E C N O N

Amplissimi Senatus Academicî consensu ; Nobilissimæque

Facultatis MEDICÆ Decreto ,

PRO GRADU DOCTORATUS ,

Summisque in MEDICINA honoribus & Privilegiis

ritè consequendis ,

Eruditorum Examini subjicit

J OHANNES BOUWER , Oppenheyemensis .

Ad diem 27. Junii horis locoque solitis.



T R A J E C T I ad R H E N U M ,

Ex Officinâ FRANCISCI HALMA , Academiæ
Typographi , clo Ioc Lxxxviii.



DISPUTATIO MEDICA
INAUGURALIS,

D C E

A F F E C T I O N E
H Y P O C H O N D R I A C A .

T H E S I S I.

Uum Hypochondria magno cum dolore
& cruciatu , nunc magis in dextro nunc
magis in sinistro latere extendantur ; &
ubi adsint intestinorum fluctuationes ,
murmura, rugitus, pulsationes, musculo-
rum abdominis , & respirationi servien-
tium spasmodicæ contractiones, acidorum,
ac austeriorum, etiam biliosorum, quan-
doque vomitus & adstricta alvus , urina
variabilis , nunc crassa turbida , nunc clara , cum cordis palpita-
tione & tremore, etiam Lypothymia vel syncope ; nec non me-
tus & tristitia , atque cardialgia ante & post paroxysmum cum
fame plerumque , pulsu tardiore , aliis melancholiæ signis adjun-
cta ; Hæc omnia *Affectio Hypochondriaca* aut *Melancholia Hypo-*
chondriaca

A 2

chon-

BOOK IV

4 D I S P U T A T I O M E D I C A

chondriaca appellari consueverunt. Videtur quod Sanguinis massa, cerebrum & supradicta viscera, &c. afficiantur.

I I.

Inter causas ut plurimum recenseri potest Melancholia, quæ functiones totius corporis deturbare potest; scilicet ubi per tristes & phantasticas cogitationes spiritus in cerebro nimium detenti, non ad inferiora ad functiones omnes peragendas, ut chylificationem, sanguificationem, circulationem &c. determinari queant.

I I I.

Diæta prava huic malo multoties præbet ansam; ubi immaturi, crudi, acidi, austeri, salsi & viscidi, ut fructus acidi & immaturi, pisces & carnes falsi &c. comeduntur, & potantur, nec non corpus quandoque frigori exponitur: Hic quoque annumeranda sunt vita ociosa & sedentaria & quoque menstrua obstructa.

I V.

Ex quibus enumeratis, succi acescentes & incrassati, in his illis ve viscerum partibus, sc. lienis mesenterii, pancreatis, glandularum intestinorum, ventriculi &c. obstrunctiones parientes, & deum, maturati, per hunc illumve motum suscitati & commoti, in intestinorum dextram, aut sinistram partem, ubi etiam acidum, pituita, corrupta bilis, chylus & pancreaticus succus reperiuntur, propulsæ ibique fermentantes, seu potius effervescentes, sic bullulas copiosissimas conficientes, fluctuationes & murmura causant & totum ventrem cum vehementiâ inflant, nervos pungunt, & paroxysmus, cum alvus adstricta sit, summpere gravatur.

V.

Prædictum verò fermentum, codem tempore ex illis partibus in sanguinem fertur, ibique tunc illius mixturam contrarietate particularum acidarum adeò deturbat, ut exinde febris cum suis consuetis Symtomatis, (ut sunt frigus, calor, pulsus celer, Lypothymia, vomitus &c.) oriatur; quæ paroxysmo cum sudore solvit, quia materia partim per intestina & vomitum, expellitur, partim per diuresin & diaphoresin foras protruditur.

VI. Cum

INNAUGURALIS

V I.

Cum vero humores illi acres ad ventriculi glandulas, & nervosam ejus substantiam propellantur, easque rodant ac pungant; ibi tunc acidorum, auferorum, viscidorum, biliosorum, &c. per convulsionem pariunt vomitum.

V II.

Palpitatio cordis etiam circa hunc affectum observatur, eaque propter turbulentam & irregularem Spirituum in cor influxum, illudque magis aut minus convellens, prout spiritus fortiori aut debiliore impetu determinentur, aut etiam majori vel minori acrie dñe aut visciditate imprægnati sint; & hinc illa palpitatio, eo magis quia externorum convulsione sanguis in istis partibus in suo motu sistitur, & propterea cor sanguinem non libere potest expellere.

V III.

Irregularis quoque spirituum influxus circa musculos respiratorios, cæterasque partes crurum brachiorumque observatur; scilicet ubi turbulentio acrioris sanguinis & spirituum motu cerebri fibrillæ nimis vehementer convulsa & tubuli magis aperti, maiorem ut oportet Spirituum copiam ad subjacentes musculos determinant, & acredine sua convulsiones & spasmos producunt.

I X.

Lypothymia & Syncope quæ in principio paroxysmi plerumque adsunt, a prædicta materia acida sanguinem adeo coagulante, ut spirituum satis magna copia pro circulatione segregari nequeant, proveniunt.

X.

Alvus adstricta ante & post paroxysmum in his ægris per quam familiaris est; quia sanguis plus debito viscidus & crassus, intestinorum glandulas propterea obstruit, & fermento deficiente fæcum alvinarum prohibetur excretio.

X I.

Urina quandoque crassa & perspicua, magis aut minus colorata, majori, aut minori hypostasi excernitur, pro ut succi magis

A 3

D I S P U T A T I O M E D I C A

gis aut minus acidi , salsi , viscidi , coagulati aut febriculosi sint.

X I I.

Metus atque tristitia hunc comitantur morbus , & vel præcesserunt & affectum procearunt , vel ex illo provenerunt . E turbulento enim sanguinis motu ab humoribus acrioribus causato , cerebri spiritus irregulariter agitantur , & sic nimis detorquentur , ita ut sinus & anguli quidam formentur in quos spiritus deturbati influunt , & inconsuetas pariunt in cerebro agitationes , de quibus anima male judicat , quia objecta ei male ob defectum organorum ostenduntur , & ea propter illa metuit & contristatur , eo magis , quia spiritus ut dictum est nimis diu in istis sinibus cohærent & remaneant , & sic quoque stultitiam inducere possunt.

X I I I.

Affectus ille Curatu difficillimus & rarissime lethalis est , & in Epilepsiam quidem mutare potest , cum nimis altas , idque inveteratione , egerit radices ; Et ubi imprægnata supervenerit , per facile abortum , paroxysmi vehementia , posset inducere , illamque postea reddere infæcundam , & etiam ut dictum memoriam læsam , stultitiam &c. adfert.

X I V.

In Causarum tum antecedentium tum præsentium cognitione , nec non in humorum aciorum & viscidorum temperatione & attenuatione , & sic functionum læsarum restituzione , idque diaphoreticis , diureticis , & acidum temperantibus , consistit cura.

X V.

Urgente in paroxysmo Syncope Spiritus salis arm. fortis sub naribus teneatur & æger suscitetur , tunc adstricta alvo a vestigio iniciatur clyster , flatus discutens ventremque laxans , ut illo aperto & laxo , & flatibus & materiæ effervescenti ut dictum , & prementi deorsum diaphragmati aperiatur via . Sequens ergo convenit formula .

R. Rad. Ennl. Camp. brionie a. 3*fl.*

Bacc. Laur. Juniper. an. 3*ijj.*

Fl. cham. melilot. an. m*j.*

Sem. cumin. anis. an. 3*ij.*

Coq. ex s. q. aq. Commun. ad 3*x.*

Colatura, adde tinct. castorei 3*ijj.*

F. Clyster.

Eodem momento oportet dari Tincturæ vitæ aut matricalis aut Tincturæ castorci, cochleare unum ac alterum, vel salis volatilis cornu cervi aut oleosi sylvii. 3*fl.* aut 3*ij.* magis aut minus prout paroxysmus urgeat, vel syncope vel Hypothymia adsint graves. Interim, premente adhuc paroxysmo, cataplasma sequens toto ventri calide ad imum usque super impositum multum opitulabitur.

R. Herb. ruta mentæ an. m*vj.*

Caryophyll. macis an. 3*fl.*

Nuc. moscat. 3*ij.* Bacc. lauri 3*ijj.*

Sem. Cummin. 3*fl.* sal. farment. 3*ij.*

Cum vini gallici s. q. f. f. a. Cataplasma, cui addatur, si applicetur sp. sal. arm. 3*fl.* vel ultra.

Hæc omnia transpirationem & sudorem promovebunt, & prædicta symptomata tollent, quia materiam prædictam foras pellunt, flatus discutiunt, & vomitum cohibere sunt valentia.

X V I.

Extra paroxysmum, necesse est, ut tollatur cacochymia & scorbutum, & deobstruantur in fœminis, si oppressi sint menses, adaptatis remediis, ut ita sanguine & humoribus bene dispositis, non tam vehemens redeat paroxysmus; &, si fieri potest, ægrum relinquare coactus sit.

Idcirco pulvsculus e salis tartari vitriolat. & vitrioli martis aliquot granis, per aliquot dies, cum vino generoso aut juscule carnis sumtus, convenit.

Porro

8 DISPUTA MEDICA IN AUG.

XVII.

Porrò Decoctum e rad. Chinæ falsæ & lign. Guajac. rud. bardan. rad. Contrayerv. Bacc. lauri Bacc. Juniper. herb. Scord. salviae &c. parari, & semel aut bis in die calide cum potu Koffee, cum admixtis quandoque antiscorbuticis succis. exhiberi potest.

Summopere etiam succi cochlear. Becabungæ, rutæ, apii, nasturtii aquatichi, trifolii. aq. &c. cum vino chalybeato, prosum; nec non Extracta Cardbened. Centaur. scordii, rutæ, absintii, gentianæ &c. cum salibus tam fixis, ut sal. tartari, armoniac. absintii, & terreis ut oss. sæpiæ oc. Can. test. ovor. &c., quam volatilibus ut cornu cervi, aliorumque cornuum, succini &c. mixta. Sudationes cum vini Spiritu vel in balneo, quia multum acidi per diaphoresin tali pacto excernitur, licet instituere.

XVIII.

Diæta exacta multum confert: Aër sit ergo purus, non nebulosus neque fætidus: sed moderate calidus. Cibi & potus non sint acidi, falsi nec viscdi; sed facilis concoctionis & bene fermentati. Super prandium & cænam quandoque maturi parum bibat vini, nec non interdiu potum Koffee cum supradictis extractis &c. Vigiliae & labores sint modici; nec non pathemata immodica fugiat omnia. Quandoque vivaciore hilarique collegio intersit

