



Disputatio medica inauguralis de diarrhoea

<https://hdl.handle.net/1874/343324>

DISPUTATIO MEDICA
INAUGURALIS,
DE

DIARRHÆA,

AUSPICE ^{QVAM} DEO OPT. MAX.
Auctoritate Magnifici D. Rectoris,

M. GERARDI de VRIES,

Philosophiæ Doctoris, ejusdemque Facultatis in Illustri
Academiâ Ultrajectinâ Professoris Ordinarii,

N E C N O N

*Amplissimi Senatus Academicus Consensu, Nobilissimaque
Facultatis MEDICÆ Decreto,*

PRO GRADU DOCTORATUS

Summisque in MEDICINA Honoribus, & Privilegiis, ritè
& legitimè consequendis,

*Eruditorum examini subjicit
TIMOTHEUS GOODWYN, ANGLUS.*

Ad diem 9. Maji, horis locoque solitis.



TRAJECTI ad RHENUM,

Ex Officinâ FRANCISCI HALMA, Academiæ
Typographi, clc Ic xcii.

Viris Dignissimis & Spectatissimis

D.D. EDMUNDŌ GOODWYN, A.M.

Patruo suo, ob continuam seriem be-
neficiorum nunquam non colendo.

D.D. JOHANNI FELTON,

Armigero, Avunculo suo, & Benefacto-
ri humanissimo semper honorando.

N E C N O N

Viro Celeberrimo & Doctissimo,

D.D. EDWARDO HULSE, M.D.

& Collegii Medicorum Londinensis
Socio, Practico fælicissimo, & in stu-
diis suis Fautori benigno.

ob summam erga se humanitatem
semper æstimando.

Hanc qualemcumque Disputationem Inauguralem:

In grati animi testimonium humillime

D. D. D.

TIMOTHEUS GOODWYN, Auctor.



DISPUTATIO MEDICA
INAUGURALIS,
DE
DIARRHÆA.

THESIS I.

Inter affectus numerosos quibus labore solet humanum genus, vix alias quispiam frequentius occurrit, quam Diarrœa; non enim tantum in Militibus aut Nautas gravissatur, quibus aëris injuriæ & mala victus ratio, huic ut & plurimis aliis affectibus ansam dat, sed etiam omnes, cujuscunque ætatis, sexus, temperamenti, aut constitutionis passim invadit; ideoque ut consuetudini hujus Illustris Academiæ satisfacerem, Diarrœam pro subjecto hujus Dissertationis mihi eligendam proposui.

II. In hujus autem morbi Historiâ tradendâ, de Etymologiâ vocis nihil dico, utpote quæ nullo modo ad ejus notitiam nos dicit, saltem in genere sic describi potest, quod sit alvi fluxus, in quo faeces alvina, humoresque varii excrementi, prater alimentum crudum, chylum, aut sanguinem, & sine intestinorum exulceratione frequentius & copiosius debito, per alcum

DISPUTATIO MEDICA

excluduntur, a glandulis & fibrillis intestinorum irritatis excitatus.

III. Veniam me impetraturum spero si in Diarrhoeæ differentias proponendo, vestigiis Antiquorum non infisterem, Illi enim in omnibus fluxibus partem aliquam mandantem supposuerunt, v. g. cerebrum, hepar, lienem &c. quæ primario ab humore aliquo morbifico obsessa, eundem tanquam sibi incongruum partibus aliis debilioribus, & in specie in hoc morbo intestinis mittere solet, hinc secundum varias has partes mandantes, varias etiam hujus affectus species constituerunt; cum autem ex lege circulationis sanguinis constat, non dari ullam corporis nostri partem quæ per vasa ejus sanguinea, ut Antiqui voluerunt, humores ad aliam partem transmittere potest, excepto Corde quod sanguinem & cum illo omnes humores circumquaque ad partes distribuit, hanc Divisionem infirmo stare tali manifestum est. Altera Divisio ab Antiquis proposita, a materia excreta petita fuit, hinc Diarrhœa, Serosa, Pituitosa, Biliosa; aut Melancholica, pro hoc aut illo humore in majori copiâ excreto appellari solebat, quoniam vero humor ille Melancholicus nihil aliud esse videtur, quam Bilis Hepatica, propter aciditatem conjunctam fixior facta, & Pituita nihil aliud est, nisi serum sanguinis in crassam & viscidam substantiam coagulatum; liceat mihi hic duas tantum, respectu humorum excretorum, species propondere, Diarrhœam sc. Serosam & Biliosam, Utræque harum vel critice vel symptomatice excitari possunt, & nunc Epidemicè, nunc Sporadicè graßiantur.

IV. His positis Symptomata quæ in duabus his speciebus accidunt, percurrere, quibus rite perpensis, partes affectas, & symptomatum rationes eruere conabor, dein signa Diagnostica quædam & Prognostica, & Curandi methodum pro more subnectam. Et primo quoad serosum alvi fluxum, hoc in antecessum monendum venit, nempe seri sanguinis eandem in hoc affectu Diathesin esse, ac in Catarrhis, in his autem vel serum insipidum & quantitate

titate solā peccat, unde Catarrhus Frigidus oritur, vel si-
mul acre est & corrosivum, aut saltē ejus fluxus à par-
ticulis acribus excitatur, & hinc Catarrhus calidus excitari
solet, eodem modo liceat mihi Diarrhæam Serosam in Fri-
gidam & Calidam distinguere.

V. Itaque in Frigidâ observare est ægros aliquando tam-
diu sine virium jacturâ, aut aliis symptomatibus molestis
hanc tolerare posse, ut tantum abest ut se morbo laborare
cogitarent, quin potius se propter hanc Diarrhæam à multis
malis præservari sperant, hoc vero rarius contingit, nam
ut plurimum post diurniorem fluxum, oriuntur lassitudines & virium defectus, ructus, flatusque varii, mur-
mura hypochondriorum, & quæ maxime ægros affligere
solent, appetitus diminutus & sitis aucta, etiam subinde
accedunt tormenta ventris, anxietates & pervigiliae; si de-
nique hic fluxus medicamentorum vim eludit & sèpius
repetitis vicibus recurrit, oritur calor hecticus, par-
tes musculosæ flaccescunt, & æger tandem marasmo
conficitur. In Calidâ autem symptomata prædicta adsunt,
sed multùm aucta, Appetitus enim omnino est prostra-
tus, & sitis maximè intensa, adeo ut eodem ardore la-
borantes, cibos solidos rejiciunt & potulenta expertunt, ac-
cedunt dolores acutissimi & tormenta ventris, nunc in te-
nuibus nunc in crassis intestinis magis molesta, hinc sedes
tam frequentes sunt ut robustos intra unum diem in maxi-
mam debilitatem, & spirituum deliquia Affectus hic redi-
git, & pingues intra paucas dies macilentos reddit, Pul-
sus celer est & exilis, Calor febrilis in toto corpore percipi-
tur, respiratio est anhela & nunc convulsiones nunc sudores
frigi, utriusque utplurimum mortis prænunciatores oriun-
tur. In Diarrhæâ Biliosa Symptomata non multum ab
istis diversa sunt, quæ in serosa calidâ nunc sunt descripta,
nisi quod rarius ad tantum gradum assurgant.

VI. In Definitione posuimus partes affectas quibus vario
modo læsis, variae fluxus species oriuntur, sc. glandulas
& fibras intestinalium, Glandulæ autem sunt illæ à Cl.

6 DISPUTATIO MEDICA

Peyero ulterius detectæ & satis accurate descriptæ. Haurum duæ sunt species, Miliares quæ in tenuibus intestini & præcipue in Ileo, in varios racemis reperiuntur, & Lenticales quæ singulatim in intestino Colo præcipue conspicuntur, Utræque sunt e genere glandularum conglomeratarum seu vasculosarum, & earum structura, ab illâ glandularum in membranâ narium cavitatem aut laryngem investiente sitarum, non differt; Humores etiam in his glandulis naturaliter secreti, lymphatici sunt & subviscidi, in Miliaribus fortasse instar salivæ, in Lenticularibus mucum intestinalem constituentes, quo fibræ intestinales ab acredine assumptorum defenduntur, eodem modo, ac membranæ supradictæ ab aëris injuriis ope humorum per proprias glandulas secretorum muniuntur. Fibræ intestinales sunt illæ à quibus motus peristalticus naturalis perficitur, de quibus hoc tantum monere liceat, quod intestina tribus tunicis consistunt, mediâ carnosis fibris donata, duabus alteris ex nervosis seu tendinous compositis, ideoque mediae tanquam tendines inservientibus.

VII. Causæ Diarrheæ variæ sunt secundum ejus diversas species, & primo Serosæ causa proxima & conjuncta, est ipsum serum sanguinis, quod vel quantitate excedens, per arterias mesentericas ad glandulas intestinales defertur, inde earum poros secretorios subito transiens, in cavitatem intestinalium copiose effunditur, illuc mole suâ fibris intestinalium nervosis molestum, spiritus ibi hospitantes irritat à quibus fibræ carneæ contractæ, spasmos excretorios solito frequentiores ineunt; in quacunque autem intestinalium regione, contractio hæc incepta est, ad reliqua intestina statim propagatur, & hæc à superiorum contentis in eorum cavitates detrusis stimulata, in spasmos etiam seriatim extantur donec alvi fæces humoresque illi excrementiū foras per alvum excluduntur. Quod si serum etiam salibus acribus & corrovis sit onustum, illa tanquam aciculæ, glandulas & fibras intestinales pungendo, & vellicando illas copiosius lympham suam expuere, has vero frequentius spar-

INAUGURALIS.

Sparmos excretorios inire faciunt. Eadem dici possunt de omnibus causis hujus affectus, quæ vel mole suâ vel acremoniâ , partibus affectis molestæ sunt.

VIII. Inquirendum est igitur quænam illa sunt quæ serum augendo , vel illud acrius reddendo Diarrheæ causæ sunt Proctarcticæ. Serosi autem humores in M. S. accumulantur à vitio digestionis , dum vel propter defectum fermenti in ventriculo , vel potulenta nimis copiose sumpta , vel alimenta crudiora ingesta , Chylificatio multum lœditur , hinc loco chyli laudabilis, liquores crudi & aquosi per vasa lactea sanguini communicantur , qui cum nullo modo apti sunt , vel sanguini assimilari , vel in nutritionem partium cedere per varias glandulas à M. S. statim separari solent , nunc per glandulas salivales , ut in morbo hypochondriaco laborantibus (qui ideo sputatores dicuntur) nunc vero per glandulas intestinales separati , Diarrheæ serosæ frigidæ ansam dant. Huic accedunt alii in rebus n. n. errores , Aer sc. humidus & nebulosus, somnus multus & quies , unde sanguis in motu suo impeditur , nec secretiones debite perficiuntur , ideoque M. S. humoribus excrementitiis serosis scatere necesse est. Serum acrius redundit Alimenta & aromata quæ sale volatili acri abundant item salita & fumo indurata , amara , liquores spirituosi , aëris æstus , corporis motus vehemens , vigiliae &c. quæ omnia vel particulas acres sanguini communicando , vel spiritus dissipando , & humores blandos salium spicula obvolventes evacuando , sanguinem & speciatim ejus partem serosam acriorem faciunt. Inter hæc sunt fructus horæi , mala dulcia , cruda , cerasa , uvæ , cucumeres , liquores etiam ex his expressi ut pomaceum &c. item cerevisia dulcis , hæc enim omnia sunt valde fermentiscibilia , ideoque cum sanguine non possunt assimilari. Sed effectus aëris præcipue notandi sunt , qui non raro particulis corrosivis & venenosis refertus , mediante respiratione cum sanguine miscetur , & hoc modo , nunc Pestis nunc Febrium malignarum , & sœpe Diarrheæ acutissimæ & Epidemicæ Author est.

3 DISPUTATIO MEDICA

est. Nec tantum vitia aeris occultiora culpanda sunt, in quibus explicandis Authores ingenia sua torserunt, sed ejus vitia manifesta, sc. subitanæ tempestatum à calore in frigus mutationes, feroſi humoris fluxum ad intestina excitant, nam ab his mutationibus poris corporis subito clausis, id quod insensibiliter exhalare solet intus retinetur, & in M. S. iterum resorbetur è quâ niſi statim eliminatur, febrem excitat; ſæpius autem evenit ut particulae illæ in sanguinem receptæ maſſam ejus ſine danno trajiciunt & nunc per renes præcipitantur, nunc in glandulas circa nares & laryngem conſitas deponuntur, unde Catarrhus, nunc denique in glandulas intestinales, unde Diarrhæa. Eodem modo frigus externum post corporis aëſtum & vehementem motum exceptum, liquores etiam frigidí pleno ore haufi, ventrem non raro subducere obſervantur.

IX. Cum Bilem augment, acrioremve reddant, omnia illa a quibus ſerum acrius fit, non est ut illa hic repetamus, tranſeamus potius ad illos morbos, à quibus Diarrhæa vel Critice vel Symptomatice excitatur. Critica autem Diarrhæa est in illis febribus in quibus materia cocta seu faeces M. S. per fermentationem separatae & quaſi præcipitatæ, per glandulas intestinales viam inveniunt. In Leucophlegmatiā quando sc. ſerum in partibus musculosis extra-vasatum & stagnans, à motu & exercitio corporis aut ab aliis causis iterum à vasis ſanguineis resorbetur, & per glandulas intestinales denuo à M. S. eliminatur. In mensium obſtructione nempe cum humores excrementitii in mensium fluxu evacuari ſolita, hâc viâ obſtructâ, per intestina alteram inveniunt. In infantibus dentitionis tempore, à ſalivâ acriori & copiosiori deglutita, & per intestina eva-cuata. Denique in Catarrhis aut Inflammationibus levibus in partibus glandulosis, materiâ sc. morbiſica ab illis in glandulas intestinales translatâ. Diarrhæa Bilioſa Critica nonnunquam ab ictero ortum ducente ab obſtructione in poro bilario, ductu cystico, aut communi excitatur, quando

quando enim tales obstrunctiones subito reseratae sunt, Bilis copiosè in intestina effunditur, a quibus confessim per alvum excluditur.

X. Symptomatica utplurimum Diarrhaea est, si accidit in febribus, dum materia est cruda, hinc enim non solum impeditur regularis fermentatio, a qua humores excrementi subigi debent, sed etiam humores sunt acriores, unde fluxus vehementiores excitantur, a quibus vires ægri maxime debilitantur; In febribus etiam ardentibus & pestilentialibus, ut & phthisi hydrope & inflammationibus magnis, saepe oritur Diarrhaea colliquativa dicta, ubi sanguis adeo acris est est ut partium solidarum pingue partem depascit, & inter circulandum secum abripit, quæ postea (sero illi pro vehiculo inserviente) per glandulas intestinales in intestina dela- ta, ab illis sub formâ pingui & oleosa per alvum excluditur. In scorbuto Diarrhaem saepe contingere: nemo mirari po- test, cum in illo affectu tota M. S. salibus acribus referta est. In his morbis aliquando materia morbifica, una cum bile in glandulis hepaticis fecernitur, & dein per ductum commu- nem in intestina effusa, Diarrhaem Biliosem nunc Criticam nunc Symptomaticam excitat, quoniam vero Serum ob sub- stantiam suam aquosam, magis aptè salibus acribus pro vehiculo inservire potest, quam Bilis quæ oleosas partes sibi ha- bet admixtas, hinc frequentiores Diarrhaes à Sero quam a Bile excitatas observare est. A Lumbricis denique Diar- rhæa solet excitari, cuius ratio ex supradiictis facile patet.

XI. Non raro autem contingit quod ubi Bilis & Serum recte se habent, & sanguinis Diathesis est satis laudabilis, Diar- rhæa acutissima excitatur, nempe à venenis sumptis aut me- dicamentis purgantibus in majori dosi exhibitis, unde Hyper- catharsis oritur, huc etiam referri possunt Mercurialia ad sa- livationem excitandam usurpata, quæ aliquando in glandu- lis intestinorum vias patentiores inveniunt. Ex levi denique causâ oritur Diarrhaea propter læsionem glandularum per humorum acrum defluxiones præcedentes, hinc earum tonus læditur, ipsæque exinde promptiores fiunt, ut frequentius &

16 DISPUTATIO MEDICA

copiosius serum vitiosum transmittant, & ob hanc causam Hic affectus sepe recurrere deprehenditur, quod idem in omnibus fluxionibus Catarrhosis observare est.

XII. Ut tandem quæ hactenus diximus ad symptomata transferamus, ubi eundem ordinem quo in symptomatis recentidis usi sumus, adhuc servabimus. Diarrhæa igitur serosa frigida in principio benigna esse solet, & verè dici potest malæ cause bonus effectus, quamvis enim melius foret, si humores serosi in M. S. non abundarent, multò tamen minorem noxam Oeconomiæ animali inferunt evacuati, quam si in M. S. retinerentur; Quod si hæc mala causa cito non auferitur, sed fluxus sit diurnior, oritur virium debilitas, propter spiritus animales unâ cum lymphâ, cum quâ conjuncti sunt, evacuatos, flatus autem varii ortum suum ducunt ex vaporibus ab effervescentiâ humorum variorum in intestinis contentorum excitatis, qui si liberum transitum inveniunt, ruetus aut strepitus, sin minus fluctuationes & murmura hypochondriorum etiam dolores tensivos producunt. Appetitus diminuitur ob maximum dispendium lymphæ per glandulas salivales aut stomachales secerni solitæ, quæ certè vel constituit vel multum confert ad ventriculi fermentum; Ex magna evacuatione lymphæ etiam sitis auctæ ratio facile peti potest; Ex hoc lymphæ dispendio denique humores in nostro corpore acriores redduntur, nam in M. S. semper Salia adfunt acria, quæ quandiu partibus aliis oleosis & mucilaginosis obvolvuntur, nullam Oeconomiæ animali noxam inferunt, quamprimum vero ex evacuatione horum humorum, salia illa extricata sunt & sui juris facta varia symptomata excitare solent, quoniam vero haec mutatio in hac specie hujus affectus tardior sit, hinc tormenta & anxietates, &c. non sunt adeo graviores, & æger marashno tandem sed sensim conficitur. In Calidâ autem ubi humores sunt multo acriores, omnia prædicta symptomata augentur, non mirum quod tormenta sint acutissima, cum ab acribus illis humoribus, mucus intestinalis qui solet intestina ab assumptorum acrimoniam defendere abraditur, hinc fibrae sunt admodum sensiles, & inspas-

spasmos frequentissimos excitatae, copiosioris humorum fluxus
Authores sunt, hinc salia acria repente sui juris facta vel in
M. S. febriles calores, vel caput potentia & nervos trajicien-
tia convulsiones in variis partibus musculosis cident. Sanguis
ob deperditionem partis sue aquosae & tenuioris crassior & vi-
scidior evadit, hinc pulsus exilis aut intermittens, respiratio
anhela & sudores frigidi deduci possunt, de quibus diutius
infistere longum foret.

XIII. Nec in signis plurimis hunc affectum dilucidando
immorari necesse est. Pauca quædam de humoribus excretis
adjiciamus. In serosa Diarrhæa humores ut plurimum in prin-
cipio sunt tenuiores & postea crassiores evadunt, hoc accidit,
vel propter poros glandularum intestinorum, qui in principio
angustiores non nisi humores tenuiores admittunt, postea
autem propter continuum humorum fluxum dilatati etiam
crassioribus viam concedunt, vel quia M. S. propter serum
copiose evacuatrum crassior est, vel quod Mucus intestina-
lis, non nisi spatio quodam temporis abradi potest & una cum
humoribus excrementiis evacuari. In Diarrhæa Biliosâ nunc
flava, nunc viridia nunc nigra etiam cernuntur excrements,
pro bilis variâ constitutione, tumidum prout acidum magis aut
minus corrosivum se huic in intestinis immiscuit. In defini-
tione posita sunt illa à quibus hic affectus a Lienteriâ, Cæliacâ
passione, & Dysenteriâ distinguitur, ideoque hic non sunt
repetenda.

XIV. De Diarrhæa serosa frigidæ, aut etiam Biliosa
Prognosi optime scriptis Celsus lib. 4. cap. 19. Uno inquit die
fluere alvum sepe pro valeridine est, aut etiam pluribus dum
febris absit & intra septimum diem conquescat, purgatur enim
corpus & quod lasurum erat utiliter effunditur, verum spatum
periculosum est, interdum enim iormina & febriculas excitat,
viresque consumit. Si repetitis vicibus saepè recurrit, ali-
quando phthisi, (vid. Morton. tractat. de Phthisi l. 1.
e. 7.) aliquando hydropi ansam dat, prout sc. salia acria
vel vesiculas pulmonales, vel vasa lymphatica erodunt, & si
simul adsit plethora Dysenteria facile producitur. Gravidæ

si supervenit, periculosa est Diarrhæa, testante *Hipp. Sect. 5.*
Aph. 34. cum enim rectum intestinum propter sedes frequen-
tiores valde stimulatur, uterus ipsi cohærens aliquando in con-
fusum trahitur, unde Abortum fieri non raro contingit. An-
tea diximus hunc affectum ophthalmiam & leucophlegma-
tiā non raro solvere ut, ex *Hipp. S. 6. A. 17. S. 7. A. 29.*
patet. Diarrhæa autem Serosa Calida semper est periculosa
ut pote quæ propter brevitatem cum magnitudine conjun-
ctam inter morbos acutissimos referri potest, majus tamen
aut minus periculum adest, prout symptomata majora aut
minora sunt. In Diarrhæā Biliosa, excrementa flava sunt
optima, deteriora viridia, sed pessimi ominis nigra, quæ ut-
plurimum mortem præ foribus adesse nunciant. In Diar-
rhæis denique symptomaticis, Prognosis est dubia, & è mor-
borum, quibus pendent, tractatione peti debet.

XV. In Curatione variæ occurunt Indicationes, ac pri-
mò in Diarrhæā serosa frigidâ seri copia minuenda est, ap-
petitus restaurandus, humorum acrimonia vel præcavenda,
vel si adsit tollenda, tonus partium affectarum labefactatus
quantum potest restituendus, & denique ad vires respiciendū
est. Serum minuitur vel pabulum ei detrahendo
(hinc sitis tolerantia, si febris non adsit, admodum condu-
cit) vel illud è corpore evacuando, 1. per Purgantia hydrago-
ga, blandiora. v. g. pulv. rad. jalap. cum rhabarb. ut
Sylv. in Prax. l. 1. c. 13. præscribit. 2. per Diuretica inter
quæ sunt Decoct. & Vin. juniperin aq. minerales sulphureæ
à Riverio laudatae item aq. minerales chalybeatæ. 3. per
Diaphoretica & Sudorifera (præcipue si à poris corporis subito
clausis affectus hic oritur) qu. sunt Pulv. è chel. 69. comp.
Lap. de Goa, Theriaca Mithridat. Diascord. & denique
Emetica aliquando in usum venire possunt ex authoritate
Hipp. S. 6. A. 15. Longa Diarrhaa laboranti, sponte super-
veniens vomitus malum solvit. Quod si sponte superveniens
effectum adeo fælicem sortitur, quid ni à medicamentis
excitatus prodebet; Ab hoc autem Ventriculus a faburrâ
humorum exrementitorum liberatur, & hinc appetitus
restau-


restaurari potest, in quem finem etiam conveniunt omnia stomachica dicta, quae sunt Plantæ amaræ & ex his Decoct. amarum in Ph. Batean. Aromata omnia quæ non sunt nimis acria & præcipue Martialis inter quæ Crocus martis tartarisatus, Syr. & Vin. chalybeat. &c. Humorum acrimoniam tollunt præter chalybeata; Puly. testacei, margaritæ sc. oc. cancr. corall. rub. ppt. &c. conf. hyacint. Emulsiones ex amygd. d. sem. papav. &c. item Decoct. lign. lentisc. & mastich. Gelatina C. C. & Decoct. C. C. C. ex quo conficitur. Decoct. alb. in Ph. Bat. Glandularum fibrarumque intestinorum tonum restituunt omnia adstringentia vulgo dicta, Talia sunt Rad. tormentil. ejusque extract. rad. bistort. fol. myrt. plantag. fl. balaust. ros. rub. cort. granati fruct. mespil. cydon. N. M. tost. mac. cinnam. Terræ omnes sigillatae, bol. armen. lap. haematit. & croc. mart. astring. & quæ acrimoniam tollunt, simulque humorum fluxum sistunt, adeoque partium tono restituendo inserviunt, nimirum Opiata ut Laud. opiat. Laud. liquid. Sydenh. Syr. è mecon. &c. & etiam Magnæ compositiones Officinales superius memoratae; Sed cavendum est ne Adstringentia & Opiata prius exhibeantur, quam materia peccans è corpore eliminetur, nam propter hunc in praxi errorem, Agyrtæ & Mulierculæ adeò frequenter ægros suos ad plures ire cogunt; Eadem cautio non est negligenda in medicamentis spiritus reficientibus exhibendis, qu. st. Mixtræ ex aq. epidem. cinnam sp. theriacal. cum aq. plantag. menth. cinnam. hordeat. mixt. talia enim medicamenta ante purgantia propinata non vires reficiunt, sed febriles calcantes excitando omnia symptomata augent.

XVI. In Diarrhæâ serosâ Calidâ purgantia debent esse leniora, ex rhabarbaro coque tosto constantia, ne igni prunas injiciamus, interim Diaphoretica & Alexipharmacæ, (si hic morbus ab effluviis venenosis aëris ortum dicit) Cardiacæ etiam temperatiora, Opiata & Adstringentia in majori dosi concedi possunt, præsertim si convulsiones adsint, ubi Opiata totam paginam absolvunt. Si febriles calores adsunt con-

14 DISPUTATIO MEDICA INAUGUR.

Venire videntur V. S. & Vesicatoria. In Diarrhæa Biliosa præter medicamenta superius memorata, convenient illa quæ Bilem attemperare dicuntur qu. sunt. Cichor. endiv. acetosa, agresta, granat. citri & ex his decocta aq. destillatae & syrapi, huc referri potest sál prunel. a R̄v. laudatus.

XVII. Externe ab Authoribus laudatur, Theriaca umbilico, aut simul etiam regioni stomachi, imposta & illita vel sola, vel cum ana bals. peruv. mixt. & gutt. aliquot. ol. destillat. mac. irrorat. Diaeta sit ex lacticinis, hordeatis, gelatinis & decoctis ex animalium extremitatibus glutinosis factis, Potus sit Decoct. alb. aut Ptisana hordeat. De Diarrhæa symptomaticæ curatione nihil dicimus, tum quod illa ad morborum a quibus pendet curationem referri debet, tum quod brevitatis limites transgredemur, si ulteriori de hac re disquisitione non supersederemus.



8

AN-



A N N E X A.

I.

S I N I T

Non datur Circulatio Bilis.

II.

Sympathia, & Amicus Æther, Antipathia, & Peregrinus Æther idem sonant.

III.

Effervescentia non datur inter Bilem & succum Pancreaticum.

IV. Me-

I V.

Medicina ab omni Philosophorum sectâ
debet esse libera , sed fortasse nunquam
est. X E M I N A

F I N I S.

Non satis Circumcisio Tunc



I

III

Ella ad ipsius non debet nisi Tunc
Invenit Pueritiam

M. VI