



# Disputatio medica inauguralis de tabe

<https://hdl.handle.net/1874/343798>

24.  
DISPUTATIO MEDICA  
INAUGURALIS,  
DE

T A B E.

QUAM  
AUSPICE DEO OPT. MAX.  
*Auctoritate Magnifici D. Rectoris,*

M. GERARDI de VRIES,

Philosophiæ Doctoris, ejusdemque Facultatis in Illustri  
Academia Ultrajectinâ Professoris Ordinarii,

NEC NON

*Amplissimi Senatus Academici Consensu, Nobilissimaque  
Facultatis MEDICÆ Decreto,*

PRO GRADU DOCTORATUS

Summisque in MEDICINA Honoribus, & Privilegiis, ritè  
& legitimè consequendis,

*Eruditorum examini subijcit*

JOHANNES FRITS, AMSTELOD-BATAV.

*Ad diem 23. Julii, horis locoque solitis.*



TRAJECTI ad RHENUM,

Ex Officinâ FRANCISCI HALMA, Academiae  
Typographi, clō Ic xcii.

*VIRO reverendo, & pietate  
conspicuo,*

**D. CORNELIO  
HEYCOOP,**

Ecclesiae Christi, quae in pa-  
go, dicto BROEK IN WA-  
TERLAND, colligitur, Pa-  
stori fidelissimo, vigilantissi-  
mo,

*Inauguralem hanc  
Disputationem*

D. D. D.

STRIJFENHUIS  
JOHANNES FRITS.

Ex Officina FRANGISCI HALMA, Aedemix  
Typographi, et Jac. xort.



DISPUTATIO MEDICA  
INAUGURALIS,  
DE  
TABE.

THESIS I.



Abes vel phthisis est exulceratio pulmonis cum marcore totius corporis conjuncta.

I I.

Dividitur in genere in humidam & siccam. Etiam a Celso in tres species: in veram phthisin seu exulcerationem pulmonis, in cachexiam ex obstructione glandularum mesenterii, & in atrophiam seu marcorem ex obstructione nervorum. Etiam dividitur tabes in incipientem & perfectam.

I I I.

Partes quæ læduntur præcipue sunt pulmo, & glandulæ lacteæ ac lymphaticæ, quæ chylum non bene distribuunt,

unt, sic ut per sedem descendat, & diarrhæa accedat, unde valde masculcit homo.

## I V.

Causa Tabis, & quidem phthiseos, est externa, & interna. Externa est disrupta vena vel arteria ex casu vel ictu, unde sanguis effunditur, qui in pulmone putrescens hunc morbum producit. Causa interna sunt destillationes acres, quæ vasa erodendo ulcus pulmonis, & dein tabem causant. Cachexiæ causa non raro est obstructio glandularum mesenterii. Atrophia etiam sæpe oritur ab obstructione nervorum, partiumque nervosarum.

## V.

Signa diagnostica sunt: in incipiente phthisi, rauco, destillationes frequentes, tussis parva, excretiones tenues, febricula lenta, inflatio abdominis, corporis emaciatio. Phthiseos perfectæ sunt, tussis magna, febris continua post partum exacerbari solita, excreationes purulentæ & fætidæ, &c. cachexiæ signa sunt extenuatio partium totius corporis, abdominis inflatio; quibus scædus corporis color, tussicula sicca, & diarrhæa non raro adfunt.

## V I.

Quoad prognosin: phthisis incipiens sæpe curatur. Phthisis inveterata, in qua excreationes sunt cruentæ & fætidæ, vix unquam curatur: si capilli defluunt, & diarrhæa accedit, mors in propinquo est.

VII.

Intentiones curativæ duæ sunt : primo acres destillationes sunt temperandæ, nec non tenues catarrhi increfandi. Secundo tussis mitiganda, ulcus pulmonum abstergendum, &c.

VIII.

Eum in finem præscribantur hæ pilulæ

℞. *Mass. pilular. de cynogloss.* ℥ss.  
*succ. liquiriti* ℥j.  
*bals. sulphuris anisat.* gr. vj.  
 f. pilula n. xij.

Sumat patiens mane & vesperi duas. Conducit etiam linctus.

℞. *Syrp. althææ fernel.* ℥ij.  
*papaver. Rhead.* ℥j.  
*flor. sulphuris* ℥j.  
*bezoar. mineral.* gr. vj.  
*M. F. linctus.*

Utatur quoque patiens hoc decocto.

℞. *Rad. sals.* ℥ij.  
*china* ℥ss.  
*althææ.*  
*liquiritiæ.* aa. ℥ss.  
*Herb. malv.*  
*tussilaginis* aa. Miß.  
*passular. mundatar.* ℥iiij.

*Coq. S. A. in aq. communi ad ℥iv.*

Cæterum nec venæ sectio hic locum habet, nec purgatio. Si tamen alvus nimium adstricta sit, sumat patiens cum Jusculo ℥ss. vel ℥j. mannæ calabrinæ.

## I X.

Si cachexia sit causa tabis, obstructions sunt aperienda, & lymphæ crassæ attenuandæ, & educendæ. In quem finem conducit decoctum, & vinum medicatum.

℞. Rad. quinq. aperienti.

gramin. aa. ℥j.

herb. scolopendr.

agrimon. aa. Mis.

cort. cappar.

tamarisc. aa. ℥b.

F. decoct. in aq. comm. ad ℥iij.

col. adde.

spirit. salis ammonia. ac ℥j.

cochlear. ℥ij.

Misceant.

℞. Rad. calam. aromatic.

helen. aa. ℥ij.

sem. siler. montan.

anis.

fœnicul. aa. ℥j.

herb. chamædr.

cupator. aa. Mj.

limat. chalyb. in nodulo

ligat. ℥j.

F. ex his sacculus.

Suspendendus in vini albi gallic.

℥iij.

De hoc vino sumat patiens bis in die cyathum.

Etiam conducit in prandio & cœna cum haustu vini sumere elixir proprietatis, vel sal volatile oleosum aromaticum.

## X.

In diæta fugiantur omnia acra & salsa, utatur patiens Jusculis, lacticiis, ovis sorbilibus, & similibus alimentis, quæ sunt boni succi & facilis degeſtionis. alvus modice laxa ſervetur. Fugiantur animi pathemata.

## VI

## COROLLARIA.

## I.

*In phthiſi incipiente vena-ſectio quando-que conducit.*

## II.

*Effentia febris conſiſtit in perturbata ſanguinis mixtura.*

## III.



Ejus signum pathognomonicum est, pul-  
sus prater naturam frequentior.

I V.

Extirpatio partis emortuae facienda est  
semper in parte viva.



I I

III