



Disputatio medica inauguralis de angina

<https://hdl.handle.net/1874/347254>

41.

DISPUTATIO MEDICA
INAUGURALIS,
DE
A N G I N A,

QVAM,
DIVINO FAVENTE NUMINE,
Ex auctoritate Magnifici D. Rectoris,
D. HERMANNI van HALEN,
S.S. Theologiæ Doctoris, ejusdemque Facultatis in inclytâ Academia
Ultrajectina Professoris Ordinarii, Verbiq[ue] Divini ibidem in
Ecclesia Praeconis,

NEC NON
Amplissimi Senatus Academicorum consensu, Nobilissimeque
Facultatis MEDICÆ Decreto,
PRO GRADU DOCTORATUS
Summisque in MEDICINA Honoribus & Privilegiis
rite & legitimè consequendis,
Eruditorum examini submitit

CORNELIUS VERMEER, Ultraject.
Ad diem 2. Decembris, hora locoque solitis.



TRAJECTI ad RHENUM,
Ex Officina FRANCISCI HALMA, Academiæ
Typographi, clo lcc LXXXIX.



Venerando PARENTI,

JUSTO VERMEER,

Reipub. Trajectinæ olim Se-
natori, Redituum ex teloniis
Illustr. ac Præpot. D. D. Or-
dinum hujus Provinciæ Quæ-
stori, Ecclesiæ Seniori,

*Hoc Exercitium Inaugurale, quā par
eft obſervantia, dicat*

Devinctissimus Filius

CORNELIUS VERMEER,

Auct. & Resp.



DISPUTATIO MEDICA
INAUGURALIS,
DE
ANGINA.

THESSIS I.



Nter affectus miseros mortales indies graviter affligen-
tes haud infimum locum
tenet dirus ille morbus,
ANGINA; cuius no-
men Latinis ab angendo,
Græcis δύσθονα laqueo, est. Verum
denominatio hæc nunc strictius nunc laxius

4 DISPUTATIO MEDICA

à Medicis sumitur. Latè sumpta Anginæ vox donotat omnem Faucium inflammationem & Affectionem, qua respirandi & deglutiendi potestas impeditur.

I I.

Igitur Angina est *Inflammatio Faucium, Gulæ, Gutturisquæ*. Puta Laryngis, Faucium seu Pharyngis, vicinarumque partium musculorum : quales sunt, Sternothyroidei, Hyothyroidei, Thyrocricoidei, Cricoarythænoidei cum laterales, tum postici, Thyroarythænoidei, Arythænoidei, Epiglottidis Musculi, Musculus Oesophageus, & plures alii cum ad Gulam, tum ad Os Hyoidis spectantes.

I I I.

Cæterum in veram seu legitimam, & spurciam seu notham Angina dividi solet. Atquæ vera nuncupatur, quæ est dictorum muscu-

INAUGURALIS.

musculorum summa intumescientia, nata à fanguine inter fibras eorum motrices extravasato, nec non inflammato. Spuria dicitur, quæ ab humore seroso è delabente, hinc vehementer musculos inflante ac distentente, originem dicit.

I. V.

Vera insuper Angina in quatuor species ab hodiernis Medicis dividitur, pro affectæ partis ratione. Quarum prima *angina*, altera *angina*, tercia *angina* quarta *angina* appellari consuevit. Per *angulæ* internorum Laryngis musculorum (quales sunt Cricothyreoidei, Thryoarythyreidoidei, Arythyreidoidei, nec non Epiglottidis) inflammationem denotari volunt: quemadmodum & internorum Pharyngis musculorum inflammationem *angulæ* dicunt. Quum inflammat Gutturis musculi externi, (puta Sternothyreidoidei, Hyothyreidoidei, Sternohyoidei,

A. 3

alii-

6 DISPUTATIO MEDICA

aliique vicini) ἀσύνετον ipfis est: at συνάντησιν, cum externi Gulæ musculi pariter afficiuntur. Hanc tamen curiosam nimis divisionem minimè admittimus, cum ne peritissimus quidem exactè distinguere queat, quinam præcisè musculi circa fauces afficiantur; præsertim quum rectæ rationi repugnare videtur, vicinas hafce partes non similiter laborare.

V.

Spuriæ seu nothæ species dicuntur duæ. Harum prima producitur ab humore pituitoso vel seroso delabente in partes nunc dictas. Altera provenire à luxatione vertebræ colli dicitur. Sed quia scopus est, explicare veram tantum Anginam, his non inhærebo.

V I.

Causæ Anginæ sunt vel internæ vel externæ.

A IN AUGURALIS.

7

næ. Interna hujus affectus causa, copiosior est fervidi sanguinis per arterias (quæ oriuntur à majori ramo arteriæ Carotidis) in dictas partes affluxus, quam per venas (à jugularis internæ ramo) refluxus; unde ejusdem cruoris stagnatio, hinc & extravasatio, inflammatio, atque adeò dictorum musculorum summa oritur distensio, nec non Gutturis Gulævè constrictio. Adhæc ad internas anginæ causas referri possunt morbi præcedentes, Febres continuæ, ardentæ, epidemicæ; uti hoc observatum fuit anno 1517. teste Foresto *Libr. 6. Observ. 2.*

V I I.

Causæ vero externæ ab auctoribus comprehenduntur sub nomine sex rerum nonnaturalium: inter quas meritò primas tenet aér externus frigidior, vel calidiori gradu excellens, constitutio aquilonaris, & omnis subita aëris mutatio, imbres assidui, Hipp. Aphor. 16. Sect. 4. & maligna aëris constitu-

tio.

8 DISPUTATIO MEDICA

tio. Excretiones Hæmorrhoidum, ac menstruorum suppressæ. Immodicum corporis exercitium. Et plura alia, quæ in casibus specialibus determinari possunt & debent.

V I I I.

Signa Diagnostica Anginæ sunt, respiratione impedita & suffocationi proxima, febris continua, deglutitionis modo major modo minor læsio, ita ut sæpè assumpta per os iterum per nares rejiciantur. Acutus faucium dolor, sitis magna, pectoris & cordis ardor, vox modo nulla, modo parva, tumor nunc manifestus, nunc nullus, anhelatio, & plura alia hic propter brevitatem, quam intendo, non enarrata.

I X.

Quoad Prognosin: inter periculosissimos

INAUGURALIS.

mos morbos Angina profectò recenseri debet , quia admodum subitò quandoquè hominem è medio tollit. Etenim acutissimus est affectus , qui non raro eodem , vel secundo , vel tertio die Ægrum jugulat.

X.

Ut autem curetur gravissimus hicce affectus , mox Vena fecetur , ad revellen- dum , in pede ; vel , ad avertendam & eva- cuandam copiam sanguinis nimiam , in brachio , ut sic depletis vasis iterum in venas recipi ac amandari queat extravasatus sanguis. Quæ venæ sectio est iteranda , reiterandaque , quamdiu vires ferunt. In venæ sectione namque præcipua salutis spes consistit. Hinc vulnusculum venæ inflatum ne protinus consolidetur ; quin potius apertum aliquamdiu servetur , splenio oleo imbuto imposito.

B

XI.

10 DISPUTATIO MEDICA

X I.

Derivatoria venæ sectio etiam eodem die instituatur, venâ sectâ raninâ : qua sanguis in partem ægram fluens educitur, nec non effusus ibidemque stagnans cror, ipsissima inflammationis causa, evacuetur. Hæc vero venæ sub lingua sectio ut fiat in hoc morbo, suadent nonnulli ut circa collum mappa leviter constringatur, ut venæ istæ intumescant : sed perperam, quoniam in angina hæc vasa (ob stagnantem in faucium musculis sanguinem) præter modum vehementer satis tument ac distenduntur. Insuper cucurbitulæ, cum multa flamma & altis scarificationibus, scapulis ac dorso admotæ sanguinem ex affecta parte multum derivare possunt.

X I I.

Institutâ identidem venæsectione, Clyster

INAUGURALIS.

xi

ster injiciatur, ex Decocto Emolliente additio
Electuariis Benedicto Laxativo & Hiera Pi-
cra, nec non Sale communi, vel Trochiscis
Alhandal, qui & iterandus est, & reite-
randus. Interim ne omittantur Gargaris-
mata, & Cataplasmata, resolventia, emol-
lientia, ac tandem suppurantia, ex Mal-
va, Althaea, Veronica, Thymo, Hyssopo,
Salvia, Floribus Meliloti, Sambuci, Rosa-
rum Rubrarum, Nido Hirundinis, Albo Græ-
co, Semine Sinapi, Sale Prunellæ, &c. Nec
non Linimenta, ex Unguento Martiato,
Althææ composito, Oleo Liliorum, Anethino,
&c. Riverius commendat in ore retinere
Cassiam recenter extractam.

X I I I.

Hicce si Inflammatio non resolvatur, ve-
rum potius suppuretur, abscessus, si non
brevi disruptur, aperiatur scalpello; hinc
ulcus mundificetur Gargarismate ex Hordeo

B. 2

Mun-

Mundato, Malva, Bismalva, Floribus Camomillæ, Liquiritia, Caricis, in Aqua decoctis, addito colaturæ Melle Rosaceo. Ast verò suffocatio si metuatur, anceps potius instituatur remedium quam nullum, & Laryngotomia (alii Bronchotomiam dici malunt) instituatur, ut pertusâ inter annulos tracheâ, tubuloque immisso, Æger spiritum ducere queat, usque dum, inflammatione vel resolutâ vel in abscessum mutatâ, Patiens curatus sit. De hac videantur Aquapendens in Oper. Cheirurgicis. Julius caslerius Placentinus de Vocis Organis, Cl. van Horne in Microtechnie. C. van Solingen in de Manuale Operationen. Diætam tenuissimam esse debere morbi natura & partes affectæ abundè evincunt, quare de illa aliquid addere supersedeo.

F I N I S.

C O.



COROLLARIA.

I.

Febris rectè definitur, perturbata sanguinis mixtura, pulsum præter naturam frequentiorem producens.

II.

Mulieri gravidae venæctionem instituere licet.

III.


In Variolis & Morbillis V. S. instituatur
ante

ante macularum eruptionem , si atas
& reliqua ferant.

I V.

*In statu naturali , ventriculi fermentum
acidum esse negamus.*

F I N I S.



LIBERIA,

D. HERMAN VAN HALEN,
Ex Physico Doctore, Mathematico Facultatis in Indycia Academiæ
Orientalis Professor, Consul, Virisque Divini Insti in
Ecclesiæ Consul.

M. I. C. R. O. N.
Sedis Academicae Indyciae, Protagonist
Iacobus PETRIUS DEAN,
Academiæ Indyciae Professor
GOMERUS VAN DER AALST, Antfcl.
Academiæ Indyciae, Consul

TRAJECTI ORBENUM,
Ex Officina FRANCISCI HALMA, Academiz
Typographi, ob Ic Lxxv.

ante quatuor et duos annos
et regnorum eius

IV. 15.

Expositio in libro de Genesi
de origine humana

PLATON

