



# Collectanea medica

<https://hdl.handle.net/1874/347834>

ПАФОЛ:

В

. 4. I.

<u>L.</u>	<i>Hieracaria.</i>	<u>T.</u>	<i>Vulgaria.</i>	<u>B.</u>	<i>Sentil:</i> Farentia.
<u>A.</u>	<i>Tab: inst: mil.</i>	<u>S.</u>	<i>Stockeius.</i>	<u>C.</u>	<i>Scoutl:</i> Faustris.
<u>B.</u>	<i>Melior: digna.</i>	<u>V.</u>	<i>Val: Cerdus.</i>	<u>D.</u>	<i>Dodonai praxis.</i>
<u>C.</u>	<i>Empirica.</i>	<u>X.</u>	<i>Vasignana.</i>	<u>R.</u>	<i>Dodonai Herbar:</i>
<u>D.</u>	<i>Medic: comp:</i>	<u>M.</u>	<i>Montaguana.</i>	<u>E.</u>	<i>Lapb: in eind.</i>
<u>E.</u>	<i>Actuosa: facult.</i>	<u>M.</u>	<i>Montanus.</i>	<u>G.</u>	<i>Cato Sebottet.</i>
<u>F.</u>	<i>Florat: 12 morb: Capitis.</i>	<u>HM.</u>	<i>Mercurialis.</i>	<u>H.</u>	<i>Amatus susit:</i>
<u>G.</u>	<i>Schweid: de morb: Pedem.</i>	<u>P.</u>	<i>Forstis.</i>	<u>I.</u>	<i>Kondelcius.</i>
<u>H.</u>	<i>Exceptio ex forsto.</i>	<u>Br.</u>	<i>Bruew.</i>	<u>J.</u>	<i>J. Heinrichs.</i>
<u>I.</u>	<i>Alpinaria puma.</i>	<u>G.</u>	<i>Guaiantrijs.</i>	<u>K.</u>	<i>J. Heinrichs.</i>
<u>J.</u>	<i>Receptio ex mij felue.</i>	<u>P.</u>	<i>Gordonius.</i>	<u>L.</u>	<i>Hollezius.</i>
<u>K.</u>	<i>Receptio ex mellitus.</i>	<u>PP.P.</u>	<i>Gatinaria.</i>	<u>M.</u>	<i>P. Bayri enbini:</i>
<u>L.</u>	<i>Receptio ex mellitus.</i>	<u>w.</u>	<i>Pernumia.</i>		<i>J. Kulan: metb:</i>
		<u>B.</u>	<i>Pereca.</i>		<i>Mart: Kulanus:</i>
		<u>P.</u>	<i>Piso.</i>		
		<u>B.</u>	<i>Begnini Tyrocin.</i>		
		<u>M.</u>	<i>Mart: Kulanus.</i>		

Aevum recent.


Scripta varii arg.

N° 401

Act. VII. pl. E.  
N° 23

Sen: Inst:  
sen: f.  
Sen: d.  
Sen: sc.

Firm.



Diligence Dessoense. // Cn: Bootij Utterpeet:  
elz. 12. c. xxviii.


..... Sat: ... — ciacum silit, agmine facto,  
Morborum omni genus; quorum si nomina p̄xas,  
Promptius expediam quod emaverit Hippia moebos.


// Sentei ep: xxxv. ~~ad bellum~~  
Innumerabiles morbos esti' miseras?  
coquos minera.





var 401 2


Hs.  
7 E 23








































3.

# MORBORUM OMNIUM

tam Externorum quam Internorum  
Series: ac descriptio brevis et methodica  
secundum partium affectuum ac ordinum.  
ordinum ac connexorum.

Particularis Affectus, seu certam aliquam corporis  
partem occupantes sunt vel

Interiores, qui sub cuto exteriori habentes ad  
internas partes magis tendunt, internaque  
causam potissimum habent. Suntque vel

Capitis.	II.	I.	LIB:
Fauicinum.	39.		
Thoracis.	41.	II.	
Ventris.	50.	III.	
Habitus corporis.	73.	IV.	

Exteriores sunt vel

Deformitates.	78.	V.	LIB:
Extuberantia.	79.	VI.	
Continui solutiones.	92.	VII.	

II Capitis affectus vel sunt

Partis principis. v. Cerebri, et quæ vel ejus  
Membranarum, quales sunt

Hydrocephalon, agnoscis capitis tumor  
(ptosis frequens) haerentia mala aqua  
sa, interdum & facillenta, aut præco  
sanguine mista vel

Inter cætem & Pericranium.

Inter Pericranium & Cranium.

Inter Cranium & Meninge

Inter Meninge

quod postremum malum incurabile.

Dolor Capitis, qui est tristis sensus membra  
narum Capitis vel Cerebri. estq  
Insolitus, qualis propriæ Cephalalgia  
dicunt, Antibus soda.

Consuetus, seu inventeratus ac leni  
de causa revertens. estq vel  
Cephalæa, universum caput, seu  
majorem ejus partem obsidens.  
Orum seu Galea barbaræ.

Hemicrania, alterutram capitis  
partem pressum ejus quæque party  
obsidens. Unde &

Substantia. II Homonopagia & Clavis.  
Meatuum ac ductuum. 14.

Partium minus principaliūm, oculorum. — 20.  
Aurum. — 31.  
Narium. — 39.  
Oris. — 35.

// Substantiae Cerebri affectus sunt vel

Functionum mentis, & vel

Inubecillitas (cuius tamen causas occurrat ostendit Art: 153.)

Menti est, cum quis apprehensione seu ingenio, iudicio seu ratione & memoria minus quam bono ingeniosus aut industrius pollet. Ejus species,

Hebetudo mentis, cum sensus interni omnes simili debetantur, & tam ingenium, & iudicium & memoria deficitur.

Tarditas ingenij, cum aegre aliquis loqui possit, & litteras aliasq; artes difficulter apprehendit.

Defectus iudicij, cum quis destitutus iudicio, in rebus, quas apprehendit, disjudicandis.

Oblivio, quando apprehensa sunt iudicatae & recordatae difficulter retinentur.

Alienatio seu Hallucinatio Mentis, paragegenury, est quando ea quae non sunt, aessent, vel quae sunt similes ac propter rationem singuntur, iudicantes ac memorantes, idq; vel simul vel separatim; sive hoc cogitatione sola fiat, sive idem dictis factisq; exprimatur. Est autem vel

Sine febre. //

Cum febre. 10.

Somni. //

6.

// Sint febrō si quā mentis alienatio sit, vel est  
154. Stūttitia, cūjus III species numerantur,

I. a nativitate in ipsa infantia quoq; pspicit, cum Stūttitia indicia gesticulando, tractit reliquoq; infantium consuetudinē edunt, neq; facilē puer obtemperat, aut docilis est, ita ut sapo neq; logūi discat, ionē geq; minūs alia industria alicuius munia obire.

II. in ijs videt, qā licet omnes reliquias vita alti-  
onts recte obeat, & in quādam p; cateris sīnō  
qūlauo quid p̄stare possit, ingenioq; exulte-  
cant, atq; artū aliqua excellant: Stūttitia  
tamen hīc p̄dicit, quod se laudari lie-  
benter audiārūt: et sī ludicas narrant  
aguntq;. Atq; hīc Magistris horum dñi  
gustūtūne delectant: eosq; ob phantasmata  
diversa ipsis eucurrentia Phantasticos vocant.

155.

III. Stūttitia species hac p̄sor in ijs patit, qū  
gestib; nūq; ac varijs sociis Stūttitia  
(vñnt) alios exerhent: & quib; alii vitia  
non omnib; accepta, easq; gravia sapo in se  
habent; qūo p̄ ipsoq; variā natūra,  
mīra sīa, nūne māzore, nūne fōrone,  
nūne alio q̄horis modo proferunt.

Temulentia, quā varijs si qāq; affectib; &  
effectis p̄udit, discursis vaporib; maximo  
quidem somni interventū, cessat & iterata saepius  
ac continua, Trenorū, Paralysim, Podagra, &  
Hydropeūm aliosq; morbos inducit.

Animi commotio. //

Melancholia. O.

Mania. A. g.

157. // Animi commotio vehementis & persistens mentem  
 ad eum depravat, ut multa a ratio aliena vel agat, vel  
 cogitat. Est quod vel

Gaudium fatuum, quo elati multa prosperitatem & in-  
 solita dicunt, & gestuendo obseruantur, ut ridendo pro-  
 gaudio lachrymantis.

158. Ira cum furore, quia perireti faciunt, & praecepites  
 post habitis turbis periculis, modo se relaxant,  
 flentis.

Terror et metus gravis maximus ex improviso accidente,  
 quod in dispositis in Melancholicam rerum  
 eamque gravissimam facile transit.

159. Tristitia vel dolor, vehemens dintus persistentes, ac  
 spiritus perturbans facilius Melancholicam generat.

Amor immoderatus, seu portinax. Eroticus furor de-  
 us quod affectus compositus est omnibus religuis  
 animi affectionibus, cum non habeat, nunc  
 Tristitia, nunc Ira effectus in eo elucescens,  
 nihilque taliter affectus inconstans sit.  
 Actiones diuinae corrumpunt, sensus instabilis,  
 corporis seruosum mutat, & faciliter Melan-  
 cholia contigitur, ant ~~magis~~ desperatio accedit.

O.

6. — Melancholia est mentis alienatio seu desipientia,  
in qua imaginatio et iudicium ita pervertuntur,  
ut simus aliqua causa admodum tristes aut metuant.  
estq; ratione humoris, vel vaporis eam inducentis  
duplex.

160.

Primaria, in qua Cerebrum primario seu peculiari  
sue totius corporis vitio affectu: sanguine  
existente Melancholico, et maligna qualiter  
ac venenata qualitate praedito. Ergo esse  
mentior vel gravior, prout a parte principi  
Melancholici humor situs sed distat.  
Genera suijs desipientiae varia, sed ad IV potissimum  
referantur.

161.


- I. Qui de salute eterna desperant, blasphemie erga Deum sunt, et horrida quis  
perpetrant. Atq; haec Melancholici graviori:
- II. Qui mortis terrore et metu potissimum  
ruxantur, dum se in mala gratia et qd  
principium, ob aliquod delictum omissionem  
ad supplicia regule falso imaginant.
- III. Qui nrgis quibusdam animo concepsit et  
infringens falso se ipso decipiunt.
- IV. Qui desiderat taciturni sunt, et vel  
Hannum consertia fugiunt, dicunt  
tunc procurpatorum.

Suam exori tenebras, Sylvas, Ante,  
et tenebras petunt: qualis Men-  
tis melancholia lupina, aliq; auxerpaonia.

Hypocondriaca seu Flatulentia Melancholia est,  
q; sinistri hypochondri posticuum Sympathica  
constatuit. Quoties n. inde seu vena portu-  
ramis vapor venenatis mentisq; perniciosus  
a intento nostra melancholica, venenata, et  
maligna ad cerebrum fertur; toties per inter-  
nata hoc malum accedit. In hac quoq;  
et minima q; in primaria Genera desipientiae varia.

Lycanthropia, Rabbi: Chatrab, vel Catabib.  
Lycanthrophi, Wölfe-wolwazi.

Cynanthrophia, Canina insania est, cum ira permixta est  
et stupido, et inquisitione corampta, cum rixa ex  
nraa contum.



City - Name -

92

49  
B  
zia.

62.

Maria, sed Fitzor, vel Insania, Melancholia  
 mām deliramenta quidem imitata; sed iracundia  
 jūrgys, clamoribus, horrendo aspectu, multo deniq̄  
 majore corporis impetu & mentis prolationem labo-  
 rantes exercet & impellit, ut interdum quasi foro  
 & immunes bellum in obvios, dentibus, linguis  
 & pugnis insitata rabie ferociter invadant.

163.

Obsessio Damoniaca est, cūm homo a spiritu maligno  
 obsecratus, & prater mania Symptoma, plerique  
 naturalia sapientia horrenda & stupenda effectu pro-  
 dicunt

Hydrocephalia, quā mania species est, cūm ab ani-  
 mali rabido demersi, in eandem rabiem, q̄ta  
 animal vexabat, incidunt, splendentia &  
 lucida fugientes, imprimitur agitam motilentes,  
 & ad eis intuitum trementes.

Saltus Viti est horridus & admirandus, sed rachis affectus  
 in quo furor q̄dam insano p̄fici appetitu  
 adeo inordinato ad salationem ferunt, ut contin-  
 uo dies noctesq̄b & ad aliquot etiam septima-  
 nas cūm alijs torpidiaco gestiant: atq̄b interim  
 exdum fatigentur, sed mino recreant, & eo-  
 ficiant: ac nisi id faciant, summopere laddant.

<sup>164.</sup> Cūm Febr<sup>o</sup> desipientia est, in qua eque mens ac in  
mania, (plus tamen numeris propter gravis est affe-  
ctus,) abalienata, nunc placides cum risu & jocis  
ac māgīs lascivientes; nūc iratos, cum iugis da-  
more, blasphemis fūcentes, & ludendo cūpientes  
agres reddentes. Estq; vel

Phrenitis (q; & Syria sis dicit, si phrenis accidat.)  
q; a proprio cerebri affectu pata inflammati-  
vum aut erysipelatum orta conitentur, vel  
subsequuntur febrem habent. Rarosq; contigit.

165.

Paraphtenitis vero seu Delirium nū statim cum  
febre exoritur, sed postea supervenit, cali-  
do in Cerebrū humorē vel vapore sublatu-

g. Somnus peccat vel in

Quantitate, et est vel

Exsuperatus. Somnus dupliciter consideratur, vel  
Sine manifesto morbo, Somnus immoditus dictus,  
et est vel

Inclinatio minima ad somnum: cum non  
tantum nocte somno dictiss induit  
gentes, manu tardius surgaunt: sed et  
interdiu, praecepsini max a sompno  
cibo, maximeq; tempore vel luce  
calido impellentz ad dormiendi necessi-  
tatem.

Somnius profundus est, a quo non facile  
excitari possunt, quicq; nonnunquam  
post vires potum in ebrys, vel sumptu-  
alida narcoticum obcepit.

Cum manifesto morbo. //

Deficiens. 13.

Qualitate. 13.

12.

167. // Somnus s<sup>r</sup> dum manifesto morbo exp̄sperat Sopor diuī.

est̄ vel.

Solitarius, qui Sopor gravis, seu Caros, seu Coma,<sup>3</sup>  
seu Veterans, seu Sibets vocantur. Cum sit  
in nāali somno oculi quādēm clauduntur corporis  
prosterni, sed tamē sensus relati oberti  
plus minūsque torquent; adeo ut res illa nū  
quām excitari possint, & expergefacti do-<sup>12</sup>  
mille dolore conqueuantur, nisi quod caput  
grave & ponderosum sit, moxq̄ iterum obi-  
dormiant.

168.

Comitatis Sopor est dum manifestiori morbo, & adē vel.  
Cum Febris comitatis Sopor est Letargus,  
in quo non tantum soporis gravis, seu  
& lenta febris indicia & symptomata  
adūnt.

Cūm Delirio, vel est

Catalepsia est Sopor, in quo licet maxima  
ad somnum proponso & decubuisse ac  
oculis clausis se exprimant, nū bilowing  
vigilant, illasq; varia uram obversant  
imaginis & spectra: vel si dormient  
insomniis varijs vel horrendis divertantur:  
impulsi agri oculos attollunt, tangunt,  
temp̄ despicunt, & licet sentiant moni-  
mentūq; tamen e lecto surgunt, &  
vigilantesq; op̄ra exercunt ne queant.  
Nominant alij Coma agrypnium (x  
in somno) Typhomania, Sopor delirans,  
Sopor gravis dum insomniis horribilis,  
Ectasis.

169.

Sopor demoniacus est Sopor sagittum,  
in quo se p̄tr aerem ferri, Martis  
victor, obcas dācere, & dum  
demonē congregati pulsant: ac vigi-  
lantes in eodem errore permanent.

Cūm Stupor Sopor est, in quo ut Stupor  
ris & Soporis indicia & symptomata con-  
spicuntur.

170. 13.  
Deficiens somnus, seu Vigiliae nimiae sunt, quando  
aut somniis non dormiunt, p<sup>r</sup> aliquot dies, aut mensis,  
non sufficiunt p<sup>r</sup>ter dormiunt, & terminum sibi in  
uel oto boranum p<sup>r</sup>krinum p<sup>r</sup>o natare huius  
consuetudine non adimplent.

171.  
Somnis qualitate fecerat, cūm molestus erit vel  
Insonnijs, cūm in ipso p<sup>r</sup> somnum sensus externi  
tantum quiescere rident, interni vero multum  
a si vigilarent excent, statim et immoderata-  
grasia.

172.  
Otabulatione, ut cūm dormientes e lecto surgant, vigi-  
lantium opera, ysq<sup>b</sup> major extrent, tertia con-  
scendentis, per tristes & adim lacunaria obtabulans,  
multaq<sup>b</sup> alia negotia finem et expedientis.

Stertoris, cūm nazibus somni admodum dissouum  
& alijs molestum edunt.

173.  
Stridore dentium, ut cūm inter dormendum ex-  
prava consuetudine quasi dentes achenes seu  
nūm ex eorum collisione edunt.

Loquela, quando dormientes voces emittunt &  
loquuntur, vel confusa admodum & inordinate,  
distrincte, & quasi cūm iudicio, ut  
intelligi ab alijs possint, a si  
vigilarent.

Ore aperto, scī cūm inter dormendum os apertum  
& patens conspicit, nec tūq<sup>b</sup> claudit.

Oculis apertis, cūm palpebris nō teguntur, sed lepos  
cūm instar, ac si vigilarent, aperti manent.  
sit affectu Tagopitthalmi vocantur.

19.

1. Meatusum & Ventriculum Cerebri affectis, seu  
sensu motisq; symptomata sunt.

174.

VERTIGO, quia ita iracundia ridens: ita quidam  
cerebrum sensuq; exagitans, ut saepe laboras  
corrugat, nisi prostratus uitaq; ad miniculis.  
& si in ea  
visus adhuc persistat, simpliciter Vertigo, sed  
Sixtus appellatur.

Oculi ita strinx obtinebentes, ut visio impedita  
primum cœlesti nubecula vel finis ob-  
stante, per quæ minuta qdam corpora,  
interdum colore rubro vel flavo vel  
atque tincta discolorata uidentur i mox  
omnino aliquamdiu tollantur. Scotoma  
vel Sixtus dicitur.

EPILEPSIA. 15.

CATALEPSIS. } 16.  
INCUBUS. }

APOPLEXIA. } 17.  
PARALYSIS. }

CONVULSIO. 18.  
TREMOR. } 19.  
CATARRHUS. }

175. **EPILEPSIA** est affectus, in quo sensus omnes ex improvise tolluntur, corporeusq; universum motu inordiinato aliquamdiu concitato seu convulsione, per arces seu paroxysmos somnium invadens et exercens.  
Estab vel

176.  
177.

Dilatatio, qua ante pubertatem si eveniat ea saepe venientie non definit, si vero post pubertatem primum incipiat, toto pleniusq; rite tempore, nunc certis, nunc incertis temporibus, horis, diebus, hebdomadiis, mensibus & annis, aut cum mutationibus agetantibus invadit.  
Nominaturq; alias Morbis caducis, funaticis, comitiales, magiques, sonitius, Herculeus.

Brevis nec ita diuturna vel mox cesat, vel saltig; non tristis quam prior protrahitur. Est a vel Mitior, qua et si pericula non vacet, canescere tamet nec magnam nec perseverantem habet. Ea sit qua modo natis, cum auctoribus primis erumpunt, vel vermis inodemodant eveniens mox cesat. Et qua Virginibus antequam menses cruentum sunt, eveniens, ut subvenientib; remittit. Et qua gravidis mulieribus primis fere mensibus occidens, medio Uttri-gestationis temporis, vel post partum definit.

Deterior summeq; perniciosa species existit, qua morbos gravis, ut vulvula, Tecta, Colicos dolores, aliasq; scirra: quia inq; atate, nunc uno, nunc altero paroxysmo, nunc pluribus usq; continuis vel intermissionibus accessionibus, agrum terribili aspectu exagitat, et pleniusq; jugulat, vel si sancti, pessima tamet interdum accidentia, uti membrorum contractio- nes, vocis, sensuumq; laestoius, aliare celiq; post se incommoda. Hae evoluta sese q; alioquin Convulsio, seu spasmodic generalis appellat.

178.

17 — Catalepsis & Catocles, Prætraxio, Stupor vigilans,  
Congelatio, zurūs admodum et adnivellandus  
tib affectu cerebri, in quo sensus interni omnis  
& externi simili aboleunt statim, Motus vero  
corporis tantum depravat, cum eam formam,  
quam corpus, — antequam hoc male corripitur,  
recumbens, sedens, aut incedens habebat, præ-  
hensi statua instar rotineant: cuncte sponte,  
nec impulsu mutent.

179.

18 — Incubus, Ephialtes est gravis corporis oppressio  
& nocturna suffocatio, respirationem offendens,  
vocemque intercipiens, non quidem sensus omnis  
adimens, sed tantum stupesciens & stolidus,  
præcipue mentem & imaginationem. Et enim  
laborans vel ab hoste se invadit, vel ab aliquo  
vitulum exigente, tanquam ab incubatore mole-  
ptum, qui manu attactis mox effugiat: vel  
abstundet quodam spectra imaginis ac fingit.  
Ephialta & Apoplexia affinis & prodromus  
est, in alteritiam n. dinitio persistens super-  
digentur.

14. — APOPLEXIA est repletiva motus et sensus, omnibus animalis functionis privatio. Hac quaque percutitur, multis feci malis indicijs praecurrentibus, totius reponit, quasi attenuatus concedit: atque si acerbum malum est, jacet fixis oculis, sine sensu, sine motu, sine mente, sola respiratione (et ex spacio peccata est adnoto) Ja mortis dissidens, qua est admodum difficultis mox tradit, Et cum stertore gravissimo, pulsus intermixta est plenus et validus, sed admodum inaequalis. Ad mortem plerumque terminans, alio quando ad convulsione aut paralysin aut altius quoddam malum transit. Nunquam plene curatur.

(92 - 77.)

15. — PARALYSIS est resolutione nervorum, ob quam sensus et motus perit, si sit consummata. At si consummata & perfecta non sit, interdum sensus tantum constat motu, vel motus constanti sensu afferit: (interdum sensus motu vero duntaxat torpuit, et stupor appellatur) Est. a. Dupliciter. Una

Quae sit ex debili Apoplexia, gravior ac perniciosa est, ac saep in Apoplexiis recurreat. Estque vel Paraplegia, qua pars omnis infra caput in utroque latere occupat.

Hemiplegia, qua alterum tantum corporis

latum seu dextrum, seu sinistrum invadit.

Quia ex stupore sensim aucto, mitior quidem est, at nihilominus pertinax. Estque vel

Universalis, qua (ut prior Paralysis) multas sub capite partis occidat, nunc dextri nunc sinistri, nunc utriusque lateris

Particularis, et certam aliquam partem obcidet,

ut: Lingam, Oculum, Maxillam,

Cervicem, Brachium, Manum,

Caus, Pedem,

aut quod sub Diaphragmatum constituitur.

## 19 - Convulsio Alio

Prerior, vel est

Vera, quae proprie<sup>t</sup> Convulsio seu Spasmodi<sup>s</sup> dicitur,  
ut nervorum musculorumq<sup>ue</sup> crevissit suam  
originem, præter voluntatem p<sup>ro</sup>p<sup>ri</sup>e<sup>ta</sup> contractio. Unde membrum, in quo  
amissili & crudi inservit, violenter tenuit,  
in vehementissimo torquetur dolor.  
(Pricipiosus est & saepissimi interictus affectus)  
Est q<sup>uod</sup> huc Convulsio vel

Universalis, & quæ totum corpus occupat,  
et quidem adeo acuto, ut fleti sonus  
possit. Est q<sup>uod</sup> vel

Emprestatorius, cum corpus aut rossum  
inchoratur.

Opisthotonus, cum corpus retroflexum  
versus natus reverberat.

Tetanus, cum corpus aequali ratione  
in utrinq<sup>ue</sup> partem intundit.

Particularis, quæ partem aliquam obdidit,  
qualis interdum in oculo, in fronte,  
cuto, in lingua radice, in maxilla,  
in labris, interdum in brachio, in  
manu, in crine animadvertisit:  
eo scilicet aut utrum ad musculo at-  
flecto, qui partis motioni destinatus est.  
Est q<sup>uod</sup> huc particularis sapientia Univ.

Flatulenta convulsio est, quia sape manus  
pedumq<sup>ue</sup> digiti nonmungit & crura,  
interiorum plures partes simul vel ex-  
tenduntur, vel in se contrahuntur simum  
dolor, sed eo brevi, et qui sola frictione  
mitescit.

Districta convulsio proprie<sup>t</sup> dicit Contractio,  
q<sup>uod</sup> est perseverans quadam membroz: rigiditas;  
cum ne ipso membra sunt contracta. Qualis  
in senibus certe, q<sup>uod</sup> membra in juventute multi-  
tam exercerent: Ita in partibus sciendiq<sup>ue</sup>.

19.  
14 - Tremor est cum membra motu inaequali siccum  
deorsimq; agitantur. Quod rituum interdum  
in manibus, interdum in pedibus, interdum in  
Capite, interdum in Maxilla inferiori, interdum  
in pluribus partibus conspicitur.

15. CATARACTA seu Destillatio est supernacantei bini  
meris e capite in subiectus sedes prolapsio.

26.

190 4 — Oculorum affectus vel subsistunt

In ipso oculi globe affectus subsistentes vel sicut  
morbi oculi tunicas occupant

Uream infestantes morbi sunt

Pupilla dilatatio. Myopiae distans, cœlio-  
sam lucem in oculum propagando,  
visionis claritati obest, nindo splendoris  
lucubras ipsi offundens. Et si magna  
sit illius ampliatio, in paucis obculu-  
sore luce noctiū adiutū & in nimis luce  
aduent. Etiam admodum noctua & Cati.

Pupilla diminutio seu angustia visionem  
vix austert, nisi quod efficiat, quod y.  
quibus abortu admodum exaspera.  
Pupilla contigit, sub nocte & tenebris  
nihil ingrediens minus cernant,  
alio plena luce. Et e tabe pupilla.

Pupillæ invulsio & rupio ex humore in  
urea tunica concluso istamq; distan-  
dente & emarginante aut ab extirpato orta.

Suggillatio seu Hypopygia est obstru-  
ctio foraminis ureæ seu pupille.  
a sanguine ab iocu, n' taurum in-  
corneam infuso, sed etiam ad span-  
tium intercedendum inter cornem &  
uram ptingente, illudq; omniuo  
vel ex parte adimplente, & pupillam  
obstruente. Qui subter primum, dein  
levigatus, mox nigricans, visum  
obfuscatur magis minus vero, propt  
magis minore spatium occupat.

Pyosis est pupilla obstruere a phle circa  
urea foramen collecto visus impedit:  
Hypopygios, cum pars copiolem collecti oculi  
nigrum totum occupat, aut etiam  
istidis spatium impedit, & cornem pallidam.

Onychia, seu Unquias est, cum exigua pueri  
parte in diba sebo unquias recte  
instar tantum transducere vident,

192.

Extra oculi globum. 27.

Symptomata. 25.

Cornicam. 22.

Anatam. 24.

Suffusio. II

20 — Suffusio, Hypochoyma, (Cataracta blearia seu)

Aquæ descensus in oculis) est papilla sine uero foramina obstruēta, a mæcco tñaci in ambitu illius foraminis seu papille marginè hæc est, illigè stran-  
tuso, sensimq; concrescente in uno sive tantum oculo, licet et alio nonnunquam maximi ratione affici incipiat, unde visus laedit, et tandem propterea an-  
fertur. Impedit n. inde humor Cystaloïdes, prius  
videndi organū; ne externarū rerū species atq; similes excipiatur, ntq; illa liberè cernat.  
Est a. vel

Incipiens, cum mucus adhuc est pallidus, & lucidus transmittit, ob crassitudinem tamen visioni, at si subd obtusa obscuraretur, & varus atomis solitariis res videtur, impeditum est hanc partem. Atq; hoc in oculo nondum hæc conspicua est, nisi quod illius nigrum, quod Stellam vocant, non exalte nigrum, quale esse debet, sed nonnihil turbidum apparet. Vix dūm nec cūm trō auge, atq; præcarbi potest.

Accrescens, quando mucus illi magis magisq; incrassatus perspicuitatemq; amittens, facilis intuitus cognoscitur, glaucusq; sive vel cincto colorē ho-  
manifestat, ac nigrum oculi timoribus defens visus  
tunc quoq; magis efficit. Hac Vettitq; Glaucomata.

Confirmata Jen Matson suffusio, Petricula, Tela,  
est cum mucus penitus incrassatus, dealba-  
tusq; di perspicuitate destitutus, visionemq;  
penitus auferat, & excitatem oculam producit.  
Atq; hoc in oculo conspicua est intrinsecus pug-  
nillam propterea obligens: estq; pellucida albus  
mini ovi coctione aduata & colorē & tenaci-  
tate non absimilis. Et licet per se nullus  
momenti esse videatur, pertinax tamen est  
affactus nullisq; remedis amplius, nisi acu-  
austerri potest: quod tamen neq; in orbis  
succedit, & quandoq; malo cum successu tentat.

195. 20. Corneam membranam infestantes morbi sunt vel  
Obscurantes corneam affectus sunt

Crassitudo Coenca est, cum ea exsor densissimis facta est. Quod vitium a morbo cariſtum, frequenter ex strabismo ortum, quia membrana quemadmodum ex unguis crassescunt, et visio sit caligans et turbidocosa.

Albigo, Lacoma dictum, cum in cornea sede macula alba nascit; quia si protuber alba, pupillae toti regioni obducta sit, caritas ortus: Sin exiguum pupilla spatium comprehendat, aut ab ea ad iridem magis inclinet, visione halo lucinantis aliquemodo facit. Hac Macula interdum superficiaria est.  
altius impressa totum cornem penetrat.

Discoloratio est vel

Cubra cum abirent sanguine rubro colore,  
flava cum a bilis infusione flavo colore,  
si corna infesta, ora objecta rubro aut flavo colore tincta videntur.

Exuberantia in cornia subsistentes sunt protuberantiae instar. Exanthematum Polyphaena Vitae, (Vesica Barberi) Dolorem in ea sede non facientes, nisi ad catoras tunicas pertingant, vissi tamen obsunt. Si oculi album pertingant, erubent, et dolorem lancinantem efficiunt. Apositis illis ulceris obseruantur, ab humorum sero, sive et excoquientur, unde orae sunt.

197. Continuit-solutions sunt

Rhexis est cornia tunica ruptura, vel sectio, vel exesio, e qua primum albigineus humor emanat, occultans multo numero et relinquit, ac visione aliatur.

Oculi procedentia, seu proptosis est, cum non tantum aqueus humor emanat, sed et urea tunica procedit. Et a. non dum excrevit, et urea non nullum extit locum exigit, prouocato, Formicale distensam amplius crevit, ut accinum leva resuscitare, gacca aqua.

Ulceras, praezimum oblitera palpebras transfilat, circos callum obducit, Tunc id quod extra palpebras transquerat, Hæc, Clavus rotundus

Ulcera Cornia visum habent, & interdum ut humoris  
 190. elabantur efficiunt, si rēdēlīcēt profunda sint. Sint. a. v.  
 Superficiea ulcera r̄bore subvenient, ardore, & n  
 torisq; accidentib; s, ut ophtalmia, molisunt, in  
 inflammationemq; aliquando accessunt.

Profunda ulcera sequuntur abscessus maturatos praece-  
 dentib; inflammationibus, qualia sunt

Botryon est ulcus carneum, angustum, pūrūm q; in  
 cornice natum, latini Fostulam, Barbari Annulū,  
 nuncupant.

Cæloma est latiss. Botryo ulcus, sed minus altum;  
Cavitas latinis dicitur.

Argema ulcus est, quod in luidis circuito nascitur,  
 undiqueq; illūm occupans, si h̄t circa extre-  
 morem luidis partem rabiendūm, circa  
 vero interiorēm albūm apparat.

Epicaruna ulcus est sordidum, & crusta obductum,  
 quo ut phlegato humoris scutis sapo effundunt.

Barbari Adustivum nominant.

Condyloma, est quod aūris constat labys.

Cæbunculi & Carcinomata Pterea hic accidunt,  
 q; ultraq; quāvis rariissima, omnium tamq;  
 sunt deteriora.

20.—Adnatur sibi adhaerenti membrana potissimum inservient

Pterygium sibi Unguis, sive Ungula, quod est rotunda, rosa, dura et albicans membranula, quae ex angulo prodicens albo oculi primum expanditur, mox et nigrum illius vel ex parte, vel totum obtigit, et inde rissimam tenet, vel ex parte dellet. Primum quidem tendit ost, sed mox cassigens carnosa fit, venis multis cruentis contexta, dictumq; Pannum cibis: alias indurata albescit, & tunc Unguis vocatur.

Ophthalmitia est oculi pblegma ex oculorum angulis in totam adhaerentem membranam effusa. In hac tenets oculorum retina tenuerant, & quae in oculorum albo obscurar fuit, conspicua fiant: ac plerisque quicquid album fuit, rubescit: si multusq; ardor ac dolor affigit, qui accidit sapientiam lacrymarum fissiōnēm accessit. Cum ingraevescere Ophthalmitia album oculi subscens usq; adeo tumet & increvit, ut nigro sublimis evadat, ipsumq; fratre congregat, Cymosis appellata.

20 Symptoma oculorum vel sunt

Motus vitia sunt

201.

Strabismus, oculi convulsio est, quia si in obliquum ita contorsquetur, ut nequeat ambo in unum esse aspectus. Quod vitium nullum in vera convolutione totius corporis, Epilepsia nimirum oculis accidit, ab ortu plerumque est contrastum, cum vel pupilla non ipsa globi ocularis partem anteriori media & nuda, sed ab ea declinans ad latera est posita. Crystallinus humor a centro pupilla leviter aliquantum declinat ad latum.

Paralysis est motus abolitus.

Dolores oculorum excitant vel incidentia, vel interna ut humorum accidit in Epiphora, ardor in Ophthalmia. Pustulae, Erosiones, & reliqua Continui sollicitationis, propter eas pustulas et ulcera, q. in cornicis incidunt, unde nullus aut admodum teris dolor excitatur. Scitur & de flatum aut humorum distensione copia quidam statuerunt.

202.

Virus vitia sunt vel

Virus depravatus (qno res aliter quam ex vera sunt, reperiuntur) est vel

Hallucinatio, quia simplicia pro genuinis cernuntur.

Nubecula, quia per nebulae aut vaporum & fumum se ota intueri laborantes videntur.

203.

Colorum virus est, cum cornea tunica alieno colori infecta est, unde fojus ota tincta cernuntur, ut in Letto, & litzina insigilla, tunc, ac inflammatione rubra.

Alia quavis falsa virus est, cum agrotinus varia spectra, muscas, culices, festuca, flores, incidentia corpuscula, aut alias quasdam res se videre existimat.

Id autem fit vel cum despiciens

Virus diminutus. //  
Labilitus. //

II. Visus diminutus est vel

Amblyopia, seu visus obscuritas est, cum quis non  
acutus sed obscuro videt. Estq; vel

204.

Nebulosus visus cibis etatis evenire potest,  
et calidam habet, vel in Cerebro, vel in Oculo.  
Caligo est visus obscuritas Semibus prochloris,  
cum minimorum ob statem vel Crystallinus  
humor, vel vitreus turbatur, vel Coena  
tunica crassior reddit, vel ctc. p: 204.

Semum visio est, cum visus est prohinghas non  
melius quam dissipata, ut naturaliter fieri  
debet, sed oculis vicinas minus quam di-  
stantes aspergit, et proin cum est minutas aut  
cernere aut legere volunt, procul ab oculis  
ea removent cogunt.

205.

Juvenum visio, cum res dissipata, nondum tamen  
ad eam sani quoq; ob nimiam distantiam  
sufficentes videb; nequeant, sed exiguo tentu  
spatio, licet magna quoq; sint, recte dico  
dicare minus possunt.

206.

Nyopia est cum est nonibil remotas minus viv-  
ident, et nisi vel scripta vel alia paullo  
minora oculis vident, namq; attingant  
recte discernere aut legere nequeant: non  
nihil lumen et clariss oculis ex intuentibus.

Nyctalopia est quando noctu ad accusa flamma  
lumen fratum, aut fero nihil vident, inter-  
dum vero in diei luce nullum visionis sentient  
impedimentum.

Vespertina acies est, cum noctu in tenetbris simi-  
lum acutius, quam interdum vident. (ut  
Noctua) idq; ob Nyctiriasis seu pupilla dilatatione

207.

II. Visus abolitus, seu Cecitas si  
nullum manifestum vitium in oculo habeat, non  
minus Anaurosis.

aliquid vitium in oculo apparuit, inde denominatis.

20 Extra levili globum morbi vel subsistunt  
 200. In dentorum angulis

1. Egilops est Pelignoni parva inter majorum  
 angulum & nasi radicem. Pars ipsa quasi  
 furunculo tumet, ambitus rubore perfum-  
 ditur, dolor summus surget, & is lancius.

2. Ulcus grossus Egilopem cunctum & in abscessu  
 sum versus oritur. Est ab utr

Simplex, est e quo extra graviora acci-  
 dentia per coctum exsiccatur.

Malignum et Septem seu Phagadenicus,  
 est Ulcus, cum sanguis & Egilopus genuit,  
 deterior fuerit, tuncque pus in album semper  
 & coctum, sed et super aqua & cridam ex-  
 oculi angulo, & Tissim chm pustis, emana.  
 Aliquamdo vero sub inferiori palpib[us] aliquo-  
 b[us] sibi viam faciens tuberculum in catro  
 facit, eoque disrupto, ulcerulum illuc  
 quoq[ue] factum aquosam praesentemq[ue]  
 hunc materiam profundit.

Fistulosum Ulcus ex Egilopo non bene  
 curato obortit, etenim cum egilops in  
 maturo apertus, aut cum cito adhuc intro-  
 gra pus diutius coercets, unicolor agit,  
 ne deinceps viscera partibus exesis simili  
 hazat, in quo coniosig colligitur. Hinc ad os  
 subiectum pertinet, et etiam in naso apit  
 proximam, p quoniam graveolens excidit.  
 Quidam pus quam sibi muniat in angulo  
 oculi majoris fistulam excaravat, quia sinus  
 in quo assidue illuvitis congerit, tumor  
 faciens, qui singulis horis postea per  
 angulo mta per illius fistulam emanauit,  
 et secundum illuvio nova illabente, intumescit  
 expurgatur.

Epinetus est Ulcus aciem sebetans, & in angulo  
 oculi periphtico bambore manans.

3. Rhyas est carunculae anguli majoris esse cunctio,  
 a qua & angulus latior evadit. Unimutatio,  
 4. Encanthus. Rhyadi opponit, et est ipsius caruncula  
 immotica mutatio.

210. // In Palpebris subsistentes affectiones sunt

Pseudophtalmia est cum palpebrarum interna  
superficie non solidam natam sed intensione ex  
quæ sit evanescere rubori subbet, oculi album hæc  
etiam eodem modo afficitus, unde lancinans  
interdum dolor contrahitur. Estq; vel

Xenophtalmia est cum præcipuis palpebrarum  
migrantes et persicatum oculorum angulos vexat.

Espipioea seu Sippitudo est, cum oculi coquimq;  
palpebra madent, lacrymæq; subtiliter ab  
intimo, max tenaciores eminant, ac tandem  
præsenta exire manu, sordidissimæ affecti  
oculi arguli, ac cilia lentiorum humoris ino  
datem conglutinata persicatum inter sonum  
oculis clausis coherent, neq; ea separari  
aut oculus apiri potest, ni prius reponuntur.

Taraxis est bimunditas ochli cum rubore et  
calore præter naturam non ex corpori, sed  
foveolæ advenientia aliquia ita ut fulvo palores,  
aut oleo oborta. Latinus Ocelli quæ illatio 22.

Sclerophtalmia est, cum Arcta tam separata, tam  
compacta in palpebrarum et oculorum angulis  
ac ciliis undiq; accrescentur.

Xirophthalmia sive Sincera Sippitudo est,  
cum palpebra aut etiam oculi simpliciter  
rubri et siccæ sunt circa ullum madorem.

Scabits.  
Ectropion.  
Eschysema.  
Hydatis.  
Grando.  
Hordecolum.  
Lithiasis.  
Motus vitia.  
Pilorum vitia.]

- // Scabies palpebrarum est vel  
Plorophtalmia, est scabies ex humor calido &  
 acci cilia potissimum occupans.
- Trochoma interna est palpebrarum Scabrities &  
 asperitas. Celso Palpebras: Asperitudo dicitur,  
 species ejus sunt
- Sycosis est scabrities adeo intensa & aucta,  
 ut veluti incisurae habeat. Sic dicta, p  
 ficium granis simillima sit, unde e  
Latin: Ficosa palpebra dicitur.
- Tylosis est, ubi asperitas jam inveterata in callum  
 abiit. Latin: Callosa palpebra asperillat.
- // Ectropion palpebre est inversio, quia haars eius interior  
 rubra prominet.
- // Ephysema est palpebræ laxus tumor, & dolor vacans,  
 atq; adeo adenotodes. Latin: Palpebra inflamma  
tionem vocant.
- // Hydatis pinguis quadam superioris palpebræ substantia  
 est, hodiore suo sic gravans, ut vix attolleretur oculum  
 sinat, eoque assidua fricione excitat, palpebrae q; in  
 hoc uscio aquam intercentem respitant. Hinc  
Palpebrarum aquæstas dicitur.
- // Grando sive granulæ est rotundum et translucidum,  
 hic atq; illuc mobile in palpebris tuberculum.
- // Hordiculum est tuberculum calidum in abscessum fore  
 desinens, quod e palpebræ margini, atq; e cilio  
 prorumpit. Nomen inde habet, quod sua forma  
 grana hordæ simile sit. Gravis debet, atq;  
 etiam neadæ quod lñ nobis n. propriæ simile sit  
 mincespat.
- // Itbiasis est cum in palpebris gignuntur candidatio  
 quadam & aspera lapidis instaz oculum prementia  
 corporiscula.

30.

- cō. — Metus palpibrarum vicia sunt  
Ancylosis sive Ancyblephora est viciūm, in quo  
 palpibrae cūm albo vel nigro, vel inter se  
 ita coalescent, ut aptici oculūs non possit.  
Latinis Palpibrarum Coalitiae,  
Hippes viciūm est ab ipso oculū nascent, propter  
 quod instabiles semper sunt palpibrae.  
Oculos claudendi aperientia impotentia (quod  
 viciūm nonnulli Gesse vocant) fit vel a  
 resolutione et Paralyse, vel ex tumorū conspi-  
 cione, motū impedito.

cō. — Pilorum vicia sunt

- Trichiasis est, ubi pilis inutiles, & oculos pun-  
 gentes in palpibris nascentur  
Maderosis seu Mitphosis pilorum palpibrae est  
 deflūvium. Latinis Glabrities, vel Casus  
pilorum nominantur. Si autem  
 deflūvium fiat e palpibris callosis & cau-  
 bentibus Otilosis appellatur.  
Distichiasis est ubi sub natali ordine pilorum  
 palpibra aliud succedit ordo.  
Phalangosis l' propria est viciūm, in quo pilorum  
 duplex triplexq[ue] acies vel in superior, vel  
 inferior palpibru provenit: evenitq[ue]  
 quando cilium retro spectat, pilorum acie  
 simil cūm eo inversa.  
 a? Phalangosis interdum in palpibris re-  
 laxatis dicitur, ubi natantes pilis bulbū  
 oculū compunguntur.  
Osticariasis est pediculorum provenit in pal-  
 pibrarum fistis.

205.

# Auris affectus vel sunt

Morbi sunt

Ptylemonus aūris partū intima inter crassiorē  
meningem & membranam, q̄ adiuenti meatū  
pretendit, colligi solet: Galozi se prodit et  
dolorē gravissimo, ac Febribulam cū suis  
symptomatibus conitem babet. Nullus tūnq;  
mūlūs q̄b rūborē foris consipicit, nisi fortē q̄u  
minato malo coctura in consensu trahant.

## Abscessus aūris oritur vel

ab Inflammatione, cū pūtis materia seni  
sim conuocione in pūs mūltū, & exulta,  
vel exēsa, vel rarefacta adiendi mem-  
branā, foras p aūris anfractū minit,  
magna doloris tensione, gravitatisq;  
lebatione. Si pūrulentā ea pīna utinā  
at, pūritū & novū quandoq; accer-  
sit dolorē m, pūtressensq; aliquando ver-  
mē procerat, postea prodentes.

Si quib; cerebri aut imbecillū aut  
excrementis abūndans ē, suppūratō hæc  
diuturna esse solet: effluente pūro, vel sanis  
citra Inflammationē fit int̄rdūm abscessus,  
aut sordidū genīs aliud, ex magna Cere-  
bri impuritatē, mūltaq; colligēt eosibi-  
viam et exitū moliente.

## Ulcus vel est.

Sinplex, citra malignitatis vitium ex abscessu  
rupto frevenit.

Sordidum est, quoties vel pūs, vel humor sum-  
ma pollet acrimonia.

Excusatus est, cū in ulcero ... hūmido  
... int̄tempstive resecato caro excusit,  
quā Aūris dūctū obturat, et auditiū  
lūpercutit.

Plasis est kontusso et conspersio foraminis, q̄ s aūrib; st.  
Symptomata. //

216.

// Symptoma Atrium sunt Excrementorum in Atrio

Excrementorum in atriis preventis sunt  
207. Sordes atrium sunt perlungib; etiam instar

crocus, & spissa, nonnunq; & diversitatis,  
intendit etiam aliter coloratu. sive a.  
Marmorata, sive Ceruina redudant, aut  
dilatim impedimentum adferunt.

Vermes Atrium, σκορπιούλα ἡλία, a diu  
# terna foris ac sanies, atque etiam a fornici,  
impuro, puerisq; ulcere provenient.

Dolor Atrium vel est

Levior nihil aliud seu est nisi Gravitas.

Gravior dolor est praeatorius, pulsans, aut  
divellens, diciturq; Lacryma.

Auditus vitia sunt

Obauditio, sive Auditus deprivatus est cum  
sonus exterius falso percipitur. Estq; vel  
Tinnitus Atrium est, quando sonus in  
atriis tintinabili instar acutu  
resonat ac tinnit. Etq; frequens aff.

\* Sibilis est sonus, qualis cum flatus per  
angustum foranum coacte perturbansit  
& necdum exakte resonans auditus.

Pulsus vel Pulsatio est sonus, qualis ab

\* ita levi vel easu guttae Ieso offert.

Barycoia, seu Auditus gravitas est, quando  
agre sonum percipitur vel discerneris possit:  
nisi uel intendat, vel in ariem quod  
infundatur.

Surditas, Cophosis est cum auditus deficit  
abolebitur, ad eo ille vel nullum sentitus ex  
teriorum sonum audiret, vel si audiret  
distingueret enim ac disiudicaret nequeant.  
Hac surditas si ab origine sit, plerisque  
Alboniam coniunctas habet.

\* Hæmorrhagia seu fæxus sanguinis ex nivibus  
aliquando magna fit cœpia.

221. \* Fluctus vel fluctuatio in nivibus est sonus  
mitius fluctuum affissioni non assimilis.  
Strepitus nivis est, q; præter hisce sonos alio  
modo se offert, vel ex sonis fit coniunctus.

326

11  
2  
1  
A.  
Aug  
7/11

bis  
ex  
et  
ant  
uall

9-Nasum Affectiones sunt

Vleris, quod vel est

Simplex & acutus, quod sine dolore atque accidit  
conspicitur, sollemque naris sanguis madefacit cornu  
stulta nigra obdicitur, levioris inceptu  
nunquam procedens, aut saltem irritatam nimis  
sanguinis eructantur.

Pulvulum & Vetrinum, Ozana dictum, (vicinis  
eterni spiritus contagio molestem) sapientia  
prosequitur, et vel Nalum alas, vel carum in  
territum, vel alia eius loci tenella ossa  
excedit et protrahit, exessumque palatum  
sanguis perforat, maximus si carcinomatous speciem,  
habeat, vel quod cerebellinum, et sedula sue &  
contractum sit.

Excessus Ulcus est, quem in ulceris aliquo excedit,  
ac naris obstruit, spiritu viam intercludens,  
nam perscrutare latius affectum decubitus, loquens,  
larm offendit et absenscat, (atque hoc symptomata  
Grauero sericea vel rotunda ecchymis cedentia,  
sinusque vleris signo habet.) Est a. vel

Sarcoma est, cum in Ulceris caro excedit,  
polypus est, cum caro in tanta longitudo  
excavatur, ut iam e naribus prospicuerit,  
aut in facies relabatur.

Odozatus vitia, sicut

Fator aspidum ex his duntaxat partibus exicit,  
qua circa Nasos & os Ethmoides sunt nam  
q in ipso olfaciendi sensu, vel proprio hunc  
intra Meningas pertinet, in ipso laborat,  
(cum sensu ipsum turbidum ferant.) sed  
aliquis aspidens deprehendet.

Odozatus immunitio, vel abilitio.

Excrementorum vitia. //

// Sacrementorum ritia in naribus sunt

Sternutatio est aeris efflatio subita magno cum impetu, clangore, rotundus corporis concussione: q̄ protissimum p̄ naribus facta modo pluribus modo paucioribus vicibus max abruptuſit.

226

Gravido s̄n̄ Coryza est frigida pituita q̄d destillatio, in os ethmoiles ejusq; membra nas incidunt, e partibus, q̄ circum cibram, aut e ventriculis ejus effusa: Ea caput in granulis, respiratione difficulter nisi balaustri pagitis, vox non sonora, adhuc tunib; liquoris principio qdēm tenuis, dein crassificuli et nard profundit. Sit interdum etiam Gravido superiori multo gravior a pituita, q̄ vel sanguinis, vel aliorum humorum primitio acris erasit. Ea narcs, n̄ solū tunc necat, sed etiam ardore summo exalcerat.

Hæmorragia Nariū est cum sanguis ex naribus erumpit, apta, rupta, vel exesa vena.

Factor Nariū aliquo odoratui tam molestus est, ut animi attinendo interficeret deliquitum necantur ab eo precipiti, cuius nāre faciat.

Oris affectus vel sunt

Certarum oris partium affectus vel sunt  
Labiorum virtus sunt

Oris tortura, seu Cynicus spasmus est diu  
stentio seu convulsio oris, qua id omnino  
pertinet. Conspicuum malum, si gravis est.  
Levi. a. n. nisi inter loquendum riddetur: vo  
detegitur. Tam significat oris labra no  
tenti contorgientur: sicuti in labiorum Par  
tysi sit: eo tam' deservimus, & in Paralyse  
labrum in sarcina partem, in Cynico spasmo  
in affectam partem contorguntur.

Sardonis Risus & circa animi affectum &  
voluntatem perseverans & periculosus risus.

Maxillarum affectus sunt

Convulsio & Paralysis maxillarum.

Destillatio. — hoc prioribus frequentius in  
maxilla articulatum ad tubercula radicem  
infusas, immobilem eam plenimq; reddit:  
loci quidem dolore & tumor dabo conspicit.

Dentium affectus sunt

Tongitudo.

Brevitas.

Defectus.

Numerus anodus, cum plurimis absunt  
duplex ordo seu Phalanx

Mobilitas.

Corrosio, cui excavantur, exceduntur, pustulatur,  
et franguntur.

Nigredo aliisque fadis color.

Stipor seu Hamodia: cum inter mordendum  
dentiū qdam molesta percussio titillatio.

Dolor, qui vel est

Odontalgia. q; cuivis etati evenire potest.

Dentito infantibus pectoralis, quem ex  
ploratu & ingebitu, et malat: rubedine  
& calor, gingivisq; tumidis & dehiscens  
tibus cognoscere licet. Comitem sive a  
rumq; febriculas aut convulsiones leviter.

Totius oris. 30.

Gingivaz.  
Lingua. 37.

## II. Gingivarum affectus sunt

232.

Auditio Gingivarum.ConsumptioGingivarum.

Plegmonus Gingivarum seu Parulis ad dentium radicem intro foras vero adeo prominet, ut etiam vicina partes distendantur, rubeant, caleant ac dolent. In superiorum maxillarum ea plicinibus solet ex oculorum cantho majori: in inferiorum vero per tempora e venis ex desinentibus.

Abscessus Gingivarum plegmonus sequitur, rupit pars nota ad faciei citetur, sed ad dentium radices exili velamur tectas, irrumperit.

Ulcus Gingivarum: ex Abscessu provenit: nonnulla a Stoebuto originem habet, a quo non tantum tumet gingiva & quozm excedunt, sed & ulcerantur, pustulunt & corrumpuntur. Nonnullam malignam id sit ex Abscessis solidis negligitis, in manibz pustulis praelestim, atqz doloris, aut non magno, sed tanie Cancerum Gingivarum vocant. Purulentum & album serum est, mox flaccidens atqz inde nigrescens scurrit & cavernosum sit; glugivasqz eo loco ubi est dephasitatur, sapidus & subiectum maxillam avitus in Sphacelum abiit.

233.

Espinis est, cum in certis Gingivari locis circa dentium radices calycula emergit. Ex hincero malo erato plerimque errans.

35. Linguae affectus vel sunt

Motus sunt

Batrachus seu Rana est tumor in oris parte molli et laxa, (q̄ sūb lingua est, & chi ea incubat, ac quasi nunculo annectitur) collitus, & interdū p̄flegmone, sapias edematias molles & laxi speciem exhibet: e quo aperto nūc proflit albamini ori p̄stulit. (In quod calculus prodit) Asperitas Linguae est, cūm ea sebra, adūs fa. & exsiccata nūcūm apparet. q̄būt: Combustio &

254.

Symptomata linguae sunt vel

Motus vitium, cūm vel ob paralysin, vel lio gulanum nūmis adstrictam movere nequit.

255.

Loquela vitia sunt

Loquela abolita, Acovita, cūm mūtus ē homo. Difficilias loquendi est, cūm certas syllabas, aut litteras (eas p̄sertim, q̄ ut plane exprimendo efforantur, variam lingua flexu, ram requirunt) ut in R. & G. cūm stridore, vel sibilo effundens, exprimeri exato, nec linguam sufficienter volnū tanq̄ possint, sed balbitiunt, & Blasi sunt.

256.

Gustus vitia sunt vel

Diminitus & gustus.  
Depravatus

90.

237. *Cotius Pois affectus sunt*

38.

Ornitatio est, cum ore aperto admodumq; dilato, acqm primum affatim haurientes mox han  
sitiosum iterum copioso efflant, cum sono  
lamentabili.

Ptyalismus est satquens et immoderata saliva pr  
os refectione, et quidem vel  
Saliva naturalis, q; concitata ac impulsa  
frequenti secreta in ore coacervata.

Humoris [pituitosi] crassi,  
purulentus.

vel ex Capitulo  
Pituitae prodeuntis.  
Ventricello.

238.

Factor Ovis, est cum exhalat fetidus per os  
ambelitus, insinc Stercorosis, minc cadaverosig;  
nunc putrum casei aliorumq; odoris offens.

Apstha (Arabes Alcolas vocant) sunt Viscicula  
buccas, singula latera et radices, gingivas  
et palatinul occupantia, minc uno, minc duo,  
bus, minc pluribus in locis. Shutq; pessa  
ab iniectio lentis instar ampla rotundataq;  
alba in medio, in ambitu vero rubra et  
veluti inflamata, doloremq; inficiens,  
qua tamen mox dilatans admodumq; serpens,  
et vicinas partes corruptunt.

239.

240. Fauicinum affectus vel sunt

Tonsillarum affectus sunt

Parietaria sunt, cum tonsillae hærimq; vel uno vel utroq; latere globi instar protuberant, imbutæ distillatione frigida; ac hæm quidem sub maxilla tumor tædi risusq; intus anim, advertit, hisq; tunc frustulum quoddam fæci cibis inhalat, mole sua premat, obstat, que non cibis, potis e salivæ facile venient. Iogb sine siti, sine ardore.

Antiaedes sunt, cum inflammatio tonsillas exercet ea præter tumoris notas p; se ferunt dolores, ruborem, ardorem ac fitim.

Abscessus tonsillarum est, cum ab inflammatione concava materia interior tonsillarum criticula disrumpit, ac pus in os eæ fæces emanat.

Ulcus tonsillarum ex abscessu provenit, vel ab acerè defluxione, aut alia cæa. atq; inde fit inspiratio graveolens.

241. Columella seu Gargareonis affectus sunt

Columella lassus seu Casus est, clam Columella instar e palati extremo propendens molesta e. hæm laxitate sua in fæces illabentem mos ista satis titillatione vel strangulatione hæm, vel frustra perorandum existimat.

Ura, ræræ, seu Gargilionis inflamatio cum rubore et ardore, ac tumor conspicitur ac clam pars ima crassa, superior nervi levitis ac nigricans sit, major cum radio infantes illabitur, suffocationis multæ conicitur.

Ulcus, quod e interdum Gargaronum confinit ab inflammatione suppura, acive fluxu, de provent.

Summarum gula partium. //

II. Summarium Gulae Guttatisq; partium effectus sunt

Angina est effectus summas Gulae Guttatisq; partes, per quas aut alimenta aut spiritus transirent, proculdens, unde spirandi vel deglutitionis difficultas etiam dolor nescio adest. Est autem vel

recta Angina cum phlegmone vel Erysipelite, tunc, calore, rubore, dolore, ne febre cognosits. Epis IV species.

I. Exuvia, cum interui Guttatis seu Laryngis musculi inflamati sunt; neque in Cervico quicquam apparet; omnis tonus periclitissima resipie intra XVIII horas occidens gravissima quoque symptomata infert.

II. Exuvia enim interiores Pharynges et faeciem musculi manifesta phlegma, non tentant. Quod quis aqua graria habet symptomata minus tonus periclitare est, qd adhuc rident: in os expurgari possit.

III. Exuvia faeces interiores una cum cervico occupans, non minus graria habet symptomata, sed tonus minus periclitosa, cum foras proficiens digeri possit.

IV. Exuvia omnia terribilissima & tristissima solam cervicem episq; musculos pressum habent, faeces tamen compressum.

Notha Angina febris expers est, inter acutes mortales minime cengenda. eaque duplex.

I. Quae astillatione peditoja in faciem musculos decumbentes, cum vel sint tumor, multo tu etiam rubore, calore, aut febre ostiatur.

II. Quae a vertebribus luxatis sit, in qua cavitas in cervicem cum dolor presenti.

Uter faecidum ex Angina quendam proruit non alius semper prattus, sed plures occupans.

Compressio faecium, cum respirationis via trahitur Anginam & faecium varias caas habet.

Bronchocelos, Hernia Guttaris, Botium <sup>horr.</sup> Barbi:  
(Montagni consil. lxxxix. p. 435. Apostolica Guta &c.)  
Borboroxanth.      b. 2. Cœlum off Cœlum.

402

the sun will be seen at the same time  
as the moon, & the sun.

THORACIS affectus vel sunt

Partium spiritalium affectus vel sunt

Morbi vel subsistunt in

In Pulmonibus subsistunt

Intemperitis simplex, maximeq; frigida,  
deinde etiam secca, ḡtūris arteriis  
exasperant, tūsim excitat siccam,  
respirationem raram et ad Calidi aëris  
potiusq; desiderium stimulat. Calidio;  
vero intemperitis respirationis cubras,  
frigidumq; tum aerum, tum potum  
requitit.

Distentio est, quando statim in Pulmone  
wazotati (avis raro fiat) ambientes  
partes distendunt, agitatioq; dolores  
infirmit, quandoq; violenter emperitis.

Obstructio frequens est magnis momentis,  
tūsim, oppressione, ac spirandi diffi-  
cultatem inferit. Cū pulsū parvus,  
inaequali, & intermittent, vel etiam  
interciso, hūdo cordis palpitatio, et  
oppositio. Corde anima qdā deficit oīz,  
Si virtus et continuo max est, inspiratione  
magna detegit, se utimē lenib; pulmorum arteriis equa atque assidis  
suscitat. v. 296. & 304. 2. 305.

Peripneumonia alia

Vera, & raro contingit, est pulmonis  
inflammatio, et quidem vel  
Pneumonia, quia ex majori peritoris an-  
gustia, minori qd; febri diagnosticis.

Erysipelas, quando peritoris minor ait  
angustia, sed febris flagrantior.  
Notra est, quando multa acris destillatio  
confertum in pulmone delapsa, atq;  
inibi accusa febrem, tūsim, spiraudit  
dificiliter invenit: qd: ager sensim  
conficitur sive ulcerat, aut fruto cruento.

Vomica. //  
Tubes. //

Symptoma. 44.

On Plena. 43.  
In Conitate. 302: 43.

Cervis. 46.

Membrorum. 40.

296.

297.  
298.

299.

300.

11 Pomica Pulmonis est abscessus exiguis, et püris  
in pulmonis quādam parti collectio, quod mem-  
branula propriaq; cysti adeo arcta concludit,  
vix ut quicquam tētrum de se in cor expirat.  
Frequens in tabidis, sed et omninoq; sine tabide.  
Latens profecto, et impensis abditum vitiām, saepo  
nec laboranti, nec medico notum: quo laboras ipsi  
nec consueta mūria intermitit, nec se morbo te-  
ntri spūtat, causamq; sui interitus recessus int' gerit.

251.

252.

11 TABES sive Phtisis est Pulmonis exulceratio, cūm  
febi continua, quā sensim corpus liqueficit. Hac  
incipiente phthisi frequens tūssis molestia est,  
cūm cunctū qd sine sensu doloris extūdens,  
quo subsistit, torpidum qd ac pūrulentum  
ejectis: Cūm febi levicula Hericaria mōr'  
a cibo invalecentem.

Aureolente phthisi, et ulcero magis magisq; sicc' pūnto ac fōrdescēto, pūis loco sanguinis exu-  
stār, quod si fracerūm est, aqua infestum  
fūndūm petlit. Redit tñ satiūdē eructa  
exsiccatio et fricato ulcero (autē pūris  
lentorū obducto) per excandescētiam, la-  
borūm, vel tūssis impetūm.

In veterascenti et confirmata phthisi pūtris  
pulmonūm portio interdūm exit, et spūtūm  
carbonibūl injectioni, aut etiam pīrogrā  
reoleat, saepo etiam Halitus contagione  
imprudentis labefactans: his Capilli defluunt,  
et alimenti pemūcium toto corpore artefacti  
et invalecenti febus unguis in manibūt  
cūrvant, mala lividant tetra vaporo  
eo sublate, costarūm extrema siccitatē  
pūrū convellunt, dū n' tandem corporis  
tūris consumptū contabefiat, calozq; nra-

q. - Pleura affectus PLEURITIS est, squal vel.

Vera Pleuritis est phlegmonis membrana pleura vel etiam mucusclorum meso. . . . . cum febri assidua acuta; Respiratione difficultate, frigore, quenti ac furva; Dolore pungente ac distendente; Pulsus frequenter et irregulariter, durus ac tenso; Tussis initio interdum sicca, sed mox secundum humidam causam et inde spuitum coloratum existit.

Notba Pleuritis est vel.

Ratione SIMILIS. Notba pleuritis est phlegmonis exteriorum thoracis muscularium. Symptoma habens leniora, Dolorem tonitruum, et tussim siccam. Facile a. ab hac in veram pleuritiden, aut a vera in hanc fit transitus.

Ratione MATERIAE. Notba pleuritis alia est

Flatulenta est, quando status internum, branas seu externas, seu internas super inferens eas distendit divellitque a vicinarum partium adhaesum: cum dolore rigo calidissimis fomentis mitigantibus, ac saepe discessu.

Pituitosa est lateris dolor (potius exacerbatus, & fomentis non cedens) e destillatione contrastiles exortatus ab humor frigido ac pituitoso, e summo canthite percurrente in scapulas et omoplatis, tantumque in lateris seu anterioris, seu posterioris missentos extenuos illapsu.

q. - In CAVITATE THORACIS sunt

SUPPURATIO seu EMPYEMA, q. est puris in Thoracis capacitatem collectio, in cuius illius videtur pulm totis immixtis.

HUMORUM collectio, cum videlicet magna Thoracis capacitas sero, pituitosa, egyptensis humor secat.

44.

Symptomata partium Spirituum sunt ut  
91. vocis vicia sunt

259.

Rauco est, cum vox profertur rauca & aspera,  
vox deficiens omnino.  
aut sibilis & alta.  
prolongata & crassa.  
tremens.  
obscura.  
alio quovis modo vicia.

250.

Dificilis Respiratio est vel

Dyspnea est vel

Magna rursum duplex

Alia, qua plurimus Spiritus trahitur  
in gentem calorem sine obstructione  
liberis denuncians.

Alia, qua Thorax & Scapulae plurimi  
adoluunt ob meatus angustior.

Parva & frequens respiratione aut vixium  
imbecillitatis, aut doloris ac impedi-  
menti, (quod vel Pulmonibus, vel  
Thoraci, vel Diaphragmati, vel Mm.  
scutis insidet, vel Nervis insidet) index E.

Asthma est, quando cum difficultate ciboram  
ac si nimis motu fatigati essent, ducunt  
respirationem, tussuntq; sed nihil purum  
tenti expulsi, & in Pulmonibus internis  
dicit fistulatio quadam & stridor auditur:  
& vel continuo, vel per exacerbationes inva-  
lescit.

\* differunt  
si affectus  
securi: magis  
omnino.

259.

Otographia est cum difficultate, nec nisi recta  
cervice Spiritus ducit: qua affecti gesti  
cognoscunt, difficulter tamen accumbunt.

Dyspnoea seu Catarrhus suffocans est, cum  
spiritus magno suffocationis piculo duciti  
& nunquam respiratione omni subito  
interrupta suffocantur.

Tussis.  
Hæmoptysis. } //

11. Tussis expiratio est valida, quia quicquid spirandi  
instrumentis molestum est, exenterat natura contendit.  
Tussiendi a. ratio seu modus varius quia partis  
haec ut id quod molestum est, indicat  
se palato et faecibus quicquid infestam est,  
scrotum eructus.  
ex Arteria aspera tussicula cum tritac titili-  
tatione ac saepè propositante ardore.  
et Pūlmonib[us] valida tussi.

11. Hæmostisis seu Spuitio carenta e varijs admodum  
locis prodit: Quos tamen peculiaribus notis in-  
ternoscere licet, etenim  
vomitione aut ex gula, aut ex ventriculo est.  
Exspunctione simplici, e gingivis, lingua, palato et.  
Scrotum e faecibus & gurgulatione emittit.  
Tussicula e guttura ejicitur.  
Tussi tenuis floridus at spumosus sanguinis  
sine sensu doloris e pulmone est.  
crassus, grumosus, nigricans, dolens  
etiam thoracis parte, e thoraco est.  
innunc tamen et suppressa nazalem hæmo-  
staxis in fauces aut pulmone aut veno-  
trichilum relabens, postea grumosus  
ac concretus exsuffit.

Cordis affectiones vel sunt

Morbi omni genere (cor obseruit, maximus vero

Intemperies (simplex) omnis vias dissolvit,  
corpusq; languidum reddit, qd hoc secundum  
talis calor ac spiritus sanguis affectus unius  
verso corporis locantes laborant. et qd  
Calida Intemperie pulsū ac respirations  
frequenter, velocem, et interdū magnam  
cū febri plenamq; et expiracionē calidam  
facit.

Frigidae intemperiei contraria ad sunt  
Humidae pulsat mōlis plenis & languidis.  
Sicca pulsū extis, tenuis ac tibis.

Pblemoni.

Erysipelas.

Vlcs. &c

Yulnus.

Veneratiy minor crebro.

radis - incipientis qd difficultissimi  
cognoscunt, invalescentes  
vero facile sed tūm frequentes  
syncopas interficiunt ad statim  
sibi fecerit habent mortis repletio-

Symptomata. //

*Cordis* *intempore* *Calida* *divisit* *n* *incommodo*, *ad* *et* *alii* *sit*  
*stevioz*:  
[gravior, quando temp<sup>o</sup> sūm calorem toti  
etiam corpori communicaat, diciturq<sup>z</sup>  
*Febris.*

406

2

14  
53  
53  
53

// Symptoma Cordis sunt

Inbecillitas viasum, cum corporis universum ager  
 & difficulter actions obicit, non sit in motu  
 impotentia, membris resolutis, sed languidis  
 ac velut conquisatis. Philus inde de Cordis  
mota immixta sit parvus, languidus, tardus,  
rauis, intermittens, Myuris, foemicans, ver-  
miculans, ac magis de ceciscens, donec propositus  
in agonie Mortis cum vita tandem deficiat.

Animi deliquium, est in hōe abīc viventiū viās  
 omnium praeceps lapsus: Philum habens aut  
 nullum, aut extremitate rauum et obscurum,  
 taliumq; respiracionem: Extremis corporis  
 partibus frigentibus, et impotibus, cervice et  
 thorace frigido sudore madentibus, facie  
 pallente, tota corpore quasi enervato ja-  
 cente, atab omni sensu ac ratione deficiente.  
 Hoc malum si levo Ciphotyma, appellatur.  
 264. gravo Syncope appellatur.

Cordis Palpitatio, immoderata est concussio reben-  
 menti diastole atq; systole molesta. Cujus  
 tanta vis est, ut saepē vicinas thoracis  
 costas frigerit, aut illas, q; supra māmas  
 sunt. It propria sede depulerit: Saepē etiam  
 arterias ad contracti pugnū magnitudinem  
 foras dilataverit in Anæsthesia, in quo et  
 tactu et visu pulsatio conspicua erat.  
 Ita quidem affecto Corde arteria omnes  
 vescimentis pulsant, ne interdum dilatatz,  
 precipue vero q; supra jugulum sunt.  
 Nonnumq; ac perit in quiete remittit hoc  
 Symptoma, nonnumquam vescimenter exasperat.

49.

265.

q1.

Mammillarum affectis sunt vel

Corporis Mammille affectis, sunt vel

Mammille affectis sunt

Incretum, sive quando mamma supra  
modum augmentata non modo praequantitur  
et preengorgis, sed et intundit virginibus  
et viris accidit: Sanguine vel Lacte  
minus eo continuo.

266.

Decrementum mamillarum, quando illa  
mollis nimis, flaccida et pendula sunt  
Sanguine vel in corpore deficiente,  
ad eas non dilata.

Inflammatio mammarum est tumores calidi  
et auro doloreque molestus, ex redundantia  
sanguinis, vel lacticis copia (in praeruptis  
est gravidis) est coagulatione profusa.

Pilaris morbus, quem fingunt nisi  
ex pilo incaricato hahsto, et ad mammillas  
ut puto corpora fungosa delata, quicquid  
toribus gravissimus sit molestus, nec  
prius definit, donec pilas vel prossus  
sponte exeat, vel cum latente exsugatur.

Scizibus mammarum, est tumor durus  
ac remittens, concolorque ac indolens.

Sistina mammarum sunt tumores duri  
propris membranis obvoluti.

Ulcerata mammarum, sunt fæde impuræ  
continuit solatones, quandoque inde  
fluxionibus frigidis, quandoque ab  
inflammatione exorta.

Cancer mammillar: nimiribus tæpas &  
carnosas mammillas habentibus frequenter  
majora symptoma habent, quodammodo  
allo loco sit, ista vel  
Obscurus sine ulcero a mitiori summa  
Ulceratus ab accioi Atta bilo est.

Papillarum affectis sunt Exulceratio flexis  
Lactis Virtus. II

Absimptio parvata tota.

II Lactis vitia sunt

Concretio seu Thrombosis, est, quando lac in manu  
milkis casus modo coagulat vel in genitos con-  
crescit: unde dubius statim genita.

{Grimmientia a frigore.

Cascatio a calore.

Redundantia lactis, seu Sparganosis est, quando  
lac in manillis nimis abundat, & mole-  
stiam inficit; cum tumor, dolor, atque in-  
terdum etiam cibedim.

Defectus lactis est cum vel {panicum}  
nihil lactis intit-

269.

270.

3 - Inferioris Ventris affectus, vel sunt  
 271. Partium nutritioni inservientium, & quidem vel  
 ventriculi affectus vel sunt  
 Gula affectus, vel sunt  
 Morbi sunt

In temperie simpliciter cum adest,  
 excellente potentiaq<sup>z</sup> tristitia  
 hanc, toto oesophago equaliter affectu,  
 sine illo angustia doloris non sensa.  
Scirrhus aliud tumor ducus ac  
 frigidus oesophagi viam interclusus  
 dens, difficultem quoq<sup>z</sup> transitum  
 facit cum parte angustia.

Plegmone si inharrerit, iter vorax  
 tristitatem, locis angustiam, dolor  
 quoq<sup>z</sup> lancingans exercitat, cum  
 calore, siti magna, & febre, hinc  
 et tempore pessimi (sereat) exit

Ulcus tandem his succedit, a quo  
 dolor in affecta parte acerbior  
 erudit, qui nimirum in modis exacerbatur  
 si vel acer, vel saltem, vel  
 acidum, vel acerbum qd mortis.

Symptomata sunt

Transglutinandi difficultas.

Dolor q<sup>z</sup> in spinam dorso in  
 cibibus, a quavis molestia oris  
 Stomachi et ipsius ventriculi. //

Intestinorum. 56. — Ani. 60.

Mesenteri, et toni: 61. — Hepatis. 63.

Lienis. 64. — Vesiculae follis. 65.

Renum. 66. — Vesicae. 67.

Partium Generationi inservientium. 60.

// Stomachi affectus vel sunt  
Morbi sunt

Intemperies

Calidior cum est, ppter inexhaustam sitim appen-  
 titibꝫ & deliciatio adest frigidorum, laſio  
 a Meraco vino, alysſe calidis, aestus internos,  
 ructus nidorosſi. Quodsi ppter hñor  
 calidus biliosissqꝫ reundat, naſea quoqꝫ  
 aderit, oris amaror, cibi fastidium, &  
 erosionis cuiusdam ſenſus.

Frigida si sit, nulla ſitis, tarda concordio, eo-  
 rum calidariūm deſiderium, frigidariūm fa-  
 ſtidium, tūm admotaz tūm exhibitor: offiſiū  
 horar, ppterigratio, & ructis acidis evint.  
 Si ppterēa hñor eragus pituitosas imba-  
 at ſeit, gravitatis cuiusdam ſenſus ventriq  
 cibam ppterit, ſin offiſiū demoror, ſin  
 oris amaror, ſed cum naſea, languor,  
 ac diſolutione.

Humida offendit hñmidis, delictatūr ſicciis,  
 et ſolidioribꝫ alimentis, Si ppterēa multis  
 hñmoris agroſis innat, aut equis tūnicis  
 impnctis ſit, ſaliva multa in os exiſigit.  
 qꝫ frigilantem pituitorū ſin hñſi uobet.

Sicca fastidit cibū ſiccū ſolidioribꝫ,  
 appetit potūm, et cibū hñmidiorū  
 ſin eroſione, ſin gravitate, nulla deuiſ  
 naſea aut coniunctione.

Imbecillitas ventriculi diuina ſit affectus Co-  
 dialem ſenſi diuina ſit dolorum efficiens.

Frigidioribus, cum languidiorē appetitu evemens,  
 difficultem & tardam concordiam, appetitum pro-  
 tratum, naſeam, ructus, cachexias, &c. efficit.

Calidioribus ſit vehementiore appetitu evemens,  
 aride ppterita orale cocequī, & in bilem au-  
 ciesqꝫ ſuccos hotissimum ſalsa, acacia & ca-  
 lida aſſumpta aerti efficit.

Inflammatio: - Abscessus, - Ulcus. //

Sympomatica. 53.

275.

Inflammatio, qua in Vitrioli substantiam incidit  
cum ingenti dolore est, ardenti, prætingenti, disten-  
denti, pulsanti, & in dorsum usq[ue] protenso:  
tumoreq[ue] maximo contactu, interdum & visu  
conspicuo. Scapulae dorsum trabant; respiratio  
difficilis est, nec facilis deglutitio aut eructatio.  
conuentum nonnumq[ue] aliqd datur nisi vomitus.  
Febrisq[ue] adest aidentissima, sevisimis comitata  
symptomatis febribus. Si autem inflammati-

//  
Plegmone pura mitora traxo? symptomata s[unt].

ut ut tamen levissima haec inflammatio poni possit  
gravior multo est ea, q[ue] vel in secoris lobum,  
vel abdominis regionem huic incubentes invadit.

Abscessus si insequitur, non foras, quemadmodum qui  
in abdomine est, sed vel in ipsam abdominis  
spatium, vel in ventriculi cavum nisi eructat,  
aut vomitu aut dejectione conspicuum.

Ulcus sive ex abscessu herculeum, sive ex affinitate  
caustico aut septico medicamentu, sive ex humoris &  
simili facultate profluat eo se infigente, profluit est  
exitiale: sicut & os corruptio ac labes a toxice  
aut venenata potionē ipsi iniusta. Estas hoc  
malum vel cum vel sine dolore, lentam tamq[ue]  
febris habens eamq[ue] assiduam, & in pulsu crebre  
ac frequenter: appetentia, concoctione, oris vena-  
triculi functione sanguinante alii dejectio aut  
vomitio fatigat, corpus malo ait, scissisq[ue]  
ciliis vita privet.

277. Symptoma ventriculi sunt triplicia, Alia n. habet  
Rudentis sensa exquisita est perditus, precipue a.  
Stomachis seu ventriculi suptriūs orificiorum,  
si ab inborante quādam mā, alijsve affectib;,  
male officiat, excitans & aut

Cephalica Symptoma excitant, cūm p̄r coni  
fusum cerebri Soporē, veterū, Incubūm,  
Catalepsim, Epilepsiam, Delirium, Melancholiā,  
aliosq; affectus plures producunt.

Cordialia Symptoma: excitant, cūm p̄r Cordis consensu  
Animi deliquū, Syncopē, & Cordis anxietate affect.

Dolor Ventriculi (hūi potius Stomachī, quā &  
Cordis dolor nūq; nominat) est, q̄ proximū  
sib; pectoris sept; anteriori; sit in molli &  
mida (ibi nūm̄ costa ab invicem dehiscenti;  
regione, q̄ forē Cordis dicitur, occurrat;  
ad sinistram latitudinē, & horūm r̄sq; proli;  
tensus. Estq; vel

In solitus Ventriculi dolor (Cardialgia  
dictus) est vel

Comprimens seu distensens dolor (q̄ &  
Cordis compresio dicitur) est, cūm in dicta,  
cordis, costis, pectori vel distentio qdā sentit, ti;  
nūm̄ levata, mūrū gerimus, cūm affectib;  
fere protrato, sapit & cūm naufragi, sūnq;  
& venientib; aliquando ructibus, vel  
vomitū, vel diarrhōa, qd; etiam levant.

Rodens Cordis dolor (q̄ & Cardiagnos, &  
Cordis rauso, seu moxius &) est, cūm  
erosione & inveteratione sensus cūm in  
punctib; interdūm obvulsus in dictū sit.  
Cordis regione sentit, accidens annas, u  
q̄ non compresionis aut raudoris sensu.  
Fidens dolor est, qui Calore vehementi  
ac veluti usendo multat.

Confundens stomachi dolor, seu Cardinalia  
super & levem ob causas rūnit.

279. Crateris sedis est appetentia.  
280. Crateris ibi promptiū.

54.

// Quatenus Stomachus est sedes appetentiae, ex illa vel

201. Appetitus deficiens est vel

Anorexia, cum cibum non appetantur, sed potius

fastiduntur.

Apositia, cum non satiscentur, sed potius desiderantur.

Fastidium querundam ciborum est, cum certas

quosdam cibos, etiam bonos et certos precepi-

tos, vel potius convenientes ut Vinum,

(grales Abitentes dicitur) fastiduntur.

202.

Appetitus depravatus est vel

Appetentia minima est vel

Pessimus est, cum essentur immoderatè

et aridus ciborum, quoniam per se appeten-

tunt, tamen vel rara satiatio possunt, vel

vix prius concerto novum expectant.

203.

Canina appetentia est, cum adeo imo-

moderato cibum appetantur, ut pra-

minia copia cum rausus eremer-

cognant, et acibo ut cants ad nos

mitum se confundant.

Pica est, quando aliena a cibi potiusq;

natura appetunt, qualia sunt terra, lata,

crux, carbuncus, fructus acidi et accepti,

fimis, calx, citta, lutum, purum attuliti,

uria, pustula, et quoniam plurima.

Quod vitium tenetquam viros et virginis

caelisticas, potissimum tamis Gravidas

multipliciter, ac precipue primis gestationis

mensibus, infestat: tuncq; Malacia nota;

204.

Sitis immoda est, cum non intempestivè sitis

admodum largit, aut aliquatenus adta magna

est, ut largo poti nix expiri, sedarum posse.

53. — Quatenus Ventriculus est cibi præsumptuarius, et  
prima coctionis officina, accidunt in eo

Cruditas est coctionis prævaratio, quia cibi nibil mutantur.  
Bradypepsia, vel Dyspepsia est tarda difficultas  
cococtio, quia cibi semicrudi manent.

Vitiata Concoctio, sed Diaplerora est, cum cibis cor-  
rum pungit, alienamq; acquirit qualitatem.

Inflatio Ventriculi (Cruditatis soboles) est, cum flatus  
Ventriculum impletus distendentem illius dolorum  
parvum parvum.

Rictus est cum flatus a ventriculo et diafragmato  
sistim excludit cum oris erupitu, nunc hidoro,  
sunt quid, nunc fætidum, alias aliquid quid  
vel etiam nibil addens.

Rugitus est, cum flatus intus in ventriculo, aut  
etiam intestinis inclusi, nec exitum inversen-  
tus, discurrendo per bordum caritatis, diversos sonos,  
strepitus, miratura, fluctuationes, coaxantes  
zandalium sonitus, aliorumque animalium in abdo,  
mimorum, maxime circa sinistrum hypochondrium,  
aut umbilicum, aliisque locis edunt

Ebulliens ardor Ventriculi est, cum qd evictare no-  
lens vehementem ardorem sentit, intercluso veluti  
aero flammæ in gula, peripat a simpto cibo,  
corporis validius per motum vehementius agitato.

Singultus est convulsio ventriculi motus, quo  
in proprium corpus seu tunicas impulsa sunt, ex-  
cuteo conantur.

Nausea est inane vomedi desiderium: quo mil ejicitur: Sopro-  
sponto sine illo conatur Aquæ pellucida ex hoc pellit.

Vomitus est eosim, qm in Ventriculi spacio statut, siccum  
facta, egestio.

Vomitus cruentus est, cum Sanguis vomitione redditur.

Cholera est bilis tam superne tam inferne eruptio,  
qui affectus acer, sevior, & impetuus acutus  
existit. C: p: 53.

Intestinorum affectus sunt et

Morbi sunt

Ostendit aut calentia prolapsione facie dejectionem interpellat.

Astrictio.

Inflammatio in gracilia intestina raro incedit: at in crassiora, q̄ sanguine multoq; carne preedita sunt frequentes, maximisq; in illis quod rectum appellant. Estq; enim dolor ex ha-  
bitu acri & lancinanti, (quiq; cysticrē anou-  
dyno in rectum in medium exadit). Tunc eoz  
fijo & constans, febri audentiore, et asti-  
phs conficit exspirante & iniquali rigore  
satiguntur: desidere cupiditatis inani.  
Quibus signis a Dysenteria distinguuntur:  
Inflammatio si in Colo aut recto intestino  
sustinet Colicus dolor aut, si in terminali  
Ileus, et si magna ad levem & extenuatum.

Abscessus ab inflammatione erithr., eoz exupto pri-  
minum sanosq; m, deinde album & concordium  
a pedice exigitur. Dolorq; ac febris &  
alia symptomata evanescent & habilitateq;  
impedimento alvis liberis exit.

Ulcus vel ex abscessu, vel ex dysenteria aut sensi-  
mo restringitur, cum dolore fixo, eoz sensu  
debilitatem intestina sapientis onus suum desio-  
nunt, eum tantq; modo extantem purulentam & sanam.  
Id si carum, pionum in parte humidam & ex-  
ercentis prua, atq; sordidum manet, ac vi-  
tandum cicatrice obdimit, et nisi diligentius  
scravens, tunc in fistulam, vel canum definit.

Symptomata. //

## II. Symptomata Intestinorum sunt

Deficiens alvi dejectio est vel

Tarda dejectio alvi, vel pigras est quia facies et  
cibi reliquia raro nec pro assumtorum actione  
descendunt per hanc facies necessario obducuntur.  
Nemis, Volvulus sed Convolutus, Eleos, Misericordia,  
et cum excrementorum via proposita occulta est,  
itnq; idem ut nec cibas descendat, nec elytor  
ascendat. Atq; & initia intestinorum: nimirum inten-  
dentes circulum mucosum, rectus iranicus, malisq; utr;  
triculū omnium hinc modo existentes. Accedit Pitti,  
ita Biliarum vomitus, atq; alimentorum stercores  
nidus iniquatorum post et in mortis vicinia  
ipsius & stercoris refectione.

Redundans & Vitiosa dejectio est vel

Catrica affectio seu passio est, excretio alvi fætida,  
tuzalis, in qua subevis & cibo concovo genitus,  
seu chylus, mire crudior adhuc, & impuncto coctus  
& proin fluidus & subeintus, aut reluti latofus,  
mire multus elaboratus crassior, & albior:  
coquitor interdum & fuscus, alias purpureus, &  
perenniter graveolens egerit. Iust. a. regu ad,  
modum debilis multaque coloratus & pallidus evadit.  
Cateria est, cum cibi parum vel nihil mistati,  
cateris excrementis misti, vixq; separati  
involuntur p; alvum profundi.

Diarrhoea, Alvi fætus, seu Flava, est alvi pro-  
fliuviatum, quo sive vescementis doloris sensu sive  
ceridore hinc modis deflant. Estab vel  
putridosa easq; vel crassa et mucosa.

Serosa. Itemis & spinosa: dictisq;

Biliosa, quia bilis ardens, ac perlungaq; spinas efficit.  
Melanocholica. Ethrus cerebralis.

Atra, & cum diluta picea, vel laeta medulla  
conferti possit.

Cruenta, } dejectio. II.  
Putrida, }  
Unita

299. Centa dejectio est vel

Dysenteria est cruenta alvi dejectio cum dolori,  
ventris torsione, & peritumq; cum febre multa  
mitosi, modo maligna, pestilenti, & contagiosa.  
Frequens adest desidendi cupiditas, aliquando  
omitta, aliquando potea cogitans. Nonnunquam  
cum gravida mulier est de intestinorum tubo  
stercor aliquid decedit. Aliquando puer san-  
guinem mucus quidam excrevit, vocatusq;  
Alba dysenteria, q; gravior est rubra, cum  
ab intestinorum substantia (q; membranosa est)  
magis exalcerata proveniat.

Tenescens est assida desidendi cupiditas circa alias  
torsiones, siccus q; non in dysenteria, in tanta  
milit puer mucusq; quidam & sanguineus  
est phaenomenum cogitans.

Hepaticus fluxus est, cum dilatatio & aquositas eis sanguinis  
recens carnis letitia similis, p; latum effundit.  
Sarcus qd; afficitur sed virtus functionesq; na-  
turalis admodum dejectus, cum siti alysa  
accidentibus, nocte ciborum & copiose, ac  
ante tempore, sicut namus dolere afficiens.  
Hamorrhoidalis fluxus est, cum sanguinis scorbutus  
& sanguis, ac rutilus plenumq; interdum gur-  
mi ridentis fustar sanis p; pedicem emanat.

Purulenta qd si doloroso excretio, qd si  
dolorosa est potica reddit, ab ulcere est.  
doloris expira, & copiosa ex abscessu est, (Mescutery-  
patica, nle vnu purulenta,) Lascit.  
upost longos dura morbos melancho-  
licos, duransq; agitationis erunt.

Unobscusa excretio, cum excreta quasi adipe, vel  
bimaculata, vel lata; vel alia pinguis dura pufa videtur.

37 - Vermes maxime intestina infestant, cùm ventris difficultate, mürmur ac mortis, licterico profluvio corporis dissolutione, facies pallor, visus laesus, unius inq[ue] primitu: Cùmque in cibis plenaria agitati suspirant, intestina mortu[us] aut suctu[us] serunt, ac siccum tussim mouent; Ovis ventriculi praeordioribus compunctionis synchia, epithelia; astutu[us] retro latrantes, devorandi conatus, & strangulandi mutantur inferunt. Sunt a. alijs Longi ac Testiculi, q[ui] nullis proprie[bus] umbrii dicuntur, & potissimum spiculis intestinis gigantur, indeq[ue] nonnumquam descendunt ad ventriculum, ad os, ad narres.

303. Pectinores & Lati, seminis lucubita effigie, q[ui] vel in Cæco intestino, vel in Coli cellularis præcitantur, ac sapientia sericea inter se coherent. Interdum multo horum ad basem oritur Vermis ille latu[us], quem Graeci ob similitudinem, Larvices appellant; in ipsis postrem, quibus pigror[um] tradicor[um] alijs natura est: figura a. & magnitudine sic vermis differt.

Exigui & Testiculi, similq[ue] Testiculi (Aesculides appellant) sedem fecerunt in recto intestino & spinacibus habentes nonnumquam cùm adulor[um] fecibus mixta existunt: aliquando etiam primitu[us] quoque invaserunt serpentis.

304. 7 - Dolor intestinorum, præter eum, qui a phlegmone, Dysenteria, Vermibus, alijsq[ue] dictis affectibus provenit, est vel Colicus dolor, q[ui] in cibis intestinis accidit, alias Vagus & instabilis, a flatibus by intestini congestis, Fixus & atra excrucians (sine febre, a crassa pectora, cùm febre, ab acri humoris).

315. Giacus dolor, q[ui] in temib[us] intestinis subsistit. alias Fixus circa dictum fatus, et in ambo umbilici vagus, ab obstructione vel adstrictione. Viticans, zodiacus, uritus, et dintrenus ac statiu[m] recurrens, ob intestinorum phlegmos, rabiliter in eorum fluctuat, sc̄ insimulante.

## Ani affectus sunt

305. Pblegmon, quia dolor lancinans, & premeendo  
ingravescens, & febrem conitetur habet, alio  
miltos dies sape subsistunt, & non nisi diu sano  
conciatio satunitur.

Abscessus & pblegmon relictus in recti intestini car  
atum potius quam cibem evanescit.

Ulcis rapto abscessus manet perculentum ac secundum  
hunc in fertilem degenerans: visimq; intridus,  
in uterum, intedum in vesicam plectans.

Rbagader seu Fissurae sunt ani kleissula oblonga,  
quibus spinositas rima profunduntur.

Intertigo est cutis ani abrasio, seu excoriatio, seu  
attrito, ab egatione, ambulatione, &c.

Condyloma dñrum est tuberculatum in Ani marginis  
estrum aut verruca aut grani lura, aut matris  
meri, aut fuchs, aut cutis rugosa et callosa, ac  
crista Galli effigie: alias molestiam alias doloris  
accidentia fistulam inflationem, his locis adfert.

306. Hemorrhoides vel consideranda

perso est vel  
externa, ex pedice fibratus ac promiscue citig  
provenientes & condyloma, cum dolere graviter  
nondimpin callosam hystericam concrecentur.

Caca appetitatis, si nihil sanguinis effundatur  
si vero appetit sanguis effundatur, tumida adeo ut  
interna hemorrhoides multo fieri sensu dolore

tumescere supradictum sanguine tristat.

Symptoma Hemorrhoidum sunt

Profluxio immoderata Hemorrhoidum est  
cum sanguis vel soprosig diutius {par est, slani  
sapientus}

Supressio Hemorrhoidum est, cum quilibet  
intervalla fluerit solent, supprimuntur.

Ani procidentia est, quando anus modo sponte, raro  
egredi, conatu procedit, appetit spinositas totius  
intervallum inversum apergitur, sit per retrahi neque

50. / Mesenterij & Pancreatis affectus sunt (p. 310.)

Tumor Mesenterij ex magna subtiliorum humorum  
colluvia fructis vel est

Caxus & Mollis, q. n. nisi pressu animadvertis, & sine  
doloro est: sed sola mole intima primum  
& coadunans sapio officit, quo minis facili  
descendent.

Durus tumor ex molli magis magis succedente  
nascit, adeo ut venienter & vero secessus erat  
usq; adeo interdum durus durebuntur est, ut  
sensitiosibus sub Umbilico partibus vel ls, vel  
calculis concretiisse putantur.

Inflammatio Mesenterij est, cum ab excessis aut exstis-  
ti illius venis Sanguis excedit, & in aliqua sede pte-  
riam collatoris patrescit, tandemq; suppuratione ab-  
cessum facit: sive manifesto doloro, nisi fortio-  
mentum tunc format, solum gravitatis sensum ha-  
bens, Febrisq; admodum lebem & lentam, sine gran-  
cibus symptomatibus.

In hac regione quidam in sensu adie-  
scunt rotundum modo cholera,  
modo Melancholia, Diarrhoea,  
Dystenia, Cachexia, Atrophia,  
Langorii, Lentitum, Erransium  
Felicium, vel Jenissi, ejusmodi  
gravium & diffusorum morborum.

312. Hepatis affectus vel sicut

Morbi sunt  
Intemperies.

Substantia corrupta, qua secur laborans sensim languore contabescit, cum frequenti animi tono  
quid deliquio, principio ad senior, deinde sudore  
rigido exstincto gravior & perniciosa.

Imbecillitas Hepatis intemperie et substantia corrupta, consequitur, quia qui tenent, proposito  
Hepatici dicuntur. Si non, y affectus tantum  
persistunt, perturbant imbecillitatem innibet,  
& labefactat vel Jeoris.

Attrahendi facultas effundit liquida maa ab aliis

Retinendi vis latifaciat, ita qdys, ut aliquando  
excurrente liquida somnosa, instar letaria camili  
vel Cribra nimis Hemorrhagia nascitur. Utroq. eis

Concoctrix seu Sanguistica vis si imbecilla stat  
orintur crudelitatis.

Obstructio jecori ad modum fumiferis est, cum gra-  
vitate & distensione, obtusoq. doloru extenso  
insidente Hypochondrio tum peripne manifestis,  
cum qd alibi abscondit, aut mox a cibo exegesta  
tione subit. Ita in stomacho, sine febre.

Sciabibus dorsi ac sternis dolorisq. exptus tunc  
cum facilis in dextrum, difficult in sinistram debilitate.

Tunc jecoris seu sciabu est pectoralibus magnis, & in  
jecoris ambientes membranas effundit.

Hepatitis est Jecoris inflammatio, quia sanguis illius  
parte quadam ppter natam collectus incendit,  
cum gravitate & dolore, spissitudineq. difficultate,  
Tusci, ac Febri ardenti & nocturna. (v. 316.)

Abscessus Hepatis ubi inflammatione ortus habet,

Uter ex abscessu relictum perpetua colluvio seru-  
deicit, neq; anguum protest sanguinem.

Symptomata. — 64.

50 Cenis affectus vel sunt

Morbi sunt

319.

Tumor distendens, laxus ~~est~~ nō admodum resintens  
interdum sicut figurāq; Cenis efficit.  
Universum Hypochondriū impliet.  
Suntq; Umbilicū prolabit.

cum difficultate respirandi, coquio laesa, &c.

Obstrūctio, cum humor in Cenū subsistens crassificet  
cum Hypochondriū gravitatē, & quandoq; in dolore.

Sciabūs ab obstruktiōne ortus modo solus Cenis &  
substantiam occupat, modo in partes vicinas  
quodq; distendit ut tēm plurimq; abdominis  
sinistrum regionem impliat.

Splenitis, seu Cenis inflamatio raro accidit: haec  
vitio dolorem pulsantem, febrem assiduam,  
& ardorem, cum singula lento migrante,  
sit implacabili & cibī fastidio: ac sinistri  
Hypochondriū distensione atq; humorē.

Ablcessus, & plegmonem sequentia.

Vesicis, & plegmonem sequentia.

321.

Distensio flatulenta, quam phaeozūm illūm  
dolorē, Cenazēm dictām (qui sanis plerimq;  
sūbito in latere sinistro, aliquando et dextro  
potissimum post cibūm valide corpori agitata)  
efficerē vulgo existimant.

Alij tamen certius hunc dolorē a Priftonei  
distensionē a flatibus fieri afferunt, scilicet  
Pleuritis motu flatulenta aflatib; is perducit.

Symptomata. //

Symptomata Ictericis Sicutisq; Sunt

61. Icterus, Morbus regius, Aürigo, Arquatus,  
est diffusus humoris & summa corporis effusio.  
in qua album acidozum, & partis. Quicunq; tenu-  
pora sunt, interdum & cibis tota vel pallida  
vel flava, vel citrina, vel subvivididi colori suffundit;  
corporis via sedante, sed pruriginosa & torpescens.
62. Arquatus natus est Melancholica humoris in cutem  
& corporis summa effusio. In qua coloris vividi  
fluo fecit, obscuransq; levibus, & subnigres apparet.  
Corpore minus qd; q; in ictere in gravescens,  
mente tamq; tristis imaginibus magis perturbata.
63. Affectio Hypochondriaca utriusq; visceris affecti sobolit;  
est vel [Melancholica alia] mittor.
64. Biliofa. (324)
65. Atrophia est nutritions error, quia corpus sensim ex-  
gescit, & absunt, sine cum corporis tenuitate.  
estq; vel (totius corporis  
partis alienas).
66. Cachexia est malis atq; vitiis totius corporis habitu-  
onis quidem ejus existente plena, sed tunc coloris  
substantia vitiata, pallida, livida, citrina,  
igualida, ac interti. Estq; vel [cetara et peritaria]  
Melanochistica.
67. Hydrops alia est e.c.
68. Anasarca est multis corporis incrementis prout  
naturam: primum quidem predib; tumefactio;  
deinde univiso corpore legisabilitate insufficiens;  
mollis, pallido, & emaciatu; cum febre tanta.
69. Ascites est abdominis ex fibrido aquoso, sero qd;  
humore distentio: corporis reliquo maritib;  
ac liquescetur, cum respirandi difficultat.
70. Tympanites, est abdominis ex multo flatu illis  
capacitate concluso distentio: Nihil in  
ascite minor, minimeq; gravi ac partim flan-  
center angulo percussus ut tympanum timuit.  
Si vero si flatus n; in abdominis capacitate;  
sed in intestinis fluant, vocat Tympanites  
Intestinalis.

50. Vesicularia Felli affectus sunt

Obstructio aut illius ductus quod Bilis se recessu prolixis:  
Intestinum persternit producit: Cysti in Intestina causa  
Faeces negliguntur, albas relinquuntur: ut infus cysti fillis  
copia distringit.

332.

Calculus in cysti felis persternit concrevit nigri sed  
tamen levis, & q Aqua immersis involuta, seus q  
is quicunque renibus aut Vesica est.

Repletio Cystis est, cum Bilis in ea exsuperat, & quem  
intervale tantoper, ut eam in ingentem distendat  
magnitudinem.

Inanitie Cystis est, cum processus exinanitus, tempore suum  
Bilem foans eridat, aut Biliofus vomitiones,  
aut Choleram morbum, diarrhoeam, Dysenteriam,  
aut Antricinum sibitem, aut reinarum vel pr  
niuum et eructum, deinde crusparum et saturato croci  
coloru, aut alia bis finitima symptomata coecitat.

## 333. / Renum affectus sint

50.

Calcaris renum ratiis est, nunc arenosus &  
sciabilis, ruber & flavus, vel cinctus: oblongus  
vel rotundus; equalis vel irregularis; major non  
nove, minore siccans & solidus, cinctus & albus.  
cum dolori sub Hypochondrio ad latris spina,  
Coxis ejusdem latbris torpor, ac urina turbida  
carent, cum sedimento nigro, interdum alba  
& turbida, & postea subedita nigrum veluti  
cretaceum in fundo habente, interdum artus  
et fabulosum quid albidum, aut quoniam continentur  
interdum aquosa, ac aliquantus vel propterea siccata.

334.

Nephritis est renim inflamatio raro quod accidens,  
interdum tandem cum cæliac aut calvico laesia de  
ribus oritur auctissima flexione p. Vasa exilientia: cum  
adors ingenti ac febri aspidina, dolori q̄z gravi pul-  
santi, naustra, rictibus, ac cæbra venatione.

335.

Abscessus utrumq; quo prævulta materia coerets, sive  
ex sordido ulceri & cupido, cohibito utrumq;  
p̄s capite sickeris obstruto, interdum tamq;  
ex pleiomond oritur, ades et distensio vnde tumor  
cicca tumbo & lîna foras prominat.

Ulcus renim diuturnum admodum tib; ac fere immo-  
dicabile, sordidum ac fistulosum: modo p̄s, modo  
micosum quid urina miscens, quæ tandem gelo  
sedimentum id micosum depositum.

Nephriticus dolor est acerbissimus Renim cruciatus,  
aut certe iacetis (cui excipiuntur isti statim).  
Is in renis sibi fixis alteratris latere stabilit, &  
nisi q̄ interdum vel ad coxandicem, vel l. ad  
testiculæ & directo facit, rectoris tractu p̄tus  
tendit, nec sit Colicis dolor in medius cibis  
aut omnem illius regiōne marmoreo quodam  
evagat.

336.

50 — Vesica affectus sunt

Calculis Vesica quos variis est magnitudine, substantia, colori, figura atque situ. Qui dum adhuc levem & exiguum est, raga tam & obtranea circa pecten & perineum sensib[us] titillatio: grandis vel n[on] incubentis gravitatis pondere precipiter, mictio non crebra, minime continua, sed intercisa: cum dolore acerbo circa finem emissionis, modo uero versum pudenti ductum, modo solas glandes affliguntur. constanti hinc meicubi conatum desideri cupiditate.

Inflammatio, in vesica, sed spinoltri cervicis musculo insinuans eam sebi ardentem & acutam, dolorem acerbo & lancinanti cum rubore & ardore in pennis exacerbat. Veina suppeditat, summo tamen meicubi conatu; aliisque solito adstrictior est.

Abscessus sed Suppeditatio cum sit ita ingens sentitur; et autem aperto mittuntur.

Ulcis aliud Gangraen, ex abscessu ager si levatus, sit in spinoltri cervicis ne solidum non regnum & perineum aut anum prosequens, inde tunc effundit uera.

Levis vesica ac ureterum ulcus, est vintare intrioris pellitur abrasio.

Mictio Symptoma sunt

Diabetes est immoderatum urina profusum, quo assumenta potio nihil mitata profundiatur.

Frequens & interruptiva mictio est, qua iusto tempore quietius ad excretionem sufficitur.

Urina incontinentia est, cum ea semper accidit & deloris sensu manifeste excedit p[er] arbitrym impensis.

Schyzia est, cum urina proflua suppeditat: nec ergo exire.

Dysuria est, cum urina stillatim gemitum interdum, interdum effundit magno cum dolore & cruentu exire.

Stranguinaria. Urina solidum est, cum urina stillatim ac guttulam reddit, alias conatur sine dolore.

Mictio cruentu est, qua sanguinem phaudit, irritacione, & uimenti dolore.

337.

338.

339.

340.

341.

342.

343.

Hu. 520.

68.

344.

50.

Partium Generationi dicatarum affectus vel sunt  
Genitalium Vizitium affectus vel  
ab interioribus potissimum provenient

Satyrizans seu Salacitas nimia est immoderata ad Ventrum propensio.

Priapismus est penis arrelio et incrementum permanens circa libidinis stimulatio. Hinc interdum cum intus circa inflammatio est.

Gonorrhœa est nimia Seminis profusio, vel cum sensu dilatationis nocturna polluitur est cum p. Insomnia libidinis, vel in affectu rei Venerea cogitatione sensu cuius periret fuit.  
Sime voluntate Gonorrhœa est vel

Simplix Gonorrhœa est invita et nimia Seminis profusio levii aut nulla oblectatio circa ventrem, libidinis, aut diligientis.

Vigilante Gonorrhœa est cum seminum vigilanti pariter ac dominanti ad remittentem circa voluntatem ac desiderationem exit, sit virus album et flavescent affect.

Inpotentia Venerea est quando exercitium nostrum in recto perficit: vel extinuta virilitate, vel p. Semen emitti non possit.

Penis affectus sunt

Phymosis est cum sic glandes Phytium tegit, ut cindari non possit.

Periphymosis est, quando Phytium retrosum deductum reddi non potest.

Inflammatio ab iustitia sanguinis

Abscessus ab inflammatione exterior

Exulceratio est vel

Cervix in penis dicitur fit, abrasa iuxta tunica.

Granos exulceratio scissa et cara est

Carcinosum tuberculum instar verrucæ pulvinantis modo uno, vero deversis in meatus locis ortum usque viam angustat ait seculum.

Corruptionis penis est cum Gangrenam, sed mortificationem (ut loquuntur) contrahit.

Uteri.

70.

Scrota  
Testic.

==

345.

346.

347.

348.

// Scroti & Testicūm affectionis sint.

Inflammatio oritur a tenui servidoq; sanguini inservi,  
tum et testes perit nāas illapso, tumores, dantis,  
ruberū, calorū, dolorē q; tunc iuntur illis  
partib; infert, ac febris plenūq; comitis habet.

Tumor dicas ex inflammatione mali curata attingit,  
color p; propriū extincto. Sola uicta dantis sint dolor, et

Ramex, Hernia, Rāx. est cūm quippiam in alterā,  
tram sedem illapsum tumor facit. Variat vel  
Loci ratione alia est.

Ostrococelus est ramex viris propria in scroto bar-  
ius, rūsto vel relaxato illo processu p;rin-  
tonai, q; ad Scrotum pertinet. Cus.

Bibonocelus, quā in lingūm utriusq; sexū accidit.  
Omphalocelus, qd; umbilicūm occupat.

Ulabentis ratione alia est

Enterocelus est, cūm Intestinū

Epiplocelus est, cūm omentū } illabit.

Hydrocelus cūm aquosū tumor } (p. 252.)

Pentumatecels cūm statūs

Sarcocelus est, tumor carnosus, dorsi, gravis,  
indolens, fixus, & tardo crescent.

Cirrōcelus est cūm Vena spermatica varicosae,  
sunt, seu intumescunt & contorquent, adeo  
ut tenūnq;am vel Sarcocelum vel tertium  
testicūm esse quibusdam suspiciorū det.

Contingit a. aliquando ut & duo ramels  
uni accident. Atq; hinc dicunt  
tricocelus.

tricocelus.

Septē etiam rebententi cogitatione libidinis colligit  
semey inter membranas sed tunicae & testicūm (darton  
puta & stybroidea) ut aut caput testicūlū, aut  
scrotū mutat. C. xxvii. n. 165, c. — 14. 170, a.

70.

Uteri affectus sunt vel  
60. Morbi vel subsistentes

in ipso utero subsistentes morbi sunt

Plegmone est uteri tumor calidus propter naturam  
a sanguine per uteras temores et venae causa-  
ri in uteris caritatis sed substantiam effuso  
accenso ac pectoris ostis.

Abscessus est uteri tumor ex pectori sanguinem  
in pectus transcurrente profectus.

Ulcus est in utero sola impuraq; continui so-  
lito, estq; vel

Lerius est, quod in utero, quod in cervicem  
interiorum pelliculam corradit, ab  
tantum modice excavat.

Gravis est, q; altius penetrat, et majoris  
noxiam inficit: estq; vel

Sordidum, q; ex rupore abscessu est.

Malignum, q; mali humoris est, et diffi-  
cilliter sanatz: inde sape evanescit  
Voma, q; sunt deponentes et effec-  
tata uteri cicera.

Carcinonata nomis malignitas,

ob humoris atabilaria: et maligna  
Putridum ulcus est, in quo n. tautum  
id, q; exit, sed et ipsa uteri substantia  
componitur.

Serratus est uteri tumor prater numerum durius:  
acutus, concolor, et indolens.

Obstruictio est vel

a Mola obstruictio est, cum in Utro capi-  
tato moles carnica modo infernit,  
modo formam aliquis rei resiliens, granulat.

Flatulenta obstruictio, seu Inflatio Utro dia-  
gnata menstruorum: eversione 3 evenit.

Aquosa obstruictio, seu Hydrops Utro est,  
cum magna aqua: copia utero colligit.

Sanguinata obstruictio est, cum a utero  
dante in Utro passis sanguine: ea obstru-  
ctus, ut inde Utro intrahat, atque  
est ingrediuntur quandoq; mentiat.

353.

354.

355.

356.

357.

358.

Symptomata. //

In pectendo mulier. //

// In Ditendo mīliebri proveniunt solent

Condylomata. } et q̄ sūb his comprehend: } Distula præcīgina  
Hæmorrhoides. } Verrāca.  
Pblegnom. } Syconis.

Abscessus.

Vicera. et q̄ sūb hoc comprehendunt } Excoriatio  
} Rbagades.

// Symptoma Uteri sunt

Mensium deficitus est, quando in fæmina q̄ uer lactat, ne  
 uterū gestat, sanguinis p̄ uterū evacuatio, quia  
 alioq̄ nātiter singulis mensibus fit, ratiō perditur  
 procedit aut in totū gressus supprimit. (p. 359.)

Mensium proflūvium est, quando māliebris menstrua  
 purgatio immoderatis procedit, sive id fiat uno impetu,  
 sive iusto longius, sive frequentius, sive stillicio.

Fluor uterinus est, cum n̄ stucerū sanguis, sed corrupti  
 humores ex utero proflūnūt, id est continentur, aut  
 nullo ordine milloq̄ cirentur.

Gonorrhœa est invita citra Venerem Seminis profissio.  
 est vel Levier, q̄ nullas malignitatis notas habet,  
 citra titillations per intervalla flētūs.

Gravior est vsuēta Gonorrhœa, q̄ impura  
 Veneris infligit, quæq; est id, ut Utérus  
 fluor, fertur, crassiss tamis id est q̄  
 fuit, quam in Utérino fuit.

Uteri strangulatio, seu Hysterica Suffocatio est quando  
 ob malignū quendam vaporē ab int̄ro ad sibi  
 partis curvissim varia excitant molesta Symptoma  
 prout vlt ad Cor, Cerebrum, Fantes, Diaphragma, et  
 ad Ventrículum strūnt, inter se diversa, ac p̄t. Cura  
 cūtis respirationis, alijs qd̄s tardiūs, alijs cerebris.

Motus inconveniens.

Dolor. — — }

Partis vitia. — }  
 Conceptionis vitia. }

Motus inconveniens Utori statuitur, cùm e sede sua vel

Ascendit cùm pudenti quodam praeconditor: dolor, spinae  
randi difficultate, animi delirio. At sine  
onere, sive delirio, aut alio symptomate gravissimi.  
Ad latera aut alteratum inguen contorquens cùm  
inguinis ac sape coxartis uterini dolore,  
cūrisq; totius ac maxime feneris forpo ac  
frigore.

Descendit utrbris supra pudendum, ut in eo subsistit,  
inter ambas laniam trispitulum, impedimentum  
ac ponderis molestiam, a quo ventre & lumbis  
deorsum trahi videtur, adest.

Foras prolabit uterus, seu procedentia Utori sensu  
facile cognoscitur.

Dolor Utori, est sensatio uteri tristis ab inflammatione  
aut distensione flatulenta provenientis.

Conceptionis vitia sunt

Sterilitas est quando mulier viri consuetudine uterum  
non concipit, nec generat. (¶ p: 368. et seqq.)  
Conceptus ingratius est, cùm alium in utero sextum  
expetient, vel stolidum, vel vixentem.

Partus vitia sunt

Abortus est cùm fatus immaturus interuptus  
sunt ante terminum partus natali destinationis  
ejicit, aut extinguitur.

Parvandi difficultas, quando fatus in hanc lucem ex  
utero magna difficultate, aut vix excernit.

Secundinae retentio est, cùm ea excrescentib; et tunc  
pregatio post partum inconveniens est, cùm effusio

sanguinis aliquamq; excurrentium per uterum  
necessaria sit, q; p; dies aliquot et copiosus &  
menstrualis fluxus fluere solet, aut

Dolor post partum est vel

distendens et in prædendis sed circa unum ventre  
distendendo p; aliquot dies, aut horas plures

Inflammans.

3. - Habitus corporis affectus sunt

374. Habitus, seu Carnositas, c<sup>o</sup> Pinguedo nimia est, cum carnis vel pinguedinis molle, corpus, vel partes aliqua minus obvnta nimium autem non solum pilibra minima est consentanea, sed et gravata, piqza, ut aliter impedita sunt ad obvnta debita numerica.

Gracilitas nimia est, quando corpus vel partes aliqua minus quam decet, carno pinguedine expletatur, ut non tantum deformem aspectum fibeant, sed et minus vegeta ac imbecilliores reddantur.

Vassitudo alia post labores contingit.

Spontanea, quando corpus vel plena hora vel cacozynia enerat. sic alia tensiua et inflammativa, a plumbosa, ulcerosa, ab acerbis humoribus, contindens et gravans, a cruda, & frigida cacozynia.

Pandiculatio est cum membra, insertum brachia cum dorso extenduntur atque curvantur mecum in modum, cum oscitatione.

Rigor est quando concusso qudam fit totius corporis aut qualcumque partim involuntaria, cum sensu quodam frigoris.

Horror est, cum levior sit corporis aut partium agitatio, & major frigoris sensus corporis praeedit, stantibus extremitate coma, periustis constructi cunctum asperum reddunt.

Sic doloris affectus.

Dolor. - - } . II.  
Gibbus. - - }

376.

Sudoris affectus sunt

Defectus sudoris est, cum sudoris parum aut nihil  
per pores cutis emittatur.

Exsuperantia sudoris est, cum sudor nimis copiose  
erumpit, ut inde vires debilitentur.

377.

Vitiosus sudor est, si is vel sitFatidus.

Frigidus & tenax, & non aequaliter e toto  
corpori, sed certissimam locis erumpit:  
q[ui] sapientia in Syncope aut agone mortis conspicitur.

II.

Dolor habitum corporis infestans in partibus inter  
actis & corporis interioribus sedts occurrit. Quale

Carnosarum partium dolor excitatus deflentibus  
cataarbis strobi hæmororis non quam simpliciter  
Aiqui, sed alioqua qualitate iubuti, hæmo-  
ræmias leboribus & exercitatis, q[ui]llam vlti-  
mentorum reddunt, q[ui]nisti, in Faciem,  
vel Collum, vel Testiculis latera ~~extremis~~,  
carnosa, vel dorsum circa ctervictis, vel lumbis,  
vel articulam carnosas sicut.

378.

Articularum dolor, qui vel ab hæmoroidis colla-  
dis intra vasa, vel a flexionibus seu  
hæmoroidibus extra vasa tacitatus, est vel  
Generalior, q[ui] ARTHASTIS dicitur, in phlebitis  
articulis, artibus, brachis, manibus, q[ui]d  
cumq[ue] fulvis, evxa, sanguinoq[ue] humero se  
extrit, & in dorso ac cervicem usq[ue]  
aliquando se q[ui]odq[ue] extendit, vel etiam  
circa maxilla articulum se manifestat.

379.

Particularis, q[ui] certum aliquis articulus occupat.  
ut q[ui]bus

Homoplatu[m] dolor, homoplatum.Chiragra manus Carpi.

vel extensis parti.

digitorum articulorum.

occupat

Ictibias coxendicem.Gonagra Genit.

pedum malleolos.

Vel pollicis metatarsi.

Dorsum articuli ab articulo denotatur.

380.

Gibbos est, cum pars aliqua dorsi  
concreta, illius motus difficulter  
erit, & quatu[m] usq[ue] extremitate dorso  
superiori erumpere vel in facta, vel  
antroposum inserviet.

301.

3. - Extioris affectus vel sunt

Deformitates vel sunt

302.

Pilorum affectus, sunt vel

Redundantia pilorum est, cum vel  
minis excedunt.  
locis insolitis proveniunt.

Defectus pilorum, est vel

Deficiens preventis pilorum est, quando  
modo, aut tarde nimis, aut non  
satis copiose procedunt.

Defluvium, sive casus pilorum, cum pili  
decidunt, vel sunt

Generalius, est quod eis pili deflu-  
vium, sive ita pilorum pilosis locis fiat.

Specialius, est vel

Calvities, est, in qua in vertice et fini  
capitis, utrinque cutis glabra existit.

Alopecia est, quando in capite  
hinc inde sine certa figura pili  
decidunt.

Ophiasis est, quando sibi certa figura  
area duae ab occipito ad auris,  
atque hinc ad fronte coenantes instar  
carinae conspiciuntur.

Tinctorati pili, sive Trica sunt, cum pili adeo  
imprimiti ut distinx non possint, gelich tincti.

Crispi } nimirum pili. Littere crissi pulchri sunt.

Recti } nimirum pili sunt, cum in yis divisiones ac fis  
in eis deprehenduntur, ac si a muribus corroti essent.

Duri, vel Mollis nimirum.

Lanuginosi pili sunt, cum ad totius et bre-  
ves redduntur, it lanuginosus potius a pilis exprimat.

Colorum exceptum habentes, ac cum vel  
albi, vel flavi, vel nigri, vel cani sunt.

303.

Extirparientia, 79.  
Contaminatio, 91.

Unguentum, //  
Cutis, 77.

304.

306. Unguiūm affectis sūt

Motilitas unguiūm est, cūm ungues mobiles facti  
sunt autē quām decident, hūc illucē inclinant.  
Defectus unguiūm est, vel

Lasis unguiūm est, cūm sponte abscedunt, no-  
vis videlicet alijs evocentib; et silpient  
desplentib;.

Brevitas unguiūm est, cūm breviores, quā ipse  
caro, illis substrata, resistunt, ut inde res  
minores apprehendere comode nequeant.

Maculae unguiūm sūt, cūm unguis maculis albis  
exilib; tanq; punctis in seniorib; persistit  
suo suctum vel pilis in locis notantur; & circa  
radicem primū exortae, una cūm ungue rascendit  
donec cūm eo amputentur cedunt, siluet/centib; saepe alijs. Has in adultis viracitatem portant  
existimant vulgus.

Auctio nimia unguiūm est, cūm longis & citig existat.  
Crassities unguiūm est, cūm adeo crassi sunt, ut strūm  
minutissime apprehensionem prohibeant.

Inequalitas unguiūm est, cūm gibbus & rugosi  
existint.

Contumit solutiones in ungilib; sūt

Erosio.  
Scabietas.  
Fissura, &  
divisio.

300. Cutis deformitates, vel sunt

75. In certis partibus vel sunt

In locis pilosis potissimum est Fibula, seu Porriga, seu Pitzeiatis, quando in parte tenacis & fuscata rase squammula ex capite vel etiam alijs non losis locis, dum caput unguis vel pedis tritac, decidunt.

In facie sunt

Ruga, q. in facie potissimum moleste esse solent.

Color faciei ingrata.

Gutta rosacea est rubedo maculosa, quia fuisse quasi guttae rosaceis majoribus in nobis vero plus minusve prominentibus correspondet videntur.

In manib[us] sunt,

Squamme manuum sunt, cum in manu volat cutis inaequalis leissa & squamosa a reliqua obcedat.

Ducties ac inaequalitas manuum.

390. In incertis partibus obtinentes cutis deformitates vel sunt

Commaculations cutis, q. ab extermis solo sordibus putredine alijs h[ab]ent.

Macula sunt vel

Navi, seu originales maculae, q[ue]as iustus iubet, in editus mox secum ab altero adfert.

Contigentes sunt maculae filio coloris predita, et coloris & magnitudine lentez retractiles sine plumbis.

Puliculares maculae, q. pulicin morbis retractantur.

Erysipletosca maculae sunt, q. parva Erysipela citra ardorem, cum calore levii representent.

Sanguinosa macula exacte rubra sanguinis inservient, collum, pectoris, &c. tamen parva & magna minime impressa, minime elevata stimaciter utræ.

Impetigines sunt macula late nonibil circa ambitum rubescens, cum cutis asperitate, illiusq[ue] veluti erosione, & tamen ita præsidentes q. Impetigines (lubentes dista) ait iuntur & impedit.

Vitiligines.

Sugillationes.

Fatidie exhalationes.

Animalium sequentias.

||.

11 Vitiligines, (q d. Malum mortuum, et Morphaea  
viciunt) sunt maculae n continuatae, sed dispergatae  
guttarum instar percutem sedem mutant, et sern  
punctis, n tnm affera nec sequentia ad exacerbat,  
unde licet farcta ruborem levem concipiant, n  
profundis cuti iuxacentes etiam pingueant, noy  
tamin dolorum siccum afferunt, nec saugis ex illis,  
sed aquosa e puncta rara sanies efficit. Est a. Morphaea.

393.

Alphæs, seu Morphaea alba est, cum maculae  
magis q ipsa cutis albiant.

Melas, seu nigra Morphaea, cum unibz nigescant.  
Quatuor, alba etiam, et Alphæs, sed altissimis descendit  
extremis totam phendit, decidentibus pilis,  
alijs albi ac tenuis lanugini similes succent.

394.

Suggillationes, Ecclymoses, Ecclymata, sunt  
levidae maculae, post contusiones evenientes, int  
quals admodum, alias amplæ, alias tumida, alias  
in longum deductæ, suntq nol  
Majores { Pelomata cum cutis liveant.  
sunt Melasmata cum cutis nigrescit.  
Minores sunt { Stigmata } a flagellis ericta.  
Vivicos

Factida exsirationes sunt ingrati ac factili odoris, qui  
a toto corpore, saepius vero a glandulosis locis, axillis  
inguinibus, emittuntur.

395.

Animadileum proventus est vel

Puricium copia saltu vestibz et integumentis sc in  
strentium, uno corpore nudo se affigunt, et  
nudis immisso sanguinibus exsurgunt, donec impli-

Pediculorum proventus, Pthizias dicitur. Sunt b.  
pediculi ali  
vulgares pediculi in totum corpus exsistant,  
maxime, capillos, cilia, barbam, axillas. Cr.

Lendes notant pediculi, q modo nati vix agneantur.  
Inguinales pediculi, sunt, q ex ura prædens impie-  
losa cutis impacti, aliquando et alijs in locis

ingentem præritum cum lacinatione excitant.  
Chironitis, seu Scironis sunt pediculi, q latitant  
sub ento volarum manum. Zaro alibi  
ex levi tuberculo seu fissura e præstitu*!!*  
accusato inserviant, animaduertintur.

396.

Exuberantia quae extrinsecus homini accidunt, sunt vel  
cum dolore Exuberantia vel sunt

Tumores sunt exuberantia majoris, et quod est  
Primary, qui alijs originem praebeant sunt  
Sanguinis collections sunt  
Inflammatio vel est

Major } II.  
Minor }

Tumor ex contusione. §1.  
Erysipelas. } §2.  
Cancer.

Secundari. §3.

Pustulae. §4.

Sunt dolore exuberantia. §5.

80.

// Inflammatio vel est

Major inflamatio vel

Incertas partes occupat

Pblegmon, q̄ est tumor calidus p̄tis sanguis collatis  
prominens atq; circumscriptus eis saltus gallinacei  
magnitudine, cum rubore & dolori, ac fistula  
alium, est q̄ vlt  
semplex, q̄ sit ex sanguine puro.

Erysipelatus, q̄ a bilioso & sanguine est.  
Oedematodes, q̄ a pitilloso & sanguine est.

Certas partes occupans inflammatio, est vlt

Glandularum inflammationes sunt

Psygetton, sūm Pannus est plegmon in  
minicosis, maxime recto in ectopio & alle  
fere post fibros, ait doloris partim emergent.  
Psyna quoq; Adiemum & tunc q̄ Psygetto aliquā  
minor et planior, minores rubeos & dolens,  
ut pote eis plūta aliq; admixtum.

Pariotis est inflammatio glandularum, q̄ post absciss.  
& ad tamen radices consistunt.

Bubo est plegmon in lymphaticis trunciens  
sanguine & a nāc depallo. Estq; vlt  
Solitarius, sūm plesiotis aliquā nitio ex  
Stupice sanguinem evolut.

Comitatus est, q̄ aliis morboz: comitatis  
& inde originem habet. Estq; vlt  
Venerus, q̄ hanc Venerem  
Malignus, q̄ Fictorum, aliud ut  
morbum malignum. } comit  
Desitentialis, q̄ peste. } habet.

Articularum inflammations subsistunt vlt  
In fracturis brachii aut cruris inflammatio  
ne dolorosa & impeditudo laboris articuli aliquā  
natur.

In digitorum, praecipue manus, aliquando &  
pedis interiordys evenientis inflammatio, sūm  
que dolorifica cum tensione circa uniusq;  
radices Parsynchia, Reduvia, Pannus,  
rūtum dicitur. Quod in valvulis scapo spissatis  
legit, et ossis corruptio.

Inter pollicem & indicem manus, cum summo  
corde & tumore inflammatio affilata

398-

399.

400.

Minor. //

// Minor inflātio est tūberculūm, quod magis adhuc  
collēctūm, acutūm, per aliquā inflātiōnēm simile  
invenit, omnesq; corporis sedes occupare potest. Elegans  
Simplex tūberculūm, sūt q;ontissimum est, nūc  
jaglandis plū minime magnitudine fūlītūm, qdā u  
adū in abscessū plurimq; dñsinit. q postea sc̄ apicis  
in aliis abit, & pūc albiū profundit.  
Sanguinētūm tūberculūm est, qd cūm in abscessū &  
alcius distat, n p̄s albūm, sed cruentū effundit  
Carnosūm tūberculūm, Fūrunculus, Dotcion. est  
tūberculūm, qd loco placis lobūm caenētūm exhibet,  
estq; magis fere ceteris, et rūbore ac ardore magis  
quam priora exercentur.

79. Tumor ex contusione, est. Adi p̄t contusions, ioh̄s, aut  
casus obtingit, & nūc collēctis, nūc diffusis plū  
minimū in altū elevatū occurrerit, alias sine inflā-  
tione, alias cūm ta, nūc conceoz, interdūm vēro  
mox tardiusq; livens, flavescent, vibice & suggillatione  
nūc sive sit, tandemq; evanescit, vel aliquando in  
abscessū indeq; in alcius utrgat.

Erysipelas, (Pthysias, Ignis sacer, seu Sylvester,  
79. Spina Avicini) est vel  
Exquisitum est vel

Simplex Erysipelas est affectus citra extubranciam manifestram, cum rubore, rigor, doloribus per exacerbatos accidentibus. Et quod vel cum, vel sine febre synocho.

Exulceratum Erysipelas duplex est,  
1.º cum summa cunctis sine altitudine exulta erat, in qua & crux pectora furtu existentia.  
II.º cum exulceratio altius in cunctis punctis e qua rupitis pastillis præstentia sanitas existet.

Minus exquisitum Erysipelas est vel

Plegmonodes Erysipelas timentilis aptis quoniam simplex, sed minus sternidum, cum vel sine pastillis aut aliquando cum vesicis majoribus in ambitu levidis rutilantia nigritas canticibus, e quibus septis sanies promanat.

Dematodes Erysipelas minori ardore & rubore se offert, extubranta & majori & magis expansa quandoque & cum vesicis subalbidis & quibus aptis serosis aut sanosis plenor fuit.

405. 79. Cancer, Carcinos, Lipus, Noli me tangere, est tumor per se quoque in corpore exostis, & proscriptus: malignitate potius, quam intenso dolore molestus. Estque vel

Simplex Cancer a tuberculo exiguo viridum conspicuo emens mox ad pustula indi' Arvillana, postea nheis, tandem ad formam uniuersis majorisq; magnitudinis exostis concavi vori similitudine, tuberculatis quibusq; inaequaliter extuberauntur venis in ambitu turgido, colore levidis, dures, duraque crux obductus, sive doloros, sola iunctio ac si acutis tinctis se patens, easq; sensim abgeget.

796. Exulceratis Cancer, Carcinoma est, cum calci cuncta aperta retractaque denudata. E quo sensim sanies putredinosa, subvires, mox nigricans continet omentum, caroq; inaequalis & corrumpita excedit, & stries, illi strigis procul exextas & profundientes profert. (p. Aob.)

Abscessus, Apostoma, Veronica, est collecta materia  
in pūs aut in alienam substantiam conversio:  
qua coctio dñm fit Symptomata s̄ta, Tūmor, Rube,  
Dürritis, Calor, q̄ antea in Inflammatione aderant,  
ingravescunt: Abscessu. a. s̄m factu, s̄m mictiscent,  
tūmoris in numeronē s̄m apicem levigentur: quē  
Ostium d̄, attollit, excitatq̄d c̄ltis p̄neigo.  
Si in profundo latet, n̄ adeo exacto, s̄ offert, aliquid  
an p̄fā p̄cūtis auxiliatur, tūbercula tūmoris,  
quod exitūrum vocant, sc̄ manifestat.

400. Mortificatio est, cū pars affecta corrumpit s̄m vi,  
tali calore ac spiritu acerbitate: P̄ligmonis  
alysq̄ tūmoris interdum procedens. sit. a. v̄l  
In Carnosis partibus fiunt

Gangrena est incipiens in carnosis partibus  
mortificatio, in qua pars colorē natū  
ratē amittere incipit, intumescit,  
et ad b̄g dolit: e qua r̄vhs quoddam  
continuo emittat, quod c̄tem et carno  
tristisq̄ inservit, moliereturq̄ reddit.

Sphacelis, Sideratio est, cū mortificatio  
jam magis accelerata confirmataq̄ est,  
et pars s̄ calore natūl, uti et p̄tū  
sensuq̄ destituta enervit.

In Ossib⁹ mortificatio s̄l corruptio est v̄l  
Exsticatio ossium, s̄l Erosio, est levior Ossium  
corruptio, unde aspera et invadalia fiunt.

Caries ossium est manifesta corruptio nigris,  
cans ps a reliquo sano tunicis separans,  
v̄l partem ejus, v̄l totū, ut in par  
conychia. Vicus. a. bilic con-  
tinuum, ex quo etiam pterozymis  
nascit, et zari nequit quādū  
s̄ corruptum manet.

410. Pustulae cùm tumoribz sunt

Scabies seu Scabrities, quia cùm scabram et exista  
obductam reddit, est vel  
Humida Scabies est, q pustulas sanie et pustu-  
lentes praestat, estqz vel  
Sine magno ardore Scabies, sunt  
Scabiosa pustulae sunt

Hydron. Sedationes, q emergunt  
frequentius qd in manibz, atq  
aliquando tuto corpore milie magni-  
tudine, aqua plena, sine dolore aut  
rubore.

Epidelides his quidem aliquanto sunt  
majores pustulae, in ambito rubea  
ac ferrividae, et quācum nōcē rūpta  
bulla aut vescet, alius humor instas  
latus exit, scabiesqz succedit.

Scabies vulgaris procedit ex pustulis sua-  
biosis, rugitis et cruxilla obductis  
colorē variis, cùm prurita, et dolor  
et lancinante, si cunctis levata, vel ad  
denti, si adgit inflamatio.

Scabies ftra, seu Agria, minus frequens  
hac priori se perteinacior, in qua  
pustulae parva placis alicubi cùm  
adimplent, et qbz rugitis humor tenus  
mollis instar continuo exudat,  
coloris nūctis continuis spissis variis  
et hili subvixit partem affectam  
obducunt, et interius serpiunt cùm  
multa pruritu, toruorique et ardore.

Scabies maliana capitis, est q cùm cap-  
itis pilosam multis foraminibus ad  
calvariam usqz perforat, et qbz sordida  
glutinosa (ex his porto seccata cruxilla  
q singulis obductis, perit) emanat. Estqz

Japula.  
Carbunculus } 80.

Cùm magno ardore. //

Sicca. 86.

Tinea, Achoris, Capitis illeora ma-  
nalia, Scabies capitis manus  
que angustis foraminibus  
Favus, Cerioni, q amplis foraminis  
bis sanie exsiccatur. (p. 412)

**Cum** magno ardore scabits est vel

**Cum** pustulis majoribus scabits sunt

**Terminali**, sunt pustulae capini aut Ciceris magni, tuidine, nigra, rotunda in ambitu rubra adhaesiva, et inflamata, ardore molesta, in crux max desinente, quia detracta aut elevata sic emouat. In prolixis frigescientibus, milieribus perstinentibus

**Epinyctides** sunt pustulae terminalibus non admodum absimiles, ejusdemque magnitudinis, levissimae, et in circuitu vrbemente rubentes noctu imprimis urentes tandemque in alcis conversae, sanctem et mucosum siccis videntur.

**Cum** minoribus pustulis scabits sunt

**Polyotra**, seu **Polyctides** sunt pustulae parva instar bullarum, vel maiores etiam ut vesicular, e quibus discepitis aqua limpidula effluit, dolorque tunc primum latenter ex contactu cunctis denudatur, (q postea crux obicitur) accedit. suntque in die in canticula, maxime in manibus et pedibus,

**Herpes** **Polyctenodes** est, cum pustulae instar bullarum citrinazzarum lucida emercentur, sericea et ferruginea etiam dum integras sunt, aliquo modo moles est et quibus apertis aqua citrina promanant, magnisque tunc ardor, accidente sapido inflammatione, subiectis, parsque exuteentur, ulcusque interdum scripi-

06.

405.

Scabios.

Sicca Scabies, seu Scabiositas, est, q̄ pustulis siccis, e quib⁹  
mec pūs, nec sanguis emanat, sc̄ prodit, cūtemq̄b̄ aspernam  
reddit & erosionem cūm primita plus minusve molesto. Ego  
Prurigo, Pruritus, Erosio, est scabies secca, in qua sanguis  
cūtis, pustulis minūis nascit exasperata, rubra  
admodum et erosa apparet, alias leviter, alias tpli,  
et majori spatio cisticula abresa vides, serpiginosus  
humor exhibet, cūm primita intolerabili. Quibusdam  
vocata Rubea, alijs Impetige, aut Ploza, si dicitur.

406.

Scabies fœda, detinor ē, cūtemq̄b̄ magis afficit, et corpore  
sensim macrum et azidum reddit. Estq̄b̄ vel  
Impetigo amplius ad hinc quam prurigo pustulis na-  
scit, et erosionibus cūtem exasperat, ac secum  
accedit, serpiginosus q̄nta cūca & brachia latius,  
ac aliquando ulterius diffagendo.

Ploza est Scabies fœda, pējor ad hinc facta, cūtem  
pustulis serpentibus magis exasperans, duri-  
orūq̄b̄ ac fūmidiorū reddens, emaq̄b̄ excident  
et frindens, a qua p̄ frictionem furfures exer-  
bunt. Neq̄b̄ artus modo sed et trānchim infestat  
ac pēpūl collum et faciem cūtemq̄b̄ capillos  
sam, a qua crux sicca, dum fricatur, occidit  
ungues quoq̄d ducas ac sebaras gigantes.

407.

Lepra Græcorum est ex scabiei facta specieb⁹ iū  
deterrima, cūtem ad hinc tpli scindens ac  
codens, ita ut squama crassioris time ab  
ea nūne subflat, nūne livide dectant.  
Altiusq̄b̄ procedens n̄ epidermidem solum, sed  
et totam pectenatus cūtem, nūllis remissis  
quomodo & Lepra Arabum, evit.

408.

Elephantinis, lues Elephantica, Lepra Arabum, si  
mosbus venenatis et contagiosus, involucra corporis  
ac imprimit cūtem certis dūntaxat locis occupat,  
adūntq̄b̄ quandoq̄b̄ Tuberula que impula loco  
veri absq̄b̄ dolori possunt: alia in hinc in palate et  
suctibili nūne flavescens nūne sublivida. Tumidus  
etiam aliqua partis sunt, reliquo corpori coniuncti  
superficie in oculo pellucida: Cithiq̄b̄ leuia et assu-  
mptiorum colorum omisisti. Plurib⁹ decidunt  
velera etiam abhunc invicti lata, enim labris  
carosis et pēnūidis, simo dolore sauginas facile rotulat.

409.

420. Papula, Herpes, pustulis minimis alicubi in cūte exūn pentibus, cūm prūritū primū, mox ardor breviter, citra tamen inflammationem aut febrem comitem, sō profert: pustulisq; arofentib; novæ in illo: ambib; emerghunt, ac si priores in orbem sō diffunderent ac stirperent. Estq; vel. Herpes miliaris, sīc Herpes simplex, in summa dūn tñxat cūte pustulis magnitudine. Sunt: nēly sc̄dū, præsentat, & licet quæq; stirpat, citius tamiz definit.

420. Herpes excdens, Papula sera, Herpes effusiomenos cūm alia pustula parva, secca, altissib; in cūte immersa prædecent, illisq; rūptis cūtis exalcerat nullo tonus pūrū aut sanie excentur. Sanatisq; sūcūm nova ulcera arida emerghunt, sicut prospicendo cūte excedentia: Hic Herpes qūmp; pannum exilcerat Erysipellati exilcerato similis vides, sed tamiz in Herpēto secca, in Igni sylvestri vñida sīt ulcera.

421. Carbunculus, Antraz, duplex est

Simpex Carbunculus, Ignis Persicus, pustulas sīcū fert plures parvas, illis q; in ambusta cūte emerghunt similes, summo urentes, q;bus mox succedit crista nigra, carbonis instar, sub quā suppura, tione facta, nū pūs sed lobūs carneus niger subiecta cani radicibus pertinaciter infixus hæret. Febrem generans, visib; prostrans.

Pestilentialis Carbunculus est, qui venteratum et pestilentialem qualitatem obtinet.

80.

Exstibornutia sive doloris sunt vel  
79. Mollitores sunt vel

Carnosus tumor dicitur Sarcoma, Sarcitis, Hypo-  
sarcosis, et Carnis exarctentia, estq; carni  
incrementum exbornutum tumoris specie;  
ut in nasibus Polypas, in gingivis Spulis,  
in Aro Fleus. Potest a. in quavis partis  
cider, sed frequentius in cervicis, alarum, ingui-  
mibus adenibus.

422.

Cutanii tumores sunt, qui cutem periplo occupant.  
causq; in tumoribus atollunt. Et vel  
Varias partes occupant

Oedema est tumor frigoris, laxus, mollis  
et doloris expedit. Estq; duplex  
Collectus & circumscriptio definita.  
q; proprio ac simpliciter Oedema vocatur.  
Diffusus & expansus, rectius est  
tumor oedematosis.

423.

Phisodis tumor, seu Flatulentus est, in quo  
vapor aliquis flatuisse pte nunc coelat.  
edematose, mollior, nec digitu pressuere  
resistit utinam. Et empysma.  
Vasa tantum occupant Pneumatosos.

Variet, Cisso, est Vena immoda dilatatio-  
in arteriis frequentia, cum partis li-  
gore, aut nigore; pressuere tumor  
protentis cedit, nonq; redit.

Anterioris est Arteriarum tumor Variet  
major sapo ad priam magnitudinem  
cum molesta pulsatione fitq; non  
solum in exterioribus, sed & aliquatenus  
in interioribus arterijs.

Diversors. //

724. Tumores sive dolori duciores sunt vel

Glandulosi tumores, Glandulae, sunt tumores in glandulis sedibus sive ente latentes, indolentes, qui tumor extensus apparentes vel tanta precipit. & secus ne sciribis in bone illare partim moveri possunt. Sensusque ortescunt. Sunt. a. vel

Serophylae, Cibandes, sunt glandulosi minoris in pluribus corporis sedibus, eodem sero & tempore similiter emergentes; in mente, inguisib[us], axillis, vel post auris, vel in pectori, mammis, alystro locis.

Struma sunt glandulae majoris certis tantum locis exanimates: ut in colli sero & h[ab]itu inclinatis ubi una simplex, vel ex duabus tibiis & trinitatis una instar cibicata excoluit, alias etiam pendula est.

Carnosi tumores sunt

Sciribus est tumor durus tenitus (firmus adeo, ut loco moveri negeat, circumscriptus, & plus minus & amplius ac corpori profidens, ut in eo profundius recessus) concolor & indolens. Estq[ue] nec

Incipiens nec confirmatus, nec legitimus, cui doloris instet sensus.

Confirmatus, & exquisitus; qui os doloris, ossis

sensus est exp[ress]us.

Abscessus indolens est, cum tumor in carnosis

sedibus natu[re]s, duri, frigidus, ne indolentis,

ne plus, sed aliam aliquam manu profundit.

Estq[ue] vel

Incerti nos abscessus indolens, est, q[ui] glandulosi,

inguinem, os, pilum, vel etiam alia extera

capite posita, ut lithum, topatum, calcatum,

carbones, coquitos & cuncta, vel alia relictant.

Certi nominis abscessus indolens est, cum materia

cysti & tunica conciliatur. Estq[ue] vel

In incertis partibus accidentum

Steatoma, q[ui] saevi similes

Atzeroma, quod quasi pulchra } manu profundit.

Melicerus, q[ui] instar mellei

In capitis pilosa sed abscessus indolens

vel Talpa } pro diversa forma notata.

Excarne. II.

Cutanei. 91.

// Externes tumores sunt

Ganglion est tumor metum articulis insperditus,  
concolor, dura, tenetis et inedens, nisi quod  
vibementis pressis stuporis sensum exhibet,  
neq; ad tactus, quin aliquo usq; pelli posse.

Nodi osseos callosi sunt in ossibus sedibus tumoris duc-  
tissimi, q; firmiori subiectis ossibus insistentes at  
illis loco moveri non possunt: Et haec incolentes sunt  
si tumor vicinas partes premat molestiam et deles  
eum intus, si articulos occupant, mortui ipsorum  
obstant. q; vel { per se incipiunt.  
Mortui nesciis comites sunt.

Callus ossius, q; in ossium fracturis denro conglu-  
tinatis genitus extra ossium superficiem extubuit,  
et foris prominet: q; si ad articulos usq; ad extensas  
metri ipsorum incommodat.

89. Cutanii tumores vel

Varus partis occupant

Cicatrix est tumor vel callus instar cattis, et ligna  
cuto albidior, insensibilis, sine posis et pilis foliis  
debet, alias instar prominentis tuberculi, alias  
maculae albae instar conspicuum: quandoque etiam  
cuto profundiis insidens.

929. Verruca est tuberculum parvum ciceris instar e cuto  
prominentis, ducam, insensibili, et radice angusta,  
qua cuto veluti pediculo inservit. Et rump vel  
Acrochordon verrucosa pensilis, cuto concolor  
magis propende.

Tymium colori tymi florae exterius, sensibili  
est minor, magisq; inqualis.

930. Nyamecia, Verruca sessilis, stabilis nec mobilis  
minimq; e cuto se exercens lapini instar,  
radice late cuto firmiter inservit, ut hinc  
mentisq; impensa punctionis mollescas  
strum insuper infert. In eaque extirpando  
filis eius ait alter, Tertius in factu conspicit.

Certas partes occupantes cutanei tumores, sunt vel  
In manibus et pedibus sunt

Collus cutantus, est summa cattis ex labore obturata  
in palnis ac pedem plantis, exceptus eis doloris  
cum nihilo radicem ait demittat.

Clavis in cuto (h. sessilis verruca) eminet albus,  
rotundus, callosus, parte summa clavornata  
cubiti similis, sed pedalis solidaque indire intro  
quasi ex geruestio emergens affigit.

931. In Capite sunt

varii sive Tentib; sunt pustulas dura, non quam  
et callosa, alias humorem aliquem exstrik-  
dantes, q; in facie conspicuntur.

Psydracia sunt, q; capillosam capitum, vel bar-  
batam menti sedem occupant.

75. Contindi solitantes sunt

Exulceratio vel est

Superficiearia est, q̄ in cūte magis apparet, alia

432.

Fissura est vel

Simplex fissura, Rima, R̄agas est, q̄m  
do cūtis sive secundum lineas et pliccas  
fendit, et pro raro profunditatis plus  
minutus sit cūm doloris lancinatio.  
Ad ulcus tendens fissura, sive Pemphigus, Chir-

mation est, cūm fissura altius se impo-  
natur, et exponit labris dūcis et pectoris tibias,  
ulcerumq; instar somni reddunt, et ab  
is ulceris prorsa interdum deficiunt.

Excoriatio, Abrasio, Attrito est, est cūticula  
a vena cūte separatio, nūc si contingit  
dolor lancinans erit.

433.

Vstio est, quando cūticula vel cūtis trahitur  
et subiecta caro ab acti potentia uideat  
tibias laddit aut affertur.

434.

Perfundit exulceratio, sive Vetus est solitus in  
tinuitatis secunda cūtem penitus, plerūq; et  
subiectam carnem dividens. Estq; vel  
Simplex ulcus est vel

435.

Sordidum est, quod pīs profundit, sim-  
iliter acceditq; mala.

Planum est, q̄ nō adeo est excavatum.

Cavum est, q̄ cavitatem insignem, et profun-  
dum rotundam, ob depletas carnis  
adepsitum est.

Sinuosum est, q̄ oblongum est et canaliculis  
sive sinuī vestit, nūne recta nūne in-  
directo cūniculos agens, saepe strigis, sive  
illuc foramine se rūsum spirat.

Composita. //

Vulnus. 94.

- II. Compositum, sed Complicatum ulcus est, cui plurimis aliis, vel laius morbi, vel Symptoma jungit. Eius poterit simum XII sunt genera.
- I. Ulcus cùm Dolore, q̄ dolorum atrocem & continualem comitem habet.
- II. Ulcus cùm Intensitate, in insignis intusies jungit.
- III. Ulcus Ectematium est, ad q̄ ex vise r̄ibis, nō a toto corpore cacoethymico vitiosus humor continuo affluit, et Tumationem impedit.
- IV. Ulcus Excusans, in quo carne nimia, cùm sanata, supra decutentem corporis superficiem luxurians excedit.
- V. Ulcus Fistulosum, seu Fistula est, q̄ intrinsecus tunica investit ac succingit.
- VI. Ulcus Callosum est, cùjus labra dura & callosa sunt.
- VII. Ulcus Cacoethes, seu Dyspepsia est, q̄ difficulter ad cicatricem ducit aut sanat, n̄ p̄ se, sed quia sub iecto invalido innixum illi adnasci negat, ut esentes corruptis aut extensis. In hoc quod est sunt Ulcere Tilepacia & Chionia magna & nec satida, nec putrida, nec deparcentia, nec dolorifica: sensatio habentia tenuitas, durescunt, & callosas, n̄ ut Cancer in ambitu timentes: Cicatricem quādriagonum obducunt, sed ea mox disrupta ulcus renovat.
- VIII. Ulcus cùm tumor est vel Pelegrinorum.  
Odematosum.  
Erysipelasum.  
Cancerum.
- IX. Ulcus corruptum seu Exudans liquorēs (Cutis, sanguis, &c. materia) cūjus caro corrupta, molles, tumida, jardi instar alba, unde serpens iecor exsiccatur.
- X. Ulcus Putridum, in quo caro putrida, glutinosa, facile dissolubilis, slava, viscidis, migrans appetit, ex eaq̄ iecor fatus, discolor tuncatur, fatigatus sentit.
- XI. Ulcus pervertsum, q̄ ad ea serpens & filtri exspirant serpens dicitur, et q̄ est  
Nemoralis, seu Excelsus, si cavitatione obtinet continuo excitat, ampliorēq; reddat.  
Deparsens si vietnam quoq; partes deparcat.  
Pugnacium si solam cutem excitat.
- XII. Ulcus Malignum, q̄ n̄ tantum serpens exspicit, et deponit, sed & peculiaris qđam malignitatem obtinet.

92. Vulnus est solutio continui a causa externa violentia  
inductum. Estas vel  
Manifestum vulnus est, quod expressio patet sozamittit  
amplo vel angustius. Estas vel  
Incertarum partium vulnus alio


Simplex est vel Plaga, q; castim.  
Punctura, q; punctionem.  
Sclerotarista, quod a tormento.  
Contusio, q; contusione.  
Morsum q; a mortu-


Compositum vulnus vel est  
q; legem non solum vulnus est, cum vulnus  
inflammatio juncit.  
Vulnus in Uteris degenerans, cum vulnus  
vel se destruxere, vel praeservare incipit.  
Vulnus cum ossium lesiono est, cum te  
vulnero os subjectum frangitur, fini  
dit, contundit, aut aliud ab eo scindit.  
Veneratrum vulnus, seu virulentum est  
q; venenata & virulenta qualitate habet.

Certarum partium vulnera diversa ratiō partis  
symptomata comitantia habent. Sunt ad  
similariū partium, vulnera ut carnis, v. m.  
Articulorum partium vulnera sunt vel  
Tunicae vulnera sunt vulnera capitis, tunicae  
osior: doris, nasi, thoracis, venter  
Articulorum vulnera sunt vulnera brachiorum  
manuum, manus, cruris, tibiae, pedis.

Obsecrūm vulnus est, quod sacerdos latens, extrinsecus  
non adde patet. Estas vel

Ruptura est quando inter seces membranae, aliare  
interna partes sub eis, vulnerantur, dilacerantur,  
contunduntur, colliduntur, aut alio modo lacerantur.  
Fractura ossis est cum os aliquod vel sindit rectius, vel  
in longitudinis, vel fractus transversus, non obliquus  
lunatio ossis est, cum os vel prolabitus, vel quis videt  
os illis caput & sinus solo promovet.  
maculae operae, quando os ab eis partum recessit,  
enq; inter se debilitant atque dislocantur.  
attrahuntq; a. At vel antrosum, vel extremitatem  
extremum, vel interossum.





# INDEX

## A.

- Aberosis. 72.  
Aberoste n. Excoriatio.  
Abscessus n. Apostema.  
— indolens. 09.  
Achoros. 24.  
Acies verticina. n. V.  
Acrochordon. 92.  
Adustivum. n. Epizyma.  
Ægilops. 24.  
Albago oculi. 22.  
Alcola. n. Aphtea.  
Alopecia. 75.  
Alphus. 70.  
Alvi dejectio. n. D.  
— fluxus. 24.  
— profluxum. n. Diarrhoea.  
Amblyopia. 26.  
Amor immoderat. n. Exoticus  
— pectinax. s. furor.  
Anasarea. 64.  
Anacyblephora. 24.  
Anacylosis. 30.  
<sup>a</sup> Ani affectus. 60.  
Abscessus. 60.  
Condyloma. 60.  
Sistura seu Regas. 60.  
Hemorrhoides. n. H.  
Phlegmone. 60.  
Præsidentia. 60.  
utens. 60.

- Animalium prætentis. 70.  
Animi commotio. 4.  
— deliquium. 47.  
Annulus n. Bolyon.  
Anorexia. 54.  
Anthrax n. carbunculus.  
Antiaedes. 39.  
Aphonia. 37.  
Aphtea. 30.  
Aphopteria. 27.  
Apositia. 54.  
Apostema. 03.  
Appetitus caninus. n. C.  
— deficiens. 54.  
— depravatus. 54.  
— nimius. 54.  
Aqua descendens in scolis n. Suffusio.  
Argema. 23.  
Arquatus. n. Petrus.  
— niger. 64.  
Artbritis. 10.  
Articularis dolor. 74.  
Articularum inflamatio. 00.  
Ascarides. 39.  
Asciates. 64.  
Asthma. 44.  
Athetoma. 09.  
Atrophia. 64.  
Atritio n. Excoriation.  
Auditus gravitas n. Baroia.  
Dopraz. n. Obaditit.

Aurigo. n. Ictericus.

- Auris effundens. 31.  
abscessus. 31.  
dolor n. Italgia.  
~~Astetis. 32.~~ — hamorrhagia. 31.  
phlegmone. 31.  
pruritus. 32.  
pulsatio. 32.  
sibilis. 32.  
~~Scrofula. 32.~~ — Jorides. 32.  
~~Tuberculosis. 31.~~ — tinnitus. 32.  
vermis. 32.  
ulcus. 32.

Axillarum fator. v. Cutis.

- a. Angina. 40.  
b. Amaurosis. 26.  
c. Ambustio. v. Ustio.  
d. Alvi fluxus sanguineus n. Di-  
iectio cruenta.

Anterioris. 09.

B.

- Baryota. 32.  
Batrachus. v. Rana.  
Beulinus. 54.  
Botryon. 23.  
Bradyptisia n. Dyspepsia.  
Bybonoculus. 09.  
Bubo. 00.  
Malignus. 00.  
pestilens. 00.  
venenosus. 00.

Bronchocelle. seu

Bottium. 41.

c. Brachy Paralysis.

C.

Cachexia. 64.

Caducus morbus n. Epilepsia.

Calculus.

cystis. v. C.

renum. v. R.

vifosa. v. V.

Caligo. 26.

Callosa palpita. v. P.

Callus. 91.

ossum. v. O.

Calvitis. 75.

Cancer. 02.

mammillar. v. M.

Canina appetentia. 54.

Canitis. 75.

- Capitis affectus. 4.  
dolor. 4.  
scabies. 84.  
Scabiosymptomatica. 1. dolor:  
ulcus
- Carbunculus. 87.  
simplicis. 87.  
pestilens. 87.  
oculi. v. O.
- Carcinoma. 82.  
oculi. v. O.
- Carcinos. a. Cancer.
- Cardialaca. 53.
- Cardialgia. 53.
- Cardiognos. 53.
- Cariss ossium. v. O.
- Carnis excrescentia. a. Sarcoma.
- Carnosae: partim dolor. 74.
- Carnositas. 73.
- Carnosus thymo. v. T.
- Cazos. 12.
- Casus pilorum. v. P.
- Catalipsis. 16.
- Catapora. 12.
- Catazosta. a. Suffusio.
- Cataracta. 19.
- Suffocans. 49.
- Catoche. a. Catalipsis.
- Cavitas in oculo. a. Coeloma.
- Cephalaca. 4.
- Cephalalgia. 4.
- Cerion. a. Favus.
- Chiragra. 74.
- Hernia. a. Hernia.
- Chironis. 70.
- Charades. a. Scrophula.
- Cholera. 55.
- Chrysma. a. Prostitus.
- Cicatrix. 92.
- Cirros. a. varix.
- Cirrocello. 69.
- Clavis. a. Cephalaca.
- Clavis cutis. 91.
- oculi. 22.
- Cæcitas. 26.
- Coeliaca præsio. 57.
- Coeloma. 23
- Colicus dolor. 59.
- Columella. 39.
- Coma. a. Cazos.
- Comitialis morbis. a. Epilepsia.
- Conceptus ingratius. 72.
- Concochia præva. a. Diaphthora.
- Condylema.
- oculi. 23.
- Congelatio. a. Catalipsis.
- Continui solutiones. 92.
- Contrastio. a. Convulsio.
- Contusio. 94.
- Convolutus. a. Ileos.
- Convulsio. 10.
- statuenda. 10.
- oris. v. O.
- maxilla. v. M.
- Coprosis. a. Sorditas.
- Cardis affectus
- dolor. 53.
- comprimens. 53.
- zedens. a. Cardiognos.
- ardens. 53.
- 11

Misfolitus. v. Cardialgia.

confictus. v. Cardialgia.

intemperies. 46.

calida. 46.

frigida. 46.

humida. 46.

sica. 46.

Erysipelas. 46.

k. palpitatio. 47.

pblegmone. 46.

k. venenatus humor. 46.

ulcus. 46.

vitius. 46.

Cornua crassitas. 22.

extuberantia. Phystira.

ulcera. 22.

Corporis Habitus aff: v. H.

Coryza. v. Gravido.

Coxenditis dolor. v. Hebias.

Crinitas. 55.

xeph. v. Hordeolum.

Conis paralysis. 17.

Kovayx. v. Angina.

Lynicus brasum. v. S.

Cystis affectus. 69.

calculus. 65.

inanitio. 65.

obstruicio. 65.

reptilio. 68.

Cutaneus tumor. v. T.

Cutis deformitates. 77.

duritiae. 77.

satida expiratio. v. F.

maculae. v. M.

commaculationes. 77.

a. Xaxet. v. Grande.

b. Cynosis. 29.

c. Costalis morib. i. Pleuritis.

d. Citta. i. Pica.

e. Chordapson. i. Ulcer.

f. Cyanorrhoea. o.

g. Colli affectus.

h. Coma agrypnus. i. Cataplera.

i. Ceratina. 92.

k. Cordis morbus. 20/20. j. Cardiognas.

l. Chimation. v. Petrio.

D.

Da'moniaca obsessio. 9.  
Defectus iudicij. v. 1.  
Deformitatis. 75.  
Deseratio cruentia. 50.  
deficiens. 52.  
prudentia. 50.  
redundans. 57.  
tarda. 57.  
vitiosa. 57.  
unctiosa. 50.

Deliquium animi. v. A.  
Delirium. 10.

Dentium affectus. 35.  
brevitas. 35.  
corroso. 35.  
defectus. 35.  
dolor. 35.  
longitudo. 35.  
mobilitas. 35.  
nigredo. 35.  
stupor. 35.  
sufficietas. 35.

Dentitio. 35.

Destillatio. v. Catarrhus.  
maxillarum. v. M.

Diabetes. 67.

Diaphora. 55.

Diarrhoea. 57.

atra. 57.  
biliosa. 57.  
melancholica. 57.  
pituitosa. 57.  
serosa. 57.

Di'vō. v. vertigo.

Distichiasis. 30.

Dolor { articular. v. A.  
nervium. v. Algia.  
Capitis. v. c.  
Colicis. v. C.  
carnosum. part. v. C.  
Dentium. v. Odontalgia.  
Iiacis. v. I.  
lateris. v. Pleuritis.  
Stomachii. v. Cordis dolor.  
post partum. v. P.  
Oculi. v. O.

Dotion. v. Thymulus.

Dysenteria. 50.

Dystipsia. 55.

Dyspnoea. 44.

Suffocans. v. Catarrhus.

Dysuria. 67.

~~Dysuria~~

v. Dystocia. v. Parituti difficultas.

# E.

Ebrietas. v. Temeritaria.

Eccymosata. v.

Eccymoses. v. Sigillatio.

Ectropion. 29.

Eleos. v. Neos.

Elephantiasis. Elephas. Eleph.  
phantias. & Elephantia. 06.

Emprestbotones. v. Convulsio.

Emphyema. 43.

Encanthis. 27.

Enterococh. 69.

Enterospipococh. 69.

Epichlodes. 09.

Epibialtes. v. Inenbus.

Epizysma. 29.

Epicantha in oculo. 00.

Epilepsia. 19.

Epinicotis. 09. - in oculo. 27.

Epiphora. v. Lippitudo.

Epiphoecl. 69.

Epulis. 36.

Eroticus favor. 7.

Erysipelas. 02.

sybolognuedes. 02.

oedematodes. 02.

Excrecens. 94.

Excoriatio. 92.

Excrescio. v. Deservitio.

Exteriores affectus. 75.

Extubantia. 79.

cum dolore. 79.

a. Ecstasis. v. Cataphora.

b. Empysema. 00.

# F.

Faciei color malis. 77.

gutta oculorum. v. G.

ziga. v. R.

Favus. 04.

Fauicam affectus. 39.

comprissio. 40.

ulcus. 40.

Fastidium. 54.

Fissura. 92.

Fistula. 93.

Ficosa palpebra. v. P.

Fellis vesica. v. Cystis aff.

Flatulenta convulsio. v. C.

flor throe. v. T.

Floris et Fluxis Alvi. v. A.

Hemorrhoid. v. H.

Hepatiche. v. H.

Uterinis. v. U.

Fatida expirations Cattis. 70.  
Fator Ovis. v. v.  
Nariūm. v. N.  
Forſula v. Botryon.  
Fractura Oſſis. v. v.  
Fürfarts v. Porrogo.  
Flor. 9.  
eroticis. v. E.  
uterinus.  
Fürunculus. v. 2.

---

Gingivarium affectus. 36.  
aſto. 36.  
abſcessus. 36.  
conſumptio. 36.  
phlegmon. v. Paruitis.  
ulcus. 36.  
Glaberitis palpebr. v. madarofis.  
Glandulae ſen<sup>z</sup>  
Glandularis tenuior. 39.  
Glandularis inflamatio. 30.  
Glaucoma. 21.  
Gonagra. 74.  
Gonorrhœa. 60. 71.  
simplic. 60.  
ventrata. 60.  
Gracilitas. 73.  
Grando. 29.  
Gravido. 39.  
Gülæ ſummar: part: aff: <sup>v</sup>GülHür  
— affectus. 50.  
dolor. 50.  
intemperies. 50.  
phlegmon. 50.  
ſcrophulus. 50.  
ulcus. 50.  
Gulstis depravatio. 37.  
diminutio. 37.  
vitia. 37.  
GülHüris ~~aff~~ ſummaris  
partium affectus. 40.  
Gulta rosacea. 77.

---

  
Gulta. v. Artritis  
GülHüris Hernia. v. Botrium.  
Pellio. 30.

Gaudium fatuum. 7.  
Genitalium affectus. 60.  
viril: aff: 60.

*H* imbecillitas. 62.  
atrabendi. 62.  
coquendi. 62.  
retinendi. 62.

inflammatio a. Hepatitis.  
intemperitis. 62.  
obstructio. 62.  
scirrhos. 62.  
tumor. 62.  
ulcus. 62.

Hepaticus fluxus. 50.  
Hepatitis. 62.  
Herculanus morbus. a. Epilepsia.  
Hernia. 69.  
Herpes. 87.

hylactenodes. 85.  
esthiomenos, seu  
exdens. 87.  
miliaris, seu  
simplex. 87.

Hippus. 30.  
Homonephagia. 9.  
Homoplata dolor. 74.  
Hordeolum. 29.  
Horror. 73.

Hydatis. 29.  
Hydroa. 84.  
Hydrocephalus. 69.  
Hydrocephalon. 9.  
Hydrocephobia. 9.  
Hydrosis. 69.

Hygrocircosculo. 69.  
Humorum collectio in Thorac. 9.  
T.

Hypochondriaca affectio. 64.  
Melancholia. v. M.

## *H*.

Habitus corporis affectus. 73.  
Haemodia a. Dentium stupor.  
Haemorrhagia.

aerium. v. A.  
narium. v. N.

Haemoptisis. 48.

Haemorrhoides. 60.

fluxus. 50. 60.

suffusio. 60.

Hallucinatio mentis. v. M.  
crist. v. V.

Hebetudo mentis. v. M.  
vifas. v. V.

Hemicrania. 9.

hemiplegia. 17.

Hepatis affectus. 62.

abscessus. 62.

corraphio. 62.

Hypochyma & Suffusio.  
Hypopyos. 20.  
Hyposarcosis. Sarcoma.  
Hypocephalum. 20.  
Hysterica prostratio seu  
Suffratio. 71.

Hyposarca & Anasarca.  
Hypercatarraxis. v. Diarrhoea.

Ingenus tarditas. 5.  
Inguinum pediculi. v. P.  
Insania & Furor.  
Insomnia. 13.  
Interioris affectus. q.  
Intestinorum affectus. 56.  
Abscessus. 56.  
Astrictio. 56.  
Dejectio vitiata. v. D.  
dolor. 59.  
obstructio. 56.  
ulcus. 56.  
Jonthi. v. Yari.  
Ira cum Furore. 7.  
Ischias. 74.  
Ischyria. 67.  
Iudicij defectus. 5.  
Jantharinum inflamatio. 80.  
Juvenum visio. v. V.

## J.

flavus. 64.

Icterus. 64. - niger. 64.  
Secoris aff. v. Hepatis.  
Ignis sacer } x Erysipelas.  
Silvester } x

Iteos. 57.

Iliacus dolor. 59.

Imbecillitas virium. v. V.

Impetigo. 77. 86. -

Impotentia ♀. v. V.

Incubus. 16.

Inflammatio. Phlegmon  
glandular: v. G.  
articulor: v. A.

a. Ignis Prusicus & Carbunculus simp.

# L

*Labeculum affectus.* 39.  
*paralysis.* 47.

*Cadis vitia.* 49.  
concretio. v. *Sclerobosis.*  
*redundantia.* v. *Spermatostis.*  
*defectus.* 49.

*Cassitudo.* 43.

*Cendes.* 70.

*Centigo.* 77.

*Cepra Acabum.* v. *Elephantiasis.*  
*Cracorum.* 86.

*Cetbarugus.* 12.

*Cencre.* 70.

*Cercoma.* v. *Albugo.*

*Cicatrix affectus.* 63.  
*abscessus.* 63.

*Distentio flat.* v. *Peritonaei.*

*Inflammatio.* v. *Splenitis.*

*obstrutio.* 63.

*seizibns.* 63.

*tumor.* 63.

*ulcus.* 63.

*Cicteria.* 47.

*Cingua affectus.* 37.  
*asperitas.* s. *scabie.*  
*combustio.* s. *scabie.*  
*scabrities.* 37.  
*motus vitio.* 37.  
*paralysis.* 47.

*Cipotbynia.* 47.

*Cippitido.* 27.

*siccera.* v. *Xerophthal-*

*Cithiasis.* 29.

*Cloquela in Somno.* 43.

*Cloquulae vitia.* 37.

*abolitio.* v. *Aphonia.*  
*dificultas.* 37.

*Cycanthropia.* 0.

*Cunaticus morbus.* v. *Epilepsia.*

*Cupus.* 02.

*Cuxatio ossis.* v. 0.

---

*Lues deifica.* v. *Epilepsia.*  
*sacra* } v. *Epilepsia.*

*Cumbrii.* v. *vermes.*

c. *Lagophthalmi.* 13.

d. *Lienaris Autoo.* 63.

e *Leucophaegma.* v. *Anasaria.*

f. *Lichen.* v. *Impetigo.*

*Lipophyschia.* v. *Lipotbynia.*

*Lumbago.*

# M

*Macula cutis.* 77.

*erysipelatose.* 77.

*originalis.* v. *Nevi.*

*pulicares.* 77.

*sanguinea.* 77.

*Mandarosis.* 30.

*Malacia.* 54.

*Malum mortis.* v. *Vitiligo.*

*Mamnillarum affectus.* 40.

*Cancer.* 40.

"decormentum. 40.  
incrementum. 40.  
inflammatio. 40.  
frigoris morbus. 40.  
Sciurus. 40.  
Struma. 40.  
Vlera. 40.

Maria. v. Furor.  
Manus dantis. 77.  
paralysis. 17.  
Ignamia. 77.

Maxillarum affectus. 34.  
convulsio. 35.  
destitutio. 35.  
paralysis. 35.

Melancholia. 0.  
hypochondriaca. 50.  
flatulenta. 0.

Melas. 70.  
Melsma. 70.  
Meliceris. 09.

Memoria perdita. i. Oblivio.  
Mensis defectus. 77.  
prefluium. 77.

Mentis alienatio. 5.  
hallucinatio. 5.  
hebetudo. 5.  
imbecillitas. 5.

Mesenteric inflamatio. 61.  
timor. 62.

Mictio continua. 67.  
frequens & intempestiva. 67.  
Milbosis. v. Madarosis.  
Misanthropia. 0.

Miserere mihi. v. Icos.  
Morbus Regius. v. R.  
Mota. 70.  
Morboea. i. Vitiligo.  
alba. v. Albus.  
miga. v. Melas.  
Morphis. 94.  
Mortificatio. 03.  
Myosita. 26.  
Myrmecia. 91.  
Mytiliasis. 20.

v. Marmozata. 92.

## N.

Nervus. 77.  
Nasum affectus. 33.  
factus. 33.  
haemorrhagia. 34.  
ulcus. 33.  
Nausea. 55.  
Nephritis. 66.  
Nephriticus dolor. 66.  
Nocturna pollutio. v. P.  
Noli me tangere. i. Cancer.

Nubecula in oculo. 25.  
Nyctatopia. 26.

---

## O

- Obambulatio in somno. 13.  
Obanditio. 32.  
Oblivio. 5.  
Obscuritas visus. v. V.  
Obsessio demonica. v. D.  
Oculi affectus. 20.  
carbunculus. 23.  
condysma. 23. ~~dolor. 29.~~  
epicrux. 23. ~~flavido. 22.~~  
epinyctis. 27. ~~paralysis. 17. 25.~~  
nubecula. 25. ~~paroxysmus. 1. Taraxis.~~  
procedentia. seu  
proptosis. 22.  
Taraxis. 22.  
rubedo. 22.  
vacillatio. 1. Taraxis.  
ulcus. v. Cornea ulc.
- Centes claudendi aperiendiq; //  
Impotentia. 30.
- Oculi aperti in somno. 13.
- Odontalgia. 35.
- Odoratus critia. 33.  
abolitus. 33.  
imminutio. 33.

- Oedema. 20.  
Onyobsa. 20.  
Ophiasis. 75.  
ophthalmia. 24.  
Opisthotonus. v. Convulsio.  
Oretopneia. 44.  
Ovis affectus. 35.  
convulsio. v. Cyn: spasmj.  
fator. 30.  
tortura. v. Cynicj spasmus.
- Os apertum in somno. 13.  
Oscitatio. 30.  
Ossium callus. 90.  
caritis. 03.  
eratio. 10<sup>3</sup>  
exesio. 03.  
fractura. 94.  
luxatio. 94.  
nodi callosi. 90.

Otalgia. 32.  
Ovum. v. Cephalaea.  
Oxana. 33.

---

# P.

Palpebrarum affectis. 20.  
agglutinatio, seu  
anæcytosis. seu  
anæcyblephora. q. A.  
asperitudo a. trachoma.  
aqueositas. v. Hydræs.  
coalitis. v. Anæcytosis.  
callus. ag.  
glabrities. v. fœtus. ag.  
madracosis. inflammatio. Epystoma.  
scabites. 29.  
sebiculari. v. Pedes

Palpitatio cordis. v. C.  
Panartidium. v. Paronychia  
Pancreatis affectis. 61.  
inflammatio. 61.  
tumor. 61.

Pandiculatio. 73.

Panniculus. 29.

Panus. v. Oxygetton.

Papillarum absumptio. 40.  
exulceratio. 40.

Papula. v. Herpes.  
fura. v. Herpes excedens.

Paroxynanche. v. Angina.

Paralysis. 17.  
Cerebri. 2  
Lingue. v. suis locis.  
Pedis. 1  
etc.

Paraphrenitis. v. Delirium.

Paraphrosyne. 5.

Paraplegia. 17.

Paræcœcum. 94.

Paroxynanche. v. Angina.  
Pariendi difficultas. 72.  
dolor post partum. 72.  
prægatito post partum. 72.

Paristhma. 39.

Paronychia. 60.

Parotis. 60.

Particularis affectus. 3.

Parvulus. 36.

Pediculari. v. Pediculariasis.  
inguinalis. 70.  
palpebræ. 30.  
vulgaris. 70.

Pedis paralysis. 17.

Peloma. 70

Penis affectis. 60.  
abscessus. 60.  
ulcus. 60.  
carnosum tuberculus. 60.  
corruptio. 60.  
inflammatio. 60.

Periphymosis. 60.

Peripneumonia. 41.

Peritoneal distento flatulenta. 63.

Pernio. 92.

Phalanx. v. Dactylum sapphirus.

Phalangitis. 30

Phlyctes tumor. v. T.

Pblegmone. 60.

Añsis. — }  
cordis — } v. suis locis  
Gallæ: part }

Phlogosis. v. Erysipelas.

Phlyctena. seu Phlyctides. 85.  
in oculo. 22.

Phrenitis. 10.

Pithritis. 40.  
Pithisis. 42.  
Phygeton. 80.  
Phyma. 80.  
Phymosis 60.  
Pica. 54.  
Pilorum affectus. 75.  
  cassis. 75.  
  crispi. 75.  
  defectus. 75.  
  defluviūm n. cassis.  
  inæquales. 75.  
  intricati n. tric.  
  lanuginosus. 75.  
  malus color. 75.  
  molles. 75.  
  pinguis. 75.  
  dari. 75.  
  recti. 75.  
  resundantia. 75.  
Pilorum e palpibus cassis. Alada  
  " cassis.  
Pinguedo nimia. n. Carnositas.  
Pityriasis n. Porrigo.  
Plaga. 94.  
Plebitis. 43.  
  flatulenta. 43.  
  notata. 43.  
  putridosa. 43.  
  vera. 43.  
Pneumatocele. 69.  
Podagra. 74.  
Pollatio nocturna. 60.  
Polypus. 33.  
Porrigo. 77.  
Ploaria n. Hordolum.  
Præsumptio. n. Catalepsis.

Priapismus. 60.  
Procidentia. seu  
Proptosis. Oculi. 40.  
Prurigo. seu  
Prætitis. 86.  
  admir. v. A.  
Pseudophtalmia. 20.  
Psora. 86.  
Psorophtalmia. 29.  
Psydecia. 91.  
Pterygion. 24.  
Ptilosis. 30.  
Ptyalismus. 30.  
Pudendi mīl: aff: v. Vulva.  
Putres. 70.  
Pulmonum affectus. 41.  
  distentio. 41.  
  Erysipēl: n. Scriptionem.  
  Intemporeis. 41.  
  obstrutio. 41.  
  plegmone. n. Scripta.  
  litens n. Pithisis.  
  vomica. 42.  
Pulsus fibrilum. v. A.  
Punctura. 94.  
Pyrosis. 20.  
Pupillæ affectus. 20.  
  angustia seu  
  clivitudo. 20.  
  dilatatio. n. Myctis aff.  
  divulsio. seu  
  ruptio. 20.  
Purgatio post fastum. v. Par:  
Pustula. 34.  
Scabiosa. 34.

a. Pellicula. 21.

b. Pupilla tablet. 1. diminutio.

c. Pneumatosis. 1. Enophysma.

## R.

Ramix a. Hernia.

Rana. 37.

Ranuccio. 44.

Raduria a. Paroxysmia.

Regius morbus a. Itches.

Renum affectus. 66.

abcessus. 66.

calculus. 66.

Aloz. a. Nephritis.

inflammatio. a. Nephritis.

Ulcs. 66.

Rhagis. 92.

Respiratio difficultis. 44.

Rheaxis.

orit. v. v.

Rhyas. 27.

Rigor. 73.

Rima. a. Rhagis.

Risus Sardonicus. 25.

Rubescens. praestans.

Ructus. 55.

Ruga. 77.

Ruptura. 94.

# S.

Sacer ignis. v. 1.  
morbis n. Epilepsia.  
Salacitas n. Satyriasis.  
Salths vitt. 9.  
Sanguinis metus. v. 9.  
Sarcitis n. Sarcoma.  
Sarcoma. 90.  
narium. 33.  
Sarcocel. 69.  
Sardonicus risus. v. 8.  
Satyriasis. 69.  
Scabits. ieh Scabritis. 84.  
agria n. fera.  
· fera. 84.  
fada. 86.  
humida. 84.  
maligna capitis. 84.  
marant. n. Achritis.  
palpebrar. v. 9.  
secca. 86.  
vrigants. 89.  
Scabiosa juncilla. v. 9.  
Sciurus. 69.  
Schizophthalmia. 20.  
Selopetrium. 94.  
Scolopendra. 86.  
Scotoma. 19.  
Seborrhœa. 39.  
Scrobi affectis. 69.  
inflammatio. 69.  
ramis n. Heynia.  
tumor durus. 69.  
Secundinae retentio. 72.  
Semim visio. v. 73.

Sibilis Aürium. v. A.  
Sideratio. i. Sphaerulus.  
Silvester ignis. v. 1.  
Singultus. 89.  
Sironis. v. Cibrons.  
Sitis immodesca. 84.  
Soda. i. Cephalalgie.  
Sonnius deficiens. v. Vigilia.  
immodesca. 11.  
inclinatio ad somn. 11.  
profundus. 11.  
Sonticus morbus n. Epilepsia.  
Sopor. 12.  
· gravis n. Caros.  
· demoniacus ieh  
Sugarum. 12.  
Sores anciim. v. A.  
Spasma.  
Spasmiss. n. Convulsio.  
cynicus. 35.  
Spazganosis. 49.  
Sphaerulus. 83.  
Spina. i. Erysiphias.  
Splenis aff. v. Ctenis.  
Splenitis. 63.  
Spirito cruenta. i. Hemoptysis.  
Squinantia n. Angina.  
Slaguæ. v. Vva.  
Slaguæwua. 12.  
Steatoma. 69.  
Sterilitas. 72.  
Sternitatio. 34.  
Strutor. 13.  
Stigma. 70.

Stomachi affectus. 51.  
abscessus. 52.  
dolor. r. Cordis dolor.  
imbecillitas. 51.  
inflammatio. 52.  
intemperies. 51.  
callida. 51.  
frigida. 51.  
humida. 51.  
secca. 51.  
Ulcus. 52.  
placa vino. Ventoicilli aff.  
Strabismus. 25.  
Stranguria. 67.  
Stridor in somno. 13.  
Struma. 09.  
Stultitia. 6.  
Stupor vigilans r. Cataplsis.  
in somno. 12.  
Substz. r. Lazaros.  
Sycosis. 29.  
Sudoris deficitus. 74.  
exsuperata. 74.  
fator. 74.  
frigus. 2.  
tenacitas. 74.  
Suggillatio. 70.  
vuln. r. Hypospadagia.  
Ervorum. r. Angina.  
Syncope. 47.  
Suppuration. r. Emphyema.  
Sarditas. 32.  
Syriasis. 10.

---

a. Soper gravis seu tertius: in somno.  
r. delizans. r. Cataphora.  
Stolicidium r. Stranguria.  
Substissum malum r. Stranguria.

Supperpurgatio. v. Diarrhoea.  
Stupor. 17.

## T.

Tabes. v. Proptrosis.  
Talpa. 09.  
Teraxis. 20.  
Tarditas ingenij. v. 1.  
Tela. 21.  
Tenuitentia. 6.  
Tenuis. 50.  
Termintzi. 05.  
Terror & Metus. 7.  
Testiculum affectus. 69.  
Inflammatio. 69.  
tumor. 69.

Tortado. 09.  
Tetanos. 10.  
Tincta v. Arboris.  
Tinnitus aurium. v. A.  
Thoracis affectus. 41.  
in Thoracis humoris collectus. 43.  
Thrombotis. 49.  
Thymum. 91.  
Tonsillarum affectus. 39.  
abscessis. 39.  
ulcus. 39.  
Tormentum. v. Itos.  
Tothora levis. v. O.  
Trachoma. 29.  
Transmutationis difficultas. 50.  
Tremor. 19.  
Tristitia & mazoz. 7.  
Tuberculosis carnosiss. v. Fibrosis  
sanguinea. 01.  
Simplex. 01.

Tylosis. 29.  
Tumor. 79.  
carnosiss.  
mollior. v. Sarcoma.  
dolor. 09.  
ex contusione. 01.  
cutaneus  
mollior. 00.  
dolor. 91.  
cum dolore. 79.  
sine dolore. 08.  
glandulae. v. Glandula.  
excavata. 90.  
flatulentis. seu  
physodes. v. Empyema.

Tympanites. 64.  
Tisis. 45.  
v. Typhomania. v. Catapora.

## V

Vari. 91.  
Varia. 00.  
Ventris impotentia. 60  
ventriculi aëris ebulliens. 55.  
conditas. v. C.  
inflatio. 55.  
plena vido Stomachii.  
Ventris affectus. 50.  
vermis. 59.  
aurium. v. A.  
Verruca. 91.  
genitalis v. Acrochordon.  
lesilis v. Myrmecia.

*Vertigo.* 14.

*tenebrisosa.* v. *Scotoma.*

*Vesica.* v. *Polyuria.*

*Vesica afflita.* 67.

*abcessus.* 67.

*calculus.* 67.

*inflammatio.* 67.

*ubens.* 67.

*Vestititia acies.* 20.

*vettens.* v. *Crocs.*

*Vibices.* 70.

*Vigilia.* 13.

*Vizum imbecillitas.* 47.

*Visio colorum.* 28.

*falsa.* 28.

*jovenum.* 28.

*semim.* 28.

*Vissus abollitus.* v. *Cacitas.*

*depravatus.* 28.

*diminutus.* 28.

*fallacia.* 28.

*hebetudo.* 28.

*obscuritas.* v. *Amblyopia.*

*Viti saltis.* v. *S.*

*Vitiligo.* 70.

*Ulcus.* 92.

*encoethes.* 93.

*callus.* 93.

*cancrum.* 93.

*cavum.* 92.

*chironium.* 93.

*coronatum.* 93.

*depravans.* 93.

*cum dolore.* 93.

*dyspepsia.* v. *Cacochi-*

// *Erysipela toscum.* 93.

*Excitans.* 93.

*Exundans* { *leuator.* v. *Locuplo-*

—  *fistulosum.* v. *Fistula.*

*cum intemperie.* 93.

*malignum.* 93.

*nomodis.* 93.

*oedematosum.* 93.

*pragadentum.* 93.

*planum.* 92.

*pterygion.* 93.

*perversum.* v. *Serpens.*

*putridum.* 93.

*rhematicum.* 93.

*Serpens.* 93.

*stomachum.* 92.

*serpens.* 92.

*telepathum.* 93.

— *in oculo.* v. *Cornua.*

*in oculi angulo.* 27.

*nasum.* }

*antrum* } v. *sitis locis.*

*tonsillar.* }

*Unguis in seno.* 20. 24.

*Unguita.* v. *Pterygion.*

*unguisum afflita.* 70.

*anæsthesia.* 76.

*brevitas.* 76.

*caust.* 76.

*crassitas.* 76.

*defectus.* 76.

*divisio.* 76.

*erosio.* 76.

*fistula.* v. *divisio.*

*inæqualitas.* 76.

//

//

*II* macula. 70.  
mobilitas. 70.  
scabritas. 70.  
*Volvulus.* v. *Stear.*  
*Vomica* v. *Apostema.*  
fulminans. v. *P.*  
*Vomitio.* 55.  
*Vomitus cruentus.*  
*Vox deficitus.* 44.  
obscura. 44.  
perfunda & crassa. 44.  
subtilis & alta. 44.  
tremens. 44.  
viciosa. 44.  
*Uterina incontinencia.* 67.  
*Ustio.* 92.  
*Uteri affectus.* 70.  
abscessus. 70.  
ascensus. 72.  
carcinomata. 70.  
declinatio ad lativa. 72.  
descensus. 72.  
*Dolor.* 72.  
*Hydrocephalus.* 70.  
*Inflatio.* 70.  
motus inconveniens. 72.  
noma. 70.  
*Obstructio.* 70.  
a Mola. v. *M.*  
aquea x *Hydrocephalus*.  
flatulenta x *Gastritis*.  
sanguinata. 70.  
*Phlegmone.* 70.  
*Procidentia* seu  
*Scrotalipsis.* 72.


*II*


*II* scirpus. 70.  
strangulatio. seu  
suffocatio. v. *Hysteria*  
ulcus. 70.  
*Uterinus fluvor.* 71.  
fulror.  
*Vera.* 39.  
*Vulnus.* 94.  
contusum. v. *C.*  
morphum. v. *M.*  
obscurnum. 94.  
cum tissum lassitudine. 94.  
phlegmonosum. 94.  
venenatum. seu  
venulentum. 94.  
in alchis degeneras. 94.  
*Vulvae affectus.* 71.  
abscessus. 71.  
condylomata. 71.  
excitatio. 71.  
haemorrhoides. 71.  
phlegmone. 71.  
hysteric pruriginos. 71.  
obnacans. 71.  
sycosis. 71.  
verruea. 71.  
ulcera. 71.


**X.**


*Xenopbtbalmia*. 27.


*Xizopbtbalmia*. 27.











Pendēny affectus sunt vel <sup>Epidēny,</sup>  
<sup>Epidēny.</sup>



Crystallina. 57.

Fungiis. L // 2. 5. a.  
w Bel-rosa.

Vulva<sup>a</sup> angustia. // 525. //

— dilatatio.

Cymbago. Felti vitium et de-  
strikas in testiculis. 't Epit  
't venenous-wort.

Caruncula in Vesica. 4. 37. a.

20. Sept. Vetus, in Agnī Casti,  
Latina;

Resor:

Balanctior:  $\text{C}_1$  3*i.*

Scobis eboris,

Eiectis,  $\text{C}_1$  3*i.*

Boli armata, in ag: Centinodis  
lora  $\text{C}_1$  3*i.*

Stm: Plantag:  $\text{C}_1$  3*i.*

Sassafras  $\text{C}_1$ .


cum succinato Sbm: Citri or:  
in ag: Nigropurpura extracta,  
 $\text{C}_1$ . Trochisci.

Trochisci Narcoticus I. Ferme.  
Antrodatus.

Trochisci Albi lobatis, in  
omnibus meritis dñi or:

Ung: Nutritum, ita Crithm,  
et de litzargyra, et  
Tricharmacum titum.

Ung: de Pruritum scabiosum.  
~~relinquit~~ pr. 712.



B  
V

7