



Collectanea medica

<https://hdl.handle.net/1874/348287>

Medic: **E** . J.

Ego amicus iucundus,
Inimicus mitis et facilis.
Exoraber antequam roger.

Sente. de Mt. Beata. 20.

neum recens.

Scripta varii arg.

N° 401

Hat. VII, pl. 2
n° 21
Var. 401 = 6

Hs.

7 E 27

Synopsis Methodica Pharmacorum: orũm Nicolai Dacier. Ticini 1619. // 8°
Systema Parascenasticum ad Praxin Mæd Medicæ Sylvam completens, D. Morelli. Genuæ. 1620. // 8°
Formulæ. Vindobonæ. 1620. // 8°
Methodus ad Praxin Ioan: Helianij. Ungl: Bat: div: annis. // 4° // 8°
Sennarti institutionum. Wittebergæ 162 // 4°
Fernelij methodi medendi libri IV posteriores. diversæ Edition: et form: 162 // 4°
Formulæ et medicorum Petri Gorraij. Paris: 15 // 16° et Genuæ 16 // 16°
J: Scyizonij methodus medendi. Genuæ: 162 // 16°
Leonb: Fuchsij compend: Medicinæ. Basil: 15 // 8° aut Paris. 15. // 16°
And: Christiani Eusebii: medic: Tinnarellij Lib: 7. Basil: 1509. // 8°
And: Casalspini Speculum Artis Medicæ Hippocraticæ. Argent: 16. // 8°

Gal: iv. de usu part: 13. sub persona Platonis: Cop: Bootij vltzpetini.
Ditiores sapientia ad virtutis
peruenimus: si verba negligenterim.

15. 12. c. xxvii.

Scal: exercit: clx. 3.

Hanc ad modum partita est Natura visus, atq3
operas in yis, quia condidit; ut idem non solum diversis
sit diversum speciebus; sed etiam eodem in corpore
alias atq3 alias comparat effectiones. A Sole incipit,
idem sane dealbat Capillum; cutem facit atq3.
desiccatur Vultum, Solvit Butyrum, etc.




De medicamentorum compositione

Noniolethiis . p: 873.

Lentivi liquores, q̄ quamvis repellant, n̄ tamē exasperant. a. videretur adu-
stingunt, sed propria sua substantia moderatioē sūt, ut Albūm Ori
Famigraci dect.
Dea. p. 96. La. opt.

p. 24. HEPATICA FRIGIDA ex hepaticis pharmacis nullūm esse debet videri
menter refrigerans. Gal. vii. de comp. med. s. l. Dea. p. 97.

Dea. Guajaci usus. (333.)



- In simplices, { Cholagoga.
 Impuritas hunc { Phlegmagoga.
 ubi purgantis { Melanagoga.
 In ex complicatione { Cholagoga et Melanagoga.
 dilatum { Melanagoga et Phlegmagoga.
 { Phlegmagoga et Cholagoga.
 T ex complicatione
 omnium { Cholagoga Phlegmag. et Melanag.

Haemagogen medicamentum nullum cepit
 neq. etiam opus fuit, dum modi vacuandi san-
 guinis hi fieri sint, Phlebotomia, Chenubitula,
 Scazificatio, Sanguiisuga, Fectio inter nares.
 Alij modi attrahendi sanguinis & medicamenti vim
 perniciosi sunt et letales: praeter eos q. sunt ad sangui-
 nem provocandum ab haemorrhoidibus, & mensibus multioribus. agen
 Porro: ago. h. 20, c.


Stercus aut alterat qualitate	prima, sic	calidum	Anserinum.
			Columbinum.
		siccum	Ciconiarum.
			Asininum.
	Secunda, sic	adstringit	Equinum.
			Caninum.
		aperit	Vulturinum.
			Caprinum.
		dolorem mitigat	Humanum.
			Bubulum.
			Ovillum.
			Lupinum.
	purgat		Galinarum.
			Suillum syl. vestr.
		Murinum.	

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several lines and appears to be a list or a series of entries, possibly related to a historical record or a legal document. The handwriting is cursive and somewhat faded.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several lines and appears to be a list or a series of entries, possibly related to a historical record or a legal document. The handwriting is cursive and somewhat faded.

Item 159.
Vitis

Tenuis in lentis morbis, (simpliciter) tenuis in Acutis simpliciter. Hydrosacchar.
et galem. Tenuior in Pituita n. colata
Tenuissimus in Peracutis, Succis Pituitae, n. colat.
Hydrosacchar.
Crassus in longis seu Chronicis morbis.



Si Oculorum morbi species nondum tibi satis cognita
perspectaq; sit; huc ne properes remedia adhibere:
sed rem totam naturam committito. Natura enim
proba vivendi ratione adfuta et iuxta, aut morbum
profligabit, aut patefaciet et vias prebet:
Incerta quippe medicatio, Cirrita, nisi dispensio
decernitur. Si quid forte experiri cogeris,
leve id esto, ne fiat in re ancipiti factura
gravis. Fern: T. Metb. 3.

○varietas formularum plurimum facit ad decus,
& splendorem tam artis, quam artificis: ad
salutem aegri nihil aut parum. L. 59. d.

Acabum descriptionibus multum
difficilius suadet. Adolf. Goellius Prof.
propter multa ingredientia, de quibus
dubitandum potius est, quam quod certi
statuendum.

III imprimis ad curationem morborum in qualibet parte
consideranda veniunt, in quorum recta dispositione Sa-
nitas, mala vero Morbi vel similis, vel Organici,
vel Communis consistit. Sicut, & haec tria

Temperies, quae tunc, } ratiocinatione a Physiologo
quam Vis — } apprehenditis.

Compositio. } quae colorum ab Anatomico considerantur.
Unio. — }

Formae I. Meth: 1, et 7.

Scia Sicut ex quibus mendum ars constituitur: tria itidem
quae ad horum notitiam nos ducunt.

- 1^a Affectus seu Morbi Species, demonstrat Remedy Genus,
vnum, an multa esse doceat: si vnum, simplex an
compositum: si multa, simulne omnia, an singillatim,
singillatim et quo quaque ordine, legitimam, an ppositam.
- 2^a Aff: seu Morbi quantitas, notat facit Remedy Quantitatem,
quam validam, quo pondere, quoties, et quamdiu
exhibendum sit. Considerando etiam aegri naturam.
- 3^a Partis affectus, conditio, docet Remedio Utendi modum,
per quod loca abigendus morbus, cui sedi adhibend: remediis,
qua forma, quo morbi tempore, quavis hora.

~~conatus~~ situs
consensus et societas
ita in eam partem affectum seu
conatus utque virgatus.

partis situs, cui sedi adhibend: remediis: extrinsecus
consensus et societas, et via in aff: parte de recto,
quomodo intro sumendum remedium
conformatio et consensus per quod loca abigend: morbus.

Affectus Species et partis natura ac situs, qua forma Prescribi
dum remediis

Sex in lacte dies, ter sunt in sanguine trim,
Bis seni castrum, ter seni menses significant. // 45.

Nervorum conjunctiones. // Procerus, hamillaris, ad dextrum.

Optica prima, oculos movet, altera, tertia gustat,
Quartaque, quinta audit, sexta, Septima linguae.

Esuicant, vigilent, vivant, qui obsecrata curant.

~~Sex in lacte dies, ter sunt in sanguine~~

Causa hysterica.

antecedens.

contingens.

A. 41.

Alibi.

Symptoma

fructus laesi.

Exemplum: aqua de laesi.

Simpl: lym: affectus.

~~Sex in lacte dies~~

PHARMACIA.

Medicinae practicae partes, quae ab
operandi modo sumuntur, tres sunt,
Diarthron, Theriaca, Praeparationes.

De postrema hac, Pharmacia nuncupatur,
sic agere nostri est instituti. Quia quidem
deinde reliquis duabus eo majoris est momenti,
quod medicamentorum omnium
administrandorum viam praemonstrat, quia
quibus praxin medicam exercere, et ad
quosvis affectus remedia praescribere sit
paratus.

Illius vero duae sunt partes.

Prima materiam medicam exponit.

Materia medica omnium medicamen-
torum, tam simplicium quam Com-
positorum, tam Internorum quam Externorum
penitus uberissimum complectitur:
Ex quo ad omnes praeter naturam affec-
tus expugnandos convenientia Remedia,
et ad quaslibet indicationes per-
ficiendas idonea, depromuntur.

Secunda praepcepta tradit, quibus
varia medicamentorum formulae ex
ista materia componuntur.

Tanta est huius partis utilitas, ut
quicumque medicamentorum formulae
componendi regulam agnam noverit,
nunquam in praescribendi modo errare
possit.

2.
PARS PRIMA.
de Materia Medica.

Materia medica duplex est, Sim-
plex et Composita.

Simplex ex tribus fontibus deservi
solet, Plantis, Animalibus, Mineralibus.
Priorum ordinem in singulis classibus
sumus observaturi.

Composita in Pharmacopaeorum
officinis haberi solet. Quam eo ordine
proponemus, ut minus composita medi-
camenta perpetuo magis composita
precedant.

Simplicia vero et composita secun-
dum facultatum classes proponuntur,
ut facilius indicationibus Medicis inser-
viri possint.

Utraq; duplicia sunt, Interna et
Externa.

Interna hic vocamus, quae internas
viri affectuum curationi sunt accom-
modata.

Ne quis agere ferat nos in Inter-
norum Catalogo illa etiam admiscere,
quae foris admoventur: Sciat nos hic
Interna appellare, non solum quae intra
corpus assumuntur, sed etiam quae foris
admoventur, dummodo affectuum inter-
norum curationi inserviant. Quod
magno Tyrorum factum est commodo,
ut ad eandem indicationem adim-
plendam materiam internam et
externam simul congestam reperiant.

Externa vero, quae curandis affectibus
externis inservire solent, Isteo
dum huius primae partis erunt Sectionis.

Prima

Prima materiam medicamentorū
internorū proponit.

Secunda vero materiam Extēnorū.

1.^a PARTIS SECTIO prima.
de Materia Medica interna.

In morborū internorū cūsa-
tione præcipue indicationes respici-
unt vel Causas morificas, vel Morbos,
vel ipsas partes affectas.

Causæ morbificæ majori ex parte
sunt varij humores, qui prout varijs
qualitatibus peccare solent, ita varia
requirunt medicamenta contrarijs
qualitatibus donata. V. G. Frigidi
humores calida, calidi frigida, ten-
ues incrassantia, Crassi attenuantia,
Corrupti tandem expurgantia poscunt
remedia. Et ita de Cæteris.

Morbi quandoq; sublati suis cūis
permanent, et præuocantem exposcunt
cūisationem per contraria remedia,
ut luculenter in generali methodo
medendi docetur.

Partes deniq; affectæ corroborantia
requirunt, et alterantia specifica,
qualia sunt Cephalica, Thoracica,
Cardiaca, Stomachica, Hepatica, &c.
quæ omnia ordine suo proponantur.

Porro omnis hæc materia vel sum-
mits ex Plantarū Radicib; Lir-
quis, Corticib; Folijs, Seminib;,
Fructib; Florib; Gummis, Resi-
nis, Liqueorib; Succis: Vel
ex Animalib; integris, aut ipsorū
partib;

partibus, tam viventibus, quam non
viventibus, & Excrementis: vel deni-
que ex mineralibus, qualia sunt
Terra, Succus concreti, Minerale la-
pidis, & Metalla. Ex quibus
varia composita parantur in Offi-
cinis, ut: Aqua, Symplicia, Conserua,
Pulueres, Trochisci, Confectiones,
Electuaria, Pillula, &c.

MATERIA MEDICA INTERNA, Simplex
& composita constat
xxxvii facultatibus.

1.	- Bilem refrigerantia & attenuantia.	-
2.	- - - - - & increasstantia.	-
3.	- Pituitam calefacientia & attenuantia.	-
4.	melancholi: alterantia.	Splenica calida - 21.
5.	Atrā Bilem pparantia.	- - - frigida - 22.
6.	Aperientia calida.	Nephritica calida - 23.
7.	- - - - - frigida.	- - - frigida - 24.
8.	Sudorifica.	Lithontreplica - 25.
9.	Digestica calida.	Conceptum solvantia. 26.
10.	- - - - - frigida.	Partum euicentia. 27.
11.	Cephalica calida.	Menses mouentia. 28.
12.	- - - - - frigida.	- - - sistētia. 29.
13.	Thoracica calida.	Lac generantia. 30.
14.	- - - - - frigida.	- - - minuētia. 31.
15.	Cardiaca calida.	Semen generantia. 32.
16.	- - - - - frigida.	- - - Extinguentia. 33.
17.	Hepatica calida.	Flatūs dissoluentia. 34.
18.	Hepatica frigida.	Astringentia. 35.
19.	Stomachica calida.	Lumbricos emecantia. 36.
20.	- - - - - frigida.	Vulneraria interna. 37.

De singulis ordine.

Cap. 1.

CAP. I.
Medicam: Bilem (refrig:
Laten:

SIMPLICIA.

Rad:

Acetosa,
Cichorij,
Graminis,
Asparagi,
Oxylapathi.

Fol:

Capit: vitulæ
Endivia.
Cichorij.

Sem:

iv frig: majora.
Endivia.
Hordei.
Acetosa.

Fruit:

Poma involuntia.
Pruna acida.

Floz:

Cichorij.

Gum:

Campbora.

Liqzoz:

Acetum.
Omphacinum.
Succi.

Limonium.
Citizorum.
Azantiorum.

Endivia.
Acetosa.
Cichorij.

COMPOSITA.

Aq:

Acetosa.
Cichorij.
Graminis.
Endivia.
Hordei.

Syz:

de Limonib:
Capill: Ven:
Acetof: simpl:
Cichorij simpl:
de Succo Acetosa.

Conseco.

Fl: Cichorij.
Acetosa.

Capilli Vener:
Cerasa condita.

Pilv: &

Electuaria.

Diamargariton frig:
Diatrion Santa len.
Diarbodon Abbatis.

ii.
Bilem (refrigerantia.
Incoasstantia.

SIMPLICIA.

Rad:

Syz: Adiantij.

Rad:

Althaa.
Plantaginis.

Fol:

Portulaca.
Lactuca.
Malva.

Sim:

Portulaca.
Lactuca.
Malva.
Papav: albi.
Nyllij.
Cydoniarum.
Bombacis.

Fz:

Injuba.
Sebestia.
Cydonia pyra.

Fl:

Viola.
Nympha.
Papav: Rubros.

Suc:

Amyli.

Gum:

Arabicum.
Tragacanthum.

Animal:

Cornu Cervi.
Spodium.

COMPOSITA.Aq:

Lactuca.
Portulaca.
Papav: Rubros.
Nympha.
Rosarum.

Syz:

Violacina. x
Injubarum.
Papaver: albi.
— — Rubros.

Mel: & Sacch:

Mel rosatum.
// violacinum.
Sacch: rosatum.

Condit:

Rosarum.
Violarum.
Fl: Nymphae.
Lactuca condita.

Elect:

Diatragmatz:
Diapredius sine specieb.

Troch:

dr spodio.
— Capryza.

III.

Pituita calefacientia
Lacteniantia

SIMPLICIA.Rad:

Emilla

x. violaceus solus in Explan-
vendis. eo qd pp dilectio-
nem facit in his vltis.
Forst. III. Obs. d. 14.

Enula Campana.
 Cypri.
 Galanga.
 Petroselin.
 Feniculi.
 Zedoaria.
 China.
 Salsa parilla.
 Zingiberis.
 Apij.

Lig:

Guajacum.
 Sassafras.
 Xyloaloeis.

Cort:

Citri sicci.
 Guajaci.
 Cinnamomum.

Fol:

Salvia.
 Thymi.
 Majorana.
 Mentha.
 Origani.
 Pulgij.
 Rosmarini.
 Betonica.
 Catamuntzi.
 Chamadryos.
 Chamopytyos.
 Absintij.

Sem:

Danci.
 Feniculi.
 Petroselini.

Anisi.
 Apij.
 Amos.
 Citri.
 Cardui Bened.
 Cami.

Fl:

Antbos.
 Betonica.
 Lavendula.
 Macis.
 Salvia.
 Stachados.

Fr:

Cucubazum.
 Seselios.
 Piper.
 Cardamomum.
 Gargophylli.

Anim:

Moschis.
 Castoreum.
 Zibeta.

Miner:

Ambazum.
 Chalybs pparatz.

COMPOSITA.

Aq:

Absyntij.
 Betonica.
 Card: Bened.
 Cinamomi.
 Calustis.
 Feniculi.

Hyssop

Hysopi.
Impatiens.
Melisse.
Salvia.
Theciacalis.
Aq. vita.

Ol: Olym:

Anisi.
Feniculi.
Cinnamomi.
Gazophylorum.

Syr:

de Absynthio: vulgari
Conditura Cortic: Citri.
de Hysopo.
— Mentha.
mel rosatum.
Oxymel simplex.
— composit.
de Radicibus.
de Stachado.

Cond: et Cons:

Cortic: citri conditi.
Rad: Emul: Camp: cond.
Myrobalani cond.
Fl: Salvia.
— Stachados.
Limbic: conditi:
Folia: Absynthii.
Antbes.
Rad: Accos cond:
Nux moscata cond:

Confect:

Alchemer.
Anisa Alexandrina.
Mitridatium.
Thecina.

Pulv: et Elect:

Diantra.
Diamoschum.
de Gemmis.
Dianthes.
Dianis.
Diagalanga.

Troch:

de Absynthio.
Alypta moscata.
de Eupatorio.
Gallia moscata.
de Mirza.

IV.

Melanchol: attenuata

Melancholicis humor
ut frigidis est et sicq.
ita calfacientib: indi-
get et humectantibus
medicamentis. Cum
vero major calfaci-
entium pars etiam ex-
siccet, illis ideo, qd p-
ciliatim vim obtinent
humectandi oportet ad-
miscenda, ut in seqq: fit.

SIMPLICIA.

Rad:

Ap-
Byglossi.

Exin

Eringy.
Famici.
Enula campana.
Petroselini.

Corticis

Radic: cappaz.
Citri.
Mediani Praxini.
— — Sambuci.
— — Thamarisci.

Fol:

Fumaria.
Lupulorum.
Melissa.
Polytrichi.
Boragin:
Byglossi.
Capill: Veneris.
Cetrac.
Cuscuta.

Sem:

Famici.
Ocymi.
Anisi.
App.
Cucurbita.
Agni casti.
Citri.
Cardus Bened.

Fr:

Cappaz.
Uva Cordintziaca.
Grana Cerevis.
Passula.

Poma redolentia.

Fl:

Boraginis.
Byglossi.
Calendula.
Crocus.
Gonista.
Sambuci.
Thamarisci.
Violaceum.

Grm:

Ammoriacum.
Bellelinum.
Mina.
Chalybs Preparat.

COMPOSITA.

Aq:

Boraginis.
Byglossi.
Card: Benedici.
Famici.
Melissa.

Syr:

Bysanthinis.
Capill: Veneris.
De Fumaria simpl.
— Pomis exolent.
— Radicibus.

Conser: & Cond:

Radic: Enul. Camp.
Corticis Citri.

Floz

Florum Genista.

— — — Tamarisci.

— — — Boraginis.

— — — Byglossi.

Confectura violar.

Radix Cappaz: cond:

Cortex Citri cond:

Myrobalani cond:

Confect:

Confectio Albizinis.

Iberiaca.

Pulv. & Elect:

Diambea.

Diamorbidum dulce.

de Gemmis.

Latificans Galeni.

Troch:

de Absinthio.

— Cappazibis.

Gallia moschata.

V.

Atram bilem attenuata.

— vel melanubolium
admixtam preparantia.

Eadem sc. medica. n.
menta requirit seorsum
ac bilis: quia tamem
crassa est, miscella
attenuantia, parva tu-
dosi, multa caliditatis,
et hi etiam humiditatis
sunt adiungenda. Hae
autem praecipue
sunt in atra
bile temperanda.

SIMPPLICIA.

Rad:

Byglossi.

Boraginis.

Liquiritia.

Fol:

Boraginis.

Byglossi.

Fumaria.

Lupulorum.

Sem.

W friz: majora.

Fl:

Boraginis.

Byglossi.

Nymphaea.

Violarum.

Fr:

Poma sedolentia.

COMPOSITA.

Aq:

Boraginis.

Byglossi.

Nymphaea.

Syz:

Violarum.

Pomoz: sedolentis.

Consirov.

Lactuca condita.

Floz: Nymphaeis.

Violarum.

Rad: & Fl: Byglossi.

Fl: Boraginis.

Nymphaea.

VI

10a

Rad: V Apri-cules.

cali: { Apri.
Feniculi.
Petroselin.
fo: { Geanninis. — al: Asparagi.
Risi.

VI.

Aperientia calida.

SIMPLICIA.

Rad:

Apj.
Aristolochia longa.
— — rotunda.

Asari.
Cypri.
Emula Campana.

Eryngj.
Feniculi.

Gentiana.
Petroselin.

Cort:

Radic: Cappasim.
retivilla Feaxini.
— — Tamarisci.

Fol:

Capillares ocs.
Centaurj minoris.
Chelidony maszeis.
Hypozici.
Origani.
Pylagj.
Polytrichi.
Absinthj Rom.
Betonica.
Capill: veneris.
Calamentj.
Chamaedrys.
Chamaepytos.
Ceteracj.
Artemisia in multientj

Sem.

Danci.
Feniculi.
Petroselin.
Seselsos.
Urtica.
Amisi.
Apj.
Amos.
Agni castj.
~~Cicubita.~~
Cardi Bened.
Ciceris rubri.

Flor:

Antbos.
Betonica.
Geminif.
Hysopi.
Stachidos.
Tamarisci.
Sambuci.

Gum:

Ammoniacum.
Bellinum.
Myrrha.
Terebintina.
Alois.

Liquor:

Qinum album.
— Chalybatiz.

Minc:

Chalybs.

COMPOSITA.

Aq:

Absin

Tamarisci.

Foli:

Tamarica.
Eupatry. ad Agcinonia.
Mazzeij.
Nasturtj atrinco.
Cochlearia.
Bleubinga. x. Anagall: eq.
Cuscuta.
Tamarisci.

Cort:

Cinnamom.
Rad: Cassiaum.

Cassia.

Fol:

Amygdala amara.

Absinthij.
Betonica.
Cardi Bened.
Cinnamomi.
Feniculi.
Hysopi.

01: Czym:

Anisi.
Feniculi.
Cinnamomi.
#Terebintina.
Spiritu Vitisoli.

Sy2:

de Absinthio vulgari.
Byzantinus.
Oxyuri simplex.
Composit:
de V. Radicibus.
Rosarium siccatum.

Confess:

Zinziber conditum.
Capill: Venzels.
Fl: Geristke.
Rad: Emil: Camp:
Fl: Absinthj.
— Tamarisci.

E. W. F.

Aromatic: rosetim.

Conflict:

Albizia,
Tournefortia.

Trock:

Die Absynthese.

de Cappazibj.
— Empatorio.
— mizba.

Y11.

Apezentia frigida.

SIMPLICIA.

Raw:

Acetosa.
Asparagi.
Cicborij.
Graminis.
Oxylapatzi.
Rufci.

Fol:

Cichorabita.
Hepatica.
Eniuvia.
Polytrichi.
Acetosa.
Agropyron.
Cichory.
Capill: vernalis.
Ceterach.
Capillaris oes.

Scim:

IV fig: majora.
Acetola.

Fl:
Cic 5024.

COMPOSITA.

Aq:

Acetosa.
Aggimomy.

Cieł

Fol:
Finnaria.

Epithorbum.
Succus Limonium.
Acetum.

Cichorij. -
Enivia.
Graminis.

Syr:

Acetosus simpl.
Capillor. venis.
Cichorij simplicis.
de Limonibus.
- Succo Acetos.

Elect:

Diatizon Santalon.
Diarrhoeos Abbatis.

VIII.
Sudorifica.

Simplia.

Efficaissima.
Lignum Guajacum
& cortex.
Sassafras.
Radix China.
- Salsaparrilla.

Mimis efficaciter

Rad:

Angelica. Petroselin.
Carlina. Apj.
Scorzenera. Farniculi.

Liq:

Guajacum.
Juniperinum.
Sassafras.

Cort:

Guajaci.

Barbana. Pimpinella.
Truncatilla. Zedaira.

Fol:

Scororij.
Ulmazie.
Carni Bened:
Barbana.

Sem:

Carni Bened:
Milly vulgaris.

Fl:

Cyami. Chamam:

COMPOSITA.

Aq:

Carni Bened:
Scabiosa.

IX.

Diuretica calida.

Simplia.

Rad:

Apj.
Farniculi.
Petroselin.
Ononidis.
Rhapsoni.
Valeriana.

Cort:

Cortex c. mediamis
Conista efficacissim.

Fol:

Saxifragia.
Sisymbrij.

Serbi

Terra sigill:

Corne Cervi.

Rob Sambuci.

Bisaccharicum mineral. f. et cum.

o. 8 fixum sub diaphoretico.

o. 4 8 fixum.

Herb:

Eryngij.
Glycyrrhiza.
Asparagi.
Pimpinella.

Spica Nardi.
Asarum.
Absinth:
Eupatorium.
Valeriana.
Betonica.
Chamaesyris.
Chamaefolia.
Ruta.
Securidum.

Cinnamom:

Sem:

Anisi.
Feniculi.
Cibicifolij.
Saxifrag.
Malva.
Althæa.

Amigd. amara.
Nuclei Persicorum.
Ficus.

Sabina.
Feniculi.
Nasturtij aquatici.
Pimpinella.
Apj.

Sem:

Lentisci.
Mily Solis.
Geraselinum macedon.
Raphani.
Sesentos macedon.
Urtica.
Apj.

Cicera rubra.
Livisticij.
Semen Galinzi.

Fr:

Bacca Jampet.
- - - Lanzi.

Fl:

Genista.
Camomilla.

Gum:

Turbinthina.

Liq:

Vinum album.

Anim:

Sanguis Hirci ppar.
Cantuarii. Berberis.

Miner:

Carabæ.

Composita.

Aq:

Apj.
Feniculi.

Sabina.

Syz:

Bysantinis.
Oxymel simplex.
- - - composit.
Capilli Venæ.
de 7 Radicibz.
Conserv.

Fl: Genista.

X.

Diuretica frigida.

Simplicia.

Rad:

Acetosa.
Asparagi.
Graminis.
Althæa.
Oxylapathi.

Fol:

Capilli Venæ.
Heriacia.
Parietaria.
Acetosa.
Summitat: Asparagi.
Bis malva.

Sem:

iv frigida majora.
Acetosa.
Alkekengi.
Hordachm.

Flor:

Althæa.

Gum

Sp: Salis. ♀ ♂

Gum:

Capbura.

Succ:

Limonium.

Fr:

Cucurbita. }
 Peponas. } caro
 Cucumeres. }
 Feaga.

COMPOSITA.Aq:

Acetosa.
 Graminis.
 Hordei.
 Parietaria.

Syz:

de Althaea.
 Capill: Veneris.
 de Limonibus.

Cons:

Capill: Veneris.
 Ralic: Eriog.
 Carni.
 Cucurbita.

Troch:

de Capbura.

Corollarium.

Ad vacuantiū genus
 spectant menses morē
 tia, quā tū ad hypōchi-
 corū clāsses melius
 referunt. Imō petant.

XI.

Cephalica Calida.

SIMPLICIA.Rad:

Acozi.
 Cypri.
 Calami Aromatici.
 Galanga.
 Peonia.
 Spica Nardi.
 valeriana.
 Zedoaria.
 Jaceo Florentina.

Liq:

Xyloalois.
 Viscus Quercinus.

Coct:

Cinamomi.

Fol:

Salvia.
 Laurei.
 Majorana.
 Poly muntani.
 Rozis marini.
 Betonica.
 Calamenthi.

Sem:

Peonia.
 Cardamomum.
 Sileris montani.

Fr:

Cucubarium.

Fol:

Hyssopi. Herba Paralysis.
 Melissa. Liliū Conostich.
 Lavendula. Origani.
 Rista. Serpillum.
 Spica.
 Viscus quercinus.

Grana

Grana Lermis.
 Gariophylli.
 Bacca Juniperi.
 ———— Lauri.
 Nix myrsinata.

Flor:

Antbos.
 Betonica.
 Lily convallij.
 Macis.
 Salvia.
 x Stachados.
 Camomilla.
 Tilia arbores.

Miner:

Ambazim.
 Azomata.
 Gariophylli.
 Cinamomum.
 Xyloaloës.
 Macis.
 Jujuba.
 Cardamomum.
 Spica Nardi.
 Moschus.
 Zibeta.

Licet hæc Azomata ad
 prædictas classes referri
 possint, quia tamen in
 significatione reborandi vix
 pia se ferunt, ideo sen-
 sum proprium, ut
 commodius ad usum
 proprium revocari
 possent.

Composita.

Aq.

Betonica.
 Cinnamomi.
 Celestis.
 Imperialis.
 Majorana.
 Napæa v. fl. Aurantior.
 Salvia.
 Theriacalis.
 Aq. Vita.

Syz:

mel antbosatum.
 de Stachado.

Conf:

Myrobalani conditi.
 Nix myrsinata condi.
 Fl: Salvia.
 — Stachados.
 Zinzibezis.
 Antbos.
 Radic: Acori.

Conf:

Alkermes.
 Aurca Alexandrina.
 Nitridatum.
 Theriaca.

Pulv: & Elect:

Diambra.
 Diamelsium dulc.
 Dianthos.
 Diazis.

Troch.

Flor:


Lavendula.
 Meliloti.

x. stachas Arabica vitæ
 quasi nervis afflat, filii
 propterea cum nervis nervis

Calamus from:

leniter hinc odorata cal-
 faciendo caput reborant.
 Nervis autem odorata nervis
 eas inducunt, caput vapores
 asplendo.

Diamarz: cal:



Cap. II. xalà 16
nos in finis
Cap. I.

Capiti nocentia

Semen castoris.
Lorè.

Asiutibz succis.
Lac in potu.

Glandes quercinae in cibo.

Olivæ nigrae.

Arbuti fructus.

Erucae.

Hederae Cacumina.

Rhus.

Lentisci fructus.

Crocus.

Benchedanum.

Cyclaminus sicca,
cum vino opota.

Mandragora.

Cicuta.

Hyosciamus patens potatilis
tristitiam omnibus dissipat
multis vero somnos
turbulenter inducit.

Troch:
de Carabi.
Gallia moschata.

Externa.

Ol:
de Castoreo.
Camomilla.
Jasinum.
Laurinum.
Nardinum.
Nucum.
Rutaceum.
de Spica.
Vulpinum.

Empl:
de Betonica.
- Baccis laetis.
- melilotis.
- nucislagimibz.

XII.
Cephalica frigida.

Singulica.

Lign:
Santali omnes.
ubi citri albas.

Fol:
Lactuca.
Portulaca.

Sem:
Lactuca.

Portulaca.
Papaveris albi.
Pylly.
in frigi: majora.

Suc:

Acetum.
Omphacium.
Opium.
Granatorum.
Limonum.

Lact:

Camporea.

COMPOSITA.

Ag:

Lactuca.
Nymphaea.
Papav: Albas.
Portulaca.
Rosarium.
Syr:

Violaceis.
Narcoticis.
Papav: albi.

Cons:

Lactuca cond:
Fl: Nymphaea:
Rosarium.
Violarium.
Cucurbita.

Elect:

Flos:
Nymphaea.
Rosae.
Violar.

si

Diantha.
Alba Alexand.
Dianthus: Albus.
Dianthus.
Mans Christi.

Diam

Albi Vasi
Gammis Jasinum.
Nucis.
Laurum.

Hic ob humectationem, pro capite in melancholicis
adhibere licet. Rosag:
Bygglif:
Poma Alaba.
Amygd: dila.

Diamargarit. frigid.
Diatrion Santalen.

Conf:

Philon: Roman. } *Narcissica.*
Requies Nicol. }

Pist.

de Cynogloss. Marot.

Externa.

Ol:

Violaceum.
Nymphaea.
Rosatum.
Caphyra.
Ompbacium.

Ung:

Rosaceum.
Populeum.
Refrigerans Galeni.
Ceratim Santalin.

XIII.

Thoracica calida.
attenuando & detur
gendo expectorantia.

Rad:

Aristolochia utriusq.
Enula Campana.
Jasos Florentina.
Liquiritia.
Zinziberis.
Scylla.
Dracunt. Helen.
Azi. Angelica.
Pimpinella. vidis.

Fol:

Roris Solis.
Thysilaginis.
Thymi.
Hedera terrestris.
Hysopi.
Nicotiani pauc. Testi.
ga vomitoria.
Origani.
Prasii albi.
Pedis Cat.
Calamentzi.

Sem:

Lini.
Urtica.
Brasica.
Seselis masculiens.

Fr:

Amygdal. dulc.
Dactyli.
Ficus.
Bacca Lauri.
Paspila dulces.
Nuclei pini.

Fl:

Croci.
Camomilla.

Gum:

Myrra.
Stuebinthina.

Animal:

Mel:
Uilmo Vulpis pparat.

Minea:

Fol:

Beltonica.
Veronica.
Cardi. Benu.

Sedibis qda vumica
in pecto & spirit.

Sem:

Famula.

minera:

Flores Sulphuris.

COMPOSITA.Aq:

Hysopi.

Tussilaginis.

Syr:

Capill: Veneris.

de Hysopo.

— Liquiritia.

— Tussilagine.

Pedis Cati.

Oxymel Simplex.

— — Scillitic:

Cons:

Capill: Veneris.

Radice: Enul: Camp:

Zinziberis.

Elect:

Diarrhoe Salomonis.

— — Simplicis.

Sacch:

Gandium.

Externa.Ol:

Irinum.

Amygdal: dulc:

Camomilla.

Liliorum.

Ausp:

Axungia Gallina.

— — Anatina.

— — Vitulina.

Butyrum recens.

Medul:

Cervina.

Vitulina.

Ung:

de Althæa.

Resumptivum.

Empl:

Fily Zacharia.

XIV.

Thoracica frigida.

Rad:

Althæa.

Liquiritia.

Fol:

Poly montani.

Capill: Veneris.

Sem:

Malva.

Papaveris albi.

Psylli.

iv frig: majora.

Althæa.

Bombacis.

Hordei.

Fz:

Dactyli.

Amygdal: dulc:

Pen-Loos de pini
Loos de pulvis Vulpis.Tragacanth: cal:
Diacalummentum
Diaprasium.

Pruna dulcia.
Sebesten.
Insiba.
Nuclei pinei.

Fl:

Nymphaea.
Papav: Abrados.
Violaceum.

Gum:

Azabicum.
Tragacanthum.

Suc:

Amylum.
Liquiritia succis.

Anim:

Caro Testudinis.
— Canceri fluvial.
Lac muliebr.
— — Asininum.
— — Caprinum.
Butyrum recens.

COMPOSITA.Ag:

Hordei.
Lactuca.
Nymphaea.
Papav: albi. Extrema.
Portulacae.

Syz:

Capill: Veneris.
Insibarum.

^{Abados.}
Papav: albi.
Violaceus.

Sacch:

Panidiatum.
Rosatum. / Violatum.
Cons:

Lactuca condita.
Rosatum.
Violatum.

Fl: Boraginis.
Caro Chenobita cond.

Elect:

Diamargarit: frig:
Diapenid: sin: spiritib.
Diatragacanthum.

Diapapaver.

Externa.Ol:

Violaceum.
Nymphaea.
Amygdalar: dulc:

XV.

Cardiaca Calida.

Rad:

Zedoaria.
Angelica.
Dictamni, seu Fraxind.
Doronic.
Gentiana.
Dentaphylli.

Rai:
Helvug

Spica

Pectori nocent

Nimis frigida, acida, rancida,
acida, adstringentia.
h: Felle h: immutabili,
Pituitum.
Lepus marinus.
Ol: Nucum.

Spica Nazili,
Imperatoria.

Cort:

Citri sicci.
Cinnamomi.

Lign:

Xyloaloes.

fol:

Cardui Bened:

Scabiosa.

Melissa.

Poly.

Ocymy, seu Basiliconis.

Roris marini.

Abrotani.

Lavendula.

Sem:

Ocymy.

Citry.

Cardui Bened:

Fl:

Anthos.

Boraginis.

Byglossi temperati.

Croci. Calendula.

Macis.

Melissa.

Fz:

Grana Tinctoria.

Garyophylli.

Nux moschata

Bacca Juniperi.

Gum:

Myrrha.

Mastix.

Thrs.

Suc:

Melissa.

Scabiosa.

Boraginis.

Anim:

Lapis Bezoar.

Moschus.

Zibetia.

Sevicium candidum.

Mintz:

Ambacum.

Succinum.

Animum.

COMPOSITA.

Aq:

Cardui Bened:

Cinnamomi.

Celestis.

Imperialis.

Melissa.

Napha.

Roris marini.

Scabiosa.

Theriacalis.

Aq: vita.

Ol: Chym:

Cinna

Scordium Vitonica.

~~Lignum Albi.~~

Cinnamomi.
Gariophyllorum.
Nucis muscatae.

Syz:

Byzantinus.
Conditura Cort: Citzi.

Cons:

Myzobalani conditi.
Nux. muscata cond:
Flor: Anthos.
Corticis Citri.

Conf:

Alkermes.
Theriaca.

Elect:

Aromatic: rosatur.
Diambra.
Diamoschum dulce.
de Gemmis.
Latificans Galeni.

XVI.
Cardiaca Frigida.

SIMPPLICIA.

Rad:

Acetosa.
Byglossi.
Bistorta.
Tormentilla.
Lign:

Santali omnis.

Fol:

Oxylapatibi.
Acetosa.
Boraginis.
Byglosji.

Sc'm:

Plantaginis.
Acetosa.
Cydoniorum.

Fl:

Bozaginis.
Byglosi.
Nenupharis.
Rosarum.
violarum.

F2:

Limonēs.
Cydonia.
Granata acida.
Poma odorata.
Ribes.

Cerasa acida.
Citria.

Grim:

Самрзоза.

Suc:

Folior: 2 } praedictor.
Florum }

Anim:

Lapis Bezoar.
Cornu Cervi.
Ebura.

Fol:

Agropyron.
Plantaginifolius

She:

Citri.
 Linum.
 Gramatiz.

Perla

Rosata novella.

In Cordis
palpitatione

1. Niamarg: cal:
2. Diacamon.
3. Myrridatum.
4. Iberia.

In Cordis
palpitatum.

Inter Cardiacæ facili^{Ph.} familiam ducunt, in pollendis rebus
noctis & vernalis, in tñ Agnō Palsitation: inferunt.

(Lapis Bizar: — a gr: ij. ad iij.

Cornu Cervi lot:

Margaritæ s — — — — — ʒss.

(Sal Perlaticum Oriental:

q comminuta in puluerem tenuiss: aspersum ut plurimum
etiam

[Aq: Cinomoni

Aq: Card: Betul:

Syr: de Acetof: Citri]

ad ℥ij

R. Fabae: m. opus: physioli & med: B.

226

Perla eximia.
Speridium.
Unicornu.
Os de corde Cerui.

miner:

Bolus Armenius.
Corallus.
Aurum.
Fragmenta ptiosa.
Terza sigillata.

COMPOSITA.

Aq:

Acetosa.
Boraginis.
Byglossi.
Rosarum.

Syr:

Granatorum.
de Limonibus.
violaceus.
de Succo Acetosa.
Rosarum siccarum.
de Pomis edolentibus.

Cons:

Rosarum.
Violarum.
Rad: & Flor: Byglossi.
Folior: Acetosa.

Conf:

de Hyacintho.
Elect:

Diamargarit: frig:
Diatrion Sandalon.

XVII.

Hepatica calida.

SIMPLICIA.

Rad:

Cyperus.
Calami Aromatici.
Enula Campana.

Fol:

Centaury minoris.
Mentha.
Absinthij Rom:
Agrimony.
Botonica.
Chamaedryos.
Chamaepytis.

Sem:

Feniculi.
Anisi.
Amicos.
Caryj.

Fl:

Anthos.
Mazis.
Stachados.

Fr:

Gaziophylli.
Nux muscata.
Passula.

Rad:

Asparagi.

Fol:

Capill: ♀.
Salvia.
Chschta.
Hepatica.
Petroselin.

Amigd. dulces.
amara.

Compo

Calamis Aromatici.
Castia liqua.
Cinnamulomum.

Margarita.
Sapphirus.
Smaraglus.
Lapis lazuli.

Mammis Abissi.
Diacoralli.

COMPOSITA.Aq:

Absynthij.

Betonica.

Mentha.

Syz:

de Absynthio vulg.

Byranticus.

de Mentha.

— V Radicibus.

Cons:

Corticis Citri.

Rad: Enulae Camp:

Myzobalani conditi.

Nux mīschata cond:

Flor: Salvia.

Anthos.

Radic: Acori.

Conf:

Mithridaticum.

Theriaca.

Elect:

Aromatic: rosatum.

Diazrhodon Abbatis.

Diambra.

Diamuschum.

Troch:

de Absinthio.

— Eupatorio.

— Rhabarbaro.

Externa.Ol:

Nardinum.

de Absynthio.

— mentha.

XVIII.

Hepatica Frigida.

Simplicia.Rad:

Acetosa.

Graminis.

Asparagi.

Cichorij.

Ruscij.

Pol:

Dentis Leonis.

Scaevola.

Endivia.

Hepatica.

Lactuca.

Portulaca.

Acetosa.

Capill: Ventris.

Cichorij.

Lign:

Santal: omnis.

Fr:

Granata acida.

Cucurbita.

Pruna acida.

Nuclei Persicorum.

Cucumeris.

Betebris.

Succ:

Cera.

Ribes.

Fraga.

Diatrium Santal:

Succ:

Acetosa.
Cichory.
Granatorum.
Limonum.
Cydoniorum.
Endivia.
Omphacy.

Anim:

Ebur.
Spodium.

Minez:

Corallus.

Fl:

Cichory. Viola.
Nymphaea.
Rosa rubra.

COMPOSITA.Aq:

Acetosa.
Graminis.
Agriomorphy.
Cichory.
Endivia.
Rosarum.

Syz:

Cichory. Simpl:
— — composit:

Granatorum.
de Limonibus.
— Succo Acetosa.
Rosarum Sacarum.

Cons:

Berberis.

Florum Cichory.
Rosarum.
Folior: Acetosa.
Cerasa acida cond:

Elect:

Diamargaritum saig:
Diatrion Santalen.
Diarrhodon Abbatis.

Troch:

de Spodio.
— Capryra.

Externa.Ol:

Rosarum.
Omphacium.
Nymphaeas.

Urg:

Rosaceum.
Ceratum Santali.
Refrigerans Galeni.

Stomachica calidaSimplex.Rad:

Cypri.
Calami aromatici.
Galanga.
Spica Nardi.
Zinziberis.

Cort:

Citri

Scedum Caprinum.

Sem: Saig: majora.
minora
Hordei.

Syr: de Acetosa Romana, a phisicis
longe pluris sit in loco refrigeranti.
Syr: de aceticitate Ciceris, cum
pluribus speciebus Ciceris in solam
mixtura, sed et de corticibus.
licet calidi expresse solvantur.

Ab Hepat: &
Lienis obstruct.
& Aq: in
terechites.

Citri succi.

Cinnamomi.

Liq:

Xyloaloes.

Fol:

Absinthij. Gentici.

— — — Romani.

Betonica.

Mentha.

Rosmarini.

Salvia. Latri.

Sem:

Anisi. Cumini.

Feniculi. Carui.

Coriandri. ¶.

Citri.

Piper.

Fl:

Anthos.

Betonica.

Croci.

Nacis.

Salvia.

Gum:

Masticis.

Arom:

Gariophylli.

Nix mischata.

Nacis.

Piper.

Spica Nardi.

Xyloaloes.

Croci.

Zinziber.

Cinnamomum.

Ambr.

manca:

Ambacum.

Corallus.

Composita.Aq:

Absinthij.

Betonica.

Mentha.

Salvia.

Syz:

de mentha.

— Absinthio pontico

Conf:

Fol: Absinthij.

Anthos.

Radice: Acori.

Cortic: Citri.

Myrobalani conditi.

Nix misch. cond:

Fl: Stachados.

Zinziber conditum.

Conf:

Alkermis.

Mithridatium.

Theziaca. (p. Xylabo)

Elect:

Aromatic: Rosat:

Diambea.

Diagalanga.

Droeb:

de Absynthio.

— Rhubarbaro.

Externa.oleaBaica: Latri.
Lunipert.Asta novella.
Diatizon Piper.
Diamisam.
Diacuminum.
Aromat: Gariophylli.
Diacinnamom.
Diagingiber.

Ol:

Nardimim.
de Absynthio.
- Mentha.
Rucis muscator.
Masticimim.
Myrtbinim.

Empl:

Pro stomacho.
de Mastiche. #

XX.

Stomachica fzig:

Simplicia.

Rad:

Plantaginis.
Acetosa.
Santalum rubri.

Fol:

Plantaginis.
Myrtbi.

Sem:

Cydoniorum.
Plantaginis.
Myrtilli.

Fl:

Balanstiorum.
Rosaz: rubrarum.

Fr:

Cydonia. Pyra.
Sorba. Persica.
Mespila. Citostilli.
Poma granata.
Fruga. Mora.

Succ:

Acacia.
Hypobystis.

Minez:

Corallus.

COMPOSITA.

Aq:

Rosatum.
Plantaginis.
Acetosa.

Syr:

de Agresta.
Cydoniorum.
Myrtbinis.
Granatorum.
Rosatum sicca:
de Sineco Acetosa.

Cons:

Rosaz: rubrar.
Fol: Acetosa.
Cerasa condita.
Ribes.
Berberis.

Elect:

Diatrion Santaloz.
Externa.

Ol:

Rosatum.
Lentiscinum.
Omphacinum.

Ung:

Rosac

horum tantum Emplastor
continuum afficit. V. S. a.
friculis humectantur
siccantur, exsiccatio
natum humiditatem
statuit. M. Consil. p. 502

Fol:
Dioscoria. Cichory.
Zactica.
Acetosa.
Endivia.

Fl:
Cydonium.

Lign: Santalum.

Sacchari Rosatum.

Diarrhoid. Abbat.
Diaciton.

Rosaceum. Vng.
Ceratū Santalin:

XXI.
Splenica Calida.

SIMPLICIA.

Rad:

Polypoty.
Gentiana.
Filiis.

Rad:

Apif.
Aristolochia longa.
Calami Aromatici.
Enula Campana.
Jecor Florentina.

Cort:

Radic: Cappasim.
Cinnamomi.
Medulla Fraxini.
— — Tamarisci.

Fol:

Chamaedryos.
Chamaepytios.
Cotoneach.
Chascita.
Centaurij minoris.
Fumaria.
Summitat: Lupuli.
Melissa.
Pylaggy.
Thymi.

Sem:

Anisi.
Apif.
Agni casti.
Cardui bened:

Nasturtij.

Fl:

Calendula.
Croci.
Genista.
Tamarisci.

Fz:

Cappas.

Gum:

Ammoniacum.
Bocellium.
Myrrha.

Mimz:

Chalybs preparat.

COMPOSITA.

Aq:

Cardui bened:
Cinnamomi.
Feniculi.
Fumaria.
Melissa.

Syz:

de Fumaria.
Oxytel Scyllitichy.
de v radicibus.
— Epithymo.

Cons:

Rad: Accori.
Cort: Citri.
Genista.
Flor: Tamarisci.

Conf:

Sambuci.

Amgyl: Amara.

Fel:

Asinib.
Rutha.
Calamintha.
Petroselin.
Vitruon.
Nasturtij.
Cochlearia.

Prasf.
Ginitre.

Sem:

Feniculi.

Alkiz

Alkermes.

Elect:

de Gemmis.

Leticians Galeni.

Troch:

de Cappariibus.

- Eupatorio.

Externa.Ol:

de Cappariibus.

Tamariſci.

Jasinum.

Rutaceum.

Ung:

de Artſemisia.

- Althaea.

Empl:

de Muccilaginis.

- Meliloto.

Diachylum cum Gummi.

XXII.
Splenica Frigida.

eade ſeu a Bilem alien:

Similia.Rad:

Acetosa.

Asparagi.

Byglossi.

Boraginis.

Cichori.

Graminis.

Liquiritia.

Oxylapatzi.

Fol:

Acetosa.

Boraginis.

Byglossi.

Cichori.

Capilliz: Veneris.

Dentis Leonis.

Endivia.

Fumaria.

Simmonit: Capuli.

Scariola.

Sem:

in frigida majora.

Acetosa.

Endivia.

Hordei.

Fr:

Poma udolentia.

Pruna acida.

Fl:

Boraginis.

Byglossi.

Cichori.

Nymphææ.

Violarum.

Stc:

Limonum.

Omphacium.

COMPOSITA.Aq:

Acetosa.

Borag:

Boraginis.

Byglossi.

Cichorij.

Endivia.

Graminis.

Hordei.

Nymphææ.

Syr:

Acetosa.

Capill: Veneris.

Cichorij simpl:

du Limonibus.

— *Pomus redolent:*

— *Succo Acetoso.*

violaceus.

Cons:

Fol: Acetosa.

Rad: & Fl: Byglossi.

Fl: Boraginis.

Capill: Veneris.

Cichorij.

Lactuca condita.

Nymphææ.

Violaceum.

Elect:

Diamargarit: frig:

Diabura Santali.

Diarrhæos Abbatis.

XXIII.

*Nephritica medica-
menta.*

*Ad Renum affectus
multa scilicet usurpatis*

*medicamenta, quia sc.
vel Urinas movent, vel
Renum ardorem continen-
tiant, vel lapidem im-
minuunt, vel artenulas
dilatant; & sunt tria
ordinis recensenda.
Urinas moventia (calida
frigida)
proprijs capitibus separ-
tiantur proposita.*

*Urina & Renum ar-
dorem temperantia &
lenientia. sc.*

Nephritica frigida.

SIMPPLICIA.

Rad:

Althææ.

Liquiritiæ.

Fol:

Cichorij.

Endivia. Parietaria.

Lactuca.

Malva.

Scariola.

Portulaca.

Sem:

W Frigida majora.

Althææ. Cydonior.

Malva.

Lactuca. Portulaca.

Hordei.

Papaveris albi.

Psylli.

Fr:

Amyg.

Ad Remedium Calorem.

300

Sile: Postillacae cum Sileo liquirit: rhus humectant.
Emulsiō Succi $\overline{w}$ fz: major:

Sile: ex Papav: albo cum Sileo et Syr: Violar:

Remis non multum expandi vassellās.

Clysters ex solo dicto Veronica cum Succario et
butyro.

304

Amygdala dulcis.

Jujuba. Fraga.

Passula.

Pruna dulcis.

Fl:

Nymphaea.

Violazum.

~~Nempharis.~~Gum:

Tragacanthum.

Anim:

Butyrum.

Lac.

COMPOSITA.Aq:

Lactuca.

Portulaca.

Nymphaea.

Syr:

Jujubarum.

de Liquiritia.

Violazum.

Cons:

Violazum.

Nymphaea.

Lactuca condita.

Elect:

Diatrachanth: frig:

Externa.Ol:

Violazum.

Rosazum.

Nempharis.

Ung:

Rosaceum.

Refrigerans Galeni.

XXIV.

Nephthica calida.

SIMPLICIA:Rad:

Apj.

Eringj.

Feniculi.

Petroselin.

Fol:

Nasturtj.

Parietaria.

Sem:

Apj.

Ciceris ruber.

Seselsos.

ErUCA.

Petroselin.

Vertica.

Fz:

Bacca Jujubar.

— — Lauri.

Passula. Amygdala.

Nuclei Pinii.

Fl:

Genista.

Rad: CapparisFol:

Capit: F.

Vatica.

Ruta.

Botanica.

Ligustici.

Sem:

Feniculi.

Dauci.

Mily Selis.

Fl:

Chamamelli.

Sol:Actium.
Succus Melensis.
Limonum.
Ribum.

Actinidia.

Schoenantbus.

Gum.

Terebintina.

Mintz:

Carabe.

COMPOSITA.

Aq:

Apq.

Fanickli.

Syz:

Byzantinis.

de v Radicibus.

Cons:

Fl: Genista.

XXV.

Lithontriptica.

SIMPPLICIA.

Rad:

Ononidis.

Lappa majoris.

Saxifraga.

Viola arvensis.

Liq:

Nephriticum.

Cost:

Fabazum siccardis.

Radic: Cacti.

Fol:

Argentina.

Calcitrapa.

Saxifraga.

Oxithim marini.

Fragaria.

Sem:

Milij Solis.

Raphani.

Vertica.

Fz:

Nuclei cerasorum.

— Persicorum.

officula mespilorum.

Bacca Juniperi.

Gum:

Terebintina.

Anim:

Canceri fluvialis.

Mille pedis.

Scorpionum cinis.

Sanguis Hirci Pharae.

Oculi Cancrosum.

Lap:

Indaionis.

Lincis.

Nephriticis. #

Crystallinus.

COMPOSITA.

Aq:

Saxifraga.

Calcitrapa.

de Saxib.

Hiera terrestris.

Betonica.

Parietaria.

Sem:

Marra silvestris.

Althaea.

Ciceris.

Petroselinaceae.

Fz: Primula;

malva: Amemur;

— Persicorum;

officula mespilorum;

Bacca Juniperi.

Gum:

Terebintina.

Amagala amara.

Althaea.

Rex Moschata.

;

Lap: Cancrosum.

*# de capis admirabilis facili
tactibus. q. Part: de gom. et
lapid: n. 10.*

Lignum Nephriticum.

Lignum Nephriticum.

Lignum Nephriticum.

Lignum Nephriticum.

Lignum Nephriticum.

Lignum Nephriticum.

Lignum Nephriticum.

Lignum Nephriticum.

Lignum Nephriticum.

Lignum Nephriticum.

*Rad: v aperientis.
Raphani.*

Cinnamonum

Syz.

de Raphano Fernel.

Oxymul simplex.

— — Scyllitichs.

Nephricat hant: Jonbek.

Syz:

de Raphano Fernel:

Nephrocathart: Jonbek.

Elect:

Litbotripticon.

Detergentia eadem sunt,

q̄ diuretica & calculos

expellentia.

Efficacissima sunt haec

Terebinthina.

Pariotaria.

Raphanus.

Apium.

Cicera rubra.

Hysterica Medicam:

q̄ utrum respiciunt

eum corroborando vel

conceptionem promovet,

vel partus & secundum

naturam exclusionem

juvant, vel menstruas

purgationes educunt,

vel nimium eandem

fluxum inhibent, vel

demum utrum ab eis

coementorum collucto

repugant: q̄ ora sigillatim

latim proponunt.

XXV.

Conceptum juvenia.

Simplicia.Rad:

Bistorta.

Cyperi.

Galanga.

Spica Nardi.

Calami Aromatici.

Fol:

Botonica.

Majorana.

Salvia.

Rosae maritimi.

Fr:

Cariophylli.

Macis.

Nux muscata.

Fl:

Anthos.

Salvia.

Botonica.

Gum:

Mastix.

Thus.

Styrax.

Benjaminum.

Anim:

Moschus.

Zibeta.

Miner:

Ambazum.

Corallus.

Succinum.

COMPOSITA.Aq.Uterum Capae:

Artemisia.

Matricaria.

Dactylum.

Phlegium.

Calamentum.

Thymus.

Melissa.

Satureia.

p

Abanambeli.

Syz: de Althaea Fern:

Aq:

Betonica.
Salvia.
Majorana.

Cons:

Anthos.
Myzobalani cond:
Nux moschata cond:
Radix Satyrionis cond:
Fl: Salvia.

Conf:

Mithridatium.
Theziaca.

Elect:

Aromatic: Rosath.
Diambre.
Diamoschum.
ad Gemmis.
Diagalanga.

Troch:

Gallia moschata.
Alipta moschata.

Externa.Ol:

Nardinum.
Myrtinum.

xxxvii.

Partim & eductia.
Secundinas

Qua menses movent,
illa satum & secundinas
educunt, Fecunditas

autem hac.

Dictamnus Creticus.
Artemisia.
Fl: Aristolochia amara.
Crocus.
Aqua Cinnamomi.
Confectio Alkermes.
Borax officinar. ad J.
Sabina.
Opoponax.
Sagapenum.
Myrrha.
Castoreum.
Asa fatida.

Posteriora hac duo tantum
secundinis conveniunt,
quia gravi odore satum
educant.

xxxviii.

Menses moventia.

Similia.Rad:

Aristolochia utriusq.
Cyperi.

Gentiana.
Valeriana.
Juncos Florentinae.

Cort:

Cinnamomi.

Fol:

Abrotani.
Artemisia.
Calamentum.
Dictamnus Creticus.

Myrra

ad Faciem movent.

Galbanum.
Ammoniacum.
Colocythis.
Ruta.
Cucumis silvestris.
Fel vaccinum.
Sulphur.
Vagina Aseni sufficit.

Feniculi.
Gethselini.
Ribia tructa.

Alindium.
Betonica.
Spica.
Asarum.
Chamaejas.
Chamaepitys.

Mafozana.
 mercurialis.
 Mateicaria.
 Nepetba.
 Origani.
 Pylegij.
 Prastij.
 Ritha.
 Salvia.

Sem:

Anisi. Petroselin.
 Carui.
 Dauci.
 Faniculi.
 Ritha.
 Seselios.

Fl:

Crocus. Chamand.

Gum:

Asa fetida.
 Sagapenum.
 Myrrha.
 Opoponax.
 Galbanum.

Anim:

Castoreum.

Mindr:

Borax officinalis.

Composita.

Aqda.

Artemisia.
 Cinnamomi.

Syr:

de Hysopo

de Artemisia.

Cons: & Elect:

petenda ex Diyseticis.

Troch:

de Myrrha.

Externa.

Ol: & Ung:

expetenda ab Emollien-
 tibus, q in secunda parte
 tradentur.

XXXIX.

Menses sistencia.

SIMPLICIA.

Rad:

Bistorta.
 Tormentilla.
 Symphyti.

Fol:

Centinodij.
 Lentisci.

Myrti.

Mentha.

Portulaca.

Plantaginis.

Summitat: Rubi.

Sem:

Acetosa.

Plantaginis.

Fr:

Myrtilli.

Fl:

Bacca Juniperi.
 Lactei.

anara & leptomyrta sicut
 illa adstricti sunt et debent.
 de Centaurea; munda.
 Phlegmum.

Fl:

Balanisteriorum.
Rosarum rubrarum.

Gum:

Mastiche.
Sanguis Draconis.

Animi:

Cornei Cervi ustis.
Ebur.
Spodium.
Coagulum Hædi.
— et Leporis.

Minez:

Corallus.
Bolis Armena.
Terra sigillata.

COMPOSITA.Aq:

Mentha.
Nymphaea.
Plantaginis.
Portulacæ.
Rosarum.

Syz:

Myrtinus.
de mentha.
Cydoniorum.
Rosarum siccar:

Cons:

Rosarum.
Cydonia condita.

Conf:Conf:

Philonium Rom:
Diacodium.

Troch:

De Spodio.
— Terra sigill.

Externa.Ol:

Myrtinum.
Cydoniorum.
Rosaceum.

Ung:

Comitisia.

Empl:

De Mastiche.
Contra rupturam.

Uterum Expurgant.
eadem q mensis mor-
ventio. et præcipue

Berionia.
Aristolochia utraq.

Gentiana.
Mercurialis.

Artemisia.
Matericaria.
Marrubium.

Chamaedris.
etc.

xxx.
Lac generantia.

Simplicia.

Fol:

Faniculi viridis.

Sem:

Faniculi viridis.

Anethi viridis.

Apj.

Brassica ~~detum~~

Lap:

Crystallinus pulvis.

Anim:

Butyrum cum

lacte & Faniculo assu-
mptum.

xxxxi.

Lac minuentia.

Simplicia.

Fol:

Calamentha.

Chelidony majoris.

Mentha.

Ocymi.

Sem:

Coriandri.

Gum:

Camphora.

Suc:

Acetum.
Omphacium.

Composit:

Syr:

Oxymel simplex.

xxxxii.

Semen generantia.

Simplicia.

Sem:

Eruca. Fraxini.

Napa. Lini.

Piptz.

Synapi.

Vertica.

Fr:

Nuclei Pini.

Pistachia.

Avellana.

Nux Indica.

Anim

Stynebis.

Cerebell: Passeris.

Testiculi Gallor:

Composit:

Elect:

Diasatyrion spiritus
excitat veneris.

Bulbi.
Cicer.
Satyrion.
Eruca.
Allium.

Lap
Rugy.
Napo.

Sem Asparagus.
Zingiber viride.
Galanga.
Lapa saliva.

Apium.
Sugentium.
Potentilla.
Polygala.

Hordei pilisana.

Portulaca.
Asila.
Salvia.
Agnus castus.
Sempiternum.
Cucurbita.
Hyoscyamus.

XXXIII.
Semen Extinguentia

Semen. a. extinguunt
aut valde refrigerantia
aut valde discutientia
qualia sunt.

Lactuca.
Portulaca.
Camphora.
Mentha.

Semen Agni Casti.

Cannabis — Anethi.
Lactuca. — Rutba.

XXXIV.
Flatūs discutientia.

Simplex.

Rad:

Acori.
Galanga.
Erula Campana.
Spica Nardi.
Zedoaria.

Cort:

Cinnamomi.

Fol:

Calamenthi.
Lauri.
Majorana.
Peigani.
Rutba.
Pylegy.

Aurantior:
Nacis.

Flo:
Chamomill:
meliloti.

Thym.

Sem:

Anisi. # Lini.
Cassii. Agni casti.
Amos. Lapiu.
Cumini.
Dauci. Petroselin.
Feniculi.
Piperis.

Fr:

Bacca Lauri.
Gaiophylli.

Anim:

Castoreum. &

reliqua ferè tam sim-
plicia quam composita
quæ pituitam attenuant.

Diaphanicon in
Cystis huius discutit
flatūs.

XXXV.
Adestringentia.

Simplex.

Rad:

Bistorta.
Tormentilla.
Symphyti.
Pentaphylli.

Cort:

Myrobalarum.

Fol:

Byss.

Sem: Anisi. Si. casti
communiter: egrogia
infantibus a visceri
bilis & pituita liberat.
Necnon: A. pax. in fl.

Galbanum.
Pix sicca.
Styrax.
Sulphur.
Sagapenum.

Abalab: testum.

Cort:
Granator:
Balis.

INCRASSANTIA. *an* ASTRINGENTIA. 320

Tortilaca, Bolus, Popaver, Acetosa.
Oxya. Lentis, Mala Cydonia, Pyra agrestis.
Amylum. fac Chalybeatum. Succus Gennator.

386

Equiseti.
Bellidii minoris.
Sanguinaria.
Thapsi Barbat.

Sem:
Acetosa.
Rosarum.

Byrsa Pastoris.
Centinodia.
Plantaginis.
Summitat. Rubi.

Sem:
Portulaca.
Plantaginis.
Myrtilli.

Fl:
Rosarum rubrar.
Balanstia.

Fz:
Cydonia.
Mespila.
Sorba.
Pyra agrestia.

Gum:
Mastiche.
Sanguis Draconis.

Ter:
Bolus Armena.
Terra Sigill.

Minez:
Corallus. Margar.
Spodium.
COMPOSITA.

Aq:
Rosarum.
Plantaginis.
Portulaca.
Centinodia.

Mentha.
Nymphaea.

Syz:
Cydoniorum.
Rosarum siccar.
de mentha.
— Myrtbo.

Cons:
Rosarum.
Cydoniorum.

Troch:
de Spodio.
— Terra Sigill.
— Polo.

xxxvi.
Lumbricos Encantia

Simplicia.

Rad:
Graminis.

Fol:
Abrotani. Acetosa.
Absinthij Romani.
Centaurij minoris.
Fumaria.
Hypocrici. Persici.
Mentha. Ruta.
Portulaca.
Scordij.

Sem:

Syz:
Granatorum.
Myrtillorum.

Troch: de Carab.
summae laudat. d. 38. a.

hic inter simplicia, sive
fzis huiusmodi applicant.

Rad:
Gentiana.
Filicis.
Helenij.

Corallina.
Nasturtium.

Dentis Leonis.

Minez:
Alumen. Ferrum.
Lapis Hamatilis.
Sticks Hypocistidis.
Impatiens. sive Agrestis.
Aeneas.

Alz:

Haimagoga nulla est probat. per 291. ^{46a} 3.20.
neq; illos: nris ee pr, mti letalis. 290.

Nola // modum dignoscendi dosin medic. compositi.
64 Seni inst: 1134.

usq ad Hepatis Cavum } 1.^a mitioribus }
 Minores existentes in Regione } 11.^a mediocribus } purgandi
 usq ad venterum } 111.^a validioribus }
 Per: 203. R. 20. d.

Macropedij difficulter admodum ferunt, fortiora sibi stimulantia Ca-
 thartica, cum ex se facili in Alvi profluvium incidunt. Observatio

Nota // quod Venter in Officinis de-
 la. Cauda a Cauda
 Punctos, quorum No. m
 alium subiacent
 si forte nigro colore albidum.

1.^a Test. usq ad Hepatis convexa, } Ecoproticis, sibi minoratis.
 sibi usq ad venter inclusivo }

PURGANTIA MEDICAMENTA.

Ut facile innotescat, non solum quæ
humorum vacient singula Cathar-
tica, sed etiam quæ dosi exhiberi
debeant: hic cuiusque propriam dosin
proponemus, quæ ita accipienda est,
ut sola et seorsim usurpetur. Alioq[ue]
si multa simul premisceantur, cuiusque
quantitas erit proportione minuenda.

Notandum hic omnium Cathar-
ticorum dosin præscribi, quatenus
in Substantia premisceantur aut
usurpentur. Nam Infusa vel Decita
maiori Dosi præscribuntur, hac t[er]cio
proportione: ut Vehementiora duplâ
quantitate exhibentur in Infusione,
quàm in Substantia; in Decocto v.
triplâ: Mitiora v. et mediocria
triplâ t[er]cio in infusione, et quadruplâ
in Decocto. Sed a regula
excipiuntur Rhubarbarum et My-
robalani, quia magis purgant in
Infusione quàm in Substantia, pro-
pter aditericoriam vim, quæ in Infu-
sione perditur.

CHOLAGOGA.

Mitiora.

Cassia. — ab ℥j. ad ℥jß. — etiam ad ℥ij. Herbar. II. præx. 22.
Manna. ^{vel assuta.} — ab ℥j. ad ℥ij.
Succus Rosarum. ab ℥jß. ad ℥ij.

Tama.

Sacchar. Viol.
Syr. Rosar. solut.
— Violat.

Sorbinthina, 3j, ad 3m.

prodest potiori, renibus, & Vesicae laceratis,

v. & Sen: inst: 479.

Urinae acrimoniā curat. Sili: 1142.

copi: de stranguria, v. & Bf. p: 240.

Tibis viscer: & Venar: obstructionsq;

soluendis aptissima. R. 25, c.

modo pellucida sit, & non adullerata

Lemm:

Laugore de Constry: Gal: p: 139.

Ungues de Catarrhe. p: 178.

In vino albo & conseruat
offic: p: 178. 240.

Tamarindi. — ab ʒij ad ʒiij.

Mediocria.

Aloë. — a ʒj. ad ʒij.

corrigits mastiche & Tragacath.

Rhabarbarum — a ʒij ad ʒiij.

tam in substantia ʒ Infusione.

corrigits Spica Nardi, & Cinnamon

Myrobalani Citrini, a ʒij ad ʒiij.

magis adstringunt, ʒ purgant.

Vis adstrictoria eorum minuit.

Infusione & lactione eorum

Ulio Amygdalar: dulci:

Vehementiora.

Scammonium — a gr: viij ad gr: xv.

corrigits Succo Cydoniorum, &

Coractis Diagordien appellab.

COMPOSITA.

Syrupi.

Rosatns Solutng. — ʒab ʒij ad ʒiij.

de Cicheto, comp: cum Rheo

— alb. ʒij ad ʒiij.

Opia.

Catholiceum. —

Diaprunum simplex } ab ʒj. ad ʒiij.

Diacassia. —

Electuar:

de Succo Rosarum. ab ʒij ad ʒij.

Opia

Spica Nardi Stan
maior ingrat.

In substantia altera ʒij non
ascendunt, in infusione
altera ʒij. tunc dicit
minuuntur procedunt
se fortiter & primatis, sim
levis tantum fiat expellit
ad ʒij ʒij procedunt
in vino cum spica & Cinn
Myrobali: in substantia ʒij ad ʒij
in infus: a ʒij ad ʒiij.
in sero lactis cum passulis
at R. 12. in substantia ʒij
dant, in infusione ʒij
in lactione ad ʒij.
biben popo asperit.

Plum: p. 295 de Compositis nullum asp^{te}
ing^t, q^d p^riam Bitem edicere possit.

Tamarindi hirsutius in Jaro lacti, ut
 cum tholis in tenebris. Cerevisia addita
 sunt, & in foveis. & Synthesis
 cabibon, nec Agrostoides. C. 92.

42a

Medicamentum

Abalarbani — Sobanant. — al. (Spica Nard)
 Scamoriij — Succus Cydon. (Cinnam)
 Agarici — Zinziber.
 Senae — S. Anisi.

Opiata fortioris.

Diapneumum solutio: } ab ℥β. ad ℥j.
 Theophrasta Persica. }

Pitt:

Aurora. — — } a 3j. ad ℥ij.
 Sine quibus. — — }
 de Rhubarbaro. — — }

sed raro hinc Pilulis vacuatis.

PHLEGMAGOGA.SIMPLICA.Mitiora.

Chartamūs. — — ab ℥β. ad ℥j.
 corrigits Aniso vel Cinnamonom.

Mediocria.

Agaricus — — a 3j. ad 3ij.
 corrigits Linxibere & Sale Gema.

Agaricus in { subit: 3ij. ad 3ij.
 { infus: 3ij. ad ℥β.
 { coct: ℥β.
℥. 13.

Vehementiora.

Turbitz. — — } a 3ij. ad ℥ij.
 Hermodactylus. }
 corrigits Linxibere.

Turbitz in { subit: 3β. ad 3ij.
 { infus: 3ij. ad 3ij. 1/2
 { coction: 3ij.
℥. 13. Sim. iust. 130

Colocynthidis non exhibetur nisi cora-
 ta & preparata in Terebinte,
 q̄i Albandel appellants. — —

— — — a. gr. viij. ad gr. xv. vel ad stannum 3j. ℥. 13. 1/2

COMPOSITA.Opiata & Electuaria.

Cathol.

Agaricus n̄ trochiscatus,
 aquas dūcit, trochiscatus
 plurimum viscidum. ℥. 13. 1/2

Catholicum.
 Diaphanum.
 Hierza picea.
 Elect. Diacarthami.
 — ad Citra solutiva

a 3vj ad ℥j.

Pitt.

De Agarico.
 Sino quibus.
 Stomachica.

ad 3ij.

Coccia majoris.
 — — minoris.
 Fartida majoris.
 Laccis majoris.
 Asbeticis.
 ad Hermodactylis.

a 3ij. ad 3j.

Trochisci.

Agaricus Trochiscatj. a 3j. ad 3ij.

MELANAGOGA.

Senna. — — a 3jβ. ad 3ij. — aut etiam 3ij. Decoq
 Polypodium. — — a 3ij. ad ℥β. quātū ad ℥j. h. u.
 Epithymon. — — cocta a ℥j.
 Helleborus Niger. a gr. xv. ad 3β.
 praestat infundere
 vel decoquere a 3j. ad 3ij.

Nota. Praestantissimum esse Remedium
 pro Melancholicis.

℥. vini albi ℥. i. Helleb. nigr. recent. 3ij.
 infundens q. triduum. utendo decoctus
 cum Sauch. q. s. si Symplicis.

Dosis

℥. 3ij.

442

1. The first part of the book is a history of the
2. The second part is a description of the
3. The third part is a description of the
4. The fourth part is a description of the
5. The fifth part is a description of the
6. The sixth part is a description of the
7. The seventh part is a description of the
8. The eighth part is a description of the
9. The ninth part is a description of the
10. The tenth part is a description of the

1716

Amsterdam in de warmste Straat in de winter dood, tot
reukst. Hb. ~~reperit~~ reperit quidam Radix, dicta
off. 2^a ff. Rad: Gelab, cuius si exhibita in pulvere,
cum vel sine Vino Pituitum & Aquas purgat.
Cedoni familiaru
sem hanc radicem
habent, sed vna
vis Hb. 3, aut 4. fl.
Optime. a. vna supplet ipsi defectum Methuacae hic t^o casu exopt.

Dosis est ℥i. vel ℥i℥.

COMPOSITA.

Operata. & Confectionis.

Catholicum. — } a ℥vj. ad ℥x.
 Diaferna. — }
 Confectio Hamich. a ℥ij. ad ℥vj.

HYDRAGOGA.

SIMPICIA.

Mitiora.

Ebuli Semen. — ad ℥j.
 --- Cortex mediana. — ad ℥ij.
 Succus ejusdem — ab. ℥j. ad ℥x.
 Sambucus idz praestat, sed in
 firmius.

Mediocria.

Meboacam — a ℥j. ad ℥ij.
 non coq̃s, sed infunditz in vino
 albo: & liquor simul cum pulve
 exhibetz.

Talapa — idz ac Meboacam.

Rebementia.

Soldonella pulv. — a ℥j. ad ℥ij.
 Radix Jidis pulv. — a ℥j. ad ℥ij.
 Succus Jidis. — ab. ℥j. ad ℥ij.
 Elaterium — a. gr. viij. ad ℥ij.
 Esula — a gr. viij. ad ℥ij.

Simil

EXTERNA.

Ung: de Aethanila majis Hypogastrio
 u imunctum. Q. 340.

Ol: Aloinum cum ebulo, sulphure
 uizorata guttula u. castor.

Ung: e Satyridis. Formely. Q. 32.

[Apo, quidem si Hypogastrium
 Laetio vero si Stomachus.]

Omnia Tella illita ventrem solvunt
L. de morb. inf. p. 16.

Epomphalion. Q. 31.

Agaricus Simpl: Hydragogum
 trachysentz Phlegmogogum
 est. L. 46. a.

Timelca . . . } a gr: v. ad 3℔.
 Chamæwa . . . }

COMPOSITA.

Diatribitis — — est pulvis pū-
 gans. datiz ad 3j.
 Diacarbannum — a 3vj. ad 8j.

Pitt.

de Sagapeno — — ad 3℔.

VOMITORIA.

vide Sennart: insti
 p: 306.

Purgioa.

Aqua tepida.
 Aqua Hordei tepida.
 Infusula pinguis tepida.
 Butyrum.

Aqua cum bacillo Mellis
 & Salis.
 Pitona cum Mellis.

Ficus recentes conculcat: & Aqua tepida
 supra superbibita.

Pulv: Rad: Setonice siccate: 3j. ad 3℔.
 cum Hydromeli exhibitā hinc efficit
 viscidus ac pituitosus crassior hinc
 res. Dod: herbi 50. 51.

* Oleum Simplex, cum aqua.
 † Oxymel Simplex, cum aqua tepida.
 Semen Atropidis.
 Flores Acetosæ.
 — Geniste.
 Succus Acetosus.

x ab Oleo abstinentiam
 ait Forst: II. Obs. 10. 13.
 qd multierum vidisse ait,
 q postea relaxata nihil
 taedio nihil actinebat.

† Fern: V. M. 13. 33. et
 Oxymel vomitum citat
 nigat, et p. Actum ab
 stringat, multaq; ma-
 gis imparet †: A.

qua oia magno bacillo exhibitanda.

Mediocria.

Radix Asari — a 3j. ad 3℔.
 & in decocto — ad 3℔.
 Radix Peponis.

-Asarum, P. castoreo probat
 Ferncl: V. M. 13. et
 p. m. Electuar: Diaphn.

EXTRAUSEA.

Ung: de Asbanita maphs. Frumacho illa
 Uhm 9. 340.
 Ung: de Satbyride. id. 32.

Raph.

Raphani succus. - - ad 3^{ij}.
 Sem: Raphani. - a 3^{ij}. ad 8^{ss}.
 in decoctione.

Agaricus. - - -
 Sem: Vatica. - - -
 Juglandis cortex nuc. } ad 3^j.
 Flores seu Glandes ejusd.

Veherentia.

Vitriolum album, solutum, filtra-
 tratum, & coagulatum.

- - - a 3^{ss}. ad 2^{ij}.

Antimonium preparatum.
 ejus dosis varia secundum
 varios preparandi modos.

Compositorum omnium vis coltura
 manifest. Fern. V. m. 13.

ERRHINA.

Quomodo Errhina a ster-
 unitate differt, etc.
 Item aliquot Errhina ex-
 lectura et rectificatione
 habet, Fern: p. 344.

Sunt inq. Errhina minus
 cum vitriolo, & ster-
 unitate, & aqua majori
 ut etiam quod posteriori
 seculi partibus vel pau-
 ces exstant, valde in-
 cussa assulentia.

Radices.

Jacos. Gentiana. Ciceris: aqua
 Cyclaminis. marzubini.
 Chelidon: Origani.

Folia.

Betula. Rulba.
 Anagallidis. Asarica.
 Majorana. Nigella.
 Salvia. Phlegij
 Bettonica.
 Hedera.

Succi.

Rad: & Folior: praedictorum.
 Elatezinum.

Nicotiana decocta & expressa egregia

Ster:

STERNUTATORIA.

Aethiops max: p. 127.

Radices.

Zingiberis.

Pyrethri.

Ictos Florentina.

Hellebori albi.

Folia.

Betonica.

Majorana.

Salvia.

alij p miscenda tanq Correctiva.

Siper albam.

Casiophylli.

Pharmica.

Gummi

Euphorbium.

Animalia.

Castoreum.

nulla etiam ex Erbina,
modo subtiliter contrita,
ut p colatorum ad eas
bonum penetrant.COROLLARIUM.Quemadmodum Erbina & Sternu-
tatoria sunt Cerebri vacuantia:Ita & Beccica pectus peculiariter
expurgant, quae tamen hic non re-
censentur, quia omnis eorum Materia
desumitur ex Thoracicis infra de-
scribendis.

Pern: p. 348.

OPHTHALMICA.

Ad varios oculorum affectus varia
usurpantur Remedia, quae aut vi-
sum acutunt, aut dolorem sedant,
aut fluxionem inhibent, aut super-
fluam humiditatem exsiccant, aut
materiam impactam digerunt & detergunt.

Oxydo

48a

A. D. E. S.		
Calcfacientia.		Refrigerantia.
Scor. Cyparissia	Asp. pont.	Rosa. Malva.
Ruta.	Laurus.	Vibisc.
Costus.	Nigella.	Laubha.
Castoreum.	Cepi.	Nympha.
Amygdala	Amara	
Elleborus albus in melle		Luc. milia
Mojchus cum lana tibia:		

Apoplegmatizonta.

Mastix.	Myrsopis.
Uvae ursae.	Origanum.
Castoreum.	Majorana.
Pyrethrum.	Thymus.
Cibeba.	
Cort: Rad: Cappaz:	
Zingiber.	
Nigella.	
Piper album.	
nigrum.	
Sinapi.	
Thalictr.	
Staphis. agraria.	

Optibalmica

Chelidonium.
Feniculum.
Euphorasia.
Rota.
Verbena.
Majosana.
Beronica.
Hieracium.

Aq: mustelana.

OXYDERICA.

sen vsum acuentia.

Radices.

Feniculi.

Chelidonia.

Raphani.

Folia.

Chelidonia.

Verbena.

Ruta.

Euphrasia.

Feniculi.

Semina.

Feniculi.

Raphani.

Semini majoris.

ANODYNA.

Lac muliebr.

Albumen ovi agitatū & in
aquam ~~imbutum~~ conversum.

Aqua Rosarum.

~~— Macilago.~~~~— Cydonia.~~~~— Cydonia.~~

Cydonia.

Medulla panis macerata &
in lacte cocta, addito panico
Croco.

Poma dulcia cocta sub cineribz.

Pomorum putridorum pulpa.

Trochisci albi Rbasia cum Opio.

Repel.

Macilago Sen: Pylly.

— Cydonia: cum Aq: Ros: Extr:

REPELLENTIA.Aquæ.

- Aquæ Rosarum.
 — Plantaginis.
 — Portulacæ.

Succi.

- Succus Cydoniorum.
 — Pomorum acidorum.
 Albumen Ovi.

EXSICCANTIA.

- Cerussa lota.
 Tincthia lota.
 Antimonium lotum.
 Unguentum de Tincthia.
 Trochisci albi Rhasis sine Opio.

DIGERENTIA.

- Sarcocolla nutrita in Lacte.
 Crocus.
 Lac multiebur.
 Decctum Farnigraeci.
 Sanguis Columbe juniorum.
 De pennis majoribus in oculum
 expressus.

DETERGENTIA sine morfu.

- Saccharum cand.
 Syrupus Rosarum siccarum.
 Tinctia.
 Pompholyx.
 Plumbum ustum & lotum.
 Antimonium lotum.

betes

Aegilex seu
neogilex calva.

majorana.

Herba paralytica.

Betonica.

Stachys.

Chamaepitys.

Rosmarinus.

Salvia.

Fol: Lailai.

Lavendula.

Artemisia.

et plerumq Cephalica.

Castoreum.

Umbolci turrescens.

Xenosticta.
Terebrantina calida &
abacton- mimbis
microbi a. proporetaki
engst. —. Len: 17 1006
Sub: M. 39.

DE TERGENTIA cū morfu.

Fella Piscium, leniora.

-- Quadruped: media.

-- Avium, fortissima. et

-- Perdicis omnium validissimis

-- Gallinae v. mitissimum.

Succus Chelidonia.

-- Faniculi.

Aqua Mellis composita.

ARTHRITICA.

Humores in articulis ipsorum
medicamentis, ac in Cerebro, praeparantur: Quandoquidem eadem
nervorum et Cerebri est ratio.

Quidam tamen peculiariter ad
Articulorum dolores commendant.

Topica praesertim, quae ita distin-
guuntur, ut alia statim initio do-
loris compescant, et fluxionem
arceant: nec tamen humores in
partem inflammataam altius im-
pingant; alia dolorem citra in-
flammationem compescant. Alia
humorem impactum dolorem
deto digerant.

FLUXIONEM INHIBENTIA.

Folia.

Hyoscyami.

Cuscutae.

Mandragorae.

Solani.

Sem

Semper vivi.

Succi.

Hyo/cyami.

Solani.

Opy.

Lactuca.

Liquores.

Acetum.

Seminis Psylli.

Cydoneorum.

Gummi.

Caphura.

Aqua.

Plantaginis.

Rosarum.

Solani.

Olium.

Rosarum.

DOLORUM SEDANTIA.

Rad: Altheae.

Lac

Stercis } Vaccinum.

Oesypus.

Vitelli Ovorum.

Flores Camomillae.

— meliloti.

Croci.

Olorum Liliorum.

DIGERENTIA.Rad

526

Radices.

Enula Campanae.

Folia.

Verbasci.

Chamaepytis.

Urticae.

Ebuli.

Salviae.

Centaurii minoris.

Semina.

Urticae.

Nasturtii.

Gummi.

Opoponax.

Bdellium.

Ammoniacum.

Sagapenum.

Galbanum.

Euphorbium.

Animalia.

Castoreum.

Vituli vivi impositi.

Liquores.

Vinum.

Aqua vita.

Vitriolum.

Cera. - ad Lateribus.

Oleum de Lateribus.

Emplastera.

de mucilagine.

— meliloti.

Oxycratum.

Ext.

1.^a PARTIS. SECTIO secunda.

de Materia Medica Externa.

MATERIA MEDICA EXTERNA

simplex et composita constat

XVII Facultatibus.

1.	Refrigerantia.	Detergentia. --	10.
2.	Repellentia.	Sanguinē sistentia.	11.
3.	Emplastica.	Glutinantia. --	12.
4.	Anodyna. --	Sarcotica. --	13.
5.	Narcotica.	Epulotica. --	14.
6.	Emollientia.	Cathartica. --	15.
7.	Resolventia.	Vesicantia. --	16.
8.	Attrahentia.	Caustica. --	17.
9.	Suppurantia.	[quo et hinc] [Pulcrific: Absorbent:]	

1.
Refrigerantia.

SIMPLICIA.

Cort:

Rad: Solani.

-- Mandragora.

Fol:

Lactuca.

Hyoscyami.

Lentiscula aquatica.

Umbilici Veneris.

Illa refrigerant simplici.

Hae refrigerantis adstringunt.

Portulaca.

Plantaginis.

Polygoni.

Ligustri.

Sem:

Frigida { majora.
 { minora.

Hyoscyami.

Papaveris albi.

Psylli.

Fl:

Nymphae.

Rosarum.

Violarum.

Succ:

Aceti liquoris.

Granatorum.

Citri.

Lact



Lactuca.
 Lymonium.
 Ompbacy liquoris
 Opj.
 Plantaginis.
 Portulacæ.
 Semper vivi.
 Solani.

Animal:

Albumen oui.

COMPOSITA.

Aq:

Nymphaea.
 Solani.
 Polygoni.
 Plantaginis.
 Rosarum.

Ol:

Violarum.
 Hyoscyami.
 Mandragora.
 Nymphaea.
 Papaveris.
 Rosacearum.

Ung:

Ceratū Santalinū.
 Populeum.
 Refrigerans Galtnj
 Rosaceum.

II.

Repellentia & Adsteg.

IMPURICIA.

Rad:

Historta.
 Rapontici.
 Symplyti.
 Tormentilla.

Cort:

Granatorum.
 Jugland: virid:
 Mediani Sumach.

Fol:

Centinodia.
 Absinthij.
 Bursæ Pastoris.
 Cypressi.
 Ebuli.
 Equiseti.
 Mentha.
 Myrti.
 Olivastri.
 Plantaginis.
 Polygoni.
 Quercu.
 Verbasci.
 Vitis. &
 Capreoli ejusdem.

Sem:

Gran

Grana Tinctorum.
 Byrsa pastoris.
 Plantaginis.
 Portulacæ.
 Acini Uuarum.

Fl:

Balanstia.
 Rosarum rubræ:

Fr:

Cydonia.
 Gallæ immaturæ.
 Mespila.
 Myrtilli.
 Sorba.
 Nux Cypressi.

Succ:

Acaciæ.
 Hypocystis.
 Plantaginis.

Gum:

Arabicum.
 Sandaraca.
 Mastice.
 Sarcocolla.
 Sanguis Dracon:
 Thus.

Miner:

Bolis Armena.
 Alumen.
 Corallus.
 Terra Sigit.

COMPOSITA.

Aq:

Corticis Nucis.
 Ferrata.
 Plantaginis
 Rosarum.
 Solani.

Ol:

Rosarum.
 de Absinthio.
 Lentiscinis.
 Masticeinis.
 Myrtinum.
 Ombacinis.
 de mentha.

Ung:

Comitis Jac.

Empl:

Contra emphysem.
 de Cerebri panis.

III.
Emplastica.

Ex his alia simpliciter
 talia sunt, nec alia aliâ
 qualitate molesta, alia
 simul exsiccant, quodam
 simul adstringant, maxi-
 ma tamen pars omnes
 istas facultates simul h.

SIMPLICIA.

Faz:

Test:

Sem: Farnigandi.

Mucilag: omnes.
 Pincos: nuclei aqua mac-
 crant.

Testici.
Fabazum.

Succ.

Amyli.

Gum: Arabicum.

Mastiche.

Sang: Draconis.

Minc:

Lapis Calaminans.

Lapis Hamatilis.

Lithargyrus.

Plumbum arduum.

Pompholyx.

Terra Sigill.

Alumen.

Bolus Armena.

Cadmia.

Cerusa.

Antimonium.

Corallus.

Gypsum.

Anim:

Mumia.

Albumen Ovi.

Ung: Composita.

Album Rostis.

Deficativ: rubus.

Diachalitides.

Diapompholyx.

dr Lithargyro.

IV.
Anodyna.

Simplicia.

Rad:

Althea.

Liliorum.

Malva.

Fol:

Althea.

Malva.

Branca uersina.

Sem:

Althea.

Famigraei.

Lini.

Faz:

Famigraei. Hordei.

Lini. Testici.

Fl:

Liliorum. Coen.

Camomilli. Sambuci.

Meliloti. Thapsi.

Composita.

Ol:

de vitellis ovorum.

Amygdal: dulce. & amari.

Anethinum.

Camomelinum.

Commune.

Imbricat.

Hyperici. pro nervis.

medicamentum calida, doloris
deficientia. Corra: dist. p. 40.

Herb.

Sambucus.

Chamaemelum.

Melilotis.

Anethinum.

medulla panis albi.

Butyrum recens.

Pinguedo gallina.

anferis.

Vitelli ovorum.

Anagala picea.

Lee Aspidium.

fl: dulce medicamentis.

Ad dolores Internos.

fl: Amygd. dulce. - 3iv ad 3vi

Semi: lini. 3iv ad 3vi

Anodyna egregia. ~.

ap: Kufner: de Morb: puer: p. 67.

Gum: Azabicum.
Sarcocolla.
Tengacatza.

Alipz accontivis.
Medulla.
Butyrum recens.
Cafis.
Cera.

inter Amylina praestantiss.
D. Monaldi de Plant. Ind. p. 917.

Trinam.

Ung:

Resumptivum.
de Albua.

V
Narcotica sem
dolorem sedantia.

Simplicia.

Rad:

Hyoſcyami.
Mandragora.

Fol:

Cicuta.
Hyoſcyami.
Mandragora.
Papaveris albi.

Sac:

Cicuta.
Opj.
Hyoſcyami.

Sem:

Hyoſcyami.
Papav: albi.

Composita.

Ol: violac:

Mandragora.
Hyoſcyami.
Papaveris albi.

VI.
Emollientia.

Simplicia.

Rad:

Albua.
Beironia.
Cucumeris agrestis.
Ebuli.
Malva.
Iridis.
Liliorum albor:

Fol:

Albua.
Atriplicis. Beta.
Brassica Vesina.
Ebuli. mercurialis.
Malva.
Parietaria, seu Perdicula.
Violaria.

Sem:

Albua.
Fenigræci.
Lin: Sesami.
Malva.

Fl:

Camomilla.
Liliorum.
Meliloti.

Fz:

Ficus pinguis.

Sic

Simpliciendo dolor quasi sopitus.
v. Gortzi dicit: p. 310. sensus
n. doloris tenuiter sopitus, &
sopitus.

Lac Mellebe.

Dest: Salicis.

Amyg: vir: in Oleo codicis.

& si quæ alia refrigerantis. // 84 //

Laudanum.

Herba emollientes.

58a

Malva.
Althaea.
Viola. — (al. Mercurialis. (al. Chamamelm.
Pavetta.
Branca hirsuta. (al. Acta. (al. Arctostaphylos

NARCOTICA ad STUPEFACIENTIA

INTERNA.

Materia Syr: Viol:
de Papav:
de Succo Lactuca.

Succi Lactuca.
Sempervivi.
Solatri.
Portulacae.
Cichor.

Cous: Violas:
Nymphaea.

Q si qua una Billem refriger: & incras:
// G. //

Quae sunt entia.

Philonis antidot: } His si nisi maxima ne-
Atbanasia. } cessitate Atbanasia, nec
Dialbanum. } continuo, sed ex intervallo
Diacodiam. } a 24 ad 31. cum
Mucosa. } Syr: Ros:

Philonis antidot: } His si nisi maxima ne-
Atbanasia. } cessitate Atbanasia, nec
Dialbanum. } continuo, sed ex intervallo
Diacodiam. } a 24 ad 31. cum
Mucosa. } Syr: Ros:

maxillam eque in articulo: Tibia. R. d. d.
 q. parat. ex veteri et corniculato capite cum fere, in
 quo nulla caro ad tabem coarctat.

Succ:

Ladanum.

Gum:

Ammoniacum.

Bdellium.

Galbanum.

Opopanax.

Styracem liquidum.

Terebinthina.

Anim:

Adeps Salsus.

-- Gallinaceus.

-- Anserinus.

Butyrum recens.

Medulla Cervina.

-- Vitulina.

Desypus.

Composita.Ol:

Commune.

Camomulinum.

Catulorum.

Lini. Liliorum.

Jasminum.

Limbricozum.

Violaceum.

Ung:

de Althaea.

Resumptivum.

Empl:

Geronticum.

Fil: Zaozaria.

Diachylum magnus.

de Meliloto.

-- Mucilagin:

Oxycozum.

de Ramis.

VII.

Resolventia. & Allen:

Simplex.Rad:

Helony.

Jeros.

Aristolochia.

Dauci.

Enula Campana.

Galanga.

Fol:

Absinthij.

Calamentij.

Hysopi.

Majorana.

Origani.

Roris marini.

Ruthe.

Salvia.

Pulegij.

Satureia.

Scm:

Anethi.

Anisi.

Cymini.

boia

Pex.
Resina.
Cera.
Oleum simplex.

- Adeps vitulinus.
Hadrinus.
Sebum Vercanum.
Medulla fere omnis.

Danci.
Fenugraci.
Feniculi.
Nigella.
Lini. Lupini.

Fr:

Baccæ Juniperi.
— — Lauri.

Piper.

Fl:

Anethi.
Camomillæ.
Hyssopti.
Lavendulæ.
Oculiloti.
Stachados.

Composita.

Ol:

de Spica.
Scorpionum.
Terebintino.
Quilpinum.
Amygdalar: amara:
Anethinum.
De Cappazibus.
Hyperici.
Nardinum.
Rutaceum.

Ung:

Aquippæ.
Arragon.

martiatum.

Empl:

de Baccis Lauris.
— Sulphuris.
Diachyli iccati.

VIII.

Attrahentia.

Rad: Simplicia.

Aristolochia utriusq.
Anacardiac.
Cyclaminis.
Hellebori.
Hermadaetyli.
Iris.
Pyretrei.
Thlaspi.

Fol:

Vitica.
Anagallidis.
Calamentæ.
Hadra.
Saponaria.
Nasturtij Agrestis.

Sem:

Nasturtij.
Synapi.
Thlaspi.
Vitica.

Fr:

Colocynthidis.

Antimoni.
Draconculi.
Gentiana.
Ranunculi.
Narcissi.
Asiudinis.
Ari.
Thapsia.

Flammula.
Lepidium.
Ranunculus.

Sic

Allium.
Cepa.
Fermentum.

Galbanum.
Pix sicca.
Styrax.
Sulphur.
Sagapenum.

Succi.

Elaterium.

Gum:

Ammoniacum.

Euphorbium.

Pix secca.

Resin:

Castoreum.

Fimus Colubæ.

-- Gallinæ.

-- Anserinæ.

Stercus Capris horii.

Miner:

Sulphur. Compos:

Ol:

Ricinum.

Synapium.

Empl:

de Meliloto.

-- Sulphuris.

Oxyacanthum.

de Baccis Lauri

IX.

Suppurantia.SIMPLICIA.Rad:

Althæa.

Liliorum.

Capa cocta.

Fol:

Althæa.

Branca Vesina.

Malva.

Oxalidis.

Plantaginis.

Sem:

Althæa. Tritici.

Lini.

Famigraci.

Fl:

Camomilla.

Meliloti.

Gum:

Ammoniacum.

Bdellium.

Pix liquida.

Resina.

Cerebintina.

Far:

Famigraci.

Lini.

Tritici.

Medulla Panis recentis

ad huc calētis troscita

Anim:

Adeps Suillus.

-- Gallinacens.

-- Anserinus.

-- Vitulinus.

Butyrum.

Medulla Cervina.

-- Vitulina

Oesiphis

Styrax liquidus.

Carica pinguis.

Ita ducta est et pinguis.
in quibus calor est moderatus.

Oestipus.
Vitellus Ovi.

CONDOSITA.

Ol: Commilino. Dulce.
Hydroceleum.
Irinum.
Liliorum.

Mucilag:

Althea.
Famigraei.
Lini.

Ung:

Agrippa.
Basilicum.
de Althea.
Resumptivum.

Empl:

Diachylum magnum.
de Muciclagin:

X
Detergentia & Ex-
purgantia abscessus
& Ulcera.

SIMPLICIA.

Rad:

Apj.
Aristolochie.
Gentiana.
Ireos.
Sigilli Salomonis.
Samaris.

Cost: Capparium.

Fol:

Absinthij. Abscessi.
Agrimony.
Anagallidis.
Centaurij minoris.
Marubij.
Plantaginis.

Sem:

Apj. Vatica.
Plantaginis.

Suc:

Folior: pradiator:
Saccharum rubrum.

Liq:

Lixivium omne.
Urina.
Vinum.

Faz:

Fabarium.
Hordei.
Famigraei.
Lini.

Lupinorum.

Orovi.

Gum:

Aloes.
Mirba.
Terebinthina.
Thus.

Minez:

Ardgo.
Salpetra.
Vitriolum.

Scoloptride:
Scylla.

Apj.
Hyslopi.
Nasturtij.
Agromonia.
Beta.
Chamaedrys.
Tanacetum.

Fi:

Amigdala amara.
Hordeum.

—Siccus Linum.

Fistula.

Anim:

Fel.
Mel.
Serum lactis.

Nitrum.

Conio

Tuchisei de Solo armena.
et de terra sigillata in
internis et externis sumpti
et ad motu proficiunt.

Tberiaci sola, parantur
incuruat, cientesat, tony
moligua et benigna silena
tutiusq; ea utitur R. 4
Ol: R. a chymi ad silena
interna. Emulcato.

R. 40, e.

COMPOSITA.

Syr:

Nel rosatum.

Ol:

Sambucinum.

Tartari.

de Mirzba.

Ovorum.

Ung:

Apostolorum.

Egyptiacum.

Alicum.

Empl:

de Botonica.

Divinum.

Gratia Dei.

Hæmastatica.

Xi.

Sanguinem sistencia.

Simplex.

Rad:

Pentaptylli.

Symphyti.

Fol.

Urtica.

Ebuli.

Pimpinella.

Vinca peruviana.

Plantaginis.

Equiseti.

Fz:

Galla immatura.

Fl:

Balanstia.

Suc:

Acacia.

Hypocystis.

Liq:

Acetum.

Omphacium.

Gum:

Mastiche.

Mirzba.

Sang: draconis.

Thls.

Anim:

Mumia.

Albumen Ovi.

Miner:

Bolus Armen:

Alumen.

Corallus.

Jasps.

Lapis Hamatites.

Terra Sigill:

Vitriolum.

Idipsum Testant Emplau
stra omnia, et ad hunc
sensum etiam referunt
Cautica medicamenta.
qua usurpant solent, ubi
hac non sufficiunt ad
desperatas hamorrhagias
compescendas.

Pulv:

Pulv: et Empl:
 haemastatic:
 (P. B. II. 00.)

Pulvis ad sistend:
 Sangu:

2 Bols Asmōn:
 Sangu: Dracon:
 Aloes.
 Terebinthina. An. q.s.
 Li. Pulvis.

XII.
 Glutinantia.

Simplicia.

Rad:

Pentapbylli.
 Symphyti.
 Tormentilla.

Fol:

Azroglosfi. x. Plan. //
 Betonica. taginis.
 Bugula.
 Cynoglossi.
 Hyperici.
 Millefolij.
 Pilsella.
 Primella.
 Sanicula.
 Scabiosa. salicis.
 Verbena. ulmi.

Gum:

Aloe.
 Mirba.
 Pix.
 Sarcocolla.
 Sangu: Draconis.

Terebinthina.
 Thūs.

Anim:

Lumbrici.
 Mūmia.
 Pili Leporis minutis
 incisi. —

Miner:

Lithargyrus.
 Ol: Composit

Ol:

Mirba.
 Nicotiana.
 Balsamum.

Ung:

Aureum. v. 334.
 Desiccativ: rubr:

Empl:

Contra rupturā.
 Nigrum.
 Triapharmacum.

XIII.

Sarcotica seu defi-
 cientem carnem in
 vulnere aut in ulcere
 cavo prosequentia.

Simplicia.

Faz:

Fenugrati.
 Orobi.
 Lupinorum.
 Gum.

Aloe.

mir

Ol:

Aloinūm.

Sals:

Italūm.
 Sūphōr.
 Vāntrol.

SARCOTICA.

Bals.
Aloc.
Colophonia.
Masticia.
Resina pinea.
Lachryma abietis.
Farina hordei.
Ezri.
Aristolochia.
Cadmia.
Zris.

Ceraia.
Tutia.
Pompholyx.
Litargyreum.
Symplytum.
Hypericam.

Parchu hac, inqt. Senn. ar. p. 260.
vix aliqua inter Sarcotica sint,
sed q. ab idem numerant, ut sunt
agglutinantia, vel deturgenta, vel
matificantia sunt, ~~etiam~~
q. tunc si alioquin admixtione tenui
perent, etiam pro Sarcoticis adhi-
beri possunt.

leaf 01: } Hypothesis: Fern. W. M. B. 29.
Orig. }

Mercha.
Pix.
Sarcocolla.
Terebintina.
Thús.

Miner:

Cerúsa.
Plumbum ústüm.

COMPOSITA.

Ung:

Apostolorum.
Aureum.
Basilicon.
Diapompholigon.

Empl:

de Actonica.
Divinum.
de lancia.
Gratia Dei.

XIV.

Epulotica, sive Cicat-
ricem inducentia.

SIMPLICIA.

Cort:

Granatorum.
Plantaginis.

Fl:

Balaustia.
Rosarum.

Miner:

Alumina ústüm.
Es ústüm lotüm.

Bolus Armen:

Cadmia.

Antimonium.

Calx.

Cerúsa.

Antimon: ústüm.

Lapis Celaminari.

Plumbum ústüm.

Pompholix.

Schoria ferri.

Terra Sigill.

Vitriol: ústüm.

Squamina aris.

Ung: Compos.

Album Rhasis.

Diapompholigon.

Desiccat: rubrum.

Empl:

de Cerúsa.

Diapalma.

de Lapide Calaminari.

Paracelsi.

XV.

Cathartica, seu
supfluas carnis exedentia.

Aq:

Secundina.

miner:

Alumen ústüm.

Aurigo.

Es ústüm.

Flos Ferri.

Anti

Ung: de cerúsa.

de cerúsa compdorato.

de calce

— Ung. de J. Carp.

Ung: de Tutia. Id. 15.

Calx.
Chalcitis.Præcipitat:
Sublimat:Mis.
Sorz.Antimon. ustis.
Cinnabaris.
Mercurij præparatus.
Plumbum ustum.
Pumex crematus.
Sal torrefactus.
Squamma Aris.Vitriolus ustus, ^{in calx} cinabari.

Ol:

Vitriolum. Sulph:

Ung:

Egyptiacum.
Apostolorum.
Desiccativ: rubrum.XVI.
Vesicantia.

Rad:

Pyretrea.

Thlaspiæ.

Sem:

Staphis agria.

Synapi.

Piperis.

Gum:

Euphorbium.

Anim:

Cantharides.

Finnis Columbinæ.

Empl:

Vesicatorium.

XVII.

Caustica.

Miner:

FIXIS

Es ustum. Aris fls.
Antimonium. Vitriol.
Calx viva.
Mercurij sublimatus.
Cansticum vulgare.
— — Chyrurgic.Septica. seu Pu
terfacientia.

Anceipigmentum.

Arsenicum.

Sandaraca Græcor.

Grisocella. q. raro uo

Serpanda, nec nisi post
crebram lotionem ex succo
Portulacæ, Solani, Scamperi
vivi, Cinnamon

Absorbentia.

Miner:

Sal. Nitrum.

Sulphur. Alumin.

Calx elota.

Cin:

Farcimentorum.

Ficulnæ.

Ilicis. Brassicæ.

Liq:

Lixivia e dict: Ciner.

— — ex Calce.

Acetum. Mucia.

Ol:

Castorei.

Euphorbiæ.

Philosophorum.

Petroleum.

PRIMÆ partis.

Cinis facem Vini.
Ficulnæ.

Fennici.

Sabinæ.

— Finnis Columbinæ.

Helleboris albus.

Thapsin. Sinapi.

Deacineulus.

Hydrophipr. Scyllæ.

Staphis agria.

Dryopteris.

Pityocamp.

Aconitum.

Lapis septicus, seu Can-

sticum potentiss. V. 3.

n. & semit: Just.

adtingunt. n. in aqua labe

q. n. facile emendat: proli-

lavio ab his seipius in, ab

prope membra in parietes pro-

cipis.

Flammula.
Ranunculis.

Fermentum.

Isobarotica media
inter Vesicantia & Caustica. // 232. //

PARS SECUNDA.
de Compositione Medicam:

Composita Medicamenta triplicia
sunt, Interna, media, & Externa.

Interna quæ sunt, intra corpus su-
muntur. Talia sunt.

[Apozemata, Potiones, Julepi,
Syrupi, Emulsiones, Boli,
Opiata, Tabellæ, Pulveres,
Trochisci, Pillulæ, &c.

Media, quæ neq[ue] intra corpus su-
muntur, neq[ue] Corporis superficiem ad-
moventur; sed in certas Corporis
capacitates immittuntur. Quæ sunt.

[Suppositoria, Clysteres, Injectiones,
Pesjalia, Erzina, Masticatoria,
Collyria, &c.

Externa, quæ partibus exterioribus
admoventur, Cujusmodi sunt.

[Epithemata, Fomenta, Balmia,
Olea, Unguenta, Emplastræ,
Cataplasmata, Sacculi, &c.

Idco hujus partis secunda tres erunt
sectiones.

Prima interiorum } medicamentorum: com-
Secunda mediorum } ponendi regulas
Tertia exteriorum } proponit.

11.^a PARTIS SECTIO prima.
de Compositione Medicam: Intern:

CAP: 1.

De APOZEMATE ALTERANTE.

Apozema lat: Decoctum, vñ
tribus Proprietatib: qualescunq: purgationibus potio.
N. Apoema est decoctio Medicamentorum
Saccaro vel melle condita, clarificata,
aromatizata, pro iv aut v dosibus
vñter facta ad humorem conco-
ctionem seu praeparationem, et in-
terdum ad tractationem
ergo ab effectu duplex etc.

N. In Alterante tu diligenter observ.
Compositio, Utrudi modis,
Utilitas.

1. In Compositione vi perquirenda

1. Ma, ex qua vis &
facultas medicatrix
elicenda: seu ex qua
componunt Apo: sunt

Radices,	hoc qd ordinat dosi ut in textu.
Cortices,	
Ligna,	
Folia,	
Semina,	
Fructus,	
Floris,	
Aromata,	de qd p: hq:

Apoema est forma Medicamenti
multorum simplicium decoctione con-
flata, Saccaro vel Melle dulcorata,
in tres, quatuor, aut quinque doses ad
alterandum vel purgandum comparata.
Ideo duplex esse solet. Alterans
sc. & Purgans.

Apoema alterans componitur ex
Radicibus, Corticibus, Lignis, Folijs,
Seminibus, Fructibus, & Floribus.
Quorum omnium quantitas talis esse de.

Radicum. — — ab ℥ij. ad ℥vj. raro ad viii.

Corticum. — — ab ℥j. ad ℥ij.

Lignorum. — — ab ℥j. ad ℥ij.

Foliorum & Herbarum. — a m. v. ad m. viii.

Seminum. — — ab ℥j. ad ℥ij.

Fructuum. — — ab ℥j. ad ℥ij.

Florum. — — a p. iij. ad p. vi.

Interdum numero mensu-
ratis, ad paria xii. vel xvi.

Majoris vero fr. tñ numero me-
suratis, eoque pari: ut ficus,
ad paria vi. vel vii.

Maximi vero numero impari,
ut poma.

Florum — — a p. iij. ad p. vi.

Interdum numero mensu-
ratis, ad paria xii. vel xvi.

Majoris vero fr. tñ numero me-
suratis, eoque pari: ut ficus,
ad paria vi. vel vii.

Maximi vero numero impari,
ut poma.

Florum — — a p. iij. ad p. vi.

Interdum numero mensu-
ratis, ad paria xii. vel xvi.

Majoris vero fr. tñ numero me-
suratis, eoque pari: ut ficus,
ad paria vi. vel vii.

Maximi vero numero impari,
ut poma.

Florum — — a p. iij. ad p. vi.

Interdum numero mensu-
ratis, ad paria xii. vel xvi.

Majoris vero fr. tñ numero me-
suratis, eoque pari: ut ficus,
ad paria vi. vel vii.

Maximi vero numero impari,
ut poma.

11.^a Liquor, in quo Consid.
Qualitas

Hac omnia decoquunt in liquore idoneo,
qua vulgo est Aqua fontis; vel inter-
dum etiam Aqua Hordei in affectibus

Aliquando ad fructus similes, et ad Bilios.
melancholicos ex sero lactis sit decoctio. No.

floris n nisi macerati
debeat

+ addita etiam sibi sibi
nem interdum Acetis
parte octava, si est
refrigeratione extenu-
quos et purgatio
petitur. No.

The first of these is the fact that the
 of the system is not a simple one, but
 a complex one, involving the interaction
 of many factors. The second is the fact
 that the system is not a simple one, but
 a complex one, involving the interaction
 of many factors. The third is the fact
 that the system is not a simple one, but
 a complex one, involving the interaction
 of many factors. The fourth is the fact
 that the system is not a simple one, but
 a complex one, involving the interaction
 of many factors. The fifth is the fact
 that the system is not a simple one, but
 a complex one, involving the interaction
 of many factors. The sixth is the fact
 that the system is not a simple one, but
 a complex one, involving the interaction
 of many factors. The seventh is the fact
 that the system is not a simple one, but
 a complex one, involving the interaction
 of many factors. The eighth is the fact
 that the system is not a simple one, but
 a complex one, involving the interaction
 of many factors. The ninth is the fact
 that the system is not a simple one, but
 a complex one, involving the interaction
 of many factors. The tenth is the fact
 that the system is not a simple one, but
 a complex one, involving the interaction
 of many factors.

† IV.^o Dissolvenda in Calatūra facta cui considerantur rationes

Qualitatis ratione dissolvuntur vel

Syrupi tantum, & tunc semper, quod loco idonei.

Saccharum astatō solūm, & ad calidos morbos ac naturas.

Syrupi & Saccharum simul.

Mel Symplicium tantum & ad frigidos morbos ac naturas

Medicamentosi Succi (vel per decoctionem & clarificationem, vel per residentiam depurati).

quod vel

Herbarum variarum pro varietate indicationis

sic passim ad Morbos Melancholicos Succi.

Rorag: Fumar: aut Capilli depurati dissolvit.

Fructuum Ferri acidorum, idque maxime ad calidos & biliosos affectus, ut: Citiorum, Limon: Granator: etc. Exomadmōdum & passim ad Melancholicos Succi Toros: addit.

Liquores ut

Acetum, ad calidos & biliosos affectus non modico ceteris temperandos, ad obstructions etiam pariter solvendas, ubi attendendum: ac incidendum.

Vinum, cuius precipua vis Symplicium ad crassos lentosque humores, ad obstructions, ad morbos frigidos ac diuturnos, qui sine febre fatigant: ad quod quovis Symplice vel Medicatedo liquoris praestantissimum est. Cum enim a. Vinum nunc familiare ac in cunctis sit, suas vires per omnia secula insimulans prompto in abutissimas partes diffundit, citiusque optime Medicinae ubique.

Quantitas //
deca in textu

tenue

Biliosis; vel Hydromel in Pituitosis.
Nonnunquam etiam in Obstructionibus
fit decoctio in aequalibus partibus Aquae
Fontis et Vini albi sub finem additi,
vel duabus partibus Aq. Fontis et
una Vini albi, pro arbitrio medici.

Quantitas

Liquoris quantitas non definitur,
sed hac praescribitur formula. V. G.
si. decoctio in Aq. Fontis q. s.

Decocti tamen colati quantitas de-
terminari solet, sc. ad lbj pro tribus
dosibus; ad quart. v. pro quatuor do-
sibus; ad lbjss, pro quinque; a. hac
formula, de Colatura cape, lbjss.

Postea dissolvuntur Symplicia ea quan-
titate, ut pro unaquaque dosi Apoze-
matis sit. ℞ Symplicia: hac formula,
In qua Colatura dissolvit Symplicia,
(V. G. Capitellor. ♀ Violarum) an ℥ij.

Interdum solum Saccharum praescri-
bitur eadem dosi, praecipue quando
succo aliqui dissolvunt, qui Apozema
reddunt efficacius: raro nitrum Symplicia addit.

Illi autem succi utilissimi praescri-
buntur in Apozemate ad ℥ij. Hac
formula, In Colatura dissolvit Succorum
depuratorum (V. G. Doraginis, Aethusa)
an ℥j. Sacchari albi ℥ij. Ut pluri-
mum vero sacchari quantitas non defini-
tur, sed praescribitur Sacch. alb. q. s.

His praescriptis Apozema condiri
solet aliquo Aromate, quo jucundius
evadat. Frequentissima tamen, et
magis grata Aromata sunt, Santalini
Citri

et crassis humoribus attenuandis
aut lentis detergendis, aut uterque
infarctibus expediendis.

b. ad frigidos humores et inde natos obstru-
tiones Aq. Chalybeata eximie occurrunt,
ex Aq. et Vini aq. p. ℞. raro ex
Vino solo, quod prompte acetat aut
vaporescat, rarius ex Aq. stillat: q.
vis ejus exoleat.

Mate ℥. (ingr. ℞) statuit quam Aquam
simplicem imm. elicitur: quoniam
eum esse maam: Neq. enim sit cum
frigidis frigida, ita cum calidis calida
neq. si seorsum diutius coquitis (ut ille dicit)
calescit, sed frigida semper tametsi nunq.
perstet.

a. Dosis ℥ non excedat, aliqui
autem solum facio coarctum, aut
solum contrarium, ita ut
sint ℥. pro qualibet dosi ℥ij, vel ℥ijss.

℥ aut aliquando ℥ijss Symplicia.

Interdum Symplicia et Saccharum,
V. G. Symplicia ℥ij, Sacchari q. s.
vel ℥ij aut ℥ijss.

f. ℥ij, vel ℥ijss.

Clarificatio postea imperatur, ut
visi fiant jucundiora, et diu-
tius asseruant, nec putrescant
facile. ℞.

iii. Decoctio ipsa
vel Decoctum.

iv. Dissolvenda
in ipso decocto.

v. Clarificatio.

vi. Aromatizatio.

Aromatizantur (ingr. ℞) cum Apozema fit pur-
gativum: Aromata enim odore jucunditate non
modo oblectant, sed et corroborant, et corporis spiritibus rebus utitur efficiunt
animi quoque exhalant.

Santalis Citrinis semper fit adu-
matizatio, Si in partium infla-
matione in crassissimam trahatur Hepar.

2. *Uſus*, ſeu *Utendi ratio* eſt, ut deſt
pro. *v* aut *v* doſibus, manu
jejuno ſtomacho. NO.
interdum manu et veſperi.
3. *Utilitas*. v. *Morſ*: p. . . .

Citrinum, & Elect: Diatrien Sano
tatum in Apozemate refrigerant.
Cinnamomum vero in calefaciente.
Et horum Aromatum basis est Ziss, vel
Zij. Hac formula. fi. Apozema
clarificatum, & Aromatizatum Zij
Cinnamomi electi, pro quatuor dosibz
matutinis.

CAP: 12.

de APOZEMATE PURGANTE.

*Apozema purgans est, quod huius
moris noxios non solum preparat, sed
etiam eademque opera evacuat, purgan-
tibus medicamentis cum alterantibus
commixtis.*

Hodie usitatisimum est hoc Apo-
 xematum genus, & solum fere in usus
 vocatur; Illud enim, quod sim-
 pliciter attestat, Iulepi non usitatis-
 imum usum habere solet.

Quadruplex. a. esse solet, pro qua
druplex Catarticonum differentia,
Cholagogum, sc. Pilemagogum, Me-
lanagogum, & Hydragogum.

Componitur eadem alterantium
Materia eademque forma; ac præterea
Cathartica adduntur, cum suis cor-
rectivis, et inter Fructus, et Flores
collocantur ea proportionē, ut totides
sint Catharticozū doses, quot Apo-
ematis.

Utitatissimum autem in omni Apop
lexmate Sennam pro Basi prescribit
feri ad ℥ij. Cui adduntur Polypodi
um & Semen Carthami eadem quan
titate

Monspeliý (ubi Medicina maximum accipit incrementum) solent prescribi, NO.

fol: Semina Orient: mundat:
Polypody Pteridii recentis,
Medulla Sem: Castanemi mediocr: contus.
⑤ ㄹ, ㄹ, ㄹ, ㄹ, pro basi.

In- Aromatizatione³ i³idem
no. respicienda sunt
Qualitas x ad Saporem generat
limitat vel
Aroma simplex, et
Santala
in caridis affe-
Cinnamonum
in frig: affectu
Aroma compositum
pulvis electuar: a
Diatrios Santala
in cal: affectu
Aromat: Rosat: a
Diambra

Quantitas, sic
[pro tti. dexti // 8i]
[pro toto dexto // 34, vlt]
ad summam.

In ^o Apozemati purganti faciendo IV ac
curvat perpendiculari: Materia ex qua fit
Catharticum; Dissolvenda in colatura,
Usus; Utilitas. NO.

1. Materia purgantis Apoxematis sunt
Cathartica simplicia vel decoda
vel infusa una cum maa Alk^{is}
zantis Apoxematis.

Nonnulli Purgantia simplicia coquendo
dissolvent, eo quod eorum vis purgans
aut si discretionem in vapores transeat,
aut obtundatur: ac primum eorum deorsum
difficilliter simulachrum observari possit.
Deinde decoctis attriti Rhabarbarum
aut aliud purgans in decocto infundi
possunt, eo quod vis purgatrix
propter decocti visciditatem tractatam
ac propterea E. G. Rhabarb. si purgans
sit indicocto, eorum in Aq. Liebigii, aut
alia stillatitia infunduntur: Sin color
raro seorsum sit, in decocto attriti
nisi? Wicquand.

In Māā purgantis Apozematis III^a Consideranda

I. Qualitas, cuius ratione alia Cathartica sunt

Coquenda una cum suis correctoribus

Sem: Carthami.	—	Anis: Cinnamom:
Turbitib.	—	Zinz: Cinnamom:
Hermoadactyli.	—	Zinz: Cinnam:
Fol: Senna ^o .	—	Anis: Fœnic: Cinnam: Cariophyl:
Polypod: Phere:	—	Anis: Zinz: Cinnam:
Epithymis.	—	Paspitaz, violat ^o .
Ram: Elleb: nigri.	—	Anis: Cinnam: Cardiacā varia.
Sem: Ebali.	—	Cinnam:
Fol: Esula ^o .	—	Aceto maceranda.
Myrobalani.	—	Oleo Amygd: dulc: confusata ^o .

Infundenda

Rhabarbarum.	—	Cinnam: Spica Nard ⁱ .
Agaricus.	—	Zinzib: Sal Gemma ^o .
Tamarindi.	—	Cinnam: Macis.
sic & mine Paris:		
Cassia.	—	Anis: Cinnam:

II. Quantitas

III. Ordo Prescribendi. p. seq:

II. Quantitas sed Dosis hae sunt est.

12

[Summa, 1] in 77 Aphorismis pro Dosi praescribuntur, majori
Polyphorum Dosi si mitiora sunt cum 35 praescribantur,
Cassidomus minor autem si calidiora, pro humore autem
ac quantitate, sexis, aetatis, regionis moderetur.

Nonnulli a. sibi Medicina maximam incrementum accipit.

2. Soli stomachus, Polyphorus, S. Cassidomus: 35 35, ad 77 pro huius.

his scribitur insuper adiacentibus sequentia.

—Cassidomus recentis 35 ad 35.

—Tamarindus recentis 35.

—Rhabarbarus electus 35, ad 35.

—Agavei albi et foetidis in uelleo ligati 35, ad 35.

—Ficulis gummati et electis 35 ad 35.

—Epithymum 35, ad 35.

—Radicis Hellebori nigri (caligando in melancholicis) 35, ad 35.

—Ebulae (aliquae in hydropicis, pituitosis, Melancholicis) 35.

—Elaeum (aliquae in hydropicis) aceto maceratur 35 ad 35.

Ceterum Calabarica haec omnia sunt Dosi deservientia exhiberi possunt, sed
ab illis soli et animoso, atque illi ad animi relaxationem autem velum mentis
educendos capiuntur. (Exemplis sunt Elaeum, Elaia, et Soma: Ebula, quibus
vero uelae insuper adduntur utrumque quoniam periculis uelae necessitas capiti
deservit, ut alijs esset vana) proinde et corporis et animi et sexus
habita ratione Dosi eorum immutari possunt. Quoniam uelae et pro his
moris moderandi speciem hae uelae illa postea designant: manifestis tunc
sunt, ut dicimus pro huius Summa, Polyphorus, S. Cassidomus,
Cassidomus huius Dosis (in testis) in intermissione 35 ad 35.

Pro praescribendi cunctis, ut perant et decaquandis
praegnotata post factis ante fluxus: excepto Polyphoro,
quod ut saepe initio decipit, sic et initio uelae post factis
praescribi possunt.
Corymbia ubi in ordine fluxum statim post sua Calabarica
praescribantur.

titate, vel saltem ad ℥j. utriusq[ue].
Deinde alia præscribuntur Cathartica
pro humore peccantis ratione, quoniam
rursum alia decoquuntur, ut Turbith,
Hecmodactyli, Epithymis, Hellebori
niger, Sem: Ebali. Alia vero in-
funduntur, ut Rhubarbarum, Agaricus,
Tamarindus: Notandi tamen Tamarindos a nullis etiam coqui: sicuti et Agaricum
ac Rhubarbarum aliquando, quoniam
hæmorrhoides panno ligata esse debent: Præstat
a. Rhubarbi non coqueri sed solum infundere
nam tenuis quæ portio purgandi quæ aris
coctionis perit et exolvitur. NO.

Illa, quæ non decoquuntur, sed tantum
infunduntur, hac formula præscribi so-
lent. (Rhabarbari .V.G.) seressim in-
fusi ℥ß.

Quæ vero decoquuntur, simplicitate an-
nunciantur.

Desium vero computatio ita fieri
debet, ut unica Senna dosis in deco-
ctione sit ℥j. Turbith, Agarici et
Hecmodactyli ℥ß. Rhubarbari in-
fusi ℥ß. Polypodii v. Sem: Car-
thami et Epithymi nulla habetur ratio,
quia sunt exigua virtutis.

Sic quando Apozema componimus
in iv. dosibus possumus præscribere Senna
℥ij. Turbith et Agarici an ℥j. Ita
enim erunt iv. doses purgantium, sc.
duæ Sennæ, una Turbith et una Agarici.
Quorum loco alia substituere possumus,
prout indicatio exigit, eadem semper me-
thodo observata.

Correctiva statim post omnium pur-
gantium enumerationem præscribuntur;
quæ ut plurimum sunt Zinziber et Caci-
oplylli, utriusq[ue] ℥j; ita ut sint Correctivorum in universum ℥ij ad ℥ß.

In decocto colato ydem propemodum
dissolvuntur Symplici, qui in alteratib[us]
Apozematibus præscripti fuerunt. In-
terdum vero, quando Apozema suffici-
enter

ac Rhubarbarum aliquando, quoniam
hæmorrhoides panno ligata esse debent: Præstat
a. Rhubarbi non coqueri sed solum infundere
nam tenuis quæ portio purgandi quæ aris
coctionis perit et exolvitur. NO.

℥ß.

q. quandoq[ue] etiam Cinnamon: Anisum;
passula, etc.

quod soli si Apozema satis purgans videatur.

2. Dissolvenda in
colatura.

.c. Interdum Syzūporum pūg-
gandū & alterantiū &
℥ij, vel iij.

enter pūrgans non estimatur, Syzūpi
pūrgantes dissolvuntur; & frequentis
simus Syzūpis Rosatis solutivus;
aliquando Syr: de Cichorea compositus
cum Rho, in affectibus Biliosis; &
Syr: de Fumaria compositus cum Rho,
in affectibus melancholicis. c. d.

Nonnunquam & Veris tempore
dissolvitur Succus Rosar: pallidar: vel
infusio eazundem completa ad ℥ij,
in affectibus Biliosis, & tunc nulli
prescribunt Syzūpi: Sed Saccari, p. s.

In usu autem omnium Apozematū
hoc observandū, ut initio humores
in prima regione contenti Mucamento
Cathartico vacuentur, & in fine illi
omnes humores reliqua expurgent:
Quod sapientissime fit ipso Apozemate,
si prima & ultima illius dosi vali-
dus pūrgans efficiatur, dissolvendo in
illa Opata vel Electuaria pūrgantis
℥ij. plus minus pro dispositione a-
gredientis, Syzūpi pūrgantis ℥j.

Hæc formula, In primā & ultimā
dosi dissolvē Electuaria (Ciacartham)
℥ij. Syzūpi (Rosati solutivi) ℥j. Miste
Fi. potio cap: cum regimine, seu custodia tū horis ante

Aliquando minorans medicamen-
tum prescribitur ante Apozema, &
tunc in ultima tantum dosi pū-
gantia illa dissolvuntur.

Nonnunquam & in affectibus Ca-
pitis & partium a ventriculo valde
remotarum pōt prescribunt post

Apoze

a. ad ℥ij pro
aut v dosibus.

d. Interdum Electuaria

Mollia qdā, ut
Diapruni solati: pro Biliosis
Diapbasiūm pro Pituita
Diasenna pro Melancholia
Catholici: pro omnibus

Solida vero ut
Electi: de Sac: Ros: pro
Biliosis
Diacartham: pro Pituita
Electi: de Citro solutivi
pro Melancholia & Pituita

atq; hæc quidem in ult-
dosi usus tū dissolvuntur
ad ℥ij, vel ℥ij. d.

3. Usus ergo idem, qui Apozematū
alterantiū, pro iv dosibus
matutinis, nisi q addatur

f. vixissime trahens
exopolixor Grati

Apozema, & tunc nihil dissolvit
in ultimâ dosi.

CAP: III.

de POTIONE PURGANTE.

^{1. & 2.} Potus

Potio^{1. & 2.} est medicamenti forma li-
quida, in unicam dosin præscribenda,
ex aquarum rerum decoctione, infu-
sione, aut dissolutione in tunc liquore
re composita: ad humores quosvis expurgandos aut etiam alterandos:

Quare & 10. Potiones dividit
in Purgantes & Alterantes. —
Eaq[ue] multiplex est, secundum varias
indicationes, in quibus usurpatur, sc.
Purgans, Corroborans, Somnium con-
cilians, Limbricos enecans, Menses
promovens, etc.

Potio purgans multis modis parari
solet, & in ea tria considerantur.

I. Decoctio. II. Infusio. III. Dissolutio.

Decoctio magis usitate præscribitur ex
Sennâ ad ℥ss. vel ℥vj. Sem: Anisi ℥j.
ad correctionem Sennâ: Vel Sem: Anisi
& Caryophyllor: an ℥ss. Herbarum af-
fectui propriarum ℥ss, vel m.ij.

Liquirit: rasa & Pastulac: mund: an ℥ij.
Chae duo fere in oib. potionib. Prescribunt, præ-
terea in nonnullis melleis, q[ui]a dulcedine ab-
horrent. Florum appropriator: P.j. vel ℥j.
& fit Decoctio ad ℥ij.

Vel sumitur Decoctum commune
Medicina purgans: quod in Officinis ha-
beri solet.

Interdum & in affectibus Pectoris
præscribitur Decoctum commune Pecu-
toral

DECOCTIO.

INFUSIO.

Qua infunduntur, vel trita, vel pulvisio
rata, vel aliquando integra macerantur
ad usum coctivum per D , aut O .
aliquando. a. eadem medicamenta nodulo
inclusa ante infusionis in felleo incipit.

Pectorali purgans eadem methodo.

Infusio fit ex Rhubarbaro in affe-
fectibus biliosis; Agarico in pituitosis
vel utroque, in mixtis. Et eorum quantitas
est a ʒj . ad ʒij . Addito correctivo
Spica Nardi, vel Cinnamomo, vel
Santalo Citrino a ʒj . ad ʒij .
Spica Nardi Rhubarbaro correctivum,
Cinnamomum utriusque est, sed in affe-
ctibus minus calidis. Santalum
Citrinum in Febris vehementissimis.

Liquor. a. in quo solet fieri Infusio
est Aqua Stillatitia affectui propria,
vel est Decoctum purgans praedictum.

DISSOLUTIO.

In Dissolutione praescribuntur Com-
posita purgantia, Optata, vel Electuaria
quae deest, pro maiori vel minori quan-
titate purgantium, quae in Decoctione
vel Infusione praescripta fuerint, ut
Syrupus aliquis purgans, v. G. Rosae
Solativus frequentissimus; Interdum
Syr: de Cicchoro composit: cum Rhoe,
vel de Fumaria composit: qui minus
purgant, quam praedictis.

Syrupus. a. quantitas perpetua e ʒj .
Nominatam vero in affectibus Pul-
monum Decocta dissolvit ab ʒij . ad ʒij .
et tunc Syrupi quantitas minuitur ad ʒij .

His variis modis Potiones Catharticae
componuntur: vel tribus hisce prepa-
rationibus, vel duabus tantum, vel una.

Si enim fiat Decoctio Magistralis,
cum infusione in eadem Decoctio-
ne, ita praescribitur.

Potio purgans *iv* considerata habet, quorum

1.^a Liquor ex quo fiunt potiones (pro dissolvendis alijs Medicamentis) tunc ratio
Qualitatis ratione vel est

Decoctum

Alterans *i*. ex varjs Plantarum partibus (diatribis aut tribulis),
tum humorum vacuandum, tum sedem affectam respicientibz,
unde Catharticum efficacius reddit, idqz *iv* Apozematis
dosi, sicuti enim Apozema pro *iv*, ita Potio pro *i*. dosi est.
vel *ii*.^o Decoctum totius Medicinæ. vel *iii*.^o Decoctum florum
et Fructuum Cordialium, quod & Decoctum Pectoralem
vocant. (in affectibus Thoracis.) vel *iv*.^o Infusulum pulli
alteratum foli Endivias, Acetosæ, Borag: Ryglosæ. (in
morbis biliosis, & febribz artuantibus.)

Purgans constat vel *i*.^o Deco aliquo jam dicto alteranti cum
Senna ad $\frac{z}{3}$ ad $\frac{z}{2}$ & correct: Aniso, Garioph: ad $\frac{z}{3}$.
vel *ii*.^o Senna cum correct: (dosi jam dictæ) cum floribus
cordialibus in Aq: cor, vel ut quidam in Aq: Stillat:
decoctis. vel *iii*.^o ex sola Senna cum Aniso in Aqua
fontana, aut stillatitia decoctis.

Infusio purgantium, quæ licet ex omnibz cathartics parari possint,
hodie tamen plurimum fit ex solo Rhabarbaro a $\frac{z}{3}$ ad
& ipsius correct: Cinnamon ad $\frac{ss}$ vel ex Agarico eadem dosi,
vel potius Rhabarbaro & Agarico simul, dimidiata utriusqz dosi,
in liquoris idonei q.s. passim .a. Aq: Still: Endivias, Cicborij,
aut alterius Herbae sedi affectæ, aut morbi accommodatæ semitur.

Decoctum cum Infusione simul, quod omnium frequentissimum,
Sicqz simili de colatura decocti alterantis aut purgantis q.s.
pro dosi, *i*.^o a $\frac{z}{3}$ vel *ii*.^o in quo infundit Rhabarbarum
dicto modo. etc.

Liquor alijs interdum in magna festinatione, ut Aqua Stillatitia
quædam, Hydromel, et sumunt. ad quibus, p. 76.

Quantitas est $\frac{z}{4}$ aut $\frac{z}{3}$ pro pueris, & mollioribus, aut $\frac{z}{2}$ passim alijs.

Dissolvenda // p. seq: //

Usus, ad unicam dosin Prescribitur sumend: mand cum custodia, lvi pcedenti capta.

Utilitas.

Dissolvenda in potione purgante considerantur vel ratione

Qualitatis ratione ea quae dissolvuntur, ~~et sunt~~

Purgantia & quidem vel

[Simplicia, ut Castia, Manna. // aliquando etiam Rhabarb. $\mathfrak{zj}$, $\mathfrak{zjss}$
in alvi fluxibus, P. Mechoacan ad vacuandos pituitosos humores.]

[Composita, ut]

molliā, cum Opیاتو, ut	Diapodemum solutivum
[Electuaria]	[Diapodemum solutivum pro Biliofis.
# Confusio.	Diaphanum pro Pituitosis.
	Electivum pro Diapem ^a & Melanchol.
	Catharticum pro arumibus.

Solida cum Tabellā, sic

[Tabulatū electuā: de Succo Lepor. p Biliofis.
Diapartannum pro Pituitosis.
Electuā: de Citro pro Melanch. & pituit.

Pillulae rarissime & nisi in affectibus soporosis dissolvuntur.

Dulcorantia praeter haec cathartica semper sunt prescribenda, sicuti
Mel, Saccharum, — sed passim et usitate Syrupi & licet
interdum simpliciter alterantes prescribantur, quando liquor persic-
satis purgans, & vel catharticonum satis in eo dissolutum fuerit)
Sodis tamen frequentissime ii Syrupi prescribuntur, qui simul pur-
gandi vim habent, ut sunt Syrupus de Cicorico cum Rho.
[Syrupus Rosae solutivus quem
nunc in Belgio compositum
habent cum

[Rho,
Agarico,] vel singulis
Senna.] vel mixtis.

Quantitas vel Dosis horum purgantium, ^{vel electuorum} maior
vel minor est, prout liquor & ^{magis aut} delecto
minus fuerit purgatorius: Vbi vero cuiusmodi liquor vel nullam vel parvam
quam vim purgandi habet, tunc solvi possunt, si praescribantur

[Simplicia ut Castia, Manna, $\mathfrak{zj}$, $\mathfrak{zjss}$
Electuaria supra memorata ab $\mathfrak{zjss}$, ad $\mathfrak{zvi}$, vel $\mathfrak{zj}$.
Pulveres & Pillulae ad $\mathfrak{zj}$ vel $\mathfrak{zj}$.
Syrupi ab $\mathfrak{zj}$ ad $\mathfrak{zjss}$.

71c

MEDICAMENTA quae infundi sibi mace-
rari solent, sunt

Agræus.	℥v.
Senna.	℥vi.
Rhabarbar.	℥iij. ad vi
Tarbit.	℥j.
Scammonium	℥ss, vel gr. xiii
Hermodactylus.	
Myobalani.	℥iij.
Tamarindi.	℥ij.
Psyllium.	℥j.
Famaria.	℥j.
Aloe.	℥ij.

et alia permixta sibi ciuere calidos temperat
aliquantulum uapore idoneo, ut vis resinosa
corrigitur.

Nb. Rhabarbarum infundi, non coqui debet, ne vis
purgandi, et exloquatur evanescat.

Senna de coqui, non infundi debet, quia multo
coctum relinquit liquorem. sic Riel: 13.14.
contra apud nos coquunt saepe Sennam, et
relinquunt in infusione eam Rhabarbaro.

74d

the ... of ...
...
...
...
...

℥. Fol: Senna, etc. si decoctio ad
 ℥ij. In Colatura infunde Rhabarb.
 (v. g.) ℥ij. Spica Rardi gr: viij. Ex
 pressione facta, dissolve Diapremi
 solutivi (v. g.) ℥ij. Syr: Rosat: solut:
 ℥j. Misc: si. potio, quia detur
 coas mand cum custodia & regimine
 artis.

Si vero fiat decoctio Magistralis
 cum infusione in Aq: still. Hac
 formula prescribitur. ℥. etc.
 si. decoctio ad ℥ij. In Colat: dissolve
 Rhabarb: (v. g.) in Aq: Cicborij cum
 Spica infusi & expressi ℥j. Electi
 ary de succo Rosar: ℥ij. Syr: de
 Cicborio Compos: cum Abto ℥j.
 Misc: si. potio. Quia detur, etc.

Si fiat ex decocto Officiali cum
 infusione in Aq: still. Hac for
 mula prescribitur. ℥. (v. g.) Rhab:
 electi & Agarici trochiscati an ℥ij.
 Cinnamonli ℥ij. Infundant in Aq:
 Rotonica, expressione facta dissolve
 Electuarij Diacasthami & Diaphan:
 an ℥ij. Syr: Rosat: Solutivi ℥j.
 Decocti communis Medicinæ purgant: ℥ij
 vel Deccti Pectoralis cois purgantis ℥ij.
 Misc: si. potio. Quia detur, etc.

Nota interdum nulla Electuaria
 prescribi, quando sc. benignius est pur
 gandum: sed tantum Decoctum,
 Infusionem & Symplicium.

Ex duabus tantum preparationibus
 conflata actiones duplices sunt. vel
 sc. ex decoctione & dissolutione, vel
 ex

ex infusione & dissolutione.

Ex decoctione & dissolutione fi-
unt Potiones hac formula. ℞. et.
Infundant, et. Expulsionem facta
dissolve Electuary, et. Syrupi et.
Misco, fi. potio.

Ex unica tantum preparatione
fiunt Potiones, quæ simpliciter dissoluti-
one constant, quod fit in Casibus
valde urgentibus, ubi decoctionibus aut
infusionibus tempus non suppetit,
& tunc Elect: purgantia dissolvunt
cum jusculo, vel Aq: appropriata, ad ℞j.
aut ℞j. Hac formula. ℞. Electua-
ry (v. G.) Diacarthami ℞j. detz cum
jusculo. vel ℞. Elect: et. Syr:
rosati solutivi ℞j. Aq: (v. G.) facta
nica q. s. Misco, fi. Potio.

Interdum dissolvit Rhubarb: pul-
verizat: cum jusculo. In Diarhea vel
Dysenteria. Hac formula. ℞. Rhubar:
pulverizati ℞j. detz Coas manu
cum jusculo. Datur ad ℞j. pulveris
qui ferri nequeunt vehementiora Ca-
thartica. Pueris etiam exhibet Māna
cum jusculo dissoluta ad ℞j. et Gran:
diaribus in affectibus Pulmonibus, ad ℞j.


ubi purgandum et ad
stringendum simul.

aliquando etiam Pulvis
Meibomianus ad educendos
pituitosos et seras humores
Pillulae vero rarissime dis-
solvenda, aut nunquam
nisi in affectibus soporosis

CAP: IV.

de POTIONE CORROBORANTE,
Somnia concil: Lumbricos ent: et

Potiones istæ, quia unicā tantū
dosi præscribuntur, sub Potionis titulo
exponuntur, licet hodie usus invaluerit
in fa-



76a

70
Juleps Arabum inventum est, vocantq; eo novu medicamentum fluidum,
delicatum & suavē. Reptoricorum Græcorum schola Ευδαμων appellavit.

Estq; duplex

Veterum Julepis propriè erat medicamentum, jecundum coctus
liquores grato suavisq; cum Saccharo in Symplici gela consistentiam
ducto, gentia oblectamenti potius quam medicamenti: quo
nimis delasatos argos delinquent. Ejusmodi duo olim
percelebres fuer, Violatus, & Rosatus seu Alexandinus,
qui Medicis Parisiensibus Julebas Regius dicti; quod is Regi
Francisco, litterarum patrono summo, esset in delicijs.

Recentiorum Julepus, sive hodie usitatus duplex etidem statuitur
[proprie talis, pilsorum more suavis et delicatus est, vis inha-
cendi saporis expert, ac instar Aquæ liquidus.
improprie talis Julepus qui sapis insuavis & ingratus est,
estq; julep tantum ratione formæ & compositionis, non
aliter ratione gratiæ ac suavitatis.

Eadem tamen utriusq; componendi ratio, ac Utendi modus.
Sens quam statuit. NO. 4 differentiam adterre conat frustra.

in facienda Medicina, ut sequent
 vocentur Julepi pro unica dosi, ad
 differentiam vulgarium Juleporum,
 qui ut plurimum pro dosi in prescribuntur.

Fiant. a. potionis ex Aq: Cardiac.
 ℥ij. Symp: Cardiaci ℥j. Confect:
 Cardiacæ ℥j. Pulverum Cardiac: ℥j.
 Hac formula. ʒ. etc. miscet et fi. potio,
 (vel fi. Julep: pro unica dosi) quam
 cap: tali hora. Omnis enim hora est
 huic remedio propinanda, sed potissimum
 mane et sero usurpatur.

Somnifera potio fit ex Syr: de Pa-
 pavere, ℥j. Aq: Cardiacæ ℥ij. Confect:
 Alchebrius ℥ss vel ℥j. Hac formula.
 ʒ. etc. m. fi. potio, quæ dets hac
 nocte, hora somni.

Potus contra Vermes fit ex Aqua
 Portulacæ aut Graminis ℥ij. Syr:
 de Limonibus ℥j. Confect: de Aya,
 cincho ℥j. Pulv: contra Vermes ʒj.
 vel alio modo consuevit.

Ad reliquas indicationes adimplen-
 das eadem ingredientium proportio
 perpetuo erit observanda, ut sint
 Aqua — ℥ij. Symp: — ℥j.
 Confect: — ʒj. Pulver: — ʒj.
 vel ad summis — ʒij.

CAP: V.

de JULEPIS. —

Julepus duobus modis componi solet
 nimirum, vel ex Aq: Stillatitij, vel
 ex

ex simplicium decoctione.

Prescribitur autem ut plurimum pro
III aut IV dosibus, ea proportionē ut
pro unaquaq; dosi sint Aquar: ℥ij
vel iij. Syr: ℥j. hac formula
℥ Ag: ℥c. M. si. Julep: pro tribus
dosibus mane & sero sumendus.

Interdum succi cum Aquis commiso
centur ea proportionē, ut pro una
quaq; dosi sint succorum ℥ss. vel ʒij

Nonnunquam etiam in Julepis
scribuntur Sp: vitrioli gutta aliquot, q̄
non determinants. Julepis dico refrigeran
tibus, sed hac formula usurpantur,
Sp: vitrioli q.s. ad certam aciditatem.

Ex decoctione Julepi componunt
eodem modo, quā Apozemata alter
rantia. Minori paullo simplicium dosi.
In eo tamen differunt, quod in fine
non prescribitur Clarificatio & pro
matizatio, sed talis eorum est formula
℥ Rad: ℥c. si. Decoctio ad ℥ij. In
Colatura dissolve Sympoz: ℥ij. M.
si. Julep: pro tribus dosibus mane &
sero sumendus in hoc post partum.

a. potest tamen in
dosim etiam prescribi
necessitate ita portu

℥. 2a. c. sumitur
Sympoz: part: iij.
Aq: part: iij.

a. quemadmodum et in
Bilepis scribitur malignis
suspectis scribitur aliquot
offendendum est et si
hoc est liquoris ℥ij. et
Aust: Rosaci: ℥j. ND

f. si media tantum
simplicium dosi.

ND hoc Julepis decoctio
tantum mane sumi
instar Apozematum.

CAP: VI. de SYRUPO ALTERANTE.

Syruporum duo sunt Genera, alte
rantium sc: & purgantium.

Alterantes Sympoz: raso componunt
a medicis, quia quamplurimum habentur
in Officinis ad oēs indicationes adim
plendas

Syr: (usuales) } alterantes
(magistrales) } purgantes

Serapia vel Sympoz esse Arabum in
cytura appellatio ipsa barbara satis
manifeste ostendit: veteres Graeci vix
movebantur.

Et autem
Sympoz medicamentum liquidum con
stant decocto vel succo aliquo, mello
aut saccharo conditum, & percoctum in
eandem consistentiam, uti extracta guttula
atq; refrigerata non amplius periclitat
sed diluti nullis crassitudinibus indurcat
ad humores quosvis alterandos, vel etia
expurgandos institutum. ND

Julepi rarisime Aromatizantur: si tu
libeat, aromatizantur gratiore quodam
Aromate vel pulvere ad ℥j pro dosibus
singulis. ND

Potiones Corroborantes nonnulli etiam
Julepos vocant: de quibus pag: Viced:

78a

Syrapi Magistralis

ex Decto Soli formula

℞. Rad. Arb. etc. si. Dectio in talis liq: q:
 de colatura caput, in qua dissolvat etc.
 si. Symplicia pfectis coctis, clarificatis
 & aromatizatis cula. etc.
 reponat in ampulla vitrea, in loco frigido
 de quo caput etc. cum etc. toties in die
 vel hebdomada.

ex Succo eoz vel

Soli, ℞. Succorum depuratorum etc.
 in quibus dissolvat, etc.
 A. Symplicia, etc. ut supra.

Quando alia in eo decoquantur vel infunduntur

℞. Succorum depuratorum etc. in quibus
 vel decoquit, vel infunde, etc.
 de colatura caput, etc. ut supra.

plendas idonei.

Idco nunquam aut rarissimo Sy-
rupi magistralis alteratis prescribunt,
sed solum officinalis usurpantur: idq
dupliciter, vel enim in alijs liquoribus
dissoluntur, vel soli & per se exhibentur.

Quomodo in alijs liquoribus dissol-
vantur, supra monstratum est in Apoc
Zemate, Potione & Pulpo.

Sed praeterea dissolvere solent nonnulli
Syrupi in Aq: cor vel Ptisana ad re-
stringendam sitim: tales sunt Syr:
de Capill: Vener: de Linonibz, &

Cydoniorum in Alvi fluxu, & solent
prescribi hac formula. ʒ Syr: (v. g.
Capillor: ʒ) ʒiij. utatur cum Aqua
potabili sitis tempore, extra partem.

Soli & per se exhibentur in Affectibz
Ventriculi & Pulmonum potissimum.

In Imbecillitate Ventriculi frequen-
tissimus est Syr: de Absynthio, qui man-
exhibetur per se hac formula,

ʒ Syr: de Absynth: ʒj. Cap: man-
alvus horis ante pastum, continuando per
triduum.

In affectibus Pulmonum prescribunt
Beccici Syrupi, hac formula.

ʒ Syr: de Thsilagin: (v. g.) ʒiij.
utatur frequent ex coactuari sensu labendo.

CAP: VII.

de SYRUPO PURGANTE magistrali.

Syrupus magistralis eodem modo
componitur, quo Apocema purgans, et
ex ead:

Alterans magistralis constat
Deco alicujus, vel Succi alteratis &
Saccari vel Mellis in coligore dispo-
niti ʒ .ss. aq: (ʒiij ad iij)
Sic Succi acidi, Saccari dosis duplicat.
Si Syrupus etiam officinalis in li-
quore dissolvatur, Saccari dosis minu-
enda ad q.s.

ad Agrieta ac

ex eadem materia, pariq; simplicius
alterantium dosi; purgantia vero
dupla ferè Apozematis quantitate præscri-
buntur cum suis correctivis dupla etiã
dosi.

Intcedum efficacissimi componentibz
Syrûpi ex succis Herbarum & Fructuum
depuratis, in quibus purgantia insun-
dunt & decoquantz, & illi succi ad triduum
vel vi præscribi solent, propterea quòd
decoctione & infusione Catbareticorum
plurimum absumitur. Decoctio fieri
solet ad ℥j. vel ℥ijß. & in ea dissolv-
sacchari quantitate circiter Deccto pari.

Ut rectè decoctum præscribatz, tot
esse debent doses purgantium, quot sunt
Decocti ℥^a. Et Deccto tantum additur
Sacchari, quot sunt Deccto ℥^a. Postea
hæc ad consistentiam Syrûpi coquantz,
& usû observatum est, ut vi. pars in
decoquendo evanescat. Ita ut ℥. G. ex
Decocti ℥x, & tantundem Sacchari,
restent ℥xv. & cum tot sint doses
purgantium, quot erant decocti. Re-
quiritur quòd Syrûpi ℥ijß pro dosi sit
præscribenda.

Intcedum Syrûpi dissolvuntz pur-
gantes vel alterantes ad ℥v. vel vi.
& tunc Sacchari quantitas minuitur ad
quantitatem Syrûpi proportionata, quia
Syrûpius pro Saccharo habetur dissoluto.

Aliquando succi dissolvuntz ad ℥vi.
vel vii. quando in Agi Simplici facta
fuit Decoctio, & tunc nulli Syrûpi
dissolvi debent, sed solum Saccharum,

Nonnunquam in affectibz Pulmonum

frig:

frigidis, Mellis aliqua portio cum Sac-
charo conjungitur, sed valde raro; postea
coquitur in Symplicum, qui in hunc
aspiratur.

Dosis est ab ℥ss ad ℥ij. pro majori
aut minori efficacia Symplici, idq3 semel
aut bis in mense.

Sumitur tandem cum jussulo cum
herbis convenientibus alterato. Vel in
melancholicis cum Sero lactis aut
Decto florem & fructum cordialium.

Quia omnia hac formula prescribi solent
℥. ℥. si. Dectio ad ℥ij. in qua dissolvit
Sacchari albi: ℥ij. si. Symplicis pteit
colatus, clarificatus & aromatizatus cum
℥ij. (v. g. Cinnamon), qui servetur in
vaso vitreo, de quo cap. ℥ss, vel ℥ij.
bis in mense, cum jussulo (v. g. Fol:
Borag: Agglos: Capill: ventr: & Scabiops)
alterato.

Si ex sacris si. Symplicis, hac formula
prescribitur. ℥. Sacchar: depurator: etc.
In quibus deoquo Fol: Senna. etc.

vel ℥ij. prout fuerit purgatorius,
& habita. ratione aetatis, sexus, etc.
cum Sero lactis, vel jussulo palli
cum fol: Actosae, Borag: etc. alterato.

CAP. VIII.

de VOMITORYS.

Vomitoriozum compositio tam varia
& multiplex est, ut quæ certas eorum
componendorum regulas proponere valia-
mus, sed varia eorum formula ex varijs
authoribus erunt mutanda. Principia
tamen sequentes esse solent, quæ ex
triplici vomitoriozum genere, scilicet
Mitiorum, Mediorum, & Vehementiorum
desumuntur.

Mitiora

Utilitas, in morbis Cro-
nicis, etc. 440.
et Morbi:

Vitiosa fieri solent ex Aq: tepida
 & viij cum Oli, vel Butyri ℥ij. vel
 ex Aq: Rosd: tepida, aut jussu valde
 pinguis bene hausti. Vel ex
 Rad: Pyrenis ℥j. contusa & infusa in
 & viij Aq: Rosd: vel Hydromelitis. Vel
 ex Decoctione Sem: Atriplicis & B. Floe
 Ameth ℥j. ad & viij dissolvendo Oxy mel
 simplex, vel Syz: acetos: ℥ij.

Ufus horum omnium hac Prescribit
 formula. ℥. et. Si. Vomitorio, q
 sumatur tepida, deinde post ambula
 tionem paucam indatq: digitu in fauce,
 aut penna Oleo intincta Vomitu prociuit.

Medecina fieri possunt, ex Rad:
 Rapsani ℥j. Agarici & B. coctis in & x
 Aq: Rosd: addendo Oxy melit: Scillitic:
 ℥ij. Si crassa Pituita luxuriat. vel
 Syz: acetos: simpl: si Bilis exsperat.
 Vel ex Rad: Asari ℥ij. Sem: Vitice ℥B.
 Fl: Genista ℥B. coctis in & viij. Hydro
 melitis. Vel ex Rad: Asari ℥B.
 & B. in Aq: Hysopi aut mentha dispo
 nita.

Vehementiora fiunt ex Vitrioli albi
 preparat: ℥B. aut ℥ij. in siliulo dissolu.
 Vel ex Coeco Metalloz: alias Hepaz
 Antimony appellant a ℥j. ad ℥B. infuso
 in vini albi vel Aq: Cardui Benedicti
 ℥ij. cum poco Cinnamon.

CAP. IX.

de EMULSIONE.

NO.

Emulsio est medicamentum potulentum,
 ex metalla fructuum & seminum quo
 eundem pectoratum contusa aqua
 affusione iuxta lactis emulsim;
 huius nomen.

Emulsio

82a
Potentes nonnulli cientes affatim danda, et
tepidula asphmerica sunt.

fiunt emulsiōes hoc modo,
 Contunduntur semina in Mortario aëreo,
 delinco in marmoreo & gussidulā antipis
 affundit liquor aculeus, seu dictum, seu
 Aqua stillat., colantur, & vin d'ulcerant.

Op. Sem. Tr. frig. major: @ 3ib.
 Portulacae,
 Lactucar, @ 3i.
 causijse: contrisa fr. Emulsio cum Aq. Capill. P, Portul.
 contunduntur fresco modo, et contrahat
 cum contrahenda gussidulā in mortario, deus
 in marmoreo

twint-gestuk is des wijfel, dair natr is
 des mortire gietet dair op giet doctum rē
 gieten, contrahet onder machander, daer
 door is Frumyn gussidulā, & gussidulā
 ontsat, seer is d'ulcerandū.

Emulſio ſit ex Amygd: dulc: deco-
ticatis ad ℥j. ℥ſſ. ℥. Sem: frigidior:
maſer ℥ſſ, vel ℥j. Sem: lactuca &
Papav: albi, ubi adſint angilia, ℥ſſ.
Contunduntur omnia & diſſolvuntur
cum Aq: Hordei tibiſ. pro iii doſib:.
Et dulcorantur vel Saccharo ſolo, ad
℥ſſ vel ℥ſſſ. vel Syr: gentianib: ut
Violar. & Capill: Veneris. ℥ſſib: d.

Formula .a. preſcribendi talis eſt.
℥. &c. Contundant in mortario marmo-
reo ſenſim affundendo Aq: Hordei tibiſ.
in colatura diſſolvat Syr: violacei
Capill: Vener: an ℥ſſ. ſi. Emulſio
pro iii doſib: marm: & ſero ſumendis
Interdum nucle: Pin: piceis addunt
in affectibus Thoracicis.

Aliquando decocto Hordei additis Aq:
Roſaceæ ℥j. quæ ſuaviorum reddit emul-
ſionem.

Fructus ſunt Amygdalæ dulces & ſcenti
excocti, Sacchari, Piſtacia,
Nuclei Pinorum amara (et ma-
cerati in Aq: Violar: &c) ab ℥j
ad ℥ſſ.

Semina ut in textu. ad ℥ſſ.

Decoctum, vel eſt Hordei tantum,
vel Rad: Liquiritiæ, vel Piſtacia.
vel Decoctum Hordei, ſaccharum,
Piſtacia: Glycyrrhizæ, Rad: &
Sem: Althææ, Malvæ (in omnem
et veſicæ affectib:) ab ℥j ad tibiſ

Syrupi Violaceus, Xanthoxanthus,
de Althæa, de ſapubis, vel
aliis & ſcopum deſtinatis addunt.
Saccharum. ab ℥ſſ ad ℥ſſſ.

vel dicitur
ſi. Emulſio, de qua cap: ℥ſſ enim
decocto aut iuſculo pulli, hora idonea
ad ſcopum. — ſed tunc ſolum
℥ſſ decocti ſerviant, aliqñ facili
corruptæ ac ſitum traheret. NO.

* Sacchar: album, vel
Roſatum.
d. aliquando ſed carius
Violar, vel Manas
Chriſti perlatæ a
℥ſſ ad ℥ſſ.

Utilitas. 1491.
Mozell:

CAP: X. de LACTE.

Lact exhibitur Potbiſicis & Febr:
hectica conſumptis. Reliquis præſtat Ali-
mentum, ubi refrigerandum & detegendum:
Caprillum vero ubi nutriendum & reſi-
ciendum.

Preſcribitur illius uſus per menſem
integrum. Menſe maſc. præſertim,
corpore prius purgato: et exhibitus die
prima ℥ſſ cum ſaccharo Roſæ, ℥j. au-
gendo ſingulis diebus ℥j. donec ad ℥ſſſ
perveniat

peruenit, Sacchari quantitatē propor-
tionaliter augendo ad ℥ii. In eadem quan-
tate postmodum persistendo.

Horā assumenda oportet matutinā,
iv horis ante cibum, quibus neq̃ dormiat,
neq̃ vehementius sese commoveat.

Formula .a. quā præscribit talis
esse potest. Utat̃ lacte Asinino ven-
centē ab ubere extracto, per mensem
integrum sumendo, prima die ℥iij, &
Sacch: rosati ℥j. augendo singulis diebus
Lactis quantitatē ℥ij Sacchari ℥ii. donec
peruenit ad lactis ℥viij. Sacch: ℥ij.
Ubi postmodum subsistat, eandemq̃
quantitatē assumat quotidie, iv
horis mane ante pastum, quibus
neq̃ dormiat, neq̃ sese vehementius
commoveat.

CAP. XI.

De SERO LACTIS.

Serum lactis etiam præscribitur vero
tempore per xv dies, aut mense integro.

In eo macerantur per noctes herbae
refrigerantes, ut: Fumaria, Cichoria,
Acetosae, ad mss. vel frequenter Epi-
thymum in Melancholicis ad ℥ss. In
quo casu dissolvitur etiam Succus Pom-
morum redolentium ad ℥j. Dosis est ℥viij vel
℥vj. mane iv horis ante pastum.

Tali .a. forma præscribitur, 2 Sero
lactis q.s. bulliat leviter & colat̃, & in
ejus ℥vj. macerent per noctem foli: et.
colatur mane, addendo Sacchari albi ℥j.
Capiat mane iv horis ante pastum, sin-
gulis diebus continuando per mensem integrum.

CAP. XII.
de DECOCTIS SUDORIFERIS.

Decocta Sudorifica vulgo componi solent ex IV præcipuis Sudorificis, ligno Guajaco, Safrasæ, Rad: China, et Salapazilla: ex quibus dicta tam Sudorifica quam Simplicia instituntur.

Quantitas Sudorificor: Prescribitur ad ℥iij vel vj. eaq; unius tantum vel duorum pro varia ægrotantis dispositione; hac perpetuo observatione, ut Guajacum in frigidioribus naturalis, Rad: China in calidioribus magis conveniat.

Postea infunduntur in ea Aq: fontis quantitate, ut pro singulis ℥ij Sudorificis sint totidem Aqua tb. Infusio .a. fit per xxiv horas supra cineres calidos, Ac tandem decoquantur ad medietatis consumptionem.

Dosis decocti est ℥viij, mane corpus tegendo plus solito, ut facilius sudores eliciantur.

Formula .v. prescribendi talis esse solet.
℥ v. 6. Casææ ligni Guajaci ℥iij. Corticis ejusdem ℥ij. infundantur per xxiv horas in ℥viij Aq: fontis, supra cineres calidos coquantur in vase duplici, lento igne, et sine fumo ad medietatis consumptionem, colentur per manicam Hippocratis, Colaturam servetis in vase vitæo, de qua Cap: ℥viij singulis diebus, mane corpus tegendo plus solito, ut excitentur sudores, corticem utando per xx aut xxx dierum spatium.

Aliquando pro delicatioribus decoctis
Jaleo

ad sudores movendos Primus, ℥viij.
Op. Sudoriferi Sæpartici, ℥viij.
Aque aut magis provocabit sudores quam Sapis Bægar. D. 31.
videtur et 1323. 1303.

dilcoratur Sacchari ℥ij, vel ℥iij et
Cinnamomi ℥ij.

Totum illud tempus, quo ager becto
illo sudorifico utitur, Diata appellatur,
propterea quod victus observatus valde
exquisitus, attenuans et exsicicans, et
pro potu ordinario praescribitur decoctum
secundarium, ex prioris residentia paratum,
quod et Bochetum appellatur.

Illud a. residentia vel sumitur sola,
vel ut efficacior decoctio evadat, additur
sudorifici recentis ℥j. infunditur per horas
viij in ℥xij Aq: Fontis, coquitur ad
iv. a. partis consumptionem, dilcoratur et
aromatizatur hac formula. ℥ Residentia
praedicta decoctionis, infundatur in
℥xij Aq: Fontis, supra cineres calidos,
per horas viij coquitur ad iv. a. partis con-
sumptionem: Coletur per manicam Hippocra-
tensis addendo Sacchari et Cinnamomi q.s. ad
saporis gratiam. Si Bochetum. Quo
utatur pro potu ordinario, toto diete
tempore, utendo interea Juncus bis cocto
et anisato, Carnibus assis et n. elixis,
hericulis montanis, Caryophyllis aut
Cinnamom: transfixis Passulis, Amyg-
dalis tocofactis, Nucleis Pinis, etc.

Si diata simplex instituenda sit, in
qua poones sudorifica non exhibentur, sed
victus tantum exsicicans cum usq
Bocheti praescribitur: tunc temporis
componitur Bochetum ex ℥ij sudorifici
infusi et decocti in ℥xij Aq: Fontis,
et reliqua eodem modo praestando, ut
in decocto ex residentia. Hac formula.
℥. V. g. Radicis China in taleosus li-
visa ℥ij, infundantur per horas xvj,
in ℥.

¶ xij. etc. si. Bochetum, Quo utat
pro putu ordinario per spatium xxx
aut xxx diem, utendo intus Pau
biscocto. etc.

Interdum & bectum secundarium
eodem modo parat ex recent. Sideri
fici & h. rejecta residentia prioris de
coctionis, eius virtus est fere depurata.

In omni diata Siderifica hoc ob
servandum, aliam fere perpetuo esse
astrictam, quia laxanda est iv. q. quos
die injecto Clyster Emollienti. Ac
propterea quia per Sideris tenuior tan
tum ma vacuatur, coarctior. v. remanet,
ideo consuetissimum erit viii. die priu
gans medicament. exhibere, abstinendo
tunc temporis ab usu ponis Siderifica.

CAP. XIII.

de DECOCTO GALLI VETERIS.

Usurpatur non raro ejusmodi deco
ctum in morbis chronicis, ut Melan
cholia hypochondriaca, Asthmate, &
Obstructionibz diuturnis. & paratur
duplex, Alterans sc. & Purgans.

Alterans componitur ex eadem ma,
qua fuit proposita in Apozem: alter
& pterea addunt Siderifica ad & h.

Maximè tamen differunt Prescribi
modo, nam in hoc deco Siderifica se
mina & Feructis prius prescribunt,
postea venter Galli Veteris impletur:
postea vero Radices, Folia, & Flores
decocto addunt. Hac formula.

¶ Rad. (China v. g.) & h. Semin. etc.
Contine

Gallus Anserodoni Gallus ueteris & quoniam sibi uisus
inducitur. Soli Senae, Epithymio, Capsi. G. Sen. Carthami.
Rad. Polygody, Uguirita, S. Anisi. Item decipiant
semper & uinum, extrahuntur per.
Specifica Gallis ueteribus inuget eis carum diuinitatem,
Pisum si equisanti forte addant quoniam pectoralis. M.

contundenda contendant, & miscen-
ant, oia simul, quod impleat ventre
Galli ueteris uiscerati, & antequam
singulethe chusu & uerberibus fatigati
fi. decoctio in q. s. Aq. Fontis (uel
quando sunt obstructionis, in tribus
partibus Aqua, & una uini albi.)
addendo Radic. Sc. Fel. Sc. Fl. Sc.
Cognantur donec Galli caro ab ossibus
separetur, Colatur dectum & for-
titer exprimatur, serueturq; in uase
uitae, in loco frigido, omni pinguedine
detracta, de quo cap. 2. viii omni
mori per multos dies.

Purgans eodem modo prescribitur,
addendo praedictis purgantia simplicia
eodem dosi, qua in Apozemate pur-
gant, & illa miscens cum his, quibus
venter Galli ueteris impletur.

Uulgo. a. in hoc Deco prescribi
solent, Senna, Polypodium, Rhabar-
barum, Cartbamm, Epithymus,
Agaricus, Thibit.

Formula huius decocti talis est.
℞. Sc. Cognant, donec Galli caro
ab ossibus separet, de Colatura capi-
tuli. qua seruentur in uase uitae,
in loco frigido, omni pinguedine
detracta, de quibus Cap. 2. B. Mani
per quatuordecim, singulis mensibus
repetendo.

CAP. XIV. de Iusculis.

Iuscula duplicia sunt, Alterantia
et u.

et Restauzantia.

Altrezantia fiunt ex Herbis conuenientibus, cum Pullo gallinaceo, vel iusculo cor, ita ut Herbarum sint ℞℥. vel ℥℥.

Omnium vulgarissima sunt iuscula in febris biliosis refrigerata, et calidis Hepatis intempiebus. Hac formula. ℞ Fol. Fe. Coquantur cum Pullo Gallinaceo, et si. iusculum. q. Cap. et manu continuando per octo vel novem dies.

Fiunt etiam interdum in Affectibus calidis Pectoris ex Thoracis simplicibus cum Pullo decoctis, quarta tñ parte Thoracis apozematis, quibus additur Radix China ad ℥j. ante alia simplicia prescribenda.

Sapē etiam usupantur iuscula aperientia ex Radicib: Herb: et Seminib: aperientibus. dicta quantitate cum iusculo communi semi-confecto decoctis.

Restauzantia iuscula componuntur ex Capone pingui exentato, et in fistula conciso, qui quidem ponitur sine ullo liquore in olla vitreata, ac, clausa et obturata, ne quid exeat; coquantur in B. M. ad pufum laginem, exprimatur succus, a quo pinguedo separatur; seruaturnq; in vaso vitreo et loco frigido ad usum.

Nominquam in iusculis et singulis adduntur Succus Cardiaci ℥j. vel ℥℥. Sacchari tantundem. Et utitur ager vel per se, vel cum iusculo.

Iuso

Prescripti huius Restitutiois formula
peculiaris non proponitur, propterea
quod ab illis, qui aegro ministrant, par-
tari solet; & Medici illius componendi
modum verbotenus tunc docere solent.

CAP. XV.
de Bolo.

Bolus duplex est, Purgans &
Corroborans.

Purgans fit interdum ex Cassia
sola ad ℥j. qui lenitioris tantum est:
vel ex Cassia ℥ss, cum alterius Opata
purgantis ℥ij, iii, vel ℥ss. Vel ex
Optatis purgantibus, una vel pluribus,
ad ℥ss. ℥ssj. vel ℥j. Vex ex Opatis
& Electuariis purgantibus ea propor-
tione, ut perpetuus sit maior Opata
quantitas quam Electuarij, et omnia
simul quantitas ℥i, non excedant.

Formula omnium horum talis E,
& Cv. g. Cassia recentior extracta) etc
cum Saccharo, si. Bolus, quem Cap.
mand cum Syr: Capill: & vel alio
convenienti & palato grato.

Interdum fiunt boli ex Terebintina
ad ℥ss. ℥ij, vel ℥j. ad Lenos deter-
gendos, quos abluunt vino albo, aut ap-
aliqua aperiente. Quor: formula talis
& Terebint: Veneta lota, de. si. Boli
qui nebulis involvantur, et ex Cochleari
cum Syr: Capill: & devorentur mane
iv aut v horis ante prandium, conti-
nuando per triduum.

Bolus

Bolus & Saccharo, quod
vixit una vice capere
magnam & excedat
modis p. 110.

Nebulas, R. 25 de 110
aut Obelia, ali. p. 110
Bela. Concretis, 110
misp. brodia. 110
patis mispale.

Bolus corroborans fit ex Confectione alicujus ℥ij vel ℥ss. Confectionis ℥ss, vel ℥ij. Pulveris ℥i. Hac formula. ʒ et c. cum Sacchari q.s. fi. Bolus, quem cap. mane dñi abús horis ante pastum.

Prescribi solet passim Bolus corroborans postmodum purgationis; ad ventriculū aliasq. partes corroborandas, quā purgatione molestiam subierunt.

CAP: XVI.

de OPIATA.

Opiata duplex est, Purgans et Corroborans.

Purgans composita ex Opiatis purgantibus Officinalibus, Electuariis purgantibus, Pulveribus Simplicium purgantium, et Symplo purgante idoneo, hac proportionē, ut pro singulis Opiatis ℥ss sint Electuarij ℥ij vel ℥ij, Pulver: Simpl: purgant: ℥i. Interdum fit tantum ex Opiatis et Electuariis, omis- sis Pulv: simplicibus. Alias ex Opiatis et Pulv: Simplicib: tantum, omis- sis Electuariis. Alias ex solis Opiatis.

Frequenter etiam, ubi benignior facienda est Opiata, Cassia portio opiatas permiscetur, vel sola, vel et cum Electuariis et Pulveribus purgatis.

Quantitas vero totius Opiatae ℥ij non excedat.

Electuarium molle generalius Opiata nominatur, in q. Opio constat (cum Sicuti Theriaca et Mithridat: etc) sed quod Opio consistentiam habeat. R. w. b.

Dose:

Electuaria quæ fiunt ex Pulveribus et Melle despumato ʒss. Pulverum partes unam, Mellis partes tres.

Dosis .v. ab ℥β, ad ℥j. per se in forma boli, vel cum Deco Herbarum appropriatarum, semel in hebdomade vel bis in mense.

Formula. a. prescribendi talis est. ʒ etc. cum Syz: (Solut: solutius. v.g.) fi. Opiata de qua cap. ℥β. (v.g. per se). vel dissolvendo in Deco Boraginis, Fumariæ, & Cicorij, semel in septimana, cum custodia & regimine artis.

Roborans Opiata componitur ex Conservis ad ℥j, ℥β, vel ℥ij. Condituris ad ℥β, ℥j. Confectionibus ad ℥ij, ℥β. Pulveribus ad ℥ij, ℥β, ʒij. cum Syzipo idoneo.

Interdum ad ornatum permiscetur foliola aut N. ij vel iij, & post pulveris prescribuntur.

Dosis ʒij vel iij, aut quod fuerit quantius ad magnitudinem Castaneæ, superbibendo liquorem convenientem. sc. Aq: Stict appropriatam, vel Vinum album, vel vinum rubrum dilatum.

Quia omnia hac formula prescribi solent, ʒ etc. cum Syz: etc. fi. Opiata: de qua cap. magnitudo Castaneæ singulis diebus mane & vespere horis ante prandium, superhabito vini diluti momento, vel superbibendo parum Aq: Boraginis. v.g.

Interdum prescribi solet assumenda ii horis ante cenam: si matutinis horis aliquod aliud Remedium sit assumendum.

92a
CONSERVA.

In Conseruis summius nullus praescriptus est modus;
usus hodie servat, ut mane & vespere melleis suglandis
quantitate exhibentis.

Nimingham cum his miscens Pulveres Aromatici,
& ut cum Saccharo vel Symplo appropriato fit
Mixture, q̄ etiam Conditum dicitur.

928

CAP. XVII.
de CONDITIS.

Conditum eodem modo fit, quo Opiata corroborans, eadem sc: Conservans, Confection: & Pulverum qnta, addendo Sacchari albi, vel Rasacei ad pondus omnium. Hac formula. ʒ. et. Sacch: colat: ad pondus om̃is. fi. Conditum auro coopertum. Quo utatur frequenter per se ex Cochleari, vel dissolvendo in jusculis, vel cum Ag: potabili sitis temporis, extra pastum.

In hoc tantis differt Conditum ab Opiata, quod hæc ad res partes p̃cipuas corroborandas, vel etiam alterandas praescribatur: Quod vero ad Cordis & Pulmonum affectus tantum inspicitur.

CAP. XVIII.
de ECLEGMATE seu LOCH.

Eclegmata solis affectibus Thoracis conveniunt, ad humorem in Pulmone contentum expectorandum, asperitatis leniendas, Haemoptysin compescendam &c.

Fiunt passim ex pulveribus Bechicis ad ʒij vel ʒss. Sacchari candi, vel p̃enidiati, vel Rosati taberi ad ʒvj. ʒij. Syr: convenientis q. s.

Vel praedictis addi solent frequenter pulpa fructuum, sc. Passularum, Finicium, Jugubarum ad ʒss.

Multis

Tabellae oblongatae minimum longae ex. Oleis Sparganis cum Saccharo,
sic fit Tabellatum Anisi, Elixophyll. Macis, Nucis, Melis: etc.
et preparatio est per gum. Sacchari. An: appropriata dispositio, et ad
tabellatum confectum est. Sumatur Olei gutt. $\overline{xx}$, aut $\overline{xvi}$, ad Si.
cum gutt. i. tunc per gran. Sabaud. molum ad $\frac{1}{2}$ lb. Sacchari, Si desit.

Tabella: 24. sunt
[rotula, quia rotundam ha-
bet formam.
Mozzelli (al: lozengia) quon-
iam longa est forma.

1 Dolls 8th 3rd, name will appear
in our 1st Dolls post card.

Multis etiam alijs modis Eclog.
mata parari solent, sed min⁹ usitate,
qua tamen apud aut bores varios videri
possunt.

Sequenti vero formula praescribi
biantur. 2. etc. cum Syr: etc. fi.
Loob. quo utatur sequenti cum
baculo Liquiritia sensim lambendo.

prostant tua eleganti
 sumi quovis hora: pro
 Loch de Papaveri, qui
 totum horam post canit

CAP: XIX.
de TABELLIS.

Tabellæ duplices sunt, vizzantes
et corroborantes,

Purgantes in Officinis habentur,
et nunquam aut rarissime Magistralis
prescribuntur.

Roborantes fiunt ex Pulv. Simpli:
vel Compositi &ß. ʒvj. Sacchari in
Aq: appropriata dissoluti & iiii. ʒvj.

Hac formula prescribuntur.
 ʒ. etc. fi. tabella ponderis ʒij, quā
 rium unam caput singulis diebus, si dori
 ante pastum, supbibendo, &c. eodem
 modo ac in Obiata corroborante.

*Fisunt etiam frequentes tabellae
ad affectus Pulmonum ex Pulveribus
appropriatis, eadem methodo.*

CAP: xx.
de PULVIS.

Pillula duplexes sunt, officinales
& magisteriales.

Officinales partim praescribunt in
affectibus febrilibus praesertim, & Hyemis
temp.

vel Tabulatum

94.

Pandaleon est chestnary solidi corporis integritate, & si
dividatur in partes quadratas, sicut Tabellae.

rotundas	— —	Rotulae, seu Cubiculi.
triangulas	— —	Lozengae.
oblongas	— —	Morselli, ali manifesti.

Constant. a. Pulvere, Saccharo,
et liquoris apto: ita quod
fit ad ℞j. Pulveris additis
Sacchari ℞j. liquoris .q.s. ad pastam consistentiam. R. 17. c.
vel etiam Sacchari ℞x, cum alia plus alia minus Sacchari
admixta. (plerumque quidem ad Spic. Roborant. ℞j,
aut Spic. Pulver. ℞j, additis Sacchari ℞j.

946

tempore, ad partes a ventriculo et
motas vacuandas.

Dosis eorum in Materia medica
fuit proposita.

Formula eas prescribendi talis ē.

℞. Massa pitt. etc. malaxentz cum
etc. (Aq. vel Sympo Rondo) formantz
pitt. vi vel vii deaurata, quas capiat
post primum somnium.

Si pitt. infirmiores videantz, ad-
duntz Diagridy vel Trochis: de Albā,
dal: gr: iiii, vel v.

Magistralis, quā a Medicis ad
varias indicationes frequenttē com-
poni solent, Usuales etiam vulgo
nuncupantz, quia eorum usus fre-
quens esse debet, sc. semel in sept.
vel bis in mense.

Componuntur ex varijs purgan-
tibus, Aloē, Agazico, Turbitz, Her-
mod. Rhubarb: Diagrid: Trochis:
de Albāndal. cum coctioivis, omniq;
in pulvrem redactis, et Sympo con-
venienti exceptis.

Omnium harum Pitt. basis ferē
Aloē esse solet, et prescribitz stat ad
℞iij vel ℞ss. Reliqua utro purgatio
simul sumpta ℞ss quātem n̄ excedant.
Correctiva. v. ad ℞i. ℞jss. Sympo
quātas non definitur, sed pro testia
parte totius massae habenda est.

Interdum ad Obstructiones purgan-
tibus admiscetz Gummi Ammoniac
vel Bdellium in aceto dissoluta
ad ℞iij vel ℞iij.

Dosis

≠ hemorrhoids aquam praeparat. succis
et Sympis: qd bis angeli. motis, d'g'is
molesta. ℞. hoc verum esse in
remollicenda massa cōposita; n̄ vero
in compositione. ℞. w. a.

Dosis pitb. mittenda est pro
purgantium efficacia, ita ut admodum
vehementer purgent, & 3ß vel ʒij
non excedant.

Hac .a. formula præscribi solent.
℞. Aloë Hepatic. etc. si omnium
pulvis, & cum Syr: (v. g. Rosat: solut)
si. massa pitb. de cuius ʒi formet
pitb. ʒj. deaurata. Cap. N.º 4
vel ʒij man. duabus horis ante præ-
dium semel in septimana.

CAP. XXI.
de TROCHISCIS.

Trochisci raro præscribuntur a Medi-
cis, qui officinalibus sunt contenti,
si quis tamen componere voluerit, id
facile præstabit sumendo pulveres
sua intentioni aptos, ad ʒij vel ʒ.
et excipiendo liquore convenienti,
aut mucilagine, ex quibus præmixti
fi. pasta, et ex illa orbiculi in
umbra exsiccandi.

CAP. XXII,
de PULVERIBUS.

Pulveres ad purgandum, corroboran-
dum, & alias intentiones præscribuntur.

Purgantes ex simplicibus gratioribus
gustui cum correctivis, & sac-
charo in delicatioribus. Quorum
Dosis erit mittenda pro purgantium
efficacia.

Summ.

Trochisci, cum suis presentat, triti ex Aqua aut Vno, aut alio
quavis liquore bibendi exhibentur. Nonnunquam autem
Autis, Saccharo, Pilulis, Clysteribus, Unguentis, alijsq. huiusmodi,
modi commiscetur.

Trochiscorum, qui sunt aliorum medicamentorum mixtionis similes,
Dosis est a ℥i ad ℥ij. At si insit Spiritus, Dosis a ℥j ad ℥ss.

Æly Vestij Trochisci Bechici.

* Nota, Moris est
apud Pharmacopos
ut ad ℥i pulvis
sufficiat ℥i. Sacchari,
et sic in his Trochiscis
sufficiunt Sacchari ℥ij.
vel ad minimum ℥ss.

℥. Spec: Diarrios
℥i. Sulphuris,
℥ss. Helenij sicut C. ℥ij.
* Sacchari ℥i.
Mucilaginis Tragacanthæ q.s.
formentis Trochisci parvi, et
signentur.

Suppositoria: 3^a. genera. Rhadam. n.

1. Levia, q^{ue} fiunt ex Rad: Bete, Cactis, vel Mercuriali
Lardo, Casto, Styracis h^um: ex Mellis
// Mellis perunctis.
S^uillo adipis sale consperso.
Fick inversa et Bals^um, adposito Sale
vel is Mellis et Sale.
2. Mediocria, q^{ue} fiunt, & Vitello Bos, Cocco, Sale et Mellis
vel is Mellis et Sale.
3. Visceraria, q^{ue} accipiunt Scamoniū, Euphorbiam
Elleborum, et ejusmodi pulsat^u

Suppositoria utrumq^{ue} acuminata p^{re}scribere solet
Henerius sūm patre, tūm filius, ut mellis a
phynctura p^{re}scribit, et chylū excludit
n^{on} excedentia quantitatē minimi digiti, neq^{ue} ita multū
causa. // debet. a. argri v^{er}is Springue desti, ne ad latere
quale hoc in Apocrypha. // illud.

2^a Spec: Huxa Ziss, Trich: Albund: & Drago: & p^{re}scribit
fi. cūm mellis mercuriale et Sale Genuae
poria N^o 4. utrumq^{ue} acuminata, parva
digiti magnitudinē. 1340.

mel melleo
mell. diffus. cum p^{re}scribit
Mercurialis.

Sarmentis .a. illi pulveris cum
jusculo vel alio liquore dissoluti,
manu cum custodia & regimine actis.

Inter pulveres roborantes sequen-
tissimi sunt Stomachici, qui vulgo
digestivi appellantur, fiuntq; ex Sto-
machicis suavioribus, ut Coriandro,
Aniso, Feniculo, Cinnamomo, etc.
ad ℥ij cum Saccharo aequali, vel du-
pla quantitate. Hac formula. ℞. et.
Sacchari albi ad pondus omnium (vel
omnium duplum) m. fi. Pulvis,
de quo Cap. 4. Coctus j. post singulos
pastus, nihil insuper bibendo vel edendo.

II. PARTIS SECTIO Secunda.

de Compositione Medicam: Mediorum.

de CAP. 1. ^{scilicet} SUPPOSITORYS. Glandib;.

Suppositoria ad alvum laxandam
vulgo usuepant: Interdum .v. licet ad
modum raro, ad quosdam Ani & In-
testini recti affectus.

Alvum laxantia componi solent
ex melle ad ℥j cocto & indurato, additis
pulverib; idoneis ad ℥j. vel dim.
Pulveres .a. illi sunt, Sal. Eoe, Hierapida-
cea; vel ubi fortius est agendum, Sal.
Gemmae, Ammoniac, Hierapida, Diacolo-
cynth: Helleborus pulverizatus.

Formula eor: talis ℞. et. fi. sup-
positoria, quorum unum Oleo vel Butyro
illitum misclat in anum, quoties opus erit.

vel coctis ad spiritum alvum in coctis
digitis attractis, tam admissis pulveribus.
Hinc Pyramides minimis digitis magnitudinis
fiant, et Oleo sed Butyro recenti illinunt.
Sennae: turt: 1292.

CAP. II.
de CLYSTERE.

Clysters alij sunt mollientes & laxantes, alij detergentes, alij abstergentes, alij anodynj & ad alias intentionis parati.

Mollientes & laxantes fiunt ex decocto Herbar: emollientium, sc. Malva, Althæa, Parietaria, Chamæmeli, Arthemisia. ad ℥j. vel ℥jss. Opiatis laxantibus ad ℥j. ℥jss (intendim Melle Mercuriali, Rosaceo, aut Violaceo ad ℥ij). Ol: filior: cors, aut Violacei ad ℥ij. Salis cors, aut Gemmei ad ℥j.

Quia vero decoctum emolliens in Officinis paratum hæc solet, idcirco nunquam præscribitur, sed enūciatur ad solutio.

V. Col. & Gaz

Hujus ergo Clysteris formula talis est. R. decocti cors emollientis Clysteris ℥jss, in qua dissolvit. et. M. fi. Clyster, qui injiciatur hora commoda.

Detergens Clyster componitur ex decocto Hordei, fuscis: macri, & Rosæ: rubr: an P. j. Si simul leniendum sit, Pl: Chamemeli: & plev: liloti præscribuntur ad P. j. vel ij. Si vero Lumbriici sint eliciendi in Pueris, adduntur Pascula & Ligustia, singul: ad ℥j.

Quantas Decoctionis Clysteris detergentis non excedat ℥j. & in ea dissolvatur Saccharum rubr: ad ℥ij.

vel citius

viser in regionibus n recipiunt altior
~~Exempli~~ ℥j, et Salis ℥ss. v. Hæm:
 max:

Clysters purgantes sicut oleis fieri non
 vult, & s. q. e. cum pinguis retineantur
 anm purgantem.

Clyster omnis tu requirit.

1. fiquorum. ut Decetum Pisonum, Cicerum, Phylli,
Gallinae, Capi, vel aliorum.
2. Medic: Purgans, quod dant secundum morbi exigentiam.
dum dupla dosi est
adhaerens.
3. Olea & Pinguiculae. q. etia pro morbi diuturnitate.
4. Salis generis, ut facultatis excretoriae excitent,
ac prout aliquando Mel, Saccharum, aut Alkyonem,
aut Vitelli ova: pro exigentia adijciunt.

Cons Clyster: regula. // Oleis vel Decet. ℥j.
Oleo: vel Ping: ℥ij vel iij.
Mellis aut Sacchari ℥ij, aut ℥j.
Vitelli Ova: n. ii aut iij.
Salis ℥j.

In Apoplexia cum vis retentrix admodum debilitata
sit, non excedat Clyster, ℥ss, ad ℥v.

2.^o Schaevel: etiam ad ℥vii.

at certe Pennum: p: 360. nimio plus hanc dose
supergeritis, cum etiam ad ℥v prescribat.

℥. 19. 6, Quantitatem Clysteris statuit

Augendum 1.^o quando etiam alius venire voluit
ut in ulcerib: ten: intestinor: & renib: dolet.
2.^o augendum & acendum, cum Virtus sopita
sit in Apoplexia, coma, letargo.

Minuendum, quando Clysteris distinctus ad-
tineri volumus.

≠ e
h.

Clyster
ad
ven
quam
can
pist
non
Clyster
F. 20

vel cum eo mel rosaceum diminuta
Sacchari dosi, dissolvatur etiam Ovi
vitellus $\mathcal{N}^{\circ}$ j. pro pueris. $\mathcal{N}^{\circ}$ vero pro
adultis.

Pueris etiam decocti quantitas minuitur,
ad $\mathcal{t}\mathcal{b}\mathcal{b}$. vel quart: $\mathcal{ij}$.

Adstringentes Clysters fiunt ex
decoctione Simplic: adstringentium, dosi
Apozematis paullo minori, et in decocti
 $\mathcal{t}\mathcal{b}\mathcal{j}$. dissolvitur Saccharum, Mel Rosat:
et vitelli Ovorum dosi praedicta.

praeferrea Symplic: Succi, vel Olea ad
stringentia, ut: Myrtin: Citonias: $\mathcal{L}.$ 19. a.

Anodynus Clysters fiunt ex lacte
Caprillo, aut Ovillo, vel decocto Capitis
et Intestinos: vervecis, ad $\mathcal{t}\mathcal{b}\mathcal{j}$. dis-
solvendo Sacchar: et vitellus Ovorum
dicta $\mathcal{q}\mathcal{u}\mathcal{a}\mathcal{r}\mathcal{t}\mathcal{o}$.

Interdum in gravissimis doloribus
intestinarum aut partium adjacentium.
(Acum $\mathcal{V}.$ 6.) dissolvitur Philonium
Romanum ad $\mathcal{z}\mathcal{j}$ vel $\mathcal{z}\mathcal{ij}$, aut Laudan-
um Opiaticum ad $\mathcal{q}\mathcal{r}$: $\mathcal{viii}$ vel $\mathcal{z}\mathcal{b}$.

Fiunt etiam interdum Clysters
nutrientes ex jusculo, Saccharo, et vitellis
ovorum, quibus aliquando ad corroborandu-
m dissolvitur Confection: Alchermes,
et de Hyacinthide $\mathcal{z}\mathcal{ij}$.

Ad Colicam dolorum praescribuntur
Clysters carminantes ex decoct: simplic:
Flatibus discentientium, quia sunt ea,
qua Pittuitam attenuant, eodem modo,
ut diximus in adstringentibus, dissolvendo
in decocto Ol: Rutaecum, Laurinum,
Anethinum, &c. ad $\mathcal{z}\mathcal{ij}$.

Decoctio Clysteris carminativa. $\mathcal{V}.$ 62.

$\mathcal{N}^{\circ}$ 299.

et Ol: Hedera. $\mathcal{D}.$ 6.

Cave ne oleum nimis calidum immittas,
Ne n. nova fibra attractio.

Glyster: $\mathcal{T}\mathcal{u}$. Epist.

magnopere extollit

Clysterem ex Vena plevra: et Oleo.

Ad Calu

Vel fiunt Clysters ad eundem scopu-
m, ex vini generosi et Ol: Nucum,
utrinusque $\mathcal{t}\mathcal{b}\mathcal{b}$.

Clysteris injeci possunt piloris $\mathcal{t}\mathcal{r}\mathcal{o}$, modo
diabulis, tribulis, aut $\mathcal{t}\mathcal{v}$ $\mathcal{b}\mathcal{b}$ is a cibo abstinent.

Cautiones istius probatur
 $\mathcal{L}.$ 19. b. c. 1345.

Clysmata nimis diu relictum
ad decoctionem proinde
debet, si Syringa, per
quam clysmata injiciuntur,
canalis proies indat
pistillo tum attigato
non modo atr sed et
Clysmata haerentur.
F. Flat: $\mathcal{u}$. p: 507.

Terebintina cum difficillime admodum
 decocto Clysteris admiscetur, Vitellum
 addere solent, et liquorem Rasinum
 affundunt, quemodo Caduorū Tere-
 bintinae fisci diuinae D. 22.
 aliquo sapissimum pharmacopola Noti
 compotis fieri nequeunt.

Ad Calculum Renium expellendum
 fiant Clysteres ex decocto apterientium
 dissolvendo Olea aperientia ad ℥ij. ℥iij.
 Quorum præcipuum est Ol. Scorpionum
 additur etiam Terebintina Vitello
 Ovi dissoluta ad ℥j.

CAP. III.

de INJECTIONIBUS.

Injectiones in partes varias fieri
 solent, Uterum, Vesicam, Anus, et ali-
 as partium cavitatis natura, vel
 morbo factas, ut fistulas.

In Uterum fiunt injectiones ad
 menses movendos, Sordes detergendas,
 Dolorem et inflammationis sedandas,
 et ad multas alias intentiones.

Fiunt. a. huiusmodi injectiones ex
 decocto simplicium idoneorum doxi
 Apozematis paullo minore, fit decocto
 ad ℥ij. quæ frequenter in Uterum
 injicienda per Syringam, quam Me-
 tenebyten vulgo appellant.

Vel fiunt tales injectiones ex succis
 Herbarum depuratis, vel ex Aquis Stills.

Et non raro in prædictis liquoribus
 quædam dissolvunt, ut Symplicia, Electua-
 aria, Trochisci, Pulveres, et similia.

Reliquæ vero injectiones eadem
 fere methodo præscribuntur, quia tan-
 sicut et prædictæ, quia sunt particula-
 ria remedia, ex Praxi particulari
 sunt mutanda.

CAP: IV.
de PESSARIIS.

Pessaria ad varios uteri affectus in illius Cervicem immittuntur, & in Crassioris longiorisq; digiti figuram efformantur, nonnunquam tñ instar globuli effinguntur pro Virginitatibus, ut facilius ab eis admittantur, & vasculia appellantur.

Fiunt. a. Pessaria primo vel ex Unguentis vel Opiatis solis ad ℥j. ℥ij. stupis mollioribus exceptis, & Panno serico vel linco involutis.

Secundo vel ex Pulveribus identis ad ℥j. ℥ij. mellis cocto exceptis, instar suppositorum, unde pessarium efformatur.

Tertio, vel ex succis Herbar: cotone exceptis ad ℥ij. quibus pulveres pro arbitrio possunt admisceri, ad ℥β, ℥vj.

Hac deniq; formula præscribi solent.
℥i. fi. Pessarium magnitudinis digiti crassioris, quod parvo serico involutum & filo alligatum in Uteri cervicem admittatur.

CAP: V.
de ERGIVIS.

Ergivum est medicamentum liquidum, quod natibus attractum hñ moris e cerebro, Pituitam potissimum evacuat, & ad multos etiam nervorum affectus usurpatur.

figuram habet prioris qd's apud Paracelm. xxiii. 47. posterioris. 41.

* aut infusum: expirat quidam pituitam, sed n. eam, quæ in vñ trientis cerebri consistet (ut Apoc phlegmatis vñ) sed q. circa cerebri substantiam, et cunctas meningis collas qd's, & fluitat. Pecun: p. 243.

Compo

Compositū ex Succis Hebeazū
Ezbinazūm, qui extrahuntur ex Fol:
contrafor: m. iij. Cūm Vini albi ℥ iij.
vj. viij. His ad correctionē, Fol: Cepha-
licor: m. j. Aq: vitæ nonnunquam ad
penetrandū ℥ j.

Vel ex decocto Simplic: Ponceorū,
dasi dimidia Apozematis ad ℥ iij. in
quō dissolvuntur interdū succi ad
℥ ij. ℥ iij. Mel compos: vel Syr: ad 3j.
3ij. Pulveris ad 3B. 3j.

Hac vero formula præscribi solet,

℥. etc. si. Ezbinūm, quō utatur
tēpore mane ꝛi horis ante pastūm,
ore prius, Aquā repleto: & capite in cen-
tricā reclinato.

Inspirando tūc Atrophē

CAP: VI.

de STERNUTATORIS.

Fit etiam Sternutatorium ad Pi-
uitam e Cerebro eliciendam, & Ce-
rebrī sopitam facultatem expultricem
irritandam in Affectibus Comatosi.

Componitur ex Pulveribus rerū
acriū, quales sūt. Piper, Pyritheiz
Sem: Sinapi, Sem: Staphys agriæ,
Rad: Hellebori albi, Euphorbiū.

Quantas horū omnium 3j. n̄ excedat
quibus addere potes ad Cerebrī defensio-
nem Majoranā sicca 3j.

Adverte Euphorbiū esse vībemen-
tissimū, nec ultra qz: ℥. vel iij. p̄scribi.

Formula præscribendi talis est.
℥. etc. m. si. Pulvis subtilissimū,
qui pennula insuffletur in narē.

CAP:

Liquorū ℥. iij. vicia infusio
sufficit: præcedente purgatione univēsa.

Estq: hocū usus in longis Capitis
morbis, p̄sertim Epilepsia, Moratus diffi-
cultate, natūm obstructione, & sceleris
vilgi antiquis.

Iniziamo, E. Atzberg vi ha ¹⁰⁶
 Zinda immutata.
 Ma tu ut prope capite gradat,
 pio acutus per te o hominis fons,
 ore in fines atq. Pan. 343.
 Sargina minus } vi agnat.
 Stomatodonta rapini
 v. D. P. Persim

1826

VIII.

In APOPHYGMA TIS OLLS.

Pini 399. mansu Martini

Grazum nostrum cibum

siccatum, Baccarum Oxii

acutis, Pyrethri, Scaphis

agria.

CAP. VII.
de GARGARISMA.

Gargarisma fit ad varios oris & partium adiacentium affectus, com-
ponitur ex dicto simpli: dosi Apozematis ad ℥j. In qua dissolvuntur Syr-
convenientes, ad ℥ij. ℥ij.

Quia vires frequentissimum paratur
Gargarismata adstringent: ad fluxiones
expellendas, ideo usitatissime in his
dissolvuntur, Diamorrum, Dianicum,
Syr: myrtin: et de Ros: siccis. Non
raro et Mel Rosaceum, ubi detergendus.

Fit etiam interdum ex Aq: Sticti:
ad ℥j. dissolvendo Symplos praedictas.

Hac denique Formula praescribitur.
℥ et. si Gargarisma, quo utatur, omni
hora.

CAP. VIII.
de MASTICATORYS.

Masticatorys etiam Pituita
copiose e Cerebro attrahitur: fiunt. a.
vel ex Rad: Pyrethri sola in fistula
concreta, et in Aceto macecata.

Vel ex multorum simpli: pulverib;
cera exceptis, ut inde Globuli confici-
antur. Illa. a. Simplicia usitatiora.
Rad: Pyrethri, Iridis, Zinziber, Sem:
Synapi, Staphys agria, Piper longum,
Mastix; quibus addunt Cephalica,
Gariophylli, Nux mesobata.

Pulveris quantitas non excedat ℥ss.

Cera

Fiunt et Gargarismata
ad pituitam e Capite
elidendam ex simplicibus
(q in masticatorys recipiunt)
solutis in Aqua quapiam
capitali
Masticatorys in eam
ceram.

quod talia
Gargarismata e Apo-
phtismatione vitandū
Catarrhus Throatidis,
et Palmonis affectibus
Gen: 344.

Cera quantitas non definitur.

Formula præscribendi talis est.

℞. Fr. omnium pulvis, qui cera
alba excipiat, fiantq; plures glo-
buli, quorum unus masticeatur manu
præo capite, sequentibus spicando.

* manu dico, compressa corpore acri,
quæ excruciantis, ac postea abluo
Vnde Os est Aqua, vel Melizato,
vel Stipula.

CAP. IX.

de COLLYRIIS.

Collyria pluribus formis componi
solent. sc. vel liquoris forma, vel li-
nimenti, vel Cataplasmatibus.

Usitatissima tamen sunt liquida,
quæ vero & proprie Collyria appel-
lantur. ~~Cogitatio~~

Componentes ex Aq: Stitt ad
℥ij vel ℥iij. Cui admiscetur pul-
vis conveniens. v. g. Tithia præpara-
ta, Trochisci albi Rhasis, Antimonium
lotum, Sarcocolla in Lacte Muliebri
mixta ad ℥i. vel ℥iij.

Formula horum præscribendor:
talis est. ℞. etc. Si. Collyrium, q
instilletur in Oculos manu & sero.

Reliqua Collyriorum formulae
ex praxi peculiari sunt desumenda,
propterea quod exquisitam Acmodi-
orum delictum, & exactam præpara-
tionem ac dosin desiderant ob extrin-
secæ partis sensum.

ODORAMENTA.

CALIDA.

FRIGIDA.

Lignum Aloes.
Cinnamom.
Macis.
Mastiche.
Mastichis.
Nigella.
Juniperus.
Genista.
Majorana.
Garriophylli.
Sadavum.
Lavendula.
Thys.

Kempbar.
Rosa.
Viola.
Santali.
Campbora.
Mandaagosa.

Ol: Violanum.
Ac Papaver.

Ung: Populeonis.

Melissa.
Corte Citri.

Nullo accedente igne Cere-
bum suo dore alterant.

Oleo vel liquor aliquo Resin-
ae formantur ad liquorem
vel angustia, vel forma:
si tunc excipiantur liquore.

Ubi horum est ad phlegmum odoris facitundum
perstentia contagia arcenda: tum den-
stillationis a capite ad pedes cohibendas,
si nempe naris admoveantur.

SUFFUMIGIA.

104

Salvia.
Rosmarin.
Macis.
Cinnamom.
Thys.
Majorana.
Basilicon.
Garriophylli.
Lignum Aloes.
Myrra.
Mastiche.

Trita illa excipiantur liquore,
ad, incendunt, aut ignitis
carbonibus insistentur.

// prout tota cum
odoramentis commoda -- vapor per os receptus
Atque ab eis conuenit.

Qui gratiora Roma odorifera voluit,
 nec Camporum, nec alia graviter obstita
 admittunt, sed potius Mosbum cum
 dimidia Sivetha quantitativ. quales 20. 70. 6.

Cavendum etiam ne Stybaci liquida,
 aut olei spica nimium addata, aut
 ima enim gutta totam massam corrumpet.

Ponderari etiam plerumque solet Communi
 odoriferum Zäpf.

11.^a PARTIS SECTIO Tertia.
de Compositione Medicam: Externæ:

CAP: 1.
de EPITHIMATE.

Epithema Cordi & Hepati potissimum admoveeri solet, ad partes illas alterandas & corroborandas. Et est duplex, Liquidum & Solidum.

Liquidum fit ex Aq: Stitb ad ℥viij vel ℥vj. Succis Siccitum (v. G. Limonium, Granatorum, Pomorum &c. dolentium) ad ℥ij vel ℥iij. Aceti Rosi ad ℥j. Eib. Pulveris Cardiaci ad ℥ij, vel ℥iij.

Nota, quando præscribuntur Succis Limonium, vel Granatorum, non esse opus Aceto.

Nota etiam, in Epithemate Cordis, si Pulmonis peculiariter sint affecti, acida non esse præscribenda, quæ sint Pectori noxia.

Item in Epithemate Hepatis majorem partem Succorum acidorum vel aceti esse præscribendam, quam in Epithemate Cordis.

Interdum præter Pulveris Cardiacos præmisceantur Confectiones Cardiacæ, Alebérnes vel de Hyacintho ad ℥j vel ℥ij. & Trochisci de Capryra in Epithemate refrigerante ad ℥ss. Crocus in calefaciente. ad gr: v.

Formula præscribendi talis est.
℥. etc. fi. Epithema liquidum applicandum

canthar.

candum regioni Cordis tepide, frequenter cum pannis Scazlatinis hoc liquore imbuitis & expressis.

Solidum Cordi tantum admoveatur, et componitur ex Conseruis Cardiacis ad ℥ij. Confectionibus ad ℥β. Pulveribus ad ℥iβ. ℥ij. Cum Aq: Cardiaca convenienti.

Formula illius talis est, 4. &c. cum Aq: (Rosaz: v. &c.) fi. Epithema solidum applicandum regioni Cordis, cum pannis scazlatinis.

Solidum hoc Epithema solum non raro prescribitur, ubi maior roborandi quam alterandi necessitas apparet. At vero liquidum nunquam usurpatur, quin post usum illius statim solidum admoveatur; ita solent Medici in illo casu liquidum et solidum consequenter prescribere, et in fine formulæ addere. Fi: Epithema solid: applicand: regioni Cordis statim post liquidum.

Ad Epithemata referuntur juniora Animalia per mediam secta, pulvere cardiaco conspersa, et Cordis regioni admoda; illa .a. Animalia sunt pullus Columbinus, aut Catellus.

Horum v. prescribendor: formula talis. Admoveatur regioni Cordis pullus Columbinus per mediam sectus, et pulvere Electuar: Cv. &c. Diamarg: frig: sinapisals. vel — 4 Pulv: Diamarg: frig: ℥ij. Sinapisets pullus Columbinus per mediam sectus, Regioni cordis Applicandus.

Interdum eadem animalia siccipiti raso admovent, pulvere Cephalica

conspersa ad cerebrum corroboran-
dum.

CAP: 11.
de FOMENTO.

Fotus fit in varijs partibus, sed
sequeñtius in laterē ad Dolores Pleu-
riticos, in Ventriculo ad corroborandū,
in Hypochondrijs ad obstructions sol-
vendās.

Pro laterē fiunt ex decoctis sim-
plicibus emollientibus, additis anodynīs
et resolventibus, quæ omnia dosi Apo-
zomatis fere præscribunt, hac formula
¶. Et. fi. omnium decoctio, quæ fo-
veatur latus dolens calidē frequenter,
cum vesica skilla hoc decocto semiplena.

Pro Ventriculo præscribunt, sim-
plicia Stomachica dosi Apozomatis mi-
nori: quibus addunt aromata, Gari-
ophylli, Nix moscata, Spica Nardi,
satis magna dosi, sc. singul: ℥ij, ℥iij,
vel ℥β. fi. decoctio in aq: partibus
Aq: fontis, et vini rubri adstringentis
sub finem additi, vel ubi magis ad-
stringendū loco Aq: Fontis Aqua fœ-
rata præscribenda.

Hujus Formula talis est. ¶. Et.
fi. decoctio in aq: partibus. etc. quæ
foveatur regio ventriculi calidē, longe
a pastu, duobus sacculis prædictis
simplicibus semiplenis.

Pro Hypochondrijs fit decoctio ex
simplic: aperientibus dosi prædicta,
admixt

admixtis quibusdam emollientibus,
in æq: partibus Aq: Fontis & Vini
albi sub finem additi, dummodo
calida intemperies non impediat.

Talis est hujus Formula. 2. &c.
fi. decoctio. &c. qua foveant Hypo-
chondria calide sequenter, cum filtris
imbatis & expressis.

Si alterum tantum Hypochondrium
laborat, prescribendum est ut foveatur
regio Hepatis, vel Lienis: prout hæc
vel illa pars fuerit affecta, admixtis
in decoct: h: simplicibus, qua partes
illas peculiariter respiciunt.

CAP: III.

de BALNEO.

Balnea parari solent ad multas
intentiones, sc. ad refrigerandum &
humectandum, mensis movendos,
conceptum juvandam, & ad externos
affectus, Scabiem & Elephantiasis.

Componitur ex Rad: iii. iv. vel v.
an lbj. lbjß. Herbis v. vi. vel vii.
singular: sc. j. Sem: a lbß ad lbj.
Fruct: a lbj. ad lbjß. Florib: Mij. lxxj.

Formula prescribendi talis est:
2. &c. fi. decoctio pro Balneo, quod
ingrediatz tepide sine sudore, bis in
die, per biduum aut triduum.

CAP: IV.

de SEMICUPIO.

Semicu

Semicupium nihil aliud est, q̄
dimidium Balneum, quo immergitur
ager umbilico tenus.

Componitur ex iisdem Balni
simplicibus; sed dimidia tantum dosi,
& sequenti formula prescribitur,
¶. etc. si. Decoctio pro Semicupio,
cui ager insideat a Genibus usq̄ ad
Umbilicum, mane & vespere longo
a pasta, p̄t biduum aut triduum,
vel urgente necessitate, si ad dolores
sedandos prescribatu.

CAP. V.
de OLIS.

Olea rarissime componuntur a
Medicis, quia in officinis ad oēs ferè
intentiones parata habentur, siq̄ tamē
artificialem Olea componendi rationē
desiderat, ita procediat. Primo
prescribat Olei cor̄ vel officinalis
unius vel plurium (lib. v. G.) Simpl:
pulverizat: & p. Succo, vini, vel alterius
liquoris ad Scopum facientis & p. & p.
Coquantur ad succorum consumptionē,
fortiter exprimantur, fiatq̄ Oleum
usui reservandum.

Si Olea officinalia sola, ut ferè
quenter fit, prescribentur: sive a Medico
seorsim componantur talis erit formula.
¶. etc. m. Inungatur talis pars can
lida vel tepida, ad motus linteis tepid
disscussis. Vel ¶. etc. m. si. Em
brochiatio, supra talis pars ad motus, etc.

CAP: VI.
de LINIMENTIS.

Linimenta vālgō fiunt ex Oleis
Officinalibus cūm Axūngijs, Būtyro,
Medullis aut Mucilagīnibus, ea pro
portione, ut sit Oleo: q̄ntas reliquorū
dūpla, unde Linimenti consistentia
emergit, quā est media inter Oleū
et Vnguentū.

Vel loco Būtyri aut axūngiarū
cera p̄scribitur ea q̄ntē: ut pro Olei ℥j.
sit cera ℥j. Passim tanus Cera
q̄ntas non definitur, sed p̄scribitur
in fine Cera q.s.

Interdūm Pulveres admiſcentur ad ℥j.
pro Olei ℥j.

Vel deniq; fit Linimentū ex Un-
guentis Officinalibus, cūm Oleis dūpla
q̄ntē, additis etiam pulveribus si libet
proportione dicta.

Q̄ntas Linimenti p̄scribitur, pro parti-
tis affecta magnitudine, passim tanus
ad ℥ij vel ℥j.

Formūla illius talis est. ꝯ etc.
fi. Linimentū: quō illinatū pars
affecta calido, admotis lintēis cali-
disculis.

CAP: VII.
de UNGUENTIS.

Componūtur vālgō Unguenta ex
Oleis, Pulveribus, et Cera, ea q̄ntē
et proportione: ut pro Olei ℥j. sint
Pulv:

Pulver: ℥j. ʒss. - Cera ʒij. Ut plurimum tamen Cera quantitas non definitur, sed dicitur. q. s.

Quantitas totius Massa pro partis inungenda magnitudine et temporis durabilitate praescribenda est ad ℥v. ʒvj. viij.

Formula vero talis est. ʒ. cr. fi. Unguentum, quo inungatis pars affecta.

Frequentius etiam fiunt Unguenta efficacissima ex Oleis ad ℥iij. v, tss. Pulveribus ad ℥ss. vel ʒvj. Succis dimidia Oleor: quantitate, vel paulo maiore, ita ut bulliant ad Succorum consumptionem, addendo postea Cera q. s. vel aliquando Unguenti officinalis, ad ℥ss. ʒij. Cera q. s.

Huius formula talis est. ʒ. cr. bulliant ad Succorum consumptionem, expressione facta dissolvat Cera q. s. fi. Unguentum.

Nota in praedictis Unguentis saepissimum misceri Pinguedines, Medullas, Butyrum et Mucilagines, quae pro Oleo sunt habenda: Gummata vera, ut Ammoniacum, Bdellium etc. Cera locum obtinere.

Fiunt et Unguenta ex Ung. officinali ad ℥ij. Oleis eadem plus minus quantitate, Pulveribus ad ʒij. ʒiij. Cera q. s.

Vel interdum Unguentum officinale solum sine ulla additione praescribitur.

CAP. VIII.
de ENPLASTRIS.

Emplastra vulgo componuntur ex Oleo, Pulveribus, & Cera: aut ipsa quae Olei consistentiam ferre habent, ut Axungia, Medulla, Butyrum, Maceilagines; aut ipsa quae Cerae naturam referunt, ut Gummata, Pix, Resina.

Horum talis est proportio, ut pro olei & sint Pulveris ℥vj. Cerae ℥jss.

Quantitas totius massa eadem, quae Unguenti.

Fiunt etiam Emplastra ex Emplastris officinalibus ad ℥j. ℥jss. Pulveribus ad ℥ss. vel ℥vj. Olea ad ℥j. Cera q:s. addendo Terebintina parum.

Vel ex solis Emplastris officinalibus, quae parti affectae proportionata.

Formula prescribendi talis est.

℥. etc. fi. Emplastrum, quod extēdat super alutam & tali parti applicetur.

Nota figuram Emplastri in multis partibus designari, ut in Sincipiti ad formam litterae T, vel etiam Ovalis figura; in ventriculi regione ad formam scuti; Lienti, ad formam linguae Bovis; uteri rotundum; Renibus quadratum; In alijs partibus non definitur, sed dicitur fi. Emplastrum magnitudinis debita.

Emplastrum & Unguenta cum Inger
 distincti si differunt in se invicem
 cognoscant possunt, ita ex Emplastro
 Diapalma, seu Diachalcit: Unguenta
 facere poteris, addendo li. Rosae: et simili
 disponendo. Contra ex Unguento Dia
 pompholygos (ex Unguenti constituta est
 serena) debet, cum omnia coctione nra
 omni terribili addita, formam poteris Em
 plastrum addendo plus Cera, vel etiam
 si visum, Specierum, et simili liquida
 ad ea miscendo apta coctione, nisi
 ut dixerimus adit, huius n. regit et
 adit.

Diapalm: 112a
 Diapomphol: 112a

1126

CAP: IX.
de CATAPLASMATE.

Cataplasma vulgo fit ex Radicib⁹,
Foljs, & Seminib⁹, & Fructib⁹, doli
Folis, quia decoquant^r in liquore ido-
neo, postea contundunt^r & trahunt^r
per setaceum, addendo Pulv: vel Fari-
naz: ℥ij. iij. vel iiii. Oleor: vel Axun-
giarum ℥ij. ℥iij.

Hac. a. formula praescribi solet,
℥. etc. decoquant^r omnia, pistent^r
in mortario marmoreo, & per setaceum
trahant^r, addendo etc. fi. Cataplasma
applicandum parti affecta.

Sapientius post usum fomenti Ca-
taplasma admoveatur, & ex illius resin-
dentia paratur, quando sc. intentio est
emolliendi, resolvendi, etc. Hac for-
mula. ℥. Residentiam predicti fomenti,
contundat^r in mortario, etc.

Interdum fit ex Fructib⁹ sub cine-
rib⁹ coctis, ut in Alvi fluxu & dy-
sentria ex Cydonijs coctis sub Cine-
rib⁹, ℞. iij. vel iiii. pro eorum ma-
gitudine, vel coctis ad ℥vj. ℥viii.
contusis & trahentis, addendo Pulveris
adstringentis dosi dicta, & tantillum
vini Rubri, si lubet.

Fit etiam in alvi fluxu ex cocta
Panis, in vino macezata ad ℥ss. vel
quart: iij. cui addunt^r Pulveris corro-
borantes & adstringentes ad ℥i. ℥ij.
vel

at in inflāmati oculis cum albūm: Ovi.
 & Aq: Rosac: oleū n. oculis n. fere.

Vel ad dolorē sedandū in in-
 flammationibūs fit Cataplasma de
 Mica panis vulgo dictū, ex mica
 Panis albi in lacte macerata ad lb̄.
 Vitellis Ovi n. 4. Cerei 2j. Non
 minquam Ol: Rosac: q. s.

al: vide apud Foetus T. 6.

CAP. X. de VESICATORIO.

Vesicatoriū duplex est, Officinale
 & Magistrale.

In Officinis habetur Emplastrū
 Vesicatoriū, quod frequentissimū præ-
 scribitur a Medicis hac formula.

4 massa Emplastro: Vesicatorij ʒj. ʒiʒ.
 extendatur supra alutā. si. Emplastro
 Magnitud: volæ manūs applicand: postea
 vtrū parti cervicis, vel alteri parti,
 si opus fuerit.

Magistralē præscribit ex fermenti
 acrioris ʒj. Cantarid: pulverizat. ʒiʒ.
 cum aceto Rosaceo fit Cataplasma ve-
 sicatoriū.

Interdū ad affectūs oculorū vel
 dentium applicant Vesicatoria ponē-
 aūt in formam semilunā, hac formula
 4 Massa Emplastro Vesicatorij ʒj. fer-
 mentū dno Emplastro ad formam Se-
 milunā, applicanda ponē utraq: aūrem.

CAP. XI. de SACCULIS.

Sacculi duobus potissimū interu-
 tionibūs præscribi solent, vel sc. ad
 humores

humorem frigidum, crassum & impu-
rum in aliqua parte resolvendum,
ut in Capite frequenter per diatas
sudorificas tales sacculi adhibentur
post assumptam sudorificam potionem.
vel ad roborandum Cor praesertim &
ventriculū.

Resolventes sacculi fiunt ut plu-
rimū ex milio ad ℥j. Sale cori,
ad ℥ss. Sem: discutientibus, ut Anisi,
Feniculi, Fenugraeci, Baccis Laui ad
℥ss, ℥viii.

Illi autem hac formula praescribun-
tur, &c. Torrefiant in Sartagine
sensim affundendo vini generosi q. s.
inclūdantur duobus sacculis, qui vi u-
cissim calentes applicentur, Aq: Vita
prius iezorati.

Roborantes fiunt ex Pulver: Rad:
Liq: Cortic: & Aromat: ad ℥ij. ℥ss.
quibus aliquando Pulv: Cyperi aut
Violaceus adjungitur ad ℥ss. Moschō,
Ambrā, ad qz: ℥ij. vj. ss.

Hac autem formula p̄scribi solent
&c. fi. omnium pulvis, q̄ exipiat
Cotonē Moschato, & cum patino serico
enbaco interposito fi. Sacculus, qui
collo appensus supra regionem Cordis
vel Stomachi.

CAP: XII. de CUCURBITA.

Sacculos roborantes amulatūz
Cucurbita cerebro roborando & cali-
faciendo dicata. Fit ex Cephalicis,
magis

magis odoratis: Nemp^o Radicibz ad
℥i. Folys ad ℥i. iii. Floribz ad
℥i. iii. Aromatib: ad ℥ss. Quibz
addi possunt Pulvis Violac: aut Cyn-
prius ad ℥ss. Storax, Benjainum, ad
℥j. ℥ij. Moschus ad ℥ss.

Formula autem talis est. $\mathcal{R}$ ex.
fi: pulvis, qui excipiat^r cotone^m Moscu-
chato, & cum panno serico int^rspuncto,
fi. Cūcupha supra caput gestanda, vel
pileo assuenda.

Aliquando duae praescribunt^r Cū-
cupha, una interdū altera de nocte
gestanda, & tūc pulve^r q^uantas est du-
plicanda; atq^{ue} ita praescribunt^r.
Fi. duae cūcupha, quarū una pileo
assuatur, altera de nocte gestet^r.

$\mathcal{R}$ q^uia tant^u pulve^ru^m
q^uo^d excedere non solet,
℥. 62. d.

CAP. XIII. de FRONTALI.

Admovetur frequenter frontale ad
Capitis dolorem sedandum & somnū
conciliandum, ex Sem: iv frigid: major:
Lactūc: & Papaver: alba ad ℥ss. vel ℥vj.
Floribz Rosarū, Violarū, & Nymphae
ad ℥ij. Addunt^r sepe ad rob^ur
Grana Obeames ad ℥ss. vel Pulvis tui^s
Santal: ad ℥i. Interdū Florū
Camamelī & Meliloti an P.B. q^ui
dolorem sedant, nec valde calefaciunt.

Formula horū talis est. $\mathcal{R}$
ex. fi. omnium Pulvis crassior, qui
includatur duobz pannis lincis, &
vapore^m aceti innotatis fronti applicet^r.
hora

hora somni.

Fit etiam frontale forma humida,
quæ ad Oxycodini naturam accedit,
& intentius refrigerat ac somnium
conciliat in Phreniticis & Febrilib;
ardentibus, aut diuturnis Vigilis.

Componitur ex Unguento Populeo
ad ℥j. Oleo Rosaceo ad ℥ss. Parti
dimidia albuminis uiniis Ovi, adu-
dendo parum Aceti Rosacei. Hac
formula. $\mathcal{A}$ &c. Agitans omnia
simul & excipians Stapis Cannæ
binis, ac Fronti applicens duob;
linteis inclusa.

Adduntur aliquando Conserva
Rosarum, Violarum ad ℥ss, vel ʒij.

FINIS.

viii^o Cal: April.

1627.

Alterantium

Temperatum dosis, a ℥i ad ℥ij.

Intemperatum, in gradu

primo, dosis, a ℥β ad ℥ij.

Secundo, dosis, a ℥i ad ℥β.

tertio, dosis, a ℥β ad ℥ij.

quarto, dosis, a gr. ij ad ℥i, // ℥β.

Purgantium

Gravis ^{¶ sunt tertia & quarta gradus magis coarctum a sua natura, adeoque}
minori dosi exhibenda, ¶ recte etiam mixtura adiunctam habent (at opus) minus

Primi mansionis

1. — ab ℥i. ad ℥ij, // ℥ij. — Syr: Rosar: solut: ma

2. — ab ℥ij. ad ℥ij. — Syr: Ros: — Mel Ros: solut:

3. — ab ℥ij. ad ℥ij. // ℥ijβ. — Manna.

Secundi mansionis

1. — ab ℥β. ad ℥ijβ. // ℥ij. — cassia, Tamarindi.

2. — ab ℥β. ad ℥ijβ.

3. — ab ℥β. ad ℥ij.

— Epithymus.

Terti mansionis

1. — a ℥i. ad ℥β.

— Myrobal: Citri, Rhabarbar:

2. — a ℥ij. ad ℥ij.

— Agaricus, Mebebens:

3. — a ℥β. ad ℥ij.

— Aloe, Senna, Polypos:

— Tribulus: Hermodact:

Lap: Aconit: Saxat:

Opoponax, Sagapinu:

Elleborus niger.

Quarti mansionis

1. — a gr: x. ad ℥β.


— Colocynth:

2. — a gr: v. ad xv.

— Scammon:

3. — a gr: ii. ad x.

— Euphorb: Esula.



Malva. mercenialis.
 Beta. Brassica. Blitum.
 Atriplex. Asparagus. Gaspula.
 Pruna dulcia. Sebasten.
 Cassia. Manna. Tamarindi.
 Ol. Amygd. dulc. Ficus ping. recta.
 Mala pinguis. Iuxa pinguis. {galli } imprimis.
 {lapi }
 Serum lactis, impr: Caprimum.

INDEURANTIA Gal: F. de simpl: med: facili: ex. sint
 Sicca, & Humida (ac frigida)
 qualia Sempervivum, Portulaca, Psyllium,
 Lenticula palustris Solanum.

LAXANTIA, calida. 1. aut 2. humectantia 2. alia:
 062 & leptomurea.
 qualia. Lilium. Semibulani, Farnigraei,
 Adipes. Butyrum, Ol: Chamamel:
 Celyphus, & similia.

RAREFACIENTIA
 moderat° calida, leptomurea, & minim° siccantia.
 Althaea, mercenialis, Anthem.
 Ol: Chamamel, Meliloti, Sambuci,
 Sem: Farnigraei, Lini. Ficus arbor.
 Ol: vetustius. Butyrum.

CONDENSANTIA.
 Aqua lustrar frigida, sed minim° astringentia
 Aqua frigida.
 Portulaca, Sempervivum, Psyllium, Myosotis,
 Tabula cordis, Lenticula palustris. Serum majus
 minus.

Myzobalana w.

Cebula,	Pituitas,	} erat clat.
Citrina,	Pituita	
Juda scutiger	melanchol	

Emblia.

The first of these is the fact that the
 number of cases of the disease has
 increased in the last few years.
 This is due to the fact that the
 disease is more common in the
 tropics than in the temperate
 regions of the world.

The second fact is that the
 disease is more common in the
 tropics than in the temperate
 regions of the world.

The third fact is that the
 disease is more common in the
 tropics than in the temperate
 regions of the world.

The fourth fact is that the
 disease is more common in the
 tropics than in the temperate
 regions of the world.

Oleum cum Praelo exprimendi modis.

Jos. Bapt. Porta. in Oleorum pretiosorum expressio-
nis huius (quales sunt Moschi, Ambrae, Zibethi) hoc
utitur organo.

Fiat aenea colummula altitudinis semipedalis, intus
inanis, palmaris diametri, crebris circumcirca foras
minibus perforata, cili lata fidelia supponitur labris cir-
cum cum undique crectis etidem aenea, cum suo canaliculo.

Repletur turriculis rerum exprimendarum, supra im-
ponitur ligneus modiolus, nex robusto torculo $\frac{1}{2}$ fortissimè
constringitur, e foraminulis Oleum effluet in fidelias,
et per canalem elicitur. Sed prius turricula
et lamina ferrea calefiant, donec digitorum tactum
vix ferant: ut liberius Oleum eliciatur.

Mesius in Oleo Laticino, meminit Torcularis plani et
cavi. Utroque tamen torculari commodius est praellum
Bibliopegorum: atque adeo jam in usu frequentissimum:

Amygdalas igitur probe tritas cilio ex seta equina
contexto involutas, assicula etiam calefacta utrim-
que minuit, post dicto praelo tradunt, contrahunt
praellum et flectunt, exprimuntque Oleum in Vas sub-
jectum.

N. Wöhr.

Confectiones Aromaticae Ambrae, Moschi, Galliae,
vel etiam Camphorae recipientes, etiam sine his odoratis
in usum mulierum Hystericarum fragrantemque horum
odorem non ferentium, commode parari possunt: Sicque
in Pharmacopoeis et cum his, et sine his duplici modo
requiruntur.

Rügästan:

Liquores destituti mitia commixtionis in
fraz feri lactis turbidi reddunt; sed lact
seunt affuso oleo $\frac{1}{2}$.



Ex libris
Joh. J. J.

123

Lapis Iunex admodum aptus ad detergendum
et polendum pergamenum, corium,
ad id ut quidam inscripta pergamenu hoc ipso
lapide deleant: nonnulli etiam barbam
inordinato loco praedentem tradaunt
also Stein, in ainer inl. geboüch by d. ger-maschels.

Terrebinthinam si laeves, noli confusim Aquam
aegilitem affundere, sed sensim & inter
valla pallulum, assidue spatula agitando.

Masticos & Bdellium cum a quibusdam
pillulis (v. G. Cochys) abesse dicit Galenus.
v. Ret. 624.

Muccilagines ut ex Sem. Cydoniorum,
& Sim: Pylly extrahant, hoc in
tegrum mantat, illud vero contundat.
Namque Pyllyum in intima subst. nimis
calat: adhuc difficulte admodum contun-
ditur, quod fit ut in compositione Regimeni
Nicolai hoc solum, & separatim a ceteris
speciebus contundi debeat.

Lac ubi Cataplasmatibus additis ad sedandos
dolores, coqui non vult. Fartst. exerc. p. 43.

Clarificatio, fit hoc modo. *Præm.* vel

Ovi albumen seorsim conquisitum, domo in spumam abeat, affundit sensim iugitandum, Decoctio aut Symplicia clarificandis; simul bulliant, et desumuntur: vel potius calidi & parum in angustis fiamatum coeunt. Contingit tamen, ut Herba alia cuius natura, aut alia accipiens clarificationem impediat: quoniam vix unquam in visum in si aliqua acidula, ut Siccus Limonium, aut illi affundunt, hinc n. partes Bettoque magis sequatur.

la Cœlæ.

Ab. Pulvisem probat clarificatio per digestionem in li. M. topiæ & borax zero v. Semart: inst. n. 2. Sic succi depurati optimi sunt. R. 204. & p. annu. haurant.

Infusio si fiat, affundit liquori (Sed p. scilicet, seu aqua p. arit. seu decoctum eligi potest) parum succi Limonium. sic multo melius ex Sena, Rhabarb. baro, &c. extrahit eis purgans.

Mon. la Cœlæ. plurimam infusionem in factam hoc modo. R. Sol: Sena, & S. Sena: Anisi parum, bulliant simul in syphoris alicuius s. q. () colatura & in infundit Rhabarb: & S. Cennam. aut Scamanti parum () stant in infusione, et eis conficit, & totas noctes si a. liqu. infusio liquor non sufficit, affundit d. m. aut v. p. p. aliq. p. d. d. Sena.

Gammata na, Arabic: Tragacanth: &c. si gaudet pulverisanda esset, in Hyeme expectantur.

At utro multo melius etiam vitatus pulverem optimo rediges in Mortario calido (et sic si factum in eo extraxeris) cum pulvis arctanti, et p. a. cineribus bene expurgatis cum sine & Cammibis.

la Cœlæ.

Nota quod Apozinata accipientia Bol tonicum siccam semper nigra sunt.

Vix pro Emplastis satis bene liquari non potest, nisi aliqd Aqua admiscetur.

l. H. ad morb. p. 2. p. 40. v.

ad reforg: Hepar. (122)
Foz: II. 115. 27/210.
ad  figuram fiat.
q tu n alio tuitus est, et primum
aliam subiungit, per Coado.

Saccubus, ad resurg: Hepar.

Fos. II. No. 27/210.

ad  signum fiat,

q. tñ in adeo tñtis est, ac primum
attñm subiungit, pro Corde.

1326



97. Suppositoria] officin: Balani,
Glandes Bell. Stesck-pillis.
G. suppositoria.
98. Masticatoria] Apophlegmatismi.
Commansa lati.
99. Clyster] officin: Enema, enema,
Ibidis Ægyptia inventum. id q p
Clysteris injecis. H. Pini.
- Ægyptia Clyster, Clysterium, instrumentum
ipsium, quo alvus cluitur. B. Custerio.
G. Clyster.
- Clyster Urethralis Celso. G. Urethralis,
Urethralis. G. Syringa.
100. Collatoria] qm proprie liquida sint,
caus assatissima. B. Ureth-
ralis dic posunt.
101. Pessarium] officin: Pessus Celso
de arbor. B. Pessum.
102. Perforatum] Ægyptia, H. Pini. q metu
forma naribus indit.
Nasali Barbaris id.

94. Pilula] a rotunda specie, pila
in tar, q corpora stip.
Catapotiūm Plini q Scriboni
describit, medicamentū q non
diluit, sed ita, ut est, assumit.
G. Pili, B. Pili, Pills.

490. 492.



FIGURÆ EMPASTRORUM Usualium



p. 110. LINIMENTA] quæ Linimenta impennit { Renti altiori — minora — }
 { hepati — — media — } te debent.
 Perenn. p. 03. c.
 { ventriculo, et
 ventri reliquo — latiora — }

Iquæ capiti affunduntur Olea, n̄ cohererent, q̄a rotundum et probe
 spazicium est, ob id ex alto per mediocrem lancē modum Syncephiti affunduntur.
 Perenn. p. 03. c. et Sylvi de medi. morb. int. p. 7. Aqua, succi, Olea, si ex alto
 torrentis in modum illidenda sint Syncephiti, unde id ipsum utile erit, si n̄ sit
 satis rariū, et lanca seu pumta corona cingere, ne humores illi prompto
 diffundant, reliquosq̄ corpori moliti sint.

cap. 90. CISTERES Ratio variorum locorum ut attingat a medicis, varias me-
 dicamentorum formas excogitare fecit. Unde: Pess. collo uteri —
Pess. recti } intestinis } inventa sunt.
Clysteris crassis }
Pessum: p. Os.

In partes capis ut aures, nates, os, utrum, &c medicamenta impellunt.

Aures, adieclatio Clysteris, infundunt.

Nares, { flatus per trachynam impellunt.
 { inspizanda attrahunt.
 { trahenda immittunt.

Os imposita, minime { gargarizantia.
 { per foramina palati expirant propelluntur.
 { devorant.
 { guttulatim deglutiant.
 { faucibus retenta sensim spirant trahunt in pulmones.
 { ore retinent, ut ventriculum vel cerebrum roborent.
 { fluxiones aeris temperant, cogant, ac reprimant.

In os et Fauces recepta communia sunt foraminibus

{ Palati. in quod efflati
 { Gutturis. in quod inspirata } ferunt. { ventriculo.
 { Gula. in quod deglutitione } qua coe sunt { Tenuib. Intesti.
 { } { ventis mesaricis.
 { } { Hepati.
 { } { Lien.
 { } { Toti deniq. Corpori
 { } { & Nari & Epur —

46. Rad. Poponis ad Si. vel ¹⁶⁴⁰ 31.

76. Ex infusum et dissolutione.
Si 71.

1436

